

### Example 01

```
x = range(0, 10)
for i in x:
    print(i)
```

Output

```
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

### Example 02

```
x = range(10, 0, -1)
for i in x:
    print(i)
```

Output

```
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
```

#With map (output based on Example 01 and 02)

```
def d1(x, y):  
    return x*y
```

```
def d2():  
    a = range(0, 10)  
    b = range(10, 0, -1)  
  
    multiples = map(d1, a, b)  
  
    for i in multiples:  
        print(i)
```

d2()

Output	Output Example 01	Output Example 02
0 ←	0 ← ★	10
9 ←	1 ← ★	9
16 ←	2 ← ★	8
21 ←	3 ← ★	7
24 ←	4 ← ★	6
25 ←	5 ← ★	5
24 ←	6 ← ★	4
21 ←	7 ← ★	3
16 ←	8 ← ★	2
9 ←	9 ← ★	1

```
#Without map
def d1(x, y):
    return x*y

def d2():
    a = range(0, 10)
    b = range(10, 0, -1)

    multiples = []
    for i in range(len(a)):
        multiple = d1(a[i], b[i])
        multiples.append(multiple)

    for multiple in multiples:
        print(multiple)

d2()
```

Output

```
0
9
16
21
24
25
24
21
16
9
```