



श्री अमृतम् इलेक्ट्रोहोम्योपैथी व नेचुरोपैथी क्लिनिक

(A Holistic Healing By All Alternative Methods)



डायबिटीज जीवन भर एलोपैथिक दवाओं पर निर्भरता बना देती है परंतु इन दवाओं के अपने साइड इफेक्ट्स हैं व ये अंग्रेजी दवाएं केवल टेंपरेरी इंसुलिन पहुंचाकर पेनक्रियाज को और निष्क्रिय ही बनाती हैं उसमें सुधार नहीं लाती। धीरे-धीरे डोज बढ़ता ही चला जाता है।

जब पेशेंट हमारी नेचुरल दवाओं को अपनाता है तो उसके पूरे शरीर में सुधार होता है। पेनक्रियाज को एक्टिव किया जाता है, लिवर को डिटॉक्स करके उसका फंक्शन सामान्य करा जाता है इसके साथ ही पाचन को सुधारना बहुत आवश्यक होता है यह भी इन्हीं दवाओं द्वारा संभव है। मेटाबोलिज्म बूस्ट करके सेल की सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सकती है इंसुलिन के प्रति जिससे 'इंसुलिन रेजिस्टेंस' कम होता है। ब्लड व लिम्फ को शुद्ध करके सारे शरीर को रोग मुक्त करते हैं यही हमारी दवाओं का सिद्धांत है। यही पेशेंट की हॉलिस्टिक हीलिंग कहलाती है जिसमें शरीर में हो रही कमी को दूर करके सभी ऑर्गन्स को सपोर्ट दिया जाता है, निष्क्रिय अंगों को सपोर्ट देने के लिए नार्विक सिस्टम को बल दिया जाता है। हम शरीर के एक-एक सेल की शुद्धि के लिए नेचुरोपैथी भी अपनाते हैं। तनाव को दूर किए बिना बीमारियों को क्योर नहीं किया जा सकता। पूरा शरीर एक दूसरे से लिंकड है इसलिए हम हॉलिस्टिक हीलिंग रोग द्वारा पूरे शारीरिक तंत्र को ठीक करने में विश्वास करते हैं जो साइड इफेक्ट्स दिए बिना केवल स्वास्थ्य में बढ़ोतरी करती है।

जाने डायबिटीज क्या है और क्यों होती है ? जानकारी ही बचाव का माध्यम है

आसान शब्दों में डायबिटीज को समझे तो यह शरीर की वह अवस्था है जिसमें बॉडी के ब्लड में तो बहुत ऊर्जा है, परंतु शरीर ऊर्जाविहीन है जैसे एक प्यासा व्यक्ति नदी के किनारे है परंतु कांच के बॉक्स में बंद है ताले की चाबी एक व्यक्ति 'इंसुलिन' के पास है। ऐसे ही हम जो खाते हैं वो पाचन क्रिया द्वारा ग्लूकोज में बदल जाता है जिसमें हमें सामान्य क्रियाकलाप के लिए व शरीर के हर अंदरूनी अंगों को काम करने के लिए ऊर्जा मिल सके। परंतु यहाँ एक शर्त यह है कि यह ग्लूकोज केवल इंसुलिन नामक हार्मोन द्वारा ही ऊर्जा के रूप में बदल जाएगा। चाहे कितनी ही ग्लूकोज पाचन द्वारा बना दिया जाए यह ब्लड तक तो आ जायेगा परंतु ब्लड से शरीर के रोम रोम में या हर अंगों में ऊर्जा पहुँचाने के लिए अंदर घुस नहीं पायेगा क्योंकि सेल यानी कोशिका पर एक ताला लगा हुआ है जो कि इंसुलिन नामक चाबी से ही खुलेगा। इंसुलिन हमारे पेट के लेफ्ट साइड में आमाशय के नीचे एक ग्रंथि में बनता है।

सामान्य स्थिति में हम खाना खाते हैं, पाचन होता है ग्लूकोस बनता है व इससे ऊर्जा बनाने के लिए इंसुलिन का उत्पादन उतनी मात्रा में होता है जितना ग्लूकोज बना है और हमें ऊर्जा मिलती है।


यह सामंजस्य बिगड़ जाता है तो डायबिटीज हो जाती है। जब ब्लड में शुगर ज्यादा है तो इन दो स्थितियों में से कोई एक स्थिति आपके शरीर में बन गई है।

पहली स्थिति:- अगर पेनक्रियाज पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाती तो पाचन से बनने वाली शुगर शरीर की ऊर्जा के लिए उपयोग में ना आकर ब्लड में ही घूमती रहती है और यूरिन द्वारा शरीर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है इसलिए इस रोग में ज्यादा यूरिन आती है और प्यास भी लगती रहती है क्योंकि शरीर ब्लड को साफ रखना चाहता है।

स्पष्ट है इस स्थिति को बनाने में पेनक्रियाज जिम्मेदार है जो या तो जरूरत से बहुत कम इंसुलिन बना रही है या बिल्कुल नहीं बना रही है, निष्क्रिय या शिथिल हो गई है।

जब बिल्कुल इंसुलिन नहीं बन पाता तब जब इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं इसे टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है। और जब जरूरत से कम इंसुलिन बनता है वह टाइप 2 में आता है।

डायबिटीज रोग को अगर हम आसान शब्दों में समझे तो यह शरीर की वह अवस्था है, जिसमें भोजन के पाचन से बनने वाली शुगर शरीर की ऊर्जा के लिए उपयोग में न होकर ब्लड में ही घूमती रहती है और यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाती है। जिससे शरीर ऊर्जाहीन हो जाता है और ब्लड टॉक्सिक हो जाता है [शुगर ज्यादा होने से]। शरीर के हर अंग के सेल (कोशिका) को काम करने या सही फंक्शन करने के लिए ऊर्जा चाहिये, जिसमें रूकावट आने से अंगों को काम करना मुश्किल हो जाता है व ब्लड में तय मानक स्तर से ज्यादा शुगर होने से उसका स्वरूप भी बिगड़ जाता है।



पैक्रियाज शिथिल या निष्क्रिय होने के निम्न कारण होते हैं:-

1. ज्यादा मात्रा में जो शक्कर, गुड़, मिठाईयाँ, चॉकलेट खाते है या जब बार-बार खाना या नाश्ता खाया जाता है तो पेनक्रियाज को बार-बार इन्सुलिन निकालने के लिए सक्रिय होना पड़ता है। जिससे ग्रंथि में थकान के कारण विकार उत्पन्न हो जाते है (जैसे बार-बार काम बताने से कोई गुस्सा हो जाता है) और इन्सुलिन निकालना बंद कर देती है।
2. बहुत ज्यादा मानसिक तनाव होना। तनाव से शरीर ऐसी स्थिति में आ जाता है जहाँ उसे किसी से लड़ाई करनी है (इसे फाईट व फ्लायट मोड कहते है) इससे शरीर ऊर्जा के लिए अपने-आप शुगर

अमृतम क्लिनिक


- का उत्पादन ज्यादा करता है और अगर तनाव लम्बे समय तक बना ही रहे तो शुगर लेवल ब्लड में बढ़ा ही रहता है।
3. चबा-चबाकर भोजन न करना व भोजन के बाद टहलना नहीं बल्कि सो जाना। इससे पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। एसिडिटी-कब्ज रहती है जिससे ब्लड बिगड़ जाता है और पेनक्रियाज पर बुरा असर पड़ता है, इसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है।
 4. फैटी लिवर या लिवर में कोई समस्या होने से वह पाचन में निकली शुगर को ग्लूकोज़ के रूप में परिवर्तित नहीं कर पाता, शक्कर के ग्लूकोज़ रूप को ही सेल व इन्सुलिन पहचानते हैं। लिवर उसका रूप नहीं बदल पाता तो यह शक्कर यूर नहीं होती है वस ब्लड में वैसी ही घूमती रहती है।
 5. किडनी की रक्त छानने की क्षमता कम हो जाए तो ब्लड में से एक्स्ट्रा शुगर साफ़ नहीं हो पाती।
 6. वंशानुगत (हेरिडिटरी)
 7. बाज़ार का खाना या पैकेट वाले प्रिजर्व्ड फूड खाना – इसमें घातक केमिकल व कलर आदि मिले रहते हैं। ये खराब तत्व ब्लड को खराब करते हैं। जिससे पैक्रियाज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसमें कितनी कैलोरी है यह भी नहीं समझा जा सकता है।
 8. पैक्रियाज पर काम करने वाली नर्व शिथिल हो जाये या किसी वायरस आक्रमण से ग्रस्त हो जाए तो भी यह काम नहीं कर पाती।
 9. पाचन खराब रहने से शरीर में विषैले पदार्थ बढ़ जाते हैं तब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कुपित होकर पैक्रियाज पर ऑटोइम्यून अटैक कर देती है और इसका फंक्शन प्रभावित हो जाता है।
 10. जब ऐसा खाना बार बार खाया जाए जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो, रफेज यानि छिलका व कच्चा पदार्थ ना हो तो ऐसा खाना तेजी से और ज्यादा मात्रा में शुगर बनाता है और पैक्रियाज इसे संभाल नहीं पाती इस खाने को हाईग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना कहा जाता है जिनसे मुख्यतः आलू, चावल, मैदा, कॉर्न, ब्रेड, मीठी चीजें, गेहूं आटा आदि।

दूसरी स्थिति :- [इन्सुलिन रेजिस्टेंस] दूसरी परिस्थिति शरीर के सेल द्वारा इन्सुलिन को रिस्पांस ना करना है।

अभी हमने देखा पैक्रियाज का गुस्सा होना अब एक स्थिति और बनती है जिसमें सेल खुद ही रूठ जाते हैं और अपना गेट नहीं खोलते इंसुलिन के लिए। मतलब इंसुलिन को रिस्पांस नहीं करते। अब इंसुलिन रूपी चाबी भी सेल का गेट नहीं खोल पाती क्योंकि सेल अपने ताले का रूप बदल लेता है। इस स्थिति में पेनक्रियाज तो अपना काम करती है परंतु सेल तक ऊर्जा नहीं पहुंच पाती इसे "इन्सुलिन रेजिस्टेंस" कहा जाता है क्योंकि सेल खुद ही मना कर रहा है, ऊर्जा लेने से और वही स्थिति बनती है जहां ब्लड में तो शुगर है परंतु शरीर ऊर्जाविहीन है।

इस स्थिति में व्यक्ति का मोटापा भी बढ़ता है और उसे भूख भी बहुत लगती है, इस कारण गले व कोहनी में कालापन आ जाता है।

इसके कारण ब्लड में - इंसुलिन की उपस्थिति है जो उपयोग में ना आ पाने से ब्लड में ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है इसके ज्यादा होने से शरीर में भूख के सेंसर जागृत होते हैं और भूख लगती है। इंसुलिन फैट जमा करने वाला हार्मोन कहलाता है यह अनउपयोगी ऊर्जा को फट के रूप में बदलकर शरीर में जगह-जगह जमाता है इसलिए व्यक्ति देखने में तो मोटा दिखता है फिर भी ऊर्जाविहीन होता है। यह भी टाइप 2 डायबिटीज में आता है।



कारण:-

1. इन्सुलिन रेजिस्टेन्स की स्थिति लाइफस्टाइल बिगड़ने से आने वाली समस्या है। आजकल व्यक्ति मानसिक परिश्रम ज्यादा करता है जबकि शरीर शारीरिक परिश्रम के लिए बना है। इस असंतुलन से रोग हो रहे हैं। इसलिए डायबिटीज आजकल आसानी से किसी को भी हो जाती है क्योंकि निष्क्रिय जीवनशैली है।
2. मोटापा व निष्क्रियता:- इन्सुलिन प्रतिरोध का प्रमुख कारण मोटापा और शरीर द्वारा हिलना-डुलना या परिश्रम ना करना है। इसकी पहचान में विशेष तौर पर कमर के आस-पास मोटापा रहता है। हर सेल के आस-पास फैट जमने से वह फैट के बोध से दब जाता है व इन्सुलिन को रिस्पांस नहीं कर पाता है, इसे दूर करने के लिए दिन-भर एक्टिव रहें जिससे सेल की सेंसिटिविटी बढ़ी रहे।
3. नींद की कमी:- नींद की कमी भी इसके जोखिम को बढ़ा देती है, यहाँ तक की एक रात की नींद की कमी से भी इन्सुलिन प्रतिरोध बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए नियमित व्यायाम करना जरूरी है और 7 घंटे की नींद लेना और बाँडी को डीटॉक्स करना जरूरी है क्योंकि सेल क्लीन रहेंगे तो इन्सुलिन के प्रति सेंसेटिव होंगे।
4. लेट नाईट खाना:- देर रात में इन्सुलिन का प्रोडक्शन कम होता है और हम रात का खाना देर से खाते हैं तो सुबह ब्लड शुगर का स्तर अधिक हो जाता है। प्रकृतिगत व्यवस्था है कि रात 11 बजे के बाद पाचन संस्थान शटडाउन हो जाता है। अब उत्सर्जन तेज व सक्रिय रहता है व शरीर की टूट-फूट मरम्मत का काम होता है इसीलिए शाम को 7 बजे तक खाना खा लेना चाहिये और 10:30 बजे तक सो जाना चाहिये।
5. वंशानुगत हेरिडिट्री
6. हाई B.P

डायबिटीज क्यों एक खतरनाक स्थिति है ?


हृदय पर असर:- जैसा हम देख चुके हैं इस बीमारी में ब्लड दूषित हो जाता है जिससे लिम्फ भी दूषित हो जाता है। ब्लड में ज्यादा मात्रा में शुगर होने से ब्लड का pH बिगड़ जाता है और ब्लड गाढ़ा हो जाता है यानी ब्लड टॉक्सिक हो जाता है ये ब्लड जिन नलियों में बहता है उसको भी डैमेज करता है और सूजन पैदा करता है जिससे नलियां संकरी होकर ब्लॉक हो सकती हैं और हार्ट अटैक का कारण बनती है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है।

किडनी पर असर:- इसके अलावा किडनी को बहुत काम करना पड़ता है ब्लड साफ रखने के लिए और उसकी खुद की खून सप्लाय की नलियां भी संकुचित होने लगती हैं जिससे किडनी फेलियर हो सकता है। ऐसे ही मस्तिष्क व आंखों की बारीक-बारीक खून की

अमृतम कि किफायत

नलियां चोक होने से ऑक्सीजन की सप्लाई वहां बाधित होती है तो आंखों में धुंधलापन व मैमोरी कम होने लगती है, पूरे शरीर का नर्वस सिस्टम भी खराब होने लगता है। जिससे इम्यूनैटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और व्यक्ति कई गंभीर बीमारियों की गिरफ्त में जल्दी आ जाता है और बार-बार बीमार होता रहता है। बीमारियां जल्दी ठीक नहीं होती।

कीटोन बाढ़ी बनना:- यह रक्त शर्करा बहुत बढ़ने में बनने वाली जीवन के लिए खतरनाक स्थिति है। जब शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज नहीं मिलता तो उसे जिंदा रहने के लिए शरीर अपने ही वसा, टिश्यू और मसल्स को तोड़कर उससे प्रोटीन व ग्लूकोज बनाने लगती है। इस क्रिया से एक जहरीले अम्ल का निर्माण होता है उन्हें "कीटोन बाढ़ी" कहते हैं। जब यह रक्त में मिलकर दिमाग तक पहुंच जाते हैं तो बेहोशी की स्थिति बन जाती है। किडनी फेल हो जाती है। इस तरह पूरा शरीर धीरे-धीरे अंदर से खोखला होता जाता है



टाइप 1 व टाइप 2 डायबिटीज़ में अंतर

टाइप 1 ज्यादातर वंशानुगत होती है। इसमें इन्सुलिन बिल्कुल नहीं बनता, ऊपर से इंजेक्शन द्वारा लेना पड़ता है। बच्चों में भी ज्यादातर टाइप 1 ही होती है।

इन्सुलिन रेजिस्टेंस जब होता है तो ब्लड में इन्सुलिन व ग्लूकोज दोनों ज्यादा होते हैं। अब इन्सुलिन ब्लड में है तो ज्यादा भूख पैदा करता है और शरीर में फैट स्टोर करता है। ज्यादा इन्सुलिन इन्फ्लेमेशन भी पैदा करता है, जोड़ों में दर्द और कई रोगों की वजह यह इन्फ्लेमेशन बनती है।

डायबिटीज के लक्षण:-

1. डायबिटीज में बार-बार पेशाब करने की जरूरत पड़ती है। जिससे शरीर शुगर को बाहर निकल सके और मूत्र सामान्य से गाढ़ा हो जाता है।
2. थकान और कमजोरी के साथ आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है।
3. बार-बार भूख लगना और मीठी चीजों के खाने की इच्छा होना।
4. त्वचा का संक्रमण बार-बार होना व खुजली आदि परेशान करते हैं। कट व घाव जल्दी ठीक नहीं होते हैं। त्वचा का सूखापन, गुप्तांगों पर खुजली होना।
5. हाई बी.पी. व आंखों में धुंधलापन हो।
6. वसा के पाचन होने में दिक्कत हो।

अमृतम क्लिनिक

7. पैरों में दर्द, वजन एकदम बढ़ना व कम होना।
8. सीढ़ी चढ़ने पर भी घबराहट महसूस होना।
9. झुनझुनी आना व विभिन्न अंगों में चीटियों के काटने की चुभन होना।

डायबिटीज रोग में सुझाव:-

1. डायबिटीज कम करने के लिए मोटे लोगों को वजन कम करने की जरूरत होती है।
2. सिगरेट व शराब पूरी तरह से छोड़ देना चाहिये।
3. एक बहुत नियमित व संयमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए जिसमें समय पर सोना-उठना, खाना-पीना, व्यायाम करना सब तय समय पर होना चाहिए।
4. सुबह के समय 45 मिनट मॉर्निंग वाक जरूर करना चाहिए।
5. गेहूं व चावल की जगह मिलेट्स का प्रयोग करें इनमें कार्बोस कम व रफेज ज्यादा होता है। रागी भी अच्छा खाना है। मिलेट्स को 7 या 8 घंटे गलाकर खिचड़ी या पीसकर रोटी बनाई जा सकती है।
6. दूध की जगह दही का प्रयोग करना चाहिए।
7. खाने के हर पोषण में प्रोटीन व रफेज [फाइबर, सलाद] शामिल होना चाहिए। दालें साबुत गलाकर खाये, मूँगफली, चने, ड्राय फ्रूट अच्छी तरह से चबा-चबा कर खायें।
8. खाने में रोटी कम और सब्जी व दाल ज्यादा रखें।
9. शक्कर के बदले सैक्रिन या 'शुगर-फ्री' का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके रसायन नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुँचाते हैं और कैंसर पैदा करते हैं।
10. प्राकृतिक रूप से पके मौसमी फल रोज दिन में एक बार लेना चाहिए।
11. रोटी का आटा, चना, जाऊ, थोड़ा सिका सोयाबीन मिलाकर पिसाए। अंकुरित चने व फल का नाश्ता करें।
12. कब्ज बिल्कुल न होने देना।
13. क्रोमियम एक ऐसा मिनरल है जो इंसुलिन को काम करने में मदद करता है। क्रोमियम की मदद से इंसुलिन कार्बोहायड्रेट, फैट [चर्बी] और प्रोटीन को शुगर में बदलता है और आवश्यकता पड़ने पर एनर्जी तैयार करता है। मैग्नीशियम, अल्फालिनोयिक एसिड, दालचीनी, विटामिन डी आहार में शामिल करने से इंसुलिन प्रतिरोध में मदद मिलती है।
14. बाज़ार का फास्ट फूड व पैकेज फूड बिल्कुल ना लें, बाज़ार में खराब फैट, तेल, घी व केमिकल यूज होते हैं खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए जो कि लिवर व पैक्रियाज की सेहत खराब करते हैं।
15. घर पर भी तली हुई चीजें व पराठें कम खाना है, एक बार तलने में उपयोग होने के बाद उस तेल को फेंक दें कोई दूसरा उपयोग न करें।
16. एंटीऑक्सीडेंट युक्त हल्का सुपाच्य खाना ही खाएं जिसमें सलाद हमेशा शामिल हो।

अभुतम क्लिनिक

Simple steps for prevention of diabetes



दवा लेने के आलावा कुछ घरेलू उपचार भी सहायक होते हैं

1. 6 ग्राम मेथी के दाने रात को पानी में भिगो दें। सुबह पीस छानकर कुछ मिलाये बिना लें।
2. जामुन की हरी पत्तियों को पीसकर दिन में दो बार लें।
3. जामुन के दस पत्ते, नीम की बीस पत्तियाँ, बेल के तीस पत्ते, तुलसी की चालीस पत्तियाँ मिलाकर सूखा लें और सुखाकर पीसकर शीशी में भर दें। एक चम्मच चूर्ण सुबह खली पेट ठण्डे पानी के साथ दस दिन तक लें।
4. अमरुद के पांच कोमल व ताजे पत्ते तोड़कर, धोकर रात को कांच के गिलास में पानी भरकर उसमें ये पत्ते डाल दें। सुबह इन पत्तों को इसी पानी में पीसकर पी लें। यह प्रयोग सुबह एक बार सात दिन तक करें।
5. सदा सुहागन (बारहमासी) के बैंगनी (चार पत्ती वाले) ताजे तीन तीन फूल तोड़ लें, एक कप गर्म पानी कर लें। दुसरे कप में फूल रख ऊपर से आधा कप पानी डालकर 5-6 मिनट रखें। फूल निकालकर फेंक दें और कप का पानी पी लें, शेष आधा गर्म पानी भी पी लें। 8 दिन इस प्रयोग को करके बंद कर दें। जरूरत पड़े तो फिर 8 दिन इस प्रयोग को करके बंद कर दें।
6. एक भिंडी के 4 चीरे लगाकर रात को एक गिलास पानी में डालकर रख लें। सुबह मसलकर छानकर पी लें। मधुमेह की बढ़िया दवा है।
7. दाना मेथी 500 ग्राम को 12 घंटे पानी में भिगो दें। पानी से निकालकर सूखा लें और महीन पीसकर चूर्ण कर लें। सुबह-शाम 1-1 चम्मच चूर्ण पानी के साथ लेने से लाभ होगा।

जुवेनाइल डायबिटीज

बच्चों की डायबिटीज को "डायबिटीज मेल्यूटस टाइप-1" या "टाइप-1 डायबिटीज" या "इन्सुलिन निर्भर डायबिटीज" भी कहा जाता है इसका कारण इन्सुलिन बनाने वाली बीटा सेल का ख़राब होना है। इस बीमारी को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर माना जाता है, जिसका कारण पर्यावरणीय है या फिर वायरस है जो की बीटा सेल को ख़राब कर देता है जिसमें बिल्कुल इन्सुलिन नहीं बनता पैक्रियाज में बीटा सेल ख़राब होने के बाद इन्सुलिन नहीं बना पाते। ये भी माना जाता है कि टाइप-1 डायबिटीज बच्चे के शरीर में विषैले पदार्थों के बढ़ने एवं संक्रमण से होता है विषैले पदार्थ इकट्ठे होने से ऑटोइम्यून अटैक हो सकता

अमृतम क्लिनिक

है पेनक्रियाज पर डायबिटिक पैरेंट [मधुमेह से पीड़ित माँ-बाप] के बच्चों को टाइप-1 डायबिटीज होने की अधिक सम्भावना है।

आमतौर पर जुवेनाइल डायबिटीज बच्चों को किशोरावस्था में होती है, किन्तु ये किसी भी अवस्था में भी हो सकती है। यह बीमारी मुख्य तौर पर उन नर्व सेल में खराबी आने के कारण होती है, जो पेनक्रियाज में इन्सुलिन को बनाने के लिए जिम्मेदार है। जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी के कारण इन्सुलिन को बनाने वाले नर्व सेल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जब पेनक्रियाज को कंट्रोल करने वाले सभी नर्व सेल्स खराब हो जाते हैं, तो पेनक्रियाज पूरी तरह से इन्सुलिन बनाना बंद कर देते हैं। इस कारण व्यक्ति को जीवन भर इन्सुलिन पर निर्भर होना पड़ता है। इससे जुड़े लक्षण हैं :-

1. बहुत प्यास लगना।
2. बार-बार पेशाब आना।
3. बहुत भूख एवं थकान लगना।
4. वजन में अनायास कमी।
5. घाव का धीरे-धीरे भरना।
6. त्वचा में सूखापन एवं खुजली।
7. पैरों में शून्यता एवं झनझनाहट होना।
8. आँखों में धुंधलापन।

हाइपोग्लिसीमिया

खून में जब कम मात्रा में शुगर या ग्लूकोज़ होता है तो उसे हाइपो-ग्लिसीमिया कहते हैं। यह अनियमित इन्सुलिन स्राव से होता है। ज्यादा इन्सुलिन बनना या बहुत देर तक भूखे रहना, इसका कारण है।

लक्षण:-

1. अचानक चक्कर व बेहोशी आना।
2. शुगर की ज्यादा डिमांड।
3. लगातार भूख लगना।
4. थकान लगना।
5. कमजोरी।
6. माइग्रेन।
7. मानसिक असंतुलन, नर्वसनेस और अनिद्रा। इन्सुलिन हार्मोन अधिक होने से शरीर फैट को जमा करता है। जिससे मोटापा आ जाता है।

कारण:-

1. पेनक्रियाज द्वारा इन्सुलिन का अधिक मात्रा में बनना।
2. वंशानुगत तथा संतुलित आहार की कमी इसके मुख्या कारण है।
3. शरीर में इन्सुलिन की अनियमितता होने लगती है और सदैव शुगर की कमी बनी रहती है।

अमृतम क्लिनिक,

सुझाव:- अचानक शुगर की कमी से चक्कर आ सकता है और बेहोशी भी आ सकती है, अतः बिना हिचक, जरूरत महसूस होने पर खाना खाये। हाइपो-ग्लिसेमिया वाले व्यक्ति को अपनी जेब में सदैव शुगर कैंडी रखनी चाहिए। जिससे किसी भी स्थान पर आवश्यकतानुसार प्रयोग की जा सके।

ऐसा भोजन खाये जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो तथा रिफाइंड कार्बोहायड्रेट एवं फैट की मात्रा कम हो। भोजन समय के बीच में खाने की इच्छा होती है तो इसके लिए नट्स तथा मूँगफली एवं अधिक विटामिन तथा मिनरल का सेवन करें।

पैन्क्रियाटिस

पेनक्रियाज एवं पैन्क्रियाटिस डक्ट में सूजन को पैन्क्रियाटिस कहते हैं। यह इन्सुलिन के अलावा कुछ पाचक एंजाइम भी बनाती है। इससे उन एंजाइम का रास्ता रुक जाता है, जिन्हे स्माल इन्टेस्टाइन में पहुँचना होता है। इसके कारण इन्सुलिन की उत्पत्ति में भी प्रभाव पड़ता है, जो शरीर में शुगर के लेवल को असंतुलित कर देता है।

लक्षण:-

1. नाभि के आस-पास दर्द, जो पीठ की तरफ बढ़ता हुआ लगे।
2. पेट में गैस बनना।
3. जी-मिचलना या उलटी आना।
4. बुखार।
5. मस्कुलर दर्द।

चूँकि इन्सुलिन व पाचक एंजाइम (ट्रिप्सीन, एमाईलपिणीक) स्माल इन्टेस्टाइन में नहीं पहुँच पाता अतः फैट नहीं पचते जिसके कारण कब्ज की भी शिकायत हो सकती है। इसके एंजाइम प्रोटीन व वसा को पचाते हैं।

सुझाव:- क्रोमियम [ब्रीवर्स यीस्ट में अधिक होता है], कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेचिथिन, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन – B₃, B₅, B₆, C, E, लें, इनसे राहत मिलेगी।

योग अभ्यास

निम्न योगाभ्यास व प्राणायाम नियमित करने से डायबिटीज रोग में काफी राहत मिलती है। इनसे पेनक्रिआज पर अच्छा दबाव आता है और उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है।

- 1.अग्निसार क्रिया 2.त्रिकोणासन 3.पादहस्तासन 4.वक्रासन 5.शशकासन 6.धनुरासन 7.उत्तानपादासन 8.उत्तानपादागुष्ठासन 9.पवनमुक्तासन 10.ताड़ासन 11.कटि चक्रासन 12.सूर्य नमस्कार 13.मरकट आसन 14.भुजंगासन 15.शलभासन 16.मंडूक आसन 17.अर्ध मत्स्येन्द्रासन 18.शवासन 19.भस्त्रिका प्राणायाम 20.कपालभाँति 21.अनुलोम विलोम।