


Dr. Abhilasha Chourasiya
BFRP (London) M.D. (A.M.)
Reg No. 23273/18



पेट के रोग

हमारा शरीर और दिमाग जिस ऊर्जा से काम करता है वह हमारे पेट के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। 90% रोगों की जड़ पेट के बिगड़े हुए स्वास्थ्य में होती है। इंसान को कितनी ही सफलताएं व खुशियां मिल जाएं पर अगर वह उसके आनंद को महसूस ना कर पाए और उसके मन में उत्साह, उमंग, हर्ष ना होकर सारा ध्यान पेट में होने वाली एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस पर बना रहे कब गोलियां खानी है इसके टाइम टेबल में उलझा रहे, तो यह खुशियां अधूरी है। क्योंकि उसकी ऊर्जा पेट से होने वाले डायरेक्ट व इनडायरेक्ट रोगों को ठीक करने में ही लगी रहेगी। खाना दवा भी हो सकता है और सजा भी। यह हमारी बुद्धिमानी पर निर्भर है कि हम इसका उपयोग कैसे करें। जरूरत से ज्यादा खाना हमेशा तकलीफ ही देगा। इसलिए 10 से 12 घंटे का ब्रेक होना ही चाहिए। शाम 7:00 से सुबह 7:00 बजे तक इंटरमिटेन्ट फास्टिंग होनी चाहिए। खाली पेट होना व भूखे होना अलग-अलग बात है। आपका ऊर्जा का स्तर गिरना भूख है हमें तब खाना चाहिए पर खाली पेट रहना अच्छी चीज है। आज विज्ञान भी स्वीकार करता है कि खाली पेट ही आपका शरीर व दिमाग अच्छी तरह कार्य करते हैं। हम सुनिश्चित करें कि हम जो भी खाएं वह दो-ढाई घंटे में हाजम हो जाना चाहिए क्योंकि शरीर में किसी भी तरह के सुधार व शुद्धिकरण के लिए पेट का खाली होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोशिकाओं (सेल) के स्तर पर शुद्धिकरण नहीं होगा और आप बहुत सारी विजातीय चीज इकट्ठा कर लेंगे और समस्या होगी।

पेट से संबंधित कई रोग होते हैं जैसे - भूख न लगना (एनोरेक्सिया), अपच (डिस्पेप्सिया), एसिडिटी, आफरा, गैस बनना, दस्त लगना, कब्ज होना (कॉन्स्टीपेशन), पाइल्स, वोमेटिंग, यह सब पेट के डाइजेशन से संबंधित प्रत्यक्ष दिखने वाले रोग हैं। इनमें से एक एसिडिटी दिखने में छोटा रोग परंतु कई खतरनाक स्थिति निर्मित कर सकती है। एसिडिटी के दूरगामी परिणाम में हड्डियां कमजोर होना याददाश्त व आंखें कमजोर होना, सिरदर्द, डायबिटीज, कैंसर जैसे रोग हैं।

डाइजेशन सही तरीके से न होने से खाना पेट में सड़ता है जिससे विजातीय पदार्थ 'आम' (टॉक्सिंस) बनते हैं व ब्लड में मिलकर भयंकर बीमारियां जैसे - गठिया, जोड़ों के दर्द, हाई बी.पी, हृदय रोग, डायबिटीज, फेफड़ों के रोग, अस्थमा आदि पैदा करते हैं। कब्ज से पाइल्स फिशुला, माइग्रेन, सिर-दर्द, कई ऑटोइम्यून बीमारियां जैसे - सोराईसिस, थायराइड, नार्विक डिसऑर्डर, अल्जाइमर्स आदि रोग होते हैं।

इस तरह की कई गंभीर असाध्य बीमारियों की जड़ पेट से शुरू होती है। पर आम इंसान इन्हें समझ नहीं पाता है और वो डॉक्टरों के पीछे भागता है और इन गंभीर बीमारियों को दबाने का प्रयास करता है, परंतु वह बीमारियों के मूल कारण को ध्यान नहीं देता। ना ही डॉक्टर उसे समझाते हैं।

परंतु अमृतम क्लिनिक में एक हॉलिस्टिक अप्रोच के द्वारा पेशेंट को ट्रीट करने के लिए उसके सभी एंगल चेक किए जाते हैं। कि रोग का कारण क्या है, मतलब रोग के जड़ों पर पहुंचकर रोग को ठीक किया जाता है। नेचुरोपैथी द्वारा बॉडी डिटॉक्स किया जाता है जिससे सभी अंग अच्छे से अपना-अपना कार्य करें। नेचर से जुड़कर किस तरह खाने को ही दवा बना सकते हैं यह भी बताया जाता है। अच्छे पाचन के लिए लिवर, आमाशय, पेनक्रियाज व आंतों को मजबूत किया जाता है जिससे पाचक एंजाइम बैलेंस में निकले और पाचन क्रिया मजबूत हो। और बॉडी में जिस मिनिरल व तत्व की कमी हो उसे पूरा किया जाता है।

इसके अलावा दिमाग के तनाव को कम करें बिना पेट के सिस्टम सही नहीं हो सकते इसके लिए हम शिरोधारा और कई रेमेडीज द्वारा रोगी को तनावमुक्त करके चित्त में शांति स्थापित करते हैं व मेटाबॉलिज्म बूस्ट करते हैं। योग थेरेपी में कुछ योगासन, जो व्यक्ति की स्थिति के अनुसार निर्धारित होते हैं, करना सिखाया जाता है जिससे आगे भी रोगी अपने आप को हमेशा स्वस्थ रख सकें यह ध्यान दिया जाता है।

अरुचि

अरुचि में भूख नहीं लगती व खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, स्वादिष्ट भोजन की सुगंध भी अच्छी नहीं लगती। यह किसी दूसरे रोग की वजह से भी हो सकता है, इससे रोगी दिन पर दिन दुर्बल व एनिमिक होता जाता है। यह समस्या मुख्यतः आमाशय से ही संबंधित है।

उत्पत्ति के विभिन्न कारण :- अरुचि की उत्पत्ति के शारीरिक व मानसिक कारण हो सकते हैं।

1. दूषित एवं तेल में तले, तेज मसाले युक्त खाना, बहुत गर्म खाना व गलत कॉम्बिनेशन का खाना आमाशय में पहुंचकर वहां स्वेलिंग (सूजन) पैदा कर सकता है व आमाशय के एंजाइम निकालने की गृथियों में खराबी, अम्लता में वृद्धि, गैस्ट्रिक कैसर, एनीमिया आदि विकार उत्पन्न होकर भूख खत्म कर देते हैं।
2. अत्यधिक अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स तथा खराब न्यूट्रिशन भी इसका कारण हो सकते हैं।
3. जब हम शोक, भय, क्रोध, व ग्लानि जैसे मानसिक तनाव की स्थिति में लगातार रहते हैं तो आमाशय की गृथियाँ पाचक रसों (एंजाइम) की उत्पत्ति कम करती है जिससे दिमाग में भूख का संदेश भी नहीं जाता और भोजन की सुगंध भी अच्छी नहीं लगती है।
4. बिना टाइम-टेबल के कभी भी उठना, भूख लगे तब खाना ना खाना, बिना भूख के खाना या और किसी की एलोपैथी दवा का सेवन करना भी भूख खत्म करता है।
5. कब्ज भी एक कारण हैं भूख ना लगने का, जब आंतों में शुष्क मल इकट्ठा हो जाता है, तब शरीर चाहता है कि ऊपर से कुछ और ना खाया जाए।

सुझाव :-

1. बहुत ज्यादा गरम पीने की चीज व गरम खाना नहीं खाना चाहिए, चाय-कॉफी व कोल्डड्रिंक्स से परहेज करना चाहिए। इनसे आमाशय की मसल्लस कड़क होकर प्रभावित होती हैं।
2. दो बड़े मील या खाने के बीच में 4 से 5 घंटे का अंतर होना चाहिए।
3. रात में सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय (7:00 PM-8:00AM) तक यथा संभव 10 से 12 घंटे का फास्ट होना चाहिए।
4. दाँत साफ करने के बाद जीभ की भी सफाई करनी चाहिए।

घरेलू उपचार :-

1. इमली या नींबू का पानक:- दो-तीन घंटे गलाकर, मसलकर व छानकर इस पानी में दाल-चीनी, छोटी इलायची, काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से अरुचि खत्म होती है।
2. अदरक का शरबत बनाकर पीना चाहिए।
3. भोजन से पहले नींबू के रस में अदरक के छोटे-छोटे टुकड़े, काला नमक, अनारदाना मिलाकर खाना चाहिए।

अजीर्ण

आमाशय में अच्छे से पाचक एंजाइम ना बनने से खाना ना पचने की शुरुआत यहीं से होती हो जाती है।

आमाशय की विकृति के अलावा लिवर की प्रॉब्लम से भी सही एंजाइम खाने में नहीं मिल पाते और खाना आमाशय में जब अच्छे से नहीं पचता तब आगे जाकर आंतों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। या तो यह अध-पका भोजन आमाशय में पड़ा रहता है और एसिडिटी उत्पन्न करता है। पेट भारी लगता रहता है।

अजीर्ण होने की दूसरी समस्या आंतों से भी हो सकती है। आंतों में भी अगर पाचक रस नहीं मिल पाते या आंतों में जो गति होती है, जिससे खाना आगे बढ़ता है (पैरास्टैल्टिक मूवमेंट) वो सही नहीं होती है या खाना आमाशय में जितना पच जाना चाहिए वो ना हो तो भी आंतों से संबंधित अजीर्ण होता है। इस तरह बिना पचा भोजन आंतों

में बहुत देर तक पड़ा रहता है, तब उसमें सड़न उत्पन्न होने लगती है। जिससे बहुत घातक 'आम' पैदा होता है, एक तरह का विष तुल्यपदार्थ बनता है। जो शरीर में सूजन पैदा करता है।

अजीर्ण की स्थिति में शरीर की प्रतिक्रिया दस्त लगाकर शरीर को साफ करने के रूप में होती है। इसलिए दस्त लग जाते हैं या कब्ज हो जाती है।

कारण :-

- ✓ आमाशय से संबंधित कारण व निदान "अरुचि" में लिखे हुए हैं। जिसमें उचित मात्रा में पाचक एंजाइम नहीं बनते हैं आमाशय में। कुछ लोगों में बिना भूख लगे भी हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की बुरी आदत होती है। पेट भरा हुआ है परंतु फिर भी खाते रहना गलत आदत होती है, भोजन पचाने की क्रिया 4 - 5 घंटे में संपन्न होती है, इसके बीच में ही जब आमाशय में पुराना भोजन पचाने की प्रक्रिया चल रही होती है व भोजन आधा पक चुका होता है तब उसमें बीच में और खा लिया जाता है तो पूरी प्रक्रिया बाधित हो जाती है तो अजीर्ण हो जाता है।
- जब अच्छी भूख लगी हो तब गरिष्ठ खाना भी पच जाता है, लेकिन जब जठराग्री जीर्ण हो, भूख ना हो तब हल्का खाना भी पच नहीं पाता तब अजीर्ण उत्पन्न हो जाता है व गैस होकर पेट फूलता है।
- भोजन करते ही बिस्तर पर जाने की आदत पेट की अतड़ियों को मूवमेंट करने का मौका नहीं देती हैं, विशेषकर ठंड के दिनों में, जिससे भोजन अधपके रूप में रह जाता है, हर खाने के आधे घंटे बाद 15-20 मिनट टहलना चाहिए।
- सूर्यास्त के बाद पाचन क्रिया अपने आप या प्रकृतिगत कम हो जाती है व सूर्योदय के दो घंटे बाद वापस तेज हो जाती है। यह 'सर्कैडियन रिदम' कहलाती है। इसलिए रात में देर से खाने से पाचन क्रिया पूरी नहीं होती है और अजीर्ण उत्पन्न होने लगता है।
- खाने से आधे घंटे पहले व खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए वरना पाचक एंजाइम डाइल्यूट (घुल) हो जाते हैं व अजीर्ण हो जाता है। इस समय के अलावा तीन लीटर पानी दिन-भर में पीना ही चाहिए।
- अधिकांश स्त्री-पुरुष अपने काम या मानसिक तनाव में घिरे रहते हैं व तनाव की स्थिति में जब भोजन किया जाता है तब पर्याप्त मात्रा में पाचक रसों (एंजाइम) की उत्पत्ति नहीं हो पाती है व अजीर्ण की स्थिति बनती है।
- भोजन में फाइबर की कमी व लिवर के एंजाइम की कमी (बाईल जूस) पेनक्रियाज के पाचक एंजाइम की कमी, खाना खा के ज्यादा शारीरिक व मानसिक परिश्रम करना आदि मुख्य कारण है खाने का पाचन सही तरीके से ना होने के।
- लिवर के रोगों की वजह से जब आंतों में पित्त नहीं पहुंच पाता तब खाना अधिक सड़ता है और मल बदबूदार हो जाता है और गैस बनती है।
- खाने में क्या खा रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि कैसे खाते हैं क्या जल्दी में, खड़े-खड़े, डाइव करते हुए, बातें करते हुए, मोबाइल पर ध्यान देकर कहते हैं। इन तीन स्टेप पर ध्यान दें।
स्टेप वन- खाना कितना चबा रहे हैं ध्यान दें गलत खाना भी चबाकर खाने से कम नुकसान करेगा।
स्टेप टू- खाना खाते हुए और कुछ भी काम ना करें, बातें ना करें किसी भी नेगेटिव थॉट या टेंशन से दूर रहें।
स्टेप 3- अपनी सभी सेंसेज को इवॉल्व करें क्योंकि सबसे पहले नाक व आंख से ब्रेन में सिग्नल जाएगा खाना खाना है। फिर मुंह व पेट में पाचक एंजाइम निकालने के लिए ब्रेन से सिग्नल जाएगा। अगर बिना महसूस कर सीधे खाने लगेंगे तो ऐसा लगेगा शरीर को जैसे नींद से उठाकर एकदम से किसी ने खाना खिला दिया जिस खाने को खाकर आप खुशी फील नहीं करेंगे वह पाचन में दिक्कत देगा।

सुझाव :-

1. जब अच्छी भूख लगे तब ही खाना खाये, दिन में केवल दो बार ही भारी खाना खाएं। बाकी समय फल व सलाद खाएं।
2. सप्ताह में एक दिन उपवास करें। शाम के खाने के बाद 500 कदम जरूर टहले।
3. खाना खाने के पहले 10 मिनट अनुलोम-विलोम प्राणायाम करें।
4. खाने का प्रथम पाचन मुंह की लार गंधियों से शुरू होता है। इसलिए एक-एक कोर को 32 बार चबाकर खाने से (ध्यानपूर्वक खाने से) कभी अजीर्ण रोग नहीं होता है।
5. खाना खाने बैठें तो कभी भी पूरा पेट भर-भर कर खाना ना खाएं, आधे पेट भरते ही उठ जाएं। क्योंकि पेट में बाकी की आधी जगह वायु व पानी के लिए खाली छोड़ना है ऐसा समझे जैसे आमाशय में मिक्सी के जार जैसी पिसाई होती है अगर पूरा जार टूंस के भर देते हैं तो वह भी नहीं घूम पाता और ना ही सही तरह से पिसाई होती है।

कब्ज व गैस

24 घंटे में दो बार शौच जाने के बाद भी संपूर्ण मल का निष्कासन ना होना कब्जियत कहलाती है। इसके लक्षणों में नाश्ता करने की इच्छा ना होना, भूख की कमी (गैसेस) वायु मुंह और गुदा से निकलते रहना और पेट मोटा होना रोग के प्रमुख लक्षण हैं।

आंतों में जब मल शुष्क व कठोर होकर सड़ने से वायु की उत्पत्ति करें और वायु किसी तरह निकल नहीं पाए तो इसे आफरा (गैस) कहा जाता है जिसमें पेट फूलने लगता है व दर्द भी होने लगता है। पेट में रुकी हुई वायु जब घूमती है तब हृदय में व पेट में दर्द हो सकता है। व हृदय की धड़कन बढ़ जाती है व मस्तिष्क पर दबाव पड़ने से सिर में दर्द होता है।

कब्ज में दस्त करने की इच्छा बार-बार होती है, पेट में मरोड़ व सूजन रहती है, बहुत दिनों तक साफ दस्त ना होने से शरीर को अत्यधिक नुकसान होता है व जहर फैलने की संभावना बढ़ जाती है।

कारण और सुझाव :-

1. खाने में फाइबर या रेशा ना हो तो वह चिकना होकर आंतों में चिपक जाता है। बारीक आटे में, मैदे में व बिना छिलके की दालों में, चावल में फाइबर नहीं मिलता है, इसलिए चक्की का पिसा थोड़ा मोटा आटा व मिक्स आटा लें रोटी बनाने में, यह बिना छना हो वह सभी दाल छिलके वाली लें व चार घंटे पानी में भिगोकर ही बनाएं।
2. खाने में बल्क बनाने के लिए व रफेज़ के लिए एक पाव सब्जी एक व्यक्ति को खाना जरूरी है, सब्जी अलग-अलग प्रकार की हो व मौसमी हो।
3. पानी की कमी से मल सूखता है, इसलिए दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिए।
4. खाने में अगर तेल घी का पूरी तरह अभाव हो जाता है तो आंतों में शुष्कता या सुखापन आ जाता है। जिससे दूषित वायु व कब्ज की उत्पत्ति होती है।
5. पौष्टिक भोजन व हैवी प्रोटीन खाकर बिस्तर पर अधिक आराम करना, संसर्ग करना, तेज धूप में जाना आदि के कारण पाचन ना होने से गैस की उत्पत्ति होती है।
6. किसी भी तरह का शारीरिक श्रम व व्यायाम न करना, निष्क्रिय शरीर के साथ आंतें भी निष्क्रिय हो जाती हैं। आंतों में मूवमेंट ना होने से मल निष्कासन के लिए आगे नहीं बढ़ पाता है। क्योंकि छोटी आंत व बड़ी आंत को मिलाकर आंतों की कुल लंबाई 25 फीट होती है और यह रास्ता मुड़ा हुआ होता है। इसलिए मूवमेंट करने से आंतों का मूवमेंट भी अच्छा हो जाता है और मल यह रास्ता आसानी से पूरा कर लेता है। 45 मिनट पैदल चलना इसका सर्वश्रेष्ठ इलाज है।
7. रात में सोते समय गाय के दूध में 5 से 10 ग्राम कैस्टर तेल (ऑयल) पिए।
8. पानी में नमक डालकर उबालें, इसे जितना गर्म पी सके पी जाए।

9. रात को तांबे के लोटे को लकड़ी पर ढककर रख दें। सुबह मल विसर्जन से पहले जितना पी सकें पी लें।
10. सोते समय एप्पल खूब चबा-चबाकर खाने से कब्ज दूर होती है। सेब खाने के बाद कुल्ला करें, पानी न पिए।
11. रात में त्रिफला चूर्ण लें।
12. 2 चम्मच मिश्री को दो चम्मच ईसबगोल की भूसी मिलकर एक कप पानी में 15 मिनट भिगोकर सोने से पहले पी लें। दो-चार दिन नियमित लेने से कब्ज दूर हो जाएगी।

अल्सर

मुंह से पेट तक के मार्ग में छाले होने को अल्सर कहते हैं। एसिड अर्थात् अम्ल जो पेट में निर्माण होकर भोजन के साथ मिलकर आंतों में जाना चाहिए परंतु मल के आंतों में मौजूद होने के कारण या अन्य कारण से पेट से एसिड ऊपर की ओर भोजन की नली और मुंह तक आने लगता है परिणामतः छाले होते हैं। कब्जित दूर करने के साथ पानी, ठंडा दूध, मीठे फलों का रस एसिडिटी कम करने के साथ अल्सर ठीक होने लगता है। शीतकारी प्राणायाम, भुजंगासन, उत्तानपादासन लाभप्रद हैं।

यह मुख्यतः आमाशय में अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनने से होता है। जो स्टमक की म्यूकस मेंब्रेन (एक सुरक्षा परत) में भी छेद या घाव कर देता है या फिर स्टमक से ऊपर जाकर भोजन नली में छाले या घाव उत्पन्न कर देता है, यही अल्सर है।

कई बार यह किसी बैक्टीरिया या संक्रमण से भी होता है, (H.पायलोरी) ज्यादा शराब, कॉफी, चाय, तले एवं मसालेदार भोजन स्टमक में जाकर वहां गंधियों को उत्तेजित करके वहां ज्यादा एसिड बनाते हैं, इससे अल्सर हो जाता है।

लगातार रहने वाला अत्यधिक तनाव भी कारण होता है जरूरत से ज्यादा एसिड सिक्रेशन का, अनियमित दिनचर्या, ज्यादा देर तक भूखा रहना, कोल्ड्रिक्स पीना, किसी तरह की एलोपैथिक दवाई लगातार खाना भी एक कारण है ज्यादा एसिड सिक्रेशन होने का। जो धीरे-धीरे अल्सर में परिवर्तित हो जाता है।

सुपाच्य खाना खाएं और एक संयमित व नियमित दिनचर्या का पालन करें व बार-बार जल्दी-जल्दी खाना ना खाएं।

बवासीर (पाइल्स)

पाचन तंत्र की खराबी के कारण भोजन से बनने वाले मल में भी विकृति आ जाती है। मलाशय में और एनस के आसपास काफी वेंस होती हैं (नसें) और जब कब्ज की वजह से मल कठोर हो जाता है आंतों से चिपका होने से बाहर नहीं आ पाता और उसे निकालने के लिए जोर लगाया जाता है तब एनस (गुदाद्वार) में अंदर या बाहर दिखते हुए कुछ मस्से व लटकी हुई नसे बन जाती है। यह गुदा में अंदर की तरफ भी हो सकती है यह एक दुखदाई स्थिति है, जो रातों की नींद भी खराब कर देती है। एनस द्वार में तीव्र जलन व दर्द होता है। बैठने में या स्कूटर में रोगी को यात्रा में भी तकलीफ होती है। स्थिति बिगड़ने से इन्हें रक्त स्राव भी होने लगता है, जिससे खून की कमी हो जाती है। पाचन तंत्र की सबसे विकृत अवस्था है यह जिसमें व्यक्ति के जीवन का सुख चैन पूरी तरह खत्म हो जाता है। क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भोजन का सुख लिया है। एनस की लम्बाई 2 इंच लगभग होती है वो कड़क मल से छिल जाती है और वहां पर घाव बन जाता है। जिसे फिशर रोग कहा जाता है। जब इस घाव में रोज रगड़ लगती है तो वहां पर सूजन हो जाती है या वहां की झिल्ली कठोर होकर मस्सों के रूप में डेवलप हो जाती हैं। यह इंटरनल हेमरेज या बादी बवासीर कहलाता है।

इसके अलावा जब मल त्याग में जोर लगाने से वेंस पर (जो झिल्ली के अंदर होती हैं) दबाव पड़ता है, जिससे वह डॉयलेट होकर मोटी हो जाती है और लटककर एनस से बाहर की तरफ आ जाती हैं और इसमें रोज रगड़ लगने से ब्लीडिंग होने लगती है।

लक्षण :-

1. सामान्यतः पुरानी कब्ज रहती है व मल त्याग के लिए जोर लगाना पड़ता है।
2. मल त्याग के पहले व बाद में एनस में जलन व दर्द होने लगता है।
3. मल त्याग के समय मल के साथ रक्त भी निकलता है।
4. गुदा स्थान पर खुजली भी होती है।
5. गुदा द्वार के बाहर छोटी गठान या मस्से के रूप में उभार दिखता है बादी बवासीर में बाहर नहीं दिखता परंतु अंदर खुजली, जलन, दर्द, सूजन रहती है जिसकी वजह से मल द्वार अवरुद्ध लगता है।
6. भूख कम लगती है, कमजोरी महसूस होती है।
7. जांघों व जोड़ों में दर्द होता है, प्रोस्टेट भी बढ़ सकती है।
8. कमर दर्द और नाभि के आसपास भी दर्द रह सकता है।
9. रक्त स्राव के साथ असहनीय पीड़ा में सिर में चक्कर भी आ जाते हैं।

रोग उत्पत्ति के कारण :-

1. इसका एकमात्र प्रमुख कारण बहुत दिनों तक कब्ज का बना रहना है।
2. जब व्यक्ति अधिक चटपटे, तले हुए, कड़वे और बिना रफेश यानी बिना छिलके के खाना खाता है जिसमें मुख्यतः मैदा, बेसन, चावल, बारीक आटा, शक्कर, दूध आदि से बना खाना होता है।
3. छोले भटूरे, समोसे-कचोरी, चीले, पकोड़े, चाइनीस फूड, पिज्जा, बर्गर, चीज, ब्रेड, परांठे-पुरी, उड़द दाल आदि खाना इस रोग की मुख्य वजह है।
4. पाचन क्रिया जब स्लो हो जाती है तब कब्ज होती है। इसलिए कब्ज न हो इसका प्रयास रखना चाहिए, इसलिए बहुत ठंडी चीज, चाय, कॉफी, शराब पीना, बहुत उपवास रखना, सूखा खाना खाना, बहुत खट्टा व अदरक, लहसुन से बना खाना, ज्यादा लाल मिर्च, गुड़, हींग, तेल, अचार का सेवन करना इसका कारण है।
5. जरूरत से ज्यादा शारीरिक श्रम करना, जिम में वजन उठाना या साइकिल की ज्यादा सवारी करना भी इसका कारण है।
6. भीगे वस्त्रों में अधिक समय तक रहना या गीले फर्श पर देर तक बैठना, धूप में अधिक चलने से भी यह समस्या हो जाती है।
7. ज्यादा समय तक एक ही जगह बैठे रहने से व मोटापे से, गुदा व उसके आस-पास की वेंस पर दबाव पड़ता है, और वहां रक्त जमा होकर सूजन आ जाती है। जिससे मल त्याग के समय रक्त स्राव होता है।
8. मल द्वार पर या एनस पर आघात लगने से हेमरेज की उत्पत्ति जल्दी होती है। गुदा मैथुन करने से स्त्री-पुरुष इस रोग से अधिक पीड़ित होते हैं।
9. मल-मूत्र, वायु आदि वेगों को अधिक समय तक रोकने से गुदा द्वार पर दबाव पड़ता है जिससे यह रोग होता है।
10. लिवर की खराबी जो मुख्यतः शराब पीने से होती है उससे पाचन खराब हो जाता है और यह रोग होता है।

चिकित्सकीय सुझाव :-

1. इस रोग का प्रमुख कारण कब्ज ना होने देने का प्रयत्न करना चाहिए, रोज 3 लीटर पानी पिए और हर खाने के साथ कुछ छिलकेदार चीजें या रफेश खाएं जब भी कोई ताली चीज खाना पड़े उसके साथ सलाद या कुछ कच्ची चीज खाना चाहिए, रात में त्रिफला चूर्ण लें ।
2. समय पर भोजन करना व नियम से रोज सुबह 3 गिलास पानी पीकर शौच के लिए जाना आवश्यक है, कई लोग रात में देर से सोते हैं व सुबह आलस से समय अभाव के कारण रोज शौच नहीं जाते हैं, जिससे वह कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हो जाते हैं और धीरे-धीरे पाइल्स हो जाती है ।
3. खाने में छाछ (मठ्ठे) का प्रयोग रोज करना चाहिए ।
4. नियमित 45 मिनट पैदल जरूर चलना चाहिए, ज्यादा लंबे समय तक एक जैसी स्थिति में ना बैठें, हर घंटे अपनी सीट से उठकर 5 मिनट स्ट्रेचिंग करें या चहलकर्म करें ।

अम्लपित्त (एसिडिटी)

स्टमक में खाना पचाने के लिए एक अम्ल (हाइड्रोक्लोरिक अम्ल) का निर्माण होता है । जब हमारी गलतियों से या किन्हीं परिस्थितियों से इस अम्ल का उत्पादन जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो यह खाने की नली में ऊपर की ओर आ जाता है, जिससे गले में जलन, छाती में जलन, दर्द, खट्टी डकार आना, पेट में भारीपन महसूस होता है, जी-मिचलाने का एहसास होता है और बहुत थकान का अनुभव होता है ।

कई बार ज्यादा अम्ल के साथ लिवर से पित्त भी ज्यादा बनने लगता है । जिससे मुंह में कड़वा पानी आता है व सुबह मुंह कड़वा हो जाता है । बेचैनी होती है, भूख भी नहीं लगती है, अम्ल में पित्त मिल जाने से अम्लपित्त हो जाता है । इसमें भूख ज्यादा लगती हैं शरीर दुबला हो जाता हैं, दस्त लग जाते हैं, सिर में दर्द होता है, आंतों में गुड़गुड़ाहट, नेत्रों में जलन, तीव्र धड़कन, मुंह में छाले, पीलिया के लक्षण मिलते हैं । इस तरह अम्ल-पित्त मिला हुआ मल या दस्त एनस में भी जलन या सूजन पैदा करता है । मलद्वार से हरे, पीले या लाल-भूरे रंग का मल निष्कासन होता है । शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, जिससे पसीना ज्यादा आता है और खाना पचने की बजाय अधिक एसिड में जलता है और उसके पोषक पदार्थ अवशोषित होने की बजाय जल जाते हैं । कुछ व्यक्ति अम्लपित्त में चलते ज्वर से भी पीड़ित होते हैं और हाथ-पैरों में जलन होती है । इस एसिड की अधिकता से आमाशय में दर्द व आंतों में सूजन भी हो जाता है ।

कारण :-

- ✓ 1. कब्जियत की स्थिति में मल का संपूर्ण निष्कासन ना होने से आंतों में मल भरा रहता है । पेट में निर्माण होने वाले पाचक रस (विभिन्न अम्ल) जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं वे छाती और मुंह की ओर आने लगते हैं, आंतों में मल भरा होने से नीचे नहीं जा सकते हैं, इसे एसिडिटी कहते हैं ।
- ✓ 2. चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट, धूप में अधिक घूमने-फिरने और शारीरिक श्रम करने से अम्लपित्त अधिक होता है । इन चीजों से आमाशय का वाल्व खराब हो जाता हैं, जो एसिड को आमाशय में नहीं रोक पाता और एसिड ऊपर आने लगता हैं ।
- ✓ 3. जब खाने में विरुद्ध प्रकृति के पदार्थ एक साथ खाए जाते हैं तो पाचन बिगड़ जाता है । गर्म के साथ ठंडा, दूध के साथ नमकीन, तले या खट्टे पदार्थ आदि गलत कॉम्बिनेशन है ।
4. मीट तथा हैवी खाने के बाद जूस या फल खाने से भी यह हो सकता है, क्योंकि फल या जूस 30 मिनट के अंदर ही फरमेंट हो जाता है, परंतु यदि मीट के साथ खाते हैं तो मीट पचने में कई घंटे लगते हैं । इसके कारण फ्रूट या जूस छोटी आंत में आगे पाचन के लिए नहीं जा पाते और जल्दी फरमेंट होने लगते है, जिससे बदहजमी तथा एसिडिटी होने लगती है ।

अमृतम क्लिनिक

5. अम्लपित्त में पित्तवर्धक व अम्लीय खाद्य पदार्थों का सेवन बंद कर देना चाहिए। सबसे अधिक बाजार में बिकने वाले चटपटे, स्वादिष्ट छोले भटूरे, गोलगप्पे, समोसे, कटलेट, चाऊमीन, आलू की टिकिया अम्लपित्त में अधिक हानिकारक होते हैं।
- ✓ 6. वर्षा ऋतु में दूषित व बासी भोजन करने से अम्लपित्त की विकृति होती है, वर्षा ऋतु में वातावरण अधिक आर्द्र हो जाता है। वायु के शीतल हो जाने से जठराग्नि क्षीण हो जाती है। पित्त की अधिक उत्पत्ति होती है। वर्षा के बाद पित्त प्रकोपित होकर अम्लपित्त से पीड़ित करता है। वर्षा ऋतु में भोजन पर बहुत ध्यान देना चाहिए।
7. अम्लपित्त में खट्टी दही व छाछ, घी, तेल से बने पकवान, उड़द की दाल, करौंदा, बेर, इमली, अमचूर, अचार, कैथ, सिरका, प्याज, लहसुन आदि हानि पहुंचाते हैं। लेकिन आंवला खट्टा और अम्लीय होने पर भी अम्लपित्त में लाभप्रद होता है।
8. स्टील के बर्तन में कई दिनों से रखा घी और दूसरे अम्लीय खाद्य पदार्थ विकृत हो जाते हैं। ऐसे घी और खाद्य पदार्थों का सेवन करने से अम्लपित्त की उत्पत्ति जल्दी होती है।
9. स्त्री-पुरुष, मल-मूत्र के वेगों को अधिक समय तक धारण करते हैं अर्थात् रोकते हैं तो अम्लपित्त से पीड़ित होते हैं।
10. शीत ऋतु में भोजन करने के बाद शीघ्र दिन में देर तक सोने, भोजन करते समय अधिक जल पीने, कुलथी, भरे हुए धान्य, घी-तेल से बने पकवान, पुलाव के अधिक सेवन से भी अम्लपित्त की विकृति होती है।
11. महानगरों में अधिक मात्रा में भोजन बनाकर फ्रिज में रख दिया जाता है। सुबह बनाकर रखा भोजन शाम को सेवन किया जाता है, फ्रिज में रखी सब्जियों को जब गरम करके खाते हैं तो उनके गुण नष्ट हो जाते हैं।
- ✓ 12. जब तला हुआ खाना या फैट युक्त खाना ज्यादा खाया जाता है और पूरा पेट भरकर खाना खाया जाता है। तब शरीर को अम्ल व पित्त अधिक मात्रा में बनाने पड़ते हैं, जब बार बार यह करना पड़ता है तो शरीर स्वभावतः इसका उत्पादन बढ़ा देता है। यह शरीर की कुपित स्थिति है।
13. अधिक मीठा खाना भी एसिडिटी बढ़ने का कारण है। यह फेटिलिवर का कारण बनता है, जिससे पित्त अनियमित बनता है।
- ✓ 14. रात में देर से खाना खाने के कारण खाने का पाचन अच्छे से नहीं हो पाता। खाने में और सोने में 2 घंटे का अंतर जरूरी है। रात का खाना सूर्यास्त होने पर कर ले उसके बाद सुबह सूर्योदय होने पर ही कुछ खाए। 10 से 12 घंटे का फास्ट होना चाहिए।
15. हमेशा स्ट्रेस में रहना, भय व अक्जायती, घृणा जैसे मानसिक विकार भी अम्लपित्त बढ़ा देते हैं।

सुझाव :-

1. पीपल, सौंफ और मिश्री तीनों को 50-50 ग्राम को महीन पीसकर शीशी में भर लें। भोजन के बाद 1-1 चम्मच चूर्ण पानी के साथ सुबह-शाम लेने से अम्लपित्त का शमन होगा।
2. पेट पर गीली मिट्टी की पट्टी रखें। अल्प उपवास करें। भूख लगने पर फलों का सेवन करें। नींबू पानी लें।
3. कच्चे नारियल का पानी पीने से अम्लपित्त का शमन होता है।
4. सुख खड़े धनियाँ को रात भर पानी में भिगोकर उस पानी को प्रातः खाली पेट पीने से अम्लपित्त की शिकायत दूर होती है।
5. गुड़ का एक छोटा टुकड़ा हर घंटे मुँह में रखकर चूसते रहने से अम्लपित्त का शमन होता है।

अमृतम क्लिनिक

6. यदि पेट भरा हो तो खाना ना खाएं, खाने को सदैव चबाकर खाएं।
7. अदरक भी पेट से एसिड को अब्सॉर्ब करने में मदद करती है। इसके साथ ऐसे भोजन का प्रयोग करें जो ज्यादा अल्कलाइन गुणों से परिपूर्ण हो।
8. भोजन के तुरंत बाद ना लें, क्योंकि इसके कारण गैस्ट्रिक जूस खाने की नली एवं गले की तरफ आने लगते हैं। यदि आप लें हैं तो सिर ऊपर की ओर रखें। लेकिन खाने के कम से कम आधा घंटे बाद ही सोवें।
9. ऐसे पदार्थों को हटाए जिनसे एसिडिटी होती है। जैसे-कि- कैफीन के साथ बनने वाले पेय पदार्थ कॉफी, चाय, कोला इत्यादि इसके साथ काली मिर्च, लाल मिर्च, कोकोआ, मैदा, मीट और पास्ता इसके अलावा सिगरेट तथा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ना लें। क्योंकि इससे पेट एवं खाने की नली का निचला भाग फूलता है और एसिड ऊपर आता है।
10. तले एवं फैटी (चर्बी) खाने से दूर रहे।
11. अपने जीवन से तनाव एवं एंग्जायटी को दूर रखें, क्योंकि एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस एवं अल्सर का यह प्रमुख कारण है।

लिवर के रोग

भोजन की वसा को या फैट को पचाने के लिए लिवर बाईल (पित्त) का उत्पादन करता है और पेट की अम्लता को कम करके उसे अल्कलाइन करता है। पाचन से बनने वाला रस सबसे पहले लिवर में जाता है, वहां खाने में ऑयल, शक्कर, प्रोटीन को पचने लायक बनाया जाता है और शरीर में जितनी जहां जरूरत हो वहां भेजा जाता है। ब्लड में ग्लूकोज का स्तर मेंटेन रखने के लिए जितनी जरूरत हो उतनी शुगर रिलीज करता है बाकी अपने पास स्टोर कर लेता है। इसी तरह विटामिन A, E व D, आयरन भी स्टोर करके रखता है। कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन व नियमन भी यही करता है। थायराइड व अन्य हार्मोन व शुगर की पर्याप्त मात्रा ब्लड में रहे इसका ध्यान लिवर ही रखता है।

शरीर को प्रोटेक्शन देने के लिए एक फिल्टर के रूप में काम करता है, शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थ व रसायनिक तत्वों को खून से साफ करके किडनी से बाहर करने योग्य बना देता है। हमारे शरीर की ऊर्जा का स्रोत भी लिवर ही है। शरीर में बनने वाला अमोनिया को यूरिया व यूरिक एसिड में बदलकर बाहर करता है।

परंतु आजकल मनुष्य अपनी भागती-दौड़ती व्यस्त जिंदगी में इतने महत्वपूर्ण अंग के स्वास्थ्य को अपनी ही गलतियों से खराब करके अपने पूरे शरीर को संकट में डालता है। लिवर विकार के कारण इसमें सूजन आ जाती है, इसके सेल टूटने लगते हैं जिससे पीलिया हो जाता है। शक्कर व फैट की अधिकता से फैटी लिवर हो जाता है। संक्रमण से हेपेटाइटिस-B जैसा घातक रोग और अधिक शराब पीने, अधिक खटाई, लाल मिर्च व नमक खाने से लिवर सिरोसिस हो जाता है।

हमेशा गरिष्ठ खाना, दिन में ज्यादा सोना, चाय, कॉफी पीना, मलेरिया, टॉयफाइड, फ्लू, टी.बी. जैसे रोगों से लिवर में वृद्धि हो के उसका स्वाभाविक फंक्शन खराब हो जाता है। शरीर में एनीमिया हो तो भी लिवर में वृद्धि हो जाती है। लगातार कब्ज रहने से व किडनी, लिवर व हृदय के कार्य बिगड़ने से भी लिवर पर विपरीत असर पड़ता है।

लक्षण :-

1. लिवर बढ़ने पर पेट में दर्द व भारीपन रहता है। जब अधिक वृद्धि हो जाती है तो बुखार व महिलाओं में मासिक धर्म रुक जाता है।
2. दस्त लग जाते हैं और शारीरिक रूप से बहुत कमजोरी महसूस होती है।
3. पेट का आकार बड़ा हो जाता है और खाने की भूख नहीं लगती है। जी-मिचलाने के लक्षण आते हैं।

4. एनीमिया हो जाता है और सिर दर्द के लक्षण आते हैं।
5. पित्त की कमी से वसा के टूटने का काम नहीं होता जिससे कब्ज, गैस बनती है, जीभ मैली हो जाती है।

चिकित्सकीय सुझाव :- रोगी को अपने भोजन पर पूरा नियंत्रण रखना आवश्यक होता है।

1. पीलिया में अधिक कैलोरी व कार्बोहाइड्रेट वाला खाना लें जैसे ग्लूकोस। जिससे क्षतिग्रस्त सेल पुर्नजीवित हो सके। प्रोटीन ना ले।
2. सभी फैटी भोजन, नमक, काली मिर्च, चाय, कॉफी, विटामिन A और शराब का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। अनाज खा सकते हैं परंतु घी, तेल, मक्खन नहीं खाना है।
3. गन्ने का रस, नास्थिल पानी, छाछ, फलों का रस, सब्जियों का सूप, दाल चावल की खिचड़ी, मूली, लौकी, पालक, गिलकी की सब्जी, एलोवेरा का रस बहुत गुणकारी होते हैं, लीवर रोग में।
4. घर पर जमाया ताज़ा दही 250 ग्राम में मूली हुई फिटकरी 10 ग्राम मिलाकर दिन में दो बार लें। अन्न ना खाएं। केवल दही छाछ पर ही रहे। 7 दिन बिस्तर पर आराम करें।
5. एक प्रके केले को बीच में चीरा लगाकर गीला चूना दोनों भागों पर लगाकर मुंह बंद कर लें। ऐसा केला दिन में तीन बार खा लें। ऐसा तीन दिन तक करें। निश्चित रूप से पीलिया ठीक हो जाएगा।
6. भोजन के साथ लगातार मूली खाने से पीलिया रोग नहीं होता।
7. पका केला मथ करके उसमें एक चम्मच शहद मिलाकर दिन में दो बार खाएं।
8. लीवर डिटॉक्स करने के लिए दो दिन तक उपवास करें। जिसमें सिर्फ जूस (संतरा, मौसम्बी, अंगूर) का सेवन करें व "शंख प्रक्षालन" की प्रक्रिया किसी योग्य प्रशिक्षक की निगरानी में करें।
9. लीवर से निकलने वाला पित्त अधिक या कम मात्रा में निकलता है तो शरीर में कई रोग होते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, हार्मोन का असंतुलन हो जाता है। इसलिए लीवर की हेल्थ को सही रखने के लिए कच्चे खाद्य पदार्थ जैसे सलाद, चटनी, बाजार की या बिना साफ सफाई से बनी ना खाएं। फलों को अच्छे से धोएं।
10. रेगुलर एक्सरसाइज से लीवर हेल्थ को अच्छा करा जा सकता है।
11. कई तरह के रसायनिक तत्व जो शरीर में कई कारणों से जाते हैं वह लीवर को खराब करते हैं जैसे मैकअप प्रोडक्ट्स परफ्यूम, प्रदूषण, अंग्रेजी दवाइयां और बाजार का या प्रिजर्व खाना। कीटनाशक दवाइया आदि।
12. दिन भर में 3 लीटर पानी जरूर पिएं।
13. खाने से पहले हाथों को साबुन से साफ करें।
14. हरी सब्जियों व अन्य सब्जियों का जूस लेना चाहिए।

अमृतम क्लिनिक पर लीवर डिटॉक्स प्रोग्राम उपलब्ध रहता है। व्यक्ति की स्थिति व प्रकृति के अनुसार उचित सलाह व मार्गदर्शन में प्राकृतिक तौर पर लीवर डिटॉक्स किया जाता है। साल में एक बार यह प्रक्रिया जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आज के परिवेश में आदर्श जीवन चर्या का पालन किसी के लिए संभव नहीं है।