



हृदय से संबंधित रोग

(1) हार्ट बर्न एसिडोसिस

हार्ट बर्न, पेट में पाचन करने वाले पदार्थों की अधिकता से होता है विशेषकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होता है। ये पदार्थ जब खाने की नली में ऊपर की ओर आ जाते हैं, तो हार्ट बर्न या गला जलने की समस्या होने लगती है।

लक्षण :- पेट में दर्द या एसिडिटी का एहसास। गला जलने लगता है। इसके अलवा सिर दर्द होना तथा दाँतों का खट्टी चीज़ों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होना भी इसके लक्षण है।

सुझाव :- 1. यदि पेट भरा हो तो खाना न खाये। खाने को सदैव चबाकर खाये व भूख लगने पर ही खाना खाये।

2. खाने को बैठकर खाये, जल्दी में नहीं खाये। खाने को देखें, खुशबू लें व दिमाग को संकेत दें कि खाना खा रहे हैं, जिससे पेट में पाचक एंजाइम निकल सकें। हर कौर को पतला होने तक चबाएं। खाते समय न बातें करें ना कोई समस्या के बारे में सोचें, ना ही मोबाइल, टी.वी चलाये। शांत चित्त से खाना खाये व पानी 1 घंटे बाद ही पियें।
3. भोजन के तुरंत बाद ना लेटें। क्योंकि इसके कारण गैस्ट्रिक जूस खाने की नली एवं गले की तरफ आने लगते हैं। यदि आप लेटते हैं तो सिर ऊपर की ओर रखें। लेफ्ट करवट लेटें। लेकिन खाने के कम से कम आधा घंटा बाद ही लेटें।
4. खाने से ऐसे पदार्थों को हटायें जिनसे एसिडिटी होती है, जैसे कि कैफीन से बनने वाले पेय पदार्थ - कॉफ़ी, चाय, कोला इत्यादि। इसके साथ काली मिर्च, लाल मिर्च, मैदा, रेड मीट और लहसुन, तेज मसाले, नमक आदि। इसके अतिरिक्त सिगरेट तथा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ना लें। क्योंकि इससे पेट एवं खाने की नली का निचला भाग (जहाँ एक वाल्व होता है जो एसिड को ऊपर आने से रोकता है) लूज हो जाता है तो एसिड नली में ऊपर आ जाता है और एसिडिटी रहने लगती है।

5. तले एवं फैटी [चर्बी] खाने से दूर रहें। शक्कर व नमक दोनों कम खायें।
6. अपने जीवन में तनाव एवं एंग्जायटी को दूर करें क्योंकि एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस एवं अलसर का यह प्रमुख कारण है।
7. खाने के पहले फल या नींबू जूस लें और लगभग 30 मिनट इनको डाइजेस्ट होने का इंतज़ार करें। उसके बाद भोजन करें।
8. एक साथ ज्यादा ना खायें और बहुत वैरायटी का खाना यानि तरह-तरह की चीजें एक बार में ना खायें।
9. अदरक भी पेट से एसिड को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। इसके साथ ऐसे भोजन का प्रयोग करें जो ज्यादा एल्कलाइन गुणों से परिपूर्ण हो। जैसे सलाद व अंकुरित अनाज।
10. अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव है कि खाना भूख से कम खायें यानि आधा ही पेट भरें एक बार में।

(2) ऐथेरोसेलेरोसिस व हाई कोलेस्ट्रॉल


कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम व अन्य मिनरल आर्टरी (खून की नली) में डिपोजिट होकर आर्टरीज को हार्ड व सकरी कर देता है। इसे प्लांक कहते हैं। यह कैल्शियम, फैट या दोनों के मिले - जुले रूप का आर्टरी के भीतरी भाग में डिपोजिट होने से होता है।

अतः इससे आर्टरीज की खून संचार की प्रक्रिया में बाधा पड़ती है। इसके अलावा कैल्शियम व शुगर डिपोजिट हुए फैट की मौजूदगी में फ्री - रेडिकल्स मॉलिक्यूलर क्रॉसिंग बनाते हैं। जिनसे खून के संचार में रूकावट पैदा होती है व खून ले जाने वाली नलियां कड़क हो जाती हैं। जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।

कारण :- 1. थायराइड की कम क्रियाशीलता 2. डायबिटीज 3. एनीमिया 4. कब्ज रहना 5. हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बी.पी 6. क्रॉनिक सूजन वाले रोग, जैसे :- गठिया - अर्थराइटिस, ल्यूपस 7. धूम्रपान 8. व्यायाम ना करना, मोटापा 9. फल सब्जी कम खाना और बाजार का तला हुआ खाना ज्यादा खाना जिससे कोलेस्ट्रॉल व सूजन बढ़ती है 10. उम्र ज्यादा होने पर भी उनका लचीलापन खत्म होता है।

अधिक कॉमन लक्षण :-

1. धमनियों के सिकुड़ने व सख्त होने की यह प्रक्रिया कई सालों में होती है और लक्षण भी नहीं आते। धीरे - धीरे किसी अंग में दर्द रहता है, किडनी की विफलता, अंधापन, नपुंसकता, खाने के बाद पेट दर्द या किसी भी अंग में जहाँ बारीक धमनिया ज्यादा हो वहाँ तकलीफ हो सकती है महिलाओं में मेनोपॉज़ के बाद यह समस्या ज्यादा होती है।
2. हाई ब्लड प्रेशर
3. एन्जाइना पैक्टोरिस (सीने में दर्द) मेहनत का काम करने पर होता है
4. ऐन्यूरिज़्म
5. हार्ट अटैक
6. ब्रेन स्ट्रोक, जो शरीर के दूसरे भागों एवं अंगों को निष्क्रिय करता है।



7. एकाग्रता एवं मेमोरी का लॉस।
8. जिस अंग में रक्त प्रवाह बाधित हो वो अंग खराब हो सकता है।
9. हाथ - पाँव की आर्टरीज के बंद होने से थकान, कमजोरी, मसल का कॉन्ट्रैक्शन एवं चलते समय दर्द होता है।

सुझाव :- अतः विटामिन ए, ई, सी और सोलेनियम के प्रयोगों का सुझाव दिया जाता है। क्योंकि ये आर्टरी को साफ़ करते हैं व लचीला बनाते हैं।

जिन व्यक्तियों को आर्टेरियोसेलेरोसिस या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक है उन्हें अपने भोजन से निम्न को हटा देना चाहिए।

1. रेड मीट (बीफ और पोर्क)
2. खाना जिसमें फैट की मात्रा अधिक हो।
3. अंडे का यॉक (जिसमें सर्वाधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है)
4. तला हुआ भोजन, सॉसेज, चीनी एवं मैदा।
5. सिगरेट कॉफ़ी और शराब।
6. बटर, क्रीम, चीज़ एवं एनिमल फैट।
7. इसके अतिरिक्त खाने में नमक व शक्कर की मात्रा भी कम कर दें।
8. कब्ज व हृदय रोग का सीधा संबंध है, अतः कब्ज न होने दें।

खाने में इन्हें अवश्य शामिल करें

1. खाने में अधिक से अधिक फाइबर, फल व सब्जियों को अवश्य शामिल करें।
2. लहसुन एवं अदरक (परन्तु कीटाणुनाशक रसायनों का उपयोग ना हो इसे उगाने में)।
3. आर्टरी ब्लॉकेज को समाप्त करने व आर्टरी में ब्लॉकेज को रोकने के लिए सबसे आवश्यक है, भोजन में अनाज के छिलके की मौजूदगी। अतः आटे की कॉम्बिनेशन को बदले - 6 कि.ग्रा. गेहूँ में 2 कि.ग्रा. चना और 2 कि.ग्रा. जौ मिलाकर आटा पिसवायें। पीसने वाले को यह जरूर बताये की आटा महीन नहीं पीसना है। मतलब हर वक्त के खाने में फाइबर जरूर हो।
4. ओमेगा 3 युक्त खाना लें।
5. हाइड्रोजेनेटेड तेल ना खायें। तेल को 1 बार तलने में उपयोग होने के बाद फेंक दें।

(3) हाईपर - टेंशन [हाई ब्लड प्रेशर]

उच्च रक्तचाप स्वयं में कोई रोग नहीं है, बल्कि एक लक्षण है कि शरीर में विजातीय तत्व जमा होकर हृदय को तकलीफ दे रहे हैं।

शरीर की आर्टरीज यानि खून ले जाने की नलियों में जो रक्त बह रहा है उसका दबाव उन नलियों की सतह पर कितना पड़ रहा है, इसका माप ही ब्लड प्रेशर होता है।

यदि 50 वर्ष की उम्र के पहले शरीर का ब्लड प्रेशर 140/90 तथा 50 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 150/95 के ऊपर है तो निश्चित रूप से हाइपर - टेंशन की समस्या है। हाई B.P. तब होता है जब नलियाँ चोक या सकरी हो जाती हैं, इस स्थिति में हार्ट को अधिक प्रेशर लगाना पड़ता है, ब्लड को सभी अंगों तक भेजने में और हार्ट दिन ब दिन कमजोर होता जाता है।

कारण :- इसके शारीरिक एवं मानसिक कई कारण है। शारीरिक कारणों में मुख्यतः किडनी में इन्फेक्शन या आर्टरी (खून की नली) में रुकावट है। (आर्टरी रोग को एथिरोस्केलेरोसिस में लिखा जा चुका है) अन्य कारण

डायबिटीज :- मधुमेह में रक्त में शक्कर का स्तर सामान्य से ज्यादा होने से रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। रक्त में ज्यादा शुगर या ज्यादा नमक धमनियों की अंदरूनी परत के एंडोथीलियम सेल को उत्तेजित व इरिटेट करते हैं, जिससे धमनियों में सूजन हो जाती है और उनका रास्ता सकरा हो जाता है। जिससे हृदय को अधिक कार्य करना पड़ता है और अधिक प्रेशर लगाना पड़ता है, ब्लड पंप करने में।

तनाव :- तनाव आने से एक हार्मोन कोर्टिसोल निकलता है, जो शरीर में ब्लड का प्रेशर बढ़ा देता है, जिससे व्यक्ति आए हुए तनाव रूपी मुसीबत से पूरी ऊर्जा से लड़ सके। परंतु लगातार तनाव बना रहे तो खून ले जाने वाली नलियाँ सिकुड़ जाती हैं और B.P. बढ़ा रहता है।

धूम्रपान :- धूम्रपान से भी ब्लड आर्टरी सिकुड़ जाती है। ज्यादा कॉफी, चाय हृदय को उत्तेजित करते हैं ज्यादा धड़कने के लिए जिससे B.P. बढ़ता है।

मोटापा :- मोटापा होने से धमनियाँ फैट के दबाव से सिकुड़ जाती हैं और इनकी दीवारों पर भी फैट जम जाता है।

पेट खराब रहना :- खाने का डाइजेशन सही नहीं होने से व लिवर फंक्शन बिगड़ने से खराब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनता है। अतड़ियों में खाना सड़ने से एक तरह का टॉक्सिन बनता है (आयुर्वेद में इसे 'आम' कहते हैं) यह कब्ज रहने से व अजीर्ण से भी बनता है और नलियों में जमता है।

* वंशानुगत * ज्यादा नमक खाना (सोडियम शरीर में पानी एकत्रित करता है) * धूम्रपान करना * शराब पीना * ज्यादा मात्रा में कॉफी एवं चाय का सेवन * गर्भ - निरोधक का प्रयोग * गठिया * ज्यादा मानसिक परिश्रम * पाचन में गड़बड़ी * लिवर दोष * दाँतों में पीव होना * कब्ज, गैस बनना * शक्कर का अत्यधिक प्रयोग * लगातार तनाव में रहना।

हाई बी. पी. के लक्षण :-

1. बेचैनी, घबराहट होना।
2. सिर दर्द, भारीपन।
3. अनिद्रा, चक्कर आना।
4. सांस लेने में परेशानी।
5. कानों में आवाज आना।
6. आंखों के आगे धुंधलापन छाना।
7. थकान व ज्यादा तनाव, ज्यादा गुस्सा आना।
8. सीने में दर्द व भारीपन।
9. समझने में, बोलने में कठिनाई होना।
10. चेहरा, हाथ व पैर में सुन्नपन आना।
11. पैरों में दर्द।

सुझाव :- 1. भोजन से नमक, कार्बोहाइड्रेट एवं अन्य साल्ट निकाल दें। जो आप तय सीमा से ज्यादा खाते हैं।

2. पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर तथा विटामिन-डी का प्रयोग बढ़ाएं, इससे शरीर के अंदर मौजूद सोडियम घुल जाता है।
3. विटामिन - ए, सी, ई के साथ नियमित कसरत करें।
4. ओमेगा - 3 खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को संतुलित करता है।
5. सोलेनियम, आर्टरी हेल्थ व CRP कंट्रोल के लिए चाहिए शरीर को।
6. सस्ता तेल, पाम ऑइल, सोयाबीन ऑइल, नकली घी ना खाएं।
7. तेल को एक बार गर्म करने के बाद वापस उसे उपयोग में ना लें।
8. खाना बनाने में तेल से धुआं नहीं निकलना चाहिए व तेल को थूप में भी ना रखें।

(4) हाइपो टेंशन [लो ब्लड प्रेशर]

जब नसों में बहने वाला रक्त कम प्रेशर से बहता है (90/60mm.Hg) तो मस्तिष्क को व शरीर के अन्य अंगों को जरूरी ऑक्सीजन व पोषण नहीं मिलता और निम्न लक्षण आते हैं - अत्यधिक कमजोरी महसूस करना, काम में मन नहीं लगना।

लक्षण :-

1. थकान।
2. भूख न लगना।
3. सर्द गर्म के प्रति अतिसंवेदनशील होना।
4. तेज नाड़ी, दिमाग कन्फ्यूजन की स्थिति में।
5. शारीरिक संबंधों में कमी और सोने की अधिक इच्छा करना।
6. घबराहट होना, मुंह सूखना, आंखों के आगे अंधेरा छाना।
7. बैठकर एकदम खड़े होने पर चक्कर आना।
8. एकदम बेहोशी आना।
9. पेट खराब होना।


कारण :-

- वंशानुगत डायबिटीज के कारण नर्व क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला रिफ्लेक्स समाप्त हो जाता है।
- गंभीर कारणों में हृदय या वाल्व की अस्वस्थता हो सकती है।
- किसी मेडिकेशन के साइड इफेक्ट से भी होता है जैसे नींद की, दर्द की व साइकोलॉजिकल समस्याओं की एलोपैथिक दवाएं।
- ज्यादा देर तक खड़े रहने का काम।
- इमोशनल तनाव, फियर - भय, इनसिक्योरिटी से नर्व डिप्रेस हो जाती है।
- डिहाइड्रेशन या वायरल अटैक के बाद जिसमें ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है।
- ज्यादा गर्मी हो तो शरीर की प्रतिक्रिया फलस्वरूप।
- हाई B.P की ज्यादा दवा, जिसमें मूत्र ज्यादा लाने की दवा भी हो।
- कुछ विष शरीर में जाने से या इंफेक्शन से (एम्प्यूट)।
- किडनी व एड्रिनल गैलैंड में प्रॉब्लम से वह B.P मेन्टेन रखने वाले हार्मोन नहीं बना पाती।
- इंटरनल ब्लीडिंग।

B.P. कम होना भी खतरा है :- इसमें शरीर का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है जिससे शरीर में विशेषकर रक्त में गंदगी बढ़ जाने से धमनियों की भीतरी झिल्ली में सूजन आ जाती है, जिससे वह खुरदरी हो जाती है। फलस्वरूप प्रायः उसमें रक्त-कण अटक जाते हैं व रक्त के वसा कण अन्य रक्त कण भी उसको आस-पास जमकर थक्का बना लेते हैं। हार्ट के द्वारा फेके गए रक्त में इतना दबाव नहीं होता है कि वह इस थक्के को हटा सके। और रक्त संचालन एकदम रुक जाता है और एकदम अटक आ जाता है। B.P बढ़ने ही नहीं बल्कि कम होने से भी अटक आ सकता है।

(5) हार्ट अटैक

हार्ट को खून मिलना बंद हो जाए तो वह काम नहीं कर पाता यही हार्ट अटैक है क्योंकि हार्ट की मसल को काम करने के लिए ऑक्सीजन-युक्त ब्लड चाहिए। वे आर्टरीज जो हार्ट को खून पहुँचाती हैं उन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। जब यह आर्टरीज कोलेस्ट्रॉल के जमने से ब्लॉक हो जाती है या एथिरोस्क्लेरोसिस से कड़क होकर ब्लॉक हो जाती हैं, तो हार्ट के सेल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे हार्ट पर एक प्रकार का परमानेंट घाव या निशान बन जाता है।



लक्षण :- हार्ट में खून की सप्लाई रुकने से सीने के बीच में अचानक असहनीय दर्द होता है। यह दर्द गर्दन, कंधे, बाहें, जबड़ा एवं दाँत, उदर के ऊपरी भाग तक फैलता है। यह भी हो सकता है कि सीने के मध्य में ही बना रहे, जबड़े में दर्द होना, सांस जल्दी-जल्दी चलने लगती है। घबराहट, ठंडा पसीना, जी मिचलाना, हाथ पैर ठंडे, नब्ब कमजोर आदि होते हैं। सीने में जकड़न लगती है।

कारण :- हार्ट अटैक के मुख्य कारण आर्टरी (खून की नली) का ब्लॉक होना है। जिनके मुख्य कारण इस प्रकार हैं - पिछले अध्याय एथिरोस्क्लेरोसिस में लिखे कारण भी पड़े, यह भी प्रमुख कारण है :-

1. शरीर में कहीं और बना ब्लड क्लॉट जो हार्ट तक पहुँच जाए।
2. सिगरेट पीना।
3. ब्लड प्रेशर ज्यादा होना या कम होना।
4. खून में ज्यादा फैट व कैल्शियम की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा होना।
5. बैठे-बैठे जीवन-जीना और कसरत नहीं करना।
6. डायबिटीज होना।
7. वंशानुगत।
8. तनाव - तनाव से आर्टरी का डायमीटर कम हो जाता है, सिकुड़ जाती है जो कोलेस्ट्रॉल द्वारा हुई रुकावट को और भी उग्र बना देती है।
9. अपर्याप्त विश्राम एवं असंयत निद्रा।
10. वृद्धावस्था।
11. किडनी रोग।
12. गठिया व गनोरिया जैसी STD's का विष।
13. स्थूलता।
14. अत्यधिक शारीरिक परिश्रम आदि।

15. शरीर में अंदर इन्फ्लेमेशन हो CRP लेवल बढ़ा हुआ हो जिससे आर्टरी की भीतरी झिल्ली में सूजन आ जाती है और प्रवाह रुकता है।

रोकथाम के लिए सुझाव :- 1. आपको अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाना चाहिए। प्रतिदिन कसरत करना और ऐसे सभी भोजनों का बहिष्कार करना, जिनमें अधिक मात्रा में फैट (चर्बी) तथा कोलेस्ट्रॉल हो।

2. सभी काम शांतिपूर्वक करें, कम बोले, धीरे बोले, कम खाएं, मेहनत करें।
3. एक बार में ज्यादा पानी व भोजन न ले।
4. हृदय रोगियों को हाथ पैर ठंडे न हो पाए इसका सदैव ध्यान रखना है।
5. हमेशा लेफ्ट करवट से ही उठना व लेटना चाहिए, जिसमें हृदय पर तनाव नहीं आएगा।
6. गुस्सा, तनाव को व अपने नेगेटिव इमोशन को कंट्रोल में रखें।
7. भोजन में ना पचने वाले फाइबर यानी कि अनाज के फाइबर की मात्रा बढ़ा दें। मिक्स आटे की रोटी खाएं जिसमें 6 किलो गेहूं में 2 किलो जौ तथा 2 किलो चना मिलाकर आटा बनवाएं। आटा बहुत महीन ना पिसवायें तथा उसे छाने नहीं। इसके अतिरिक्त फाइबर युक्त फल एवं सब्जियों का सेवन करें।

हार्ट अटैक उपचार :- 1. एक कप दूध में तीन कप पानी डालकर इसमें एक बड़ा चम्मच अर्जुन छाल का चूर्ण डालकर उबाले। जब एक कप बच जाए तब इसे ठंडा कर छानकर सुबह खाली पेट पीने से हृदय को बल मिलता है। तथा हृदय रोग दूर होते हैं।

2. लहसुन में पाए जाने वाले एलिसिन नामक तत्वों में रक्त पतला करने की क्षमता होती है, यह कोलेस्ट्रॉल की को भी कम कर देता है (अगर केमिकल रहित उगाया गया हो)।
3. प्याज के नियमित सेवन से रक्त प्रवाह सुचारू रहता है। तथा हृदय रोगों से बचाव होता है।
4. अंकुरित गेहूं के साथ किशमिश नाश्ता ले।
5. हृदय रोग से पीड़ित रोगी को कैल्शियम वाले खाद्य-पदार्थ विशेष रूप से देने चाहिए। परीक्षण से जाना गया है कि हृदय रोग से ग्रस्त रोगी को कैल्शियम-प्रधान खाद्य-कम देने से उसके हृदय की धड़कन अधिक बढ़ जाती है। और हृदय अतिदुर्बल हो जाता है।
6. रात का खाना सूर्यास्त तक खा लेना चाहिए। रात में 7 से 8 घंटे लगातार नींद लें।
7. कब्ज व एसिडिटी ना हो इसका ध्यान रखें। लगातार बहुत देर तक एक जगह ना बैठें। हर घंटे में एक्टिविटी करें। बिना नहाए 45 मिनट रोज वॉक करें।
8. दातों व मसूड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
9. ट्रांसफैट व हाइड्रोजेनेटेड रिफाइनड तेल न खाएं। पराठें, पुड़ी, तली हुई अन्य चीजें व हर रूप में शुगर अवॉइड करें।
10. उपवास इस रोग की प्रधान चिकित्सा है।
11. बिस्किट, टोस्ट, भटूरा, मिठाई व बाजार की फ्राइड व मीठी चीज बिल्कुल ना खाएं।
12. काली मिर्च खाने से आँतों में जलन व सूजन उत्पन्न होती है। यह दिल में धड़कन बढ़ाकर उसे कमजोर बनाती है। यह बहुत हानिकारक है।
13. "ॐ" का उच्चारण 10 मिनट तक प्रतिदिन करना चाहिए।
14. ब्लड प्रेशर में हम ऐसे आसनो का उपयोग करते हैं जिनसे सीन फैलता है, एवं संकुचित होता है। फैलने एवं संकुचन से हृदय की मालिश होती है साथ ही धमनियाँ लचीली बनती हैं। जिससे

धमनियों में वसा का जमाव धीरे-धीरे कम होता जाता है और धीरे-धीरे ब्लड प्रेशर अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है ।

15. नियमित पैदल चलें 45 मिनट और निम्न आसन प्राणायाम जरूर करें जिससे तनाव कम हो और शारीरिक मानसिक मजबूती आए । अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, मार्जरासन, भुजंगासन, शशकासन, वक्रासन, धनुरासन, उत्तानपादासन, पवनमुक्तासन, शवासन, विपरीत करणी, गोमुखासन, उष्ट्रासन, मत्स्यासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, पश्चिमोत्तान, अर्ध हलासन नियमित करने से सहायता मिलती है ।
16. हृदय स्तंभासन - पीठ के बाल लेटकर नौकासन में दोनों पैरों को मिलाकर उठाएं फिर धड़ को उठाएं और हाथों को सिर से पीछे पैरों की ऊंचाई तक ले जाएं । (श्वास लेते रहें) यह बहुत लाभकारी आसन है परंतु बीपी हाई हो तो ना करें ।