

## 0.1 H16 数学 A

[1]  $\lambda, \mu$  の固有空間をそれぞれ  $V_\lambda, V_\mu$  とする. 対角化可能であるから  $V = V_\lambda \oplus V_\mu$  である.  $W_\lambda = W \cap V_\lambda, W_\mu = W \cap V_\mu$  とする.  $W_\lambda \cap W_\mu = W \cap V_\lambda \cap V_\mu = \{0\}$  である. また  $w \in W$  に対して  $w = w_\lambda + w_\mu$  となる  $w_\lambda \in V_\lambda, w_\mu \in V_\mu$  が一意に存在する.  $W \ni f(w) - \mu w = (\lambda - \mu)w_\lambda$  より  $w_\lambda \in W_\lambda$  である. 同様に  $w_\mu \in W_\mu$  である. よって  $W = W_\lambda \oplus W_\mu$  である.  $W$  を  $f$  の固有空間の直和に分解できたから  $f|_W$  は対角化可能である.

[2] (1)  $X$  のコンパクト集合  $C$  をとる.  $x \in X \setminus C$  を一つ固定する. 各  $y \in C$  に対して  $x \in U_y, y \in V_y, U_y \cap V_y = \emptyset$  となる開集合  $U_y, V_y$  が存在する.  $\{V_y \mid y \in C\}$  は  $C$  の開被覆であるから有限部分集合  $C' \subset C$  が存在して  $C \subset \bigcup_{y \in C'} V_y$  となる.  $U = \bigcap_{y \in C'} U_y$  とする.  $U$  は  $x$  の開近傍であり  $U \subset X \setminus C$  であるから  $x$  は  $C$  の外点. 任意の  $x$  でなりたつから  $C$  は閉集合である.

(2)  $A \cap B$  の開被覆  $S = \{U_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$  を任意にとる.  $S \cup \{X \setminus A\}$  は  $B$  の開被覆である. したがって有限部分集合  $\Lambda' \subset \Lambda$  が存在して  $B \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda'} U_\lambda \cup (X \setminus A)$  となる.  $A \cap B \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda'} U_\lambda$  である. したがって  $A \cap B$  はコンパクト集合である.

[3] (1)  $G(x) = \int_0^x f(x, y) dy$  とする.

$$\begin{aligned} \frac{G(x+h) - G(x)}{h} &= \int_0^{x+h} \frac{f(x+h, y)}{h} dy - \int_0^x \frac{f(x, y)}{h} dy = \int_x^{x+h} \frac{f(x, y)}{h} dy + \int_0^{x+h} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h} dy \\ &= \int_0^h \frac{f(x, y+x)}{h} dy + \int_0^x \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h} dy + \int_x^{x+h} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h} dy \end{aligned}$$

である. 第一項は  $\lim_{h \rightarrow 0} \int_0^h \frac{f(x, y+x)}{h} dy = \frac{\partial}{\partial h} \int_0^h f(x, y+x) dy = f(x, x)$  である.

第二項は  $\frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h} = \frac{\partial f}{\partial x}(x + \theta h, y)$  となる  $\theta \in (0, 1)$  が存在して  $\int_0^x \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h} dy \leq \int_0^x \frac{\partial f}{\partial x}(x + \theta h, y) dy \leq \infty$  であるから優収束定理より  $\lim_{h \rightarrow 0} \int_0^x \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h} dy = \int_0^x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) dy$  である.

第三項はある 0 の近傍で  $\left| \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h} \right| \leq M$  であるから  $\lim_{h \rightarrow 0} \int_x^{x+h} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h} dy \leq \lim_{h \rightarrow 0} \int_x^{x+h} M dy = 0$  である. よって  $G'(x) = f(x, x) + \int_0^x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) dy$  である.

したがって  $F'(x) = f(x, x) - f(x, -x) + \int_{-x}^x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) dy$  である. さらに  $F''(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, x) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, x) - \frac{\partial f}{\partial x}(x, -x) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, -x) + \frac{\partial f}{\partial x}(x, x) - \frac{\partial f}{\partial x}(x, -x) + \int_{-x}^x \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) dy = 2 \frac{\partial f}{\partial x}(x, x) - 2 \frac{\partial f}{\partial x}(x, -x) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, x) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, -x) + \int_{-x}^x \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) dy$  である.

[4]  $f(z) = e^{iz}/(z - i\varepsilon)$  とすれば,  $f$  は  $z \neq i\varepsilon$  で正則である. 積分経路  $C$  を原点中心の半径  $R > 2\varepsilon$  の上半平面の半円とする.  $C_1$  を実軸上の  $-R$  から  $R$  までの部分,  $C_2$  を半円とする.  $f$  の  $C$  での積分は留数定理から  $\int_C f(z) dz = 2\pi i \text{Res}(f, i\varepsilon) = 2\pi i e^{-\varepsilon}$  である.  $C_2$  での積分は  $z = Re^{i\theta}$  ( $0 \leq \theta \leq \pi$ ) とすると,  $|\int_{C_2} f(z) dz| \leq \int_0^\pi e^{-R \sin \theta} / R d\theta \rightarrow 0$  ( $R \rightarrow \infty$ ) である. したがって  $\int_{-\infty}^\infty f(x) dx = 2\pi i e^{-\varepsilon}$  より  $\frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^\infty f(x) dx = e^{-\varepsilon}$  である.