

$$x = 1 \text{ mol} - 24 \text{ min}$$

05)

a)

$$1) K_p = \frac{[P_{B_2}]^2 [P_{C_2}]^2}{[P_{A_2}]^3} \quad \text{--- 24 min}$$

$$X_{A_2} =$$

$$P_{A_2} = X_{A_2} \times P_T = 39 \text{ min}$$

$$K_c = \frac{[B_2]^2 [C_2]^2}{[A_2]^3} \quad \text{--- 24 min}$$

$$= \frac{7 \text{ mol}}{11} \times 7.2 \times 10^6 \text{ Pa} \quad \text{--- 24 min}$$

$$= 4.58 \times 10^6 \text{ Pa}$$

$$\approx 4.6 \times 10^6 \text{ Pa} \quad \text{--- 24 min}$$

$$(II) PV = nRT \quad \text{--- 24 min}$$

$$P_{B_2} = P_{C_2} = X_{C_2} \times P_T = 39 \text{ min}$$

$$= \frac{2}{11} \times 7.2 \times 10^6 \text{ Pa} \quad \text{--- 24 min}$$

$$= 1.309 \times 10^6 \text{ Pa}$$

$$= 1.3 \times 10^6 \text{ Pa} \quad \text{--- 24 min}$$

$$n = \frac{PV}{RT}$$

$$= \frac{4 \times 10^6 \text{ Nm}^2 \times 4.157 \times 10^{-3} \text{ m}^3}{8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 200 \text{ K}} \quad \text{--- 14 min}$$

$$K_p = 4.309 \times$$

$$= 10 \text{ mol} \quad \text{--- 24 min}$$


$$1) K_p = \frac{[P_{B_2}]^2 [P_{C_2}]^2}{[P_{A_2}]^3} \quad \text{--- 24 min}$$

$$= \frac{(1.3 \times 10^6 \text{ Pa})^2 (1.3 \times 10^6 \text{ Pa})^2}{(4.6 \times 10^6 \text{ Pa})^3} \quad \text{--- 24 min}$$

$$= \frac{2.8561 \times 10^{18} \text{ Pa}^4}{97.336 \times 10^{18} \text{ Pa}^3}$$

$$= 0.029 \times 10^6 \text{ Pa}$$

$$\approx 3 \times 10^4 \text{ Pa} \quad \text{--- 24 min}$$



Initial mol	10 mol	-	-
7n mol	3x	-	-
20. 2n mol	10-3x	2x	2x

$$\text{--- 24 min}$$

$$\text{Oxygen mol} = 10 - 3x + 4x$$

$$= 10 + x$$

300 K

$$PV = nRT \quad \text{--- 24 min}$$

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{7.2 \times 10^6 \text{ Nm}^2 \times 4.157 \times 10^{-3} \text{ m}^3}{8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 400 \text{ K}} \quad \text{--- 14 min}$$

$$10 + x = 9 \text{ mol} \quad \text{--- 24 min}$$

iv) A, B, C යනු වායු වේ.
 ඔබ්බට පරිවරණය වෙමින්.
 - 4 points

vi) $K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$ - 3 points
 $K_p = K_c (RT)$

$$K_c = \frac{K_p}{RT}$$


$$= \frac{3 \times 10^4 \text{ N/m}^2}{8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 400 \text{ K}}$$

$$= 0.029857 \text{ mol m}^{-3}$$

$$= 9.02 \text{ mol m}^{-3}$$

$$= 9.02 \times 10^3 \text{ mol dm}^{-3}$$

- 2 points



ම. මවු = $1 + y$ mol

$PV = nRT$ - 3 points
 $n = \frac{PV}{RT}$

$$1 + y \text{ mol} = \frac{2.08 \times 10^5 \text{ N m}^{-2} \times 4.157 \times 10^{-3} \text{ m}^3}{8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 400 \text{ K}}$$

$$1 + y = 11.55 \text{ mol}$$

$y = 0.55 \text{ mol}$ - 2 points

$P_{A_2} = P_T \times X_{A_2}$ - 3 points
 $= 2.08 \times 10^5 \text{ N m}^{-2} \times \frac{5.35}{11.55}$

$= 9.63 \times 10^6 \text{ N m}^{-2}$
 - 2 points

$P_{B_2} = P_T \times X_{B_2}$ - 3 points
 $= 2.08 \times 10^5 \text{ N m}^{-2} \times \frac{3.1}{11.55}$

$= 5.58 \times 10^6 \text{ N m}^{-2}$
 - 2 points

$P_{C_2} = P_T \times X_{C_2}$ - 3 points
 $= 2.08 \times 10^5 \text{ N m}^{-2} \times \frac{3.1}{11.55}$

$= 5.58 \times 10^6 \text{ N m}^{-2}$
 - 2 points

VIII ඔබ්බට පරිවරණය වෙමින් වායු වේ.
 ඔබ්බට පරිවරණය වෙමින් වායු වේ.
 ඔබ්බට පරිවරණය වෙමින් වායු වේ.
 ඔබ්බට පරිවරණය වෙමින් වායු වේ.
 ඔබ්බට පරිවරණය වෙමින් වායු වේ.
 ඔබ්බට පරිවරණය වෙමින් වායු වේ.
 ඔබ්බට පරිවරණය වෙමින් වායු වේ.
 ඔබ්බට පරිවරණය වෙමින් වායු වේ.

IX $K_p = \frac{(P_{B_2})^2 (P_{C_2})^2}{(P_{A_2})^3}$ - 3 points

$= \frac{(5.58 \times 10^6 \text{ N m}^{-2})^2 (5.58 \times 10^6 \text{ N m}^{-2})^2}{(9.63 \times 10^6 \text{ N m}^{-2})^3}$
 - 2 points

$= 1.08 \times 10^6 \text{ N m}^{-2}$
 - 2 points

$$K_a = \frac{[H_3O^+]^2 [S^{2-}]}{[H_2S(aq)]} = 3 \times 10^{-7}$$

$$K_{a1} \cdot K_{a2} = \frac{(0.03 \text{ mol dm}^{-3})^2}{0.01 \text{ mol dm}^{-3}} \quad \text{--- 2 marks}$$

$$[S^{2-}] = \frac{1 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3} \times 1 \times 10^{-14} \text{ mol dm}^{-3} \times 1 \times 10^{-14} \text{ mol dm}^{-3}}{(3 \times 10^{-2})^2 \text{ mol dm}^{-3}}$$

$$= 1.1 \times 10^{-20} \text{ mol dm}^{-3}$$



- 24 mins

b) Flammorange - Spezial

b)

(1) H_2S in O_2 and K_2S in H_2O = $\frac{0.34 \text{ g dm}^{-3}}{34 \text{ g mol}^{-1}}$ — 24 marks

= 0.01 mol dm^{-3} — 24 marks



H₂S ގެ ចំណុះ ចំណុះ ចំណុះ
 2. ចំណុះ ចំណុះ H₃O⁺ ចំណុះ ចំណុះ
 3. ចំណុះ ចំណុះ ចំណុះ (H₃O⁺) ≈ 0.03 mol/L
 (0.03 x <<< 1) - ចំណុះ

IP Ans:

MnS in Jwerst = $3 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$

Oubini $\rightarrow$ 2yutur

$= 3 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} \times 1.1 \times 10^{-2}$

$= 3.3 \times 10^{-5} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$

$\rightarrow$ 2yutur

4. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$

$$I_p \text{ MnS} < K_{sp} \text{ MnS}$$

Omro Bisy ammy

$$\begin{aligned} \text{CuS molar } (I_p) &= [\text{Cu}^{2+}] [\text{S}^{2-}] \\ \text{O.N.m} &\quad \leftarrow \text{Significant} \\ &= 1.5 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} + 1.5 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} \\ &= 1.65 \times 10^{-23} \text{ mol dm}^{-3} \end{aligned}$$

$$= 1.65 \times 10^{23} \text{ mol/dm}^3$$

$$I_P \text{ CuS} > K_{sp} \text{ AgCl}$$

Other Cus Divisions
— 24 ml

$$(11) K_{sp} (\text{ans}) = [\text{Mn}^{2+}] [\text{S}^{2-}] \quad \text{H}$$

- 3 marks

$$[\text{S}^{2-}] = \frac{5 \times 10^{-10} \text{ mol dm}^{-3}}{3 \times 10^3 \text{ mol dm}^{-3}} \quad \text{- 2 marks}$$

$$= 1.67 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3} \quad \text{- 2 marks}$$

$$K_a = \frac{[\text{HSO}_3^+]^2 [\text{S}^{2-}]}{[\text{H}_2\text{S}_2]} \quad \text{- 2 marks}$$

$$[\text{H}_2\text{S}_2] \quad \text{- 2 marks}$$

$$[\text{HSO}_3^+]^2 = \frac{K_{a1} K_{a2} [\text{H}_2\text{S}_2]}{[\text{S}^{2-}]} \quad \text{- 2 marks}$$

$$= \frac{1 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3} \times 1 \times 10^{-14} \text{ mol dm}^{-3} \times 1 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}}{1.67 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}} \quad \text{- 1 mark}$$

$$[\text{HSO}_3^+] = 0.77 \times 10^{-8} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$= 7.74 \times 10^{-9} \text{ mol dm}^{-3} \quad \text{- 2 marks}$$

(150)

6
a)

$$R = k[A]^x[B]^y[C]^z \quad - 5 \text{ yr}$$

$$2 \times 10^{-8} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} = (1 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3})^x (0.02 \text{ mol dm}^{-3})^y (0.02 \text{ mol dm}^{-3})^z \quad \text{--- ①} \quad - 5 \text{ yr}$$

$$8 \times 10^{-8} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} = (0.0004 \text{ mol dm}^{-3})^x (0.02 \text{ mol dm}^{-3})^y (0.02 \text{ mol dm}^{-3})^z \quad \text{--- ②} \quad - 3 \text{ yr}$$

$$8 \times 10^{-8} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} = (0.002 \text{ mol dm}^{-3})^x (0.04 \text{ mol dm}^{-3})^y (0.02 \text{ mol dm}^{-3})^z \quad \text{--- ③} \quad - 3 \text{ yr}$$

$$2 \times 10^{-8} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} = (0.002 \text{ mol dm}^{-3})^x (0.04 \text{ mol dm}^{-3})^y (0.01 \text{ mol dm}^{-3})^z \quad \text{--- ④} \quad - 3 \text{ yr}$$

$$\frac{\text{②}}{\text{①}} = \frac{4}{1} = \left(\frac{4}{1}\right)^x$$

$$x = 1$$

$$- 3 \text{ yr}$$

$$\frac{\text{②}}{\text{③}} \Rightarrow 1 = 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^y$$

$$y = 1$$

$$- 3 \text{ yr}$$

$$\frac{\text{③}}{\text{④}} \Rightarrow 4 = \left(\frac{2}{1}\right)^z$$

$$2^2 = (2)^z$$

$$z = 2$$

$$- 3 \text{ yr}$$

$$2) R = k[A]^x[B]^y[C]^z \quad - 6 \text{ yr}$$

$$R = k[A]^x[B]^y[C]^z$$

$$R = k[0.001 \text{ mol dm}^{-3}]^x [0.04 \text{ mol dm}^{-3}]^y [0.04 \text{ mol dm}^{-3}]^z$$

$$R = k[0.001 \text{ mol dm}^{-3}]^x [0.04 \text{ mol dm}^{-3}]^y [0.04 \text{ mol dm}^{-3}]^z \quad \text{--- ⑤} \quad - 3 \text{ yr}$$

$$2 \times 10^{-8} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} = k[0.001 \text{ mol dm}^{-3}]^x [0.02 \text{ mol dm}^{-3}]^y [0.02 \text{ mol dm}^{-3}]^z \quad \text{--- ①}$$

$$- 3 \text{ yr}$$

$$\frac{Q}{V} \Rightarrow \frac{R}{2 \times 10^8 \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}} = 0.02 \frac{0.04 \text{ mol dm}^{-3}}{0.02 \text{ mol dm}^{-3}} \times \left(\frac{0.04}{0.02} \right)^2$$

$$R = 16 \times 10^{-8} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$$

$$R = 4 \times 10^{-8} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} \quad \text{--- 3.4 mark}$$

(iii) ප්‍රතික්‍රියාවේ වේගය --- 5.4 mark

(iv) ප්‍රතික්‍රියාවේ වේගය පරිණාමය වන විට ප්‍රතික්‍රියාවේ වේගය අඩු වේ. ප්‍රතික්‍රියාවේ වේගය අඩු වීම නිසා ප්‍රතික්‍රියාවේ වේගය අඩු වේ. --- 8.4 mark

b) i) ප්‍රතික්‍රියාවේ වේගය අඩු වීම නිසා ප්‍රතික්‍රියාවේ වේගය අඩු වේ. ප්‍රතික්‍රියාවේ වේගය අඩු වීම නිසා ප්‍රතික්‍රියාවේ වේගය අඩු වේ. --- 10.4 mark

$$P_A = X_A P_A^0$$

$$\text{--- 5.4 mark}$$

P_A = වාෂ්ප පීඩනය
 X_A = වාෂ්ප පීඩනය (A)
 P_A^0 = A වාෂ්ප පීඩනය
 --- 5.4 mark

$$2) P_A = P_A^0 X_A \quad \text{--- 5.4 mark}$$

$$P_B = P_B^0 X_B \quad \text{--- 5.4 mark}$$

$$P_T = P_A + P_B$$

$$= P_A^0 X_A + P_B^0 X_B \quad \text{--- 5.4 mark}$$

$$P_A = Y_A P_T \quad \text{--- 5.4 mark}$$

$$Y_A = \frac{P_A^0 X_A}{P_A^0 X_A + P_B^0 X_B} \quad \text{--- 10.4 mark}$$

$$P_B = Y_B P_T \quad \text{--- 5.4 mark}$$

$$Y_B = \frac{P_B^0 X_B}{P_A^0 X_A + P_B^0 X_B} \quad \text{--- 10.4 mark}$$

$$(10) Y_A = \frac{4.5 \text{ kPa} \times \frac{2}{5}}{(4.5 \text{ kPa} \times \frac{2}{5}) + (60 \text{ kPa} \times \frac{3}{5})} \quad \text{--- 5 marks}$$

$$= \frac{90}{90 + 180}$$


$$= \frac{1}{3}$$

$$= 0.33 \quad \text{--- 5 marks}$$

$$Y_B = 1 - Y_A$$

$$= 1 - 0.33$$



$$= 0.67 \quad \text{--- 5 marks}$$



(150)

09)

- a)
- 1) A - Cathode - 2 marks
 - B - Anode - 2 marks



4) $E_{\text{cell}}^{\ominus} = E_{\text{ca}} - E_{\text{anode}} - 5 \text{ marks}$

$$= -1.05 \text{ V} - (-2.15 \text{ V})$$

$$= -1.05 \text{ V} + 2.15 \text{ V}$$

$$= 1.1 \text{ V} \quad \text{--- 4 marks}$$

$E = IR$ - 5 marks

$I = E/R$

$= 1.1 \text{ V} / 0.1 \Omega$

$= 11 \text{ A} \quad \text{--- 4 marks}$

2) A - ଥରାପଠା ବିନ୍ୟ ଉତ୍ତରଣିକା / ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର - 5 marks

B - ଥରାପଠା ବିନ୍ୟ ଉତ୍ତର - 5 marks

3) ଥରା

$\text{Capacity} = \frac{639 \text{ mAh}}{2 \times 96500 \text{ C/mol}} \times 11 \text{ A} \times 5 \text{ h}$ - 5 marks

$= 1.077 \text{ g} \quad \text{--- 4 marks}$

$$4) \text{Uy} \text{ Cu mol} = \frac{1.0979}{63.5 \text{ mol}} \quad \text{--- by unit}$$

$$= 1.7 \times 10^{-2} \text{ mol} \quad \text{--- Synt}$$

Ammonia (Ammonia)

$$2) \text{Uy Cu}^{2+} \text{ mol} = 0.5 \text{ mol} \times 0.5 \times 10^{-3} \text{ dm}^3$$

$$= 0.25 \text{ mol} \quad \text{--- Synt}$$

$$3) \text{Uy Cu}^{2+} \text{ mol} = 0.25 - 0.017 \text{ mol}$$

$$= 0.233 \text{ mol} \quad \text{--- Synt}$$

$$[\text{Cu}^{2+}] = \frac{0.233 \text{ mol}}{500 \times 10^{-3} \text{ dm}^3}$$

$$= 0.466 \text{ mol dm}^{-3} \quad \text{--- Synt}$$

$$e^+ \text{ mol} = \frac{3300 \text{ C}}{96500 \text{ mol}} \quad \text{--- Synt}$$

$$= 0.0342 \text{ mol} \quad \text{--- Synt}$$

$$H^+ \text{ mol} = 0.0342 \text{ mol} \quad \text{--- Synt}$$

$$[H^+] = \frac{0.0342 \text{ mol}}{500 \times 10^{-3} \text{ dm}^3}$$

$$= 0.0684 \text{ mol dm}^{-3} \quad \text{--- Synt}$$

$$pH = -\log [H^+] \quad \text{--- Synt}$$

$$= -\log 6.84 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$= 1.16 \quad \text{--- Synt}$$

$$b) \text{Uy X-Co} \quad \text{--- by unit}$$

$$Y = \text{Cu}$$

$$Z = \text{Ni} \quad \text{--- Synt}$$

$$(ii) \text{Co}^{2+} = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^7$$

$$\text{Cu}^{2+} = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^9$$

$$\text{Ni}^{2+} = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^8 \quad \text{--- by unit}$$

$$(iii) P = [\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$$

$$Q = [\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$$

$$R = [\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+} \quad \text{--- Synt}$$

$$(iv) T = [\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$$

$$V = [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$$

$$J = [\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$$

$$U = [\text{CoCl}_4]^{2-}$$

$$W = [\text{CuCl}_4]^{2-}$$

$$K = [\text{NiCl}_4]^{2-} \quad \text{--- Synt}$$

$$(v) T = \text{hexamminecobalt(II) ion}$$

$$U = \text{tetrachlorocobaltate(II) ion}$$

$$V = \text{tetraamminecopper(II) ion}$$

$$J = \text{hexamminenickel(II) ion} \quad \text{--- Synt}$$

$$(vi) \text{A} = \text{Ammonium} \quad \text{--- Synt}$$

$$\text{NaOH} \text{ (aq) / Al}^{3+} \text{ (aq) } \rightarrow \text{Al(OH)}_3 \text{ (s)}$$

$$\text{Gong} \text{ (aq) } \rightarrow \text{Gong} \text{ (s)}$$

$$\text{Gong}$$


$$\text{--- Synt}$$

$$(vii) \text{Ammonium Hydroxide}$$

$$(viii) \text{Ammonium} \text{ (aq) } \rightarrow \text{Gong} \text{ (s)}$$






$$\text{Al}^{3+} \text{ (aq) } \rightarrow \text{Al(OH)}_3 \text{ (s)}$$



Ques 2 C




open.

30 yrs





Q. 4-nitrophenol is more acidic than 2-nitrophenol. Phenoxide ion is more stable than 2-nitrophenoxide ion. Explain.







-10 marks

Q. 4-nitrophenol is more acidic than 2-nitrophenol. Phenoxide ion is more stable than 2-nitrophenoxide ion. Explain.






-10 marks

9)



a)



(iii)



b)



$$1\text{CIO}_3 \text{ (from titration)} = \frac{0.214\text{g}}{214\text{g/mol}}$$

$$= 1 \times 10^{-3} \text{ mol} \text{ - (byproduct)}$$

$$n\text{CIO}_3 : n\text{I}_2 = 4 : 3$$




$$\text{I}_2 \text{ mol (from titration)} = 3 \times 10^{-3} \text{ mol} \text{ - byproduct}$$

$$n\text{S}_2\text{O}_3^{2-} : n\text{I}_2 = 2 : 1$$

$$\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \text{ mol (from titration)} = 6 \times 10^{-3} \text{ mol} \text{ - (byproduct)}$$

$$[\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] = \frac{6 \times 10^{-3} \text{ mol}}{60 \times 10^{-3} \text{ dm}^3}$$

$$= 0.1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ - (byproduct)}$$



$$\text{from Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \text{ mol (from titration)} = 0.1 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$42 \times 10^{-3} \text{ dm}^3$$

$$= 4.2 \times 10^{-3} \text{ mol} \text{ - byproduct}$$

$$\text{I}_2 \text{ mol} = 2.1 \times 10^{-3} \text{ mol} \text{ - byproduct}$$

$$250\text{cm}^3 \text{ of Cu}^{2+} \text{ mol} = 4.2 \times 10^{-3} \text{ mol} \text{ - byproduct}$$

$$250\text{cm}^3 \text{ of Cu}^{2+} \text{ mol} = 4.2 \times 10^{-3} \text{ mol} \text{ - byproduct}$$

$$\text{Cu (from)} = 4.2 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 63.5 \text{ g/mol}$$

$$= 0.2667\text{g}$$

$$= 2.667\text{g} \text{ - byproduct}$$

$$\text{Cu\%} = \frac{2.667\text{g}}{20\text{g}} \times 100\%$$

$$= 13.33\% \text{ - byproduct}$$

(150)

1) Հանձնարար Եւ Կիւտարան Կա Ձեռքով
Օրոշում


* Դիտարկող Եւ Կիւտարան Կա Ձեռքով
Ստանդարտացում Եւ Կիւտարան Կա Ձեռքով
(Կիւտարան)

Օրոշում Եւ Կիւտարան Կա Ձեռքով

2) Կիւտարան Կա Ձեռքով
Օրոշում Եւ Կիւտարան Կա Ձեռքով
Օրոշում Եւ Կիւտարան Կա Ձեռքով

3) 1) R_1 - Կիւտարան
 R_2 - Կիւտարան
 R_3 - Կիւտարան
 R_4 - Կիւտարան

4) P_1 - Կիւտարան
 P_2 - $Ca(OH)_2$
 P_3 - HCl
 P_4 - $MgCl_2$




III) M_1 - $NaCl$
 M_2 - $NaOH$
 M_3 - Mg
 M_4 - Կիւտարան
 M_5 - Կիւտարան
 M_6 - Կիւտարան

IV) A_1 - CO_2
 A_2 - H_2O
 A_3 - H_2
 A_4 - Կիւտարան

V) 1 - Կիւտարան
2 - Կիւտարան
3 - Կիւտարան
4 - Կիւտարան
5 - Կիւտարան
6 - Կիւտարան

VI) M_1 - Կիւտարան
 M_2 - Կիւտարան
 M_3 - Կիւտարան
 M_4 - Կիւտարան
 M_5 - Կիւտարան
 M_6 - Կիւտարան



5

മുൻ ഭാഗം

പഴയ ഭാഗം

മുൻ ഭാഗം

കുറവ് മുൻ - 5 മുൻ

(150)