

# 北京大学 2014 年硕士研究生入学考试高等代数与解析几何第 7 题

叶卢庆\*

2014 年 10 月 28 日

题目 (北京大学 2014 年硕士研究生入学考试高等代数与解析几何第 7 题). 求单叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

垂直的直母线交点的轨迹.

解. 单叶双曲面可以分别化为

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = \left(\frac{z}{c}\right)^2 + 1^2 \quad (1)$$

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = \left(\frac{z}{c}\right)^2 + (-1)^2. \quad (2)$$

针对方程(1), 可以设

$$\begin{pmatrix} \frac{z}{c} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{x}{a} \\ \frac{y}{b} \end{pmatrix}. \quad (3)$$

针对方程(2), 可以设

$$\begin{pmatrix} \frac{z}{c} \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{x}{a} \\ \frac{y}{b} \end{pmatrix}. \quad (4)$$

无论是方程(3), 还是方程(4), 都是代表双曲面的直母线. 其中  $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$  是参数. 而且易得形如(3)和形如(4)的直母线族都可以遍历双曲面上所有点, 而且易得直母线族(3)里的任意两条直线异面, 直母线族(4)里的任意两条直线也异面<sup>1</sup>. 因此只可能是直母线族(3)里的直线和直母线族(4)里的直线相交. 直线(3)的方向向量为

$$\left(\frac{\sin \alpha}{a}, \frac{\cos \alpha}{b}, 0\right) \times \left(\frac{\cos \alpha}{a}, \frac{-\sin \alpha}{b}, \frac{-1}{c}\right) = \left(-\frac{\cos \alpha}{bc}, \frac{\sin \alpha}{ac}, \frac{-1}{ab}\right),$$

直线(4)的方向向量为

$$\left(-\frac{\cos \beta}{bc}, \frac{\sin \beta}{ac}, \frac{-1}{ab}\right).$$

当直线(3)和(4)垂直时, 我们有

$$\frac{\cos \alpha \cos \beta}{b^2 c^2} + \frac{\sin \alpha \sin \beta}{a^2 c^2} + \frac{1}{a^2 b^2} = 0. \quad (5)$$

现设直线(3)和(4)的交点为  $(x_0, y_0, z_0)$ , 则

$$\begin{cases} \frac{x_0}{a} \cos \alpha - \frac{y_0}{b} \sin \alpha = \frac{z_0}{c}, \\ \frac{y_0}{b} \cos \alpha + \frac{x_0}{a} \sin \alpha = 1, \\ \frac{x_0}{a} \cos \beta - \frac{y_0}{b} \sin \beta = \frac{z_0}{c}, \\ \frac{y_0}{b} \cos \beta + \frac{x_0}{a} \sin \beta = -1, \end{cases}$$

\*叶卢庆 (1992—), 男, 杭州师范大学理学院数学与应用数学专业本科在读, E-mail: yeluqingmathematics@gmail.com

<sup>1</sup>见我的文档《单叶双曲面和双曲抛物面是直纹面的另类证明》

解得

$$\cos \alpha = \frac{\frac{x_0 z_0}{ac} + \frac{y_0}{b}}{\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}}, \sin \alpha = \frac{\frac{x_0}{a} - \frac{y_0 z_0}{bc}}{\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}}.$$

$$\cos \beta = \frac{\frac{x_0 z_0}{ac} - \frac{y_0}{b}}{\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}}, \sin \beta = \frac{-\frac{x_0}{a} - \frac{y_0 z_0}{bc}}{\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}}.$$

代入方程(5), 可得单叶双曲面互相垂直的直母线的交点轨迹为

$$\left(\frac{x^2 z^2}{c^2} - \frac{a^2 y^2}{b^2}\right) + \left(\frac{y^2 z^2}{c^2} - \frac{b^2 x^2}{a^2}\right) + c^2 \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)^2 = 0.$$

□