

《常微分方程教程》习题 2.3.7¹

叶卢庆

杭州师范大学理学院, 学号:1002011005

Email:h5411167@gmail.com

2013. 11. 9

习题 (2.3.7). 令集合 $H^0 = \{f(x) | f \text{ 是以 } 2\pi \text{ 为周期的连续函数}\}$. 易知 H^0 关于实数域构成一个线性空间. 对于任意 $f \in H^0$, 定义它的模

$$\|f\| = \max_{0 \leq x \leq 2\pi} |f(x)|.$$

证明 H^0 是一个完备的空间 (即 *Banach* 空间). 利用 (13) 式可以在空间 H^0 中定义一个变换 ϕ , 它把 f 变成 y . 试证 ϕ 是一个从 H^0 到 H^0 的有界线性算子.

证明. H^0 的完备性的证明是很容易的. 而且 ϕ 是一个线性算子这件事情也是简单的. 下面证明这是一个有界线性算子. 我们主要来看

$$\left\| \int_t^{2\pi+t} f(x) e^{ax-at} dx \right\|.$$

根据 $f(x)$ 的周期性, 易得可以把上式化为

$$\left\| \int_0^{2\pi} f(x) e^{ax} dx \right\|.$$

根据 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\left| \int_0^{2\pi} f(x) e^{ax} dx \right| \leq \sqrt{\int_0^{2\pi} f^2(x) dx} \sqrt{\int_0^{2\pi} e^{2ax} dx} \leq \sqrt{2\pi} \|f\| \sqrt{\int_0^{2\pi} e^{2ax} dx}.$$

证明完毕. □

¹在《常微分方程教程》例 2.3.2 中我们解决了如下的问题:

例 (2.3.2). 设微分方程

$$\frac{dy}{dx} + ay = f(x), \quad (1)$$

其中 $a > 0$ 为常数, 而 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数. 试求方程 (1) 的 2π 周期解.

解. 方程 (1) 化为

$$dy + (ay - f(x))dx = 0. \quad (2)$$

两边同时乘以非零函数 $u(x)$, 得到

$$u(x)dy + u(x)(ay - f(x))dx = 0. \quad (3)$$

假设 (3) 是恰当方程, 则

$$\frac{du(x)}{dx} = au(x) \Rightarrow u(x) = be^{ax}, \text{不妨设 } b = 1. \quad (4)$$

于是我们得到恰当方程

$$e^{ax}dy + e^{ax}(ay - f(x))dx = 0. \quad (5)$$

设对于二元函数 $\phi(x, y)$ 来说,

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = e^{ax} \Rightarrow \phi = ye^{ax} + g(x). \quad (6)$$

因此

$$yae^{ax} + g'(x) = yae^{ax} - f(x)e^{ax} \Rightarrow g'(x) = -f(x)e^{ax}. \quad (7)$$

因此

$$g(x) = - \int f(x)e^{ax}dx + C. \quad (8)$$

因此通积分为

$$ye^{ax} - \int f(x)e^{ax}dx + C = 0. \quad (9)$$

设 $H(x) = \int f(x)e^{ax}$, 则 $x = t$ 时,

$$y_te^{at} - H(t) + C = 0. \quad (10)$$

当 $x = 2\pi + t$ 时,

$$y_{2\pi+t}e^{2\pi a+ta} - H(2\pi+t) + C = 0. \quad (11)$$

式 (10) 减去式 (11) 可得

$$y_te^{at} - y_{2\pi+t}e^{2\pi a+ta} + \int_t^{2\pi+t} f(x)e^{ax} = 0. \quad (12)$$

由于是 2π 周期解, 因此 $y_t = y_{2\pi+t}$, 因此

$$y_t = \frac{\int_t^{2\pi+t} f(x)e^{ax}}{e^{2\pi a+ta} - e^{at}} = \frac{\int_t^{2\pi+t} f(x)e^{ax-at}dx}{e^{2\pi a} - 1}. \quad (13)$$

□

