吕林根, 许子道《解析几何》习题 3.2.1

叶卢庆*

2015年1月8日

题目. 计算下列点和平面间的离差和距离.

- $M(-2,4,3),\pi: 2x-y+2z+3=0.$
- $M(1, 2-3), \pi: 5x 3y + z + 4 = 0.$
- 首先将平面 π 化为法式方程

$$-\frac{2}{3}x + \frac{1}{3}y - \frac{2}{3}z - 1 = 0$$

可见, 点 M 和平面之间的离差为

$$(\frac{-2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{-2}{3}) \cdot (-2, 4, 3) - 1 = \frac{-1}{3}.$$

可见点 M 到平面的距离为 1/3.

• 首先将平面 π 化为法式方程

$$-\frac{5}{\sqrt{35}}x + \frac{3}{\sqrt{35}}y - \frac{1}{\sqrt{35}}z - \frac{4}{\sqrt{35}} = 0.$$

可见, 点 M 和平面之间的离差为

$$\left(\frac{-5}{\sqrt{35}}, \frac{3}{\sqrt{35}}, \frac{-1}{\sqrt{35}}\right) \cdot (1, 2, -3) - \frac{4}{\sqrt{35}} = 0.$$

可见, 点 M 和平面之间的距离为 0.

^{*}叶卢庆 (1992—), 男, 杭州师范大学理学院数学与应用数学专业本科在读,E-mail:yeluqingmathematics@gmail.com