

点到平面的距离


叶卢庆

yeluqingmathematics@gmail.com


杭州师范大学理学院数学 112

2014 年 3 月 13 日

点到直线的距离



点到直线的距离




$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{AP} = 0$$

点到直线的距离

在平面直角坐标系中考虑

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{AP} = 0$$




$$M(m_1, m_2), N(n_1, n_2), P(p_1, p_2).$$

点到直线的距离

在平面直角坐标系中考虑

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{AP} = 0$$




$$M(m_1, m_2), N(n_1, n_2), P(p_1, p_2). \overrightarrow{MN} = (n_1 - m_1, n_2 - m_2).$$

点到直线的距离

在平面直角坐标系中考虑

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{AP} = 0$$




$$M(m_1, m_2), N(n_1, n_2), P(p_1, p_2). \overrightarrow{MN} = (n_1 - m_1, n_2 - m_2).$$

$$\overrightarrow{MA} = \lambda \overrightarrow{MN} = (\lambda(n_1 - m_1), \lambda(n_2 - m_2)).$$

点到直线的距离

在平面直角坐标系中考虑

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{AP} = 0$$



$$M(m_1, m_2), N(n_1, n_2), P(p_1, p_2). \overrightarrow{MN} = (n_1 - m_1, n_2 - m_2).$$


$$\overrightarrow{MA} = \lambda \overrightarrow{MN} = (\lambda(n_1 - m_1), \lambda(n_2 - m_2)).$$

$$\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{MP} - \overrightarrow{MA}$$

点到直线的距离

在平面直角坐标系中考虑

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{AP} = 0$$



$$M(m_1, m_2), N(n_1, n_2), P(p_1, p_2). \overrightarrow{MN} = (n_1 - m_1, n_2 - m_2).$$


$$\overrightarrow{MA} = \lambda \overrightarrow{MN} = (\lambda(n_1 - m_1), \lambda(n_2 - m_2)).$$

$$\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{MP} - \overrightarrow{MA} = (p_1 - m_1, p_2 - m_2) -$$

点到直线的距离

在平面直角坐标系中考虑

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{AP} = 0$$



$$M(m_1, m_2), N(n_1, n_2), P(p_1, p_2). \overrightarrow{MN} = (n_1 - m_1, n_2 - m_2).$$

$$\overrightarrow{MA} = \lambda \overrightarrow{MN} = (\lambda(n_1 - m_1), \lambda(n_2 - m_2)).$$

$$\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{MP} - \overrightarrow{MA} = (p_1 - m_1, p_2 - m_2) - (\lambda(n_1 - m_1), \lambda(n_2 - m_2))$$