北京大学教材

解析几何

丘维声 编





北京大学出版社

内容提要

本书是北京大学数学系解析几何课程的教材,主要讲述解析几何的基本内容和基本方法,包括:向量代数、空间直线和平面、常见曲面、坐标变换、二次曲线方程的化筒、正交变换、仿射变换、射影平面和射影变换等。本书注意培养读者的空间想象能力;论证严谨而简明,叙述深入浅出、条理清楚。书中有适量例题且每节都配了习题。

本书可作为综合大学和高等师范院校的解析几何课程的教材,也可供其他学习解析几何课程的广大读者作为教材或教学参考书。

解析几何 丘维声 著 责任编辑, 王明冉

北京大学出版社出版 (北京大学校内) 北京大学印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

850×1168 選米 32 开本 9.625 印张 200 千字
1988 年 8 月第一版 1988 年 8 月第一次印刷
印数: 00001—11000 册
ISBN 7-301-00349-8/0·063
定价: 1,95元



解析几何是大学数学系的主要基础课程之一,学好这门课对于学习数学分析、高等代数、微分几何和力学等课程都有很大的帮助,并且它本身的内容对于解决一些实际问题也是很有用的。

本书是以作者近几年在北京大学数学系讲授解析几何课程的 讲稿为基础编写成的。编写中主要考虑了以下几点:

- 1. 贯穿全书的主线是阐述解析几何的几种基本方法: 坐标法,向量法,坐标变换法,点变换法,第一、二、三章主要讲坐标法和向量法,并且用这些方法讨论了空间中的平面和直线,以及常见曲面。第四、五章主要讲坐标变换法,并且用这方法讨论了二次曲线方程的化简。第六、七章主要讲点变换法,讲了三种变换,正交变换、仿射变换和射影变换;讲了如何用点变换法研究图形的性质,并且运用这些变换分别讨论了二次曲线的正交分类、仿射分类和射影分类。
- 2. 本书主要讲欧氏几何和仿射几何,同时射影几何的內容 也占了一定的篇幅。本书在讲射影几何的內容时,紧紧抓住几何 背景(主要是抓住"中心投影"和"把"),从而使读者易于理解 射影平面、齐次坐标、交比、射影坐标和射影映射等概念。
- 3. 本书注意培养读者对空间图形的直观想象能力,这尤其体现在第三章中关于旋转面、柱面和锥面方程的建立,以及专门用一节介绍了画空间图形常用的三种方法,画曲面的交线和画曲面围成的区域的方法。
- 4. 本书论证严谨,同时义力求简明。叙述上深入浅出,条理清楚,注意讲清所讨论问题的来龙去脉。
 - 5. 本书在第四意 § 2结合坐标变换引进了矩 阵 的概念,讲

了矩阵的运算以及可逆矩阵、正交矩阵等內容。这样 从第四章 § 3开始,本书就运用了矩阵的工具,从而使很多叙述和 证 明变得比较简单。

6. 本书仔细注意了习题的选择和配置。每一节后面都配了习题,有些习题是为了熟练掌握正文内容的,有些习题是富有启发性的,有的习题是对正文内容的补充。加"*"号的题较难一些。

本书可供综合大学和高等师范院校的数学系、力学系作为解析几何教材。如果周学时为4+2(即每周4学时讲课,2学时习题课),则一学期可讲完全书(加"*"号內容可略去)。如果周学时为3+1,则可略去加"*"号內容以及第六章 §6和第七章。

作者衷心啟谢姜伯驹教授,他仔细审阅了本书初稿,提出了 许多宝贵的修改意见,尤其是第七章,在他的指导下,作者对这 一章的初稿作了修改,使得该章的质量有了很大提高。

作者感谢章学诚副教授和尤承业副教授,他们曾经对本书初稿的提纲提出了宝贵意见。作者还要威谢吴光磊教授、丁石孙教授、程庆民教授、田畴教授以及北京大学数学系几何代数教研室的同志们给予的支持和帮助。

由于作者水平的限制,书中缺点错误在所难免,诚恳地希望大家批评指正。

丘维声

1986年4月于北京大学

目 录

第一	葷	向量代数	
	§ 1	向量及其线性运算	(1)
	习題1	. 1	(10)
	§ 2	仿射坐标系和直角坐标系	(13)
	习题1	.2	(20)
	§ 3	向量的内积	(22)
	习题1	.3	(27)
	§ 4	向量的外积	(28)
	习题1	.4	(35)
	§ 5	向量的混合积	(36)
	习题!	.5	(43)
第二	章	空间的平面和直线	
	§ 1	仿射坐标系中平面的方程、两平面的相关位置 ************************************	(45)
	习题:	2.1	(50)
	§ 2	直角坐标系中平面的方程,点到平面的距离 ************************************	(53)
	习题	2.2	(56)
	§ 3.	直线的方程,直线、平面间的相关位置	(58)
	习题:	2 . 3	(65)
	§ 4	点、直线和平面之间的度量关系	(69)
	习题	2 . 4	(72)
第三	章	常见曲面	
	§ 1	球面和旋转面	(75)
	习题	3 . 1	(81)
	§ 2	柱面和锥面	(84)
	习题	3 . 2	(91)
	§ 3	二次曲面	(93)

	习题	3.3	(101)
	§ 4	直纹面	(103)
	习题:	3.4	(107)
	§ 5	曲面的交线, 曲面所围成的区域	(108)
	习题	3.5	(115)
第四	軍	坐标变换	
	§ 1	平面的仿射坐标变换 ************************************	(117)
	习题	1.1	(119)
	§ 2	矩阵及其运算	(120)
	习题。	1.2 ************************************	(132)
	§ 3	平面直角坐标变换	(133)
	-	.3	
	§ 4	空间坐标变换 ************************************	(141)
	习题	1,4	(145)
第五	章	二次曲线方程的化简及其性质	
		二次曲线方程的化简 ************************************	
	习魔5	.1 ************************************	(160)
	§ 2	二次曲线的不变量	(161)
	习题5	. 2	(171)
		二次曲线的对称中心 ************************************	
	习题5	.3	(177)
	§ 4	二次曲线的直径和对称轴 ************************************	(178)
	习题5	. 4	(186)
		二次曲线的切线,双曲线的渐近线	
	习题5	.5	(190)
第六	章	正交变换和仿射变换	
	§ 1	映射 ************************************	(193)
	习题6	.1 ************************************	(199)
	§ 2	平面的正交变换	(200)
		. 2	
		平面的仿射变换	
	习题6	.3 ************************************	(216)

	§ 4	图形的度量性质和仿射性质 ************************************	(219)
	习题6	. 4	(225)
	§ 5	二次曲线的正交分类和仿射分类	(226)
	习题6	.5	(230)
	§ 6	空间的正交变换和仿射变换	(231)
	习题6	.6	(236)
第七	章	射影平面和它的射影变换	
	§ 1	射影平面,齐次坐标	(239)
	习题7	,1	(251)
	§ 2	射影平面上的对偶原理	(252)
	习题7	.2	(255)
	§ 3	交比	(255)
	习题7	7.3	(263)
	§ 4	射影坐标和射影坐标变换	(264)
	习题?	7 - 4	(275)
	§ 5	射影映射和射影变换	(277)
	习题7	7.5	(286)
	§ 6	配极,二次曲线的射影分类	(287)
	习题?	7_6 ************************************	(298)

第一章 向量代数

解析几何最基本的方法是坐标法,即,建立一个坐标系,使得点用有序实数组(称为它的坐标)表示,从而图形可以用方程表示,通过方程来研究图形的性质。坐标法的优越性在于它利用了数可以进行运算的优点。那末,能否把代数运算直接引到几何中来?即什么样的几何对象能够做运算?我们从力学中知道,力、速度这些量既有大小、又有方向,它们可以用有向线段来表示,力(或速度)的合成可以通过有向线段来进行。这类既有大小、又有方向的量称为向量(或矢量),本章要研究向量的代数运算。利用向量的运算来研究图形性质的方法称为向量法,它的优点在于比较直观,并且它在力学、物理学中也有重要的应用。在解析几何中,常常把向量法和坐标法结合起来使用。


§1 向量及其线性运算

1.1 向量的概念

旣有大小、又有方向的量称为**向量**(或**矢量**)。向量用符号a, b, c, ..., 或 \overline{a} , \overline{b} , \overline{c} , ...表示。

一个向量 α 可以用一条有向线段 \overline{AB} 来表示,用这条线段的长度 |AB| 表示 α 的大小,用起点 A 到终点 B 的指向表示 α 的 方向(如图1.1)。

规定长度相等并且方向相同的有向线 段表示同一个向量。例如,若 \overrightarrow{AB} 表示向量。例如,若 \overrightarrow{AB} 表示向量。则 \overrightarrow{AB} 经过平行移动得到的有向线



E 1.2

段 \overrightarrow{CD} 仍然表示向 量 α (如图1.2)。我们记作 $\alpha = \overrightarrow{AB}$ = \overrightarrow{CD} 。


我们今后把向量的大小

也称为向量的长度。向量α的长度记作|α|。

长度为零的向量称为零向量,记作0。零向量的方向不确定。长度为1的向量称为单位向量。与 α 同向的单位向量记作 α 0。与 α 4长度相等并且方向相反的向量称为 α 6的反向量,记作 α 6. 例如 \overrightarrow{BA} 是 \overrightarrow{AB} 6的反向量,因此 \overrightarrow{BA} = $-\overrightarrow{AB}$ 6.


1.2 向量的加法

我们知道,接连作两次位移 \overrightarrow{AB} 和 \overrightarrow{BC} 的效果是作了位移 \overrightarrow{AC} (如图 1.3)。由这个实际背景我们作出




定义1.1 对于向量 a,b,作有

向线段 \overrightarrow{AB} 表 示 a, 作 \overrightarrow{BC} 表示 b, 把 \overrightarrow{AC} 表示的向量 c 称 为 a 与 b 的和,记作 c = a + b (如图1.4)。



活1 若另取一个起点 A_1 , 作 A_1B_1 表示 α , 作 B_1C_1 表示 δ , 则容易说明 A_1C_1 与 AC 表示同一个向量(如图1.4)。因此向 量的加法与起点的选择无关。

注2 也可以从同一起点 O 作 \overrightarrow{OA} 表示 α , 作 \overrightarrow{OB} 表示 δ , 再作平行四边形 O A C B , 则容易说明 \overrightarrow{OC} 也表示向量 \mathbf{c} (如图1.5).






图 1.5

向量的加法适合下述规律,

- (1) 结合律: (a+b)+c=a+(b+c), 其中 a,b,c 是 任意 向量;
 - (2) 交換律: a+b=b+a, 其中a,b 是任意向量,
 - (3) 对任意向量 a, 有 a+0=a;
 - (4) 对任意向量 a, 有 a+(-a)=0.
- (1) **的证明** 作 \overrightarrow{OA} 表示 a, 作 \overrightarrow{AB} 表示 b, 作 \overrightarrow{BC} 表示 c (如图1.6),则 \overrightarrow{OB} 表示 a + b,

 \overrightarrow{OC} 表示 (a+b)+c, 又 \overrightarrow{AC} 表示 b+c, \overrightarrow{OC} 表示 a+(b+c), 因此有

$$(a+b)+c=a+(b+c).$$




图 1.6

其余规律类似可证得。


本书中用符号 " $A \coloneqq B$ " 表示用 $B \times 规定 A$,读作 " $A \subset \mathcal{V}$ 成 B".

向量的减法的定义为:

定义1.2 a-b:=a+(-b).

者 a,b 分别用同一起点的有向线段 \overrightarrow{OA} , \overrightarrow{OB} 表示,则

$$\alpha - b = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + (-\overrightarrow{OB}) = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{BA}$$
.



大于另两边的和。

容易看出,对于任意向量 α, b ,都有

$$|a+b| \leq |a|+|b|$$
,

这个不等式称为**三角形不等式**,它是 用向量的形式表示:三角形的一边不

1.3 向量的数量乘法

定义1.3 实数 λ 与向量 α 的乘积 $\lambda \alpha$ 是 一 个 向量,它的长度为

$$|\lambda \alpha| := |\lambda| |\alpha|$$
,

它的方向当 $\lambda > 0$ 时与 α 相同, 当 $\lambda < 0$ 时与 α 相反。

对于任意向量 α ,由于 $|0\alpha|=0$ $|\alpha|=0$,所以 $0\alpha=0$ 。同理,对一切实数 λ 都有 $\lambda 0=0$ 。

设α = 0, 因为 | α | ⁻¹α 与α 同向, 拜且

$$| |\alpha|^{-1}\alpha| = |\alpha|^{-1}|\alpha| = 1$$
,

所以 $a^0 = |a|^{-1}a$ 。把一个非零向量 a 乘以它的长度 的 倒 数,便得到一个与它同向的单位向量 a^0 ,这称为把 a 单位化。

向量的数量乘法适合下述规律。对于任 意 向 量 a,b 和任意 实数 λ,μ 有

- (1) 1a = a, (-1)a = -a;
- (2) $\lambda(\mu\alpha) = (\lambda\mu)\alpha$;

(3)
$$(\lambda + \mu)\alpha = \lambda \alpha + \mu \alpha;$$
 (1.1)

(4)
$$\lambda(a+b) = \lambda a + \lambda b$$
. (1.2)

关于(1)和(2)可以用定义1.3直接验证。

(3)的证明 若 $\alpha = 0$ 或者 λ, μ 中有一个为零时,则等式(1.1) 显然成立。下面设 λ, μ 都不等于零,并且 $\alpha = 0$ 。

$$= (\lceil \lambda \rceil + \lceil \mu \rceil) \rceil \alpha \rceil,$$

久有

$$|(\lambda + \mu)\alpha| = |\lambda + \mu| |\alpha| = (|\lambda| + |\mu|) |\alpha|,$$

因而

$$|\lambda \alpha + \mu \alpha| = |(\lambda + \mu)\alpha|,$$

科且当 λ , μ 同号时,显然 $\lambda\alpha + \mu\alpha$ 与 $(\lambda + \mu)\alpha$ 同向,所以

$$(\lambda + \mu)\alpha = \lambda\alpha + \mu\alpha.$$

情形2. 若 λ , μ 异号,由于 λ 和 μ 的 地位是对称的,因此不妨设 $\lambda > 0$, $\mu < 0$ 。 又分以下三种情形:

- 2.1) 若 λ + μ = 0, 则等式(1.1)的左边为0α = 0, 右边为 λα + (~λ)α = λα + (~1)(λα) = λα + (~λα) = 0,
 因此(1.1)式成立。
 - 2.2) 若 $\lambda + \mu > 0$,因为 $\lambda + \mu > 0$, $-\mu > 0$,于是由情形 1知 $\lceil (\lambda + \mu) + (-\mu) \rceil \alpha = (\lambda + \mu) \alpha + (-\mu) \alpha,$

即得

$$\lambda \alpha = (\lambda + \mu)\alpha + (-\mu \alpha),$$

从而有

$$(\lambda + \mu) \mathbf{a} = \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{a}.$$

2.3) 若 $\lambda + \mu < 0$,因为 $\lambda + \mu$ 与 $-\lambda$ 同号,于是由情形 1 知 $[(\lambda + \mu) + (-\lambda)]\alpha = (\lambda + \mu)\alpha + (-\lambda)\alpha.$

类似于2.2)可得(1.1)式。

(4)的证明 若 $\lambda = 0$ 或者 α, b 中有一 个 为 0,则(1.2)式显然成立。下面设 $\lambda \neq 0, \alpha \neq 0, b \neq 0$ 。


若 a 和 b 平行,则存在实数 μ 使得 b = μa,于是

$$\lambda(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) = \lambda(1\boldsymbol{a} + \mu\boldsymbol{a}) = \lambda[(1 + \mu)\boldsymbol{a}]$$

$$= [\lambda(1 + \mu)]\boldsymbol{a} = (\lambda + \lambda\mu)\boldsymbol{a}$$

$$= \lambda\boldsymbol{a} + (\lambda\mu)\boldsymbol{a} = \lambda\boldsymbol{a} + \lambda(\mu\boldsymbol{a})$$

$$= \lambda\boldsymbol{a} + \lambda\boldsymbol{b}$$



昔 a 和 b 不平行,那末当 λ >0 时,作 \overrightarrow{OA} , \overrightarrow{AB} 分別表示 a, b, 于是 \overrightarrow{OB} 表示 a+b; 作 \overrightarrow{OC} , \overrightarrow{CD} 分别表示 λa , λb (如图1.8)。则 $\triangle OAB \sim \triangle OCD$, 从而 D 必在 直线 OB 上,于是 \overrightarrow{OD} 表 示 $\lambda (a$

+ b); 又 OD 表示 $\lambda a + \lambda b$, 所以有

$$\lambda(\alpha + b) = \lambda\alpha + \lambda b$$

当 4<0 时可以作类似讨论。

1.4 共线(共面)的向量组

向量的加法和数量乘法统称为向量的线性运算。

设 a_1, a_2, \dots, a_n 是一组向量, k_1, k_2, \dots, k_n 是一组 实 数,则 $k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_n a_n$ 是一个向量,称它是向 量 组 a_1, a_2, \dots, a_n 的一个线性组合,称 k_1, \dots, k_n 是这个组合的**系数**。

定义1.4 向量组若用同一起点的有向线段表示后,它们在一条直线(一个平面)上,则称这个向量组是共线的(共面的)。

若α与b 共线,则记作α // b.

显然 0 与任意向量共线; 共线的向量组一定共面; 两个向量一定共面; 若 $\alpha = \lambda b$ (或者 $b = \mu \alpha$), 则 α 与 b 共线.

命题1.1 若 α 与 δ 共线,并且 α \Rightarrow 0,则存在唯一的实数 λ 使得 δ = $\lambda \alpha$.

证明 存在性。若 α 与 δ 同尚,则 $\delta^0 = a^0$,从而有 $\delta = \{b \mid b^0 = \{b \mid a^0 = \lfloor b \mid (\lfloor a \rfloor^{-1}a) = (\lfloor b \mid \lfloor a \rfloor^{-1})a$,

取 $\lambda = \lfloor b \rfloor \lfloor \alpha \rfloor^{-1}$, 即得 $b = \lambda \alpha$ 。 若 α 与 b 反向,可以类似讨论。

唯一性。假如 $b=\lambda\alpha=\mu\alpha$,则 $(\lambda-\mu)\alpha=0$,因 为 $\alpha \neq 0$,所 以 $\lambda-\mu=0$,即 $\lambda=\mu$ 。

命题1.2 a 与 b 共 线 的充分必要条件是存在不全为零的实

$$\lambda \boldsymbol{a} + \mu \boldsymbol{b} = \mathbf{0}. \tag{1.3}$$

证明 必要性。设α与b共线, 若α=b≈0,则有1α+1b=0。

者 α 与 δ 不全为 0,不妨设 α \Rightarrow 0,则存在实数 λ 使得 δ = λ α ,从而有


$$\lambda \boldsymbol{a} + (-1)\boldsymbol{b} = 0.$$

充分性。若有不全为零的实数 λ , μ 使 得(1.3)式成立,不妨设 λ \neq 0, 则山(1.3)式 得 α = $-\frac{\mu}{\lambda}$ b, 因此 α 与 b 共线。

推论1.1 α 与 b 不共线的充分必要条件是,从(1.3)式成立可以推出 $\lambda = \mu = 0$.

命題1.3 若 $c = \lambda a + \mu b$,则 a,b,c 共面。

证明 岩 α //b,则 α ,b,c 共线,从而它们共面。岩 α //b,则当 λ >0, μ >0 时,山图1.9知, α ,b,c 共面。对 λ , μ 的其他取值情况,可以类似讨论。



命题1.4 若 α , b, c 共面, 幷且 α 与 b, 不共线,则存在唯一的一对实数 λ , μ 使得

$$c = \lambda a + \mu b$$
.

证明 存在性。从同一起点〇作 $\overrightarrow{OA} = a$, $\overrightarrow{OB} = b$, $\overrightarrow{OC} = c$.

过C作CD #OB, 且与直线 OA 变于D. 因为 \overrightarrow{OD} 与 a 共线,所以有实数 λ 使得 $\overrightarrow{OD} = \lambda a$ 、同理有 $\overrightarrow{DC} = \mu b$ 。因此有

$$\mathbf{c} = \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{DC} \approx \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}$$

唯一性。假如 $c = \lambda a + \mu b = \lambda_1 a + \mu_1 b$,则有 $(\lambda - \lambda_1) a + (\mu - \mu_1) b = 0,$

因为 a 与 b 不 共线, 根据推论 1、1 即 得

$$\lambda - \lambda_1 = 0, \quad \mu - \mu_1 = 0,$$

于是 $\lambda = \lambda_1$, $\mu = \mu_1$.

命题1.5 α , b, c 共 面 的充分必要条件是有不全为零的实数 k_1 , k_2 , k_3 使得

$$k_1 a + k_2 b + k_3 c = 0. (1.4)$$

证明 必要性。设 α,b,c 共面,若 α χ b,则有实数 λ,μ 使得 $c=\lambda\alpha+\mu b$ 。即

$$\lambda a + \mu b + (-1)c = 0.$$

岩 $\alpha \parallel b$,则有不全为零的实数 λ , μ 使得 $\lambda \alpha + \mu b = 0$,从而有 $\lambda \alpha + \mu b + 0 c = 0$.

充分性。不妨设 $k_1 \neq 0$,则由(1.4)式得

$$a = -\frac{k_2}{k_1}b - \frac{k_3}{k_1}c,$$

因此 α, b, c 共面。

推论1.2 α , δ , ϵ 不共面的充分必要条件是: 从(1.4)式成立可以推出 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$.

由于上述这些命题,使得向量的线性运算可以用来解决有关 点的共线或共面问题, 直 线 的 共 点问题以及线段的定比分割问题, 并且这些命题是建立向量的坐标的依据。

例1.1 试证:点 M 在线段 AB 上的充分必要条件 是:存在非负实数 $^{\lambda}$, $^{\mu}$ 使得

$$\overrightarrow{OM} = \lambda \overrightarrow{OA} + \mu \overrightarrow{OB}$$
, $A + \mu = 1$,

其中 0 是任意取定的一点。

证明 必要性。设M在线段 AB上,则 AM 与 AB 同向,并

且 $0 \leqslant |\overrightarrow{AM}| \leqslant |\overrightarrow{AB}|$,所以

$$\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AB}, \ 0 \leqslant k \leqslant 1.$$

任取一点O,由上式得 $\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA} = k(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA})$,即

$$\overrightarrow{OM} = (1 - k)\overrightarrow{OA} + k\overrightarrow{OB},$$

取 $\lambda = 1 - k$, $\mu = k$, 则 $\lambda + \mu = 1$, 拜且 $\lambda \ge 0$, $\mu \ge 0$.

充分性。 若对某一点 Ο 有非负实数 λ,μ 使得

$$\overrightarrow{OM} = \lambda \overrightarrow{OA} + \mu \overrightarrow{OB}$$
, \mathbf{J} , $\lambda + \mu = 1$,

厠

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA} = (\lambda \overrightarrow{OA} + \mu \overrightarrow{OB}) - (\lambda + \mu)\overrightarrow{OA}$$
$$= \mu(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) = \mu \overrightarrow{AB},$$

于是 \overrightarrow{AB} 与 \overrightarrow{AB} 共线,所以M在直线 \overrightarrow{AB} 上。由于 $0 \le \mu \le 1$,所以M在线段 \overrightarrow{AB} 上。

例1.2 试证:三点 A,B,C 共线的充分必要条件是:存在不全为零的实数 λ , μ , ν , 使得

$$\lambda \overrightarrow{OA} + \mu \overrightarrow{OB} + \nu \overrightarrow{OC} = 0$$
, 幷且 $\lambda + \mu + \nu = 0$,

其中〇是任意取定的一点。

证明 必要性。若 A,B,C 共线,则 \overrightarrow{AB} 与 \overrightarrow{AC} 共线,于是存在不全为零的实数 k,l 使得

$$k\overrightarrow{AB} + l\overrightarrow{AC} = 0.$$

任取一点 (), 由上式得

$$k(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) + l(\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}) = 0,$$

 $\mathbf{II} \qquad -(k+l)\overrightarrow{OA} + k\overrightarrow{OB} + l\overrightarrow{OC} = \mathbf{0}.$

取 $\lambda = -(k+l)$, $\mu = k$, $\nu = l$, 则得

$$\lambda \overrightarrow{OA} + \mu \overrightarrow{OB} + \nu \overrightarrow{OC} = 0$$
, $\pm \lambda + \mu + \nu = 0$.

充分性。若对某一点O,有不全为零的实数 λ , μ , ν 使得

 $\lambda \overrightarrow{OA} + \mu \overrightarrow{OB} + \nu \overrightarrow{OC} = 0, \quad \underline{\Pi} \quad \lambda + \mu + \nu = 0,$ 则 $\lambda = -(\mu + \nu)$, 于是

$$-(\mu+\nu)\overrightarrow{OA} + \mu\overrightarrow{OB} + \nu\overrightarrow{OC} = 0,$$

$$\mu(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) + \nu(\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}) = 0.$$

也就是 $\mu \overrightarrow{AB} + \nu \overrightarrow{AC} = 0$. 易说明 μ, ν 不全为零,从而得 $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{AC}$,所以 A, B, C 共线、

习题 1.1

- 1. 已知平行四边形 ABCD 的对角线为 AC 和 BD, 设 \overrightarrow{AC} = a, $\overrightarrow{BD} = b$, 求 \overrightarrow{AB} , \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{CD} 和 \overrightarrow{DA} .
- 2. 已知平行四边形 ABCD 的边 BC 和 CD 的中点分别为 K 和 L ,设 $\overrightarrow{AK} = k$, $\overrightarrow{AL} = l$,求 \overrightarrow{BC} 和 \overrightarrow{CD} 。
- 3. 证明: M 是线段 AB 的中点的充分必要条件是: 对任意 一点 O 有 $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$.
- 4. 设 M 是平行四边形 ABCD 的 对 角线的交点,证明: 对任意一点 O ,有 $^{\overrightarrow{OM}}$ = $\frac{1}{4}(\overset{\rightarrow}{OA}+\overset{\rightarrow}{OB}+\overset{\rightarrow}{OC}+\overset{\rightarrow}{OD})$.
- 5. 设 AD, DE, CF 是 $\triangle ABC$ 的三条中线,用 \overrightarrow{AB} , \overrightarrow{AC} 表示 \overrightarrow{AD} , \overrightarrow{BE} , \overrightarrow{CF} , 并且求 \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{CF} .
- 6. 设 A,B,C,D 是一个四面体的顶点,M,N分别是边 AB, CD 的中点,证明 $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$.
 - 7。 证明: 对任意向量 a,b 都有 |a+b|≪|a|+|b|,

这个不等式称为三角形不等式。等 号 成 立 的充分必要条件是什么?

舠

- 8. 证明, 若 a, b, c 共面, 则其中至少有一个向量可以表示 成其余两个向量的线性组合。是否其中每一个向量都可以表示成 其余两个向量的线性组合?
- 9、 证明: 点M在直线 AB 上的充分必要条件是: 有实数 λ , μ 使得

$$\overrightarrow{OM} = \lambda \overrightarrow{OA} + \mu \overrightarrow{OB}$$
, $\cancel{4} + \mu = 1$,

其中 0 是任意取定的一点。

10. 证明: 四点 A,B,C,D 共面的充分必要条件是: 存在不全为零的实数 λ,μ,ν,ω 使得

 $\lambda \overrightarrow{OA} + \mu \overrightarrow{OB} + \nu \overrightarrow{OC} + \omega \overrightarrow{OD} = 0$, 且 $\lambda + \mu + \nu + \omega = 0$, 其中 O 是任意取定的一点。

11. 设 A,B,C 是不在一直线上的三点,则点M在A,B,C决定的平面上的充分必要条件是,存在实数 λ,μ,ν 使得

$$\overrightarrow{OM} = \lambda \overrightarrow{OA} + \mu \overrightarrow{OB} + \nu \overrightarrow{OC}$$
, $H \lambda + \mu + \nu = 1$,

其中0是任意取定的一点。

12. 证明: 点M在 $\triangle ABC$ 內(包括 三条边)的充分必要条件是: 存在非负实数 λ , μ 使得

$$\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC}$$
, $\exists \lambda + \mu \leqslant 1$.

13. 证明: 点M在 $\triangle ABC$ 内(包括三边)的充分必要条件是: 存在非负实数 λ,μ,ν 使得

$$\overrightarrow{OM} = \lambda \overrightarrow{OA} + \mu \overrightarrow{OB} + \nu \overrightarrow{OC}, \quad \underline{\Pi} \lambda + \mu + \nu = 1,$$

其中〇是任意取定的一点。

- 14. 用向量法证明: 平行四边形的对角线互相平分,
- 15. 用向量法证明: 三角形 ABC的三条中线相交于一点M, 幷且对任意一点O有

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$$
.

16. 用向量法证明: 四面体 ABCD 的 对 棱中点连线交子一

点M,并且对于任意一点O有

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}).$$

17. 在 $\triangle ABC$ 中,E,F分别是AC,AB上的点,并且 $CE=\frac{1}{3}CA$, $AF=\frac{1}{3}AB$,设BE与CF交于G,证明

$$GE = \frac{1}{7}BE$$
, $GF = \frac{4}{7}CF$.

*18. 用向量法证明**契维定理**: 若三角形 ABC 的 三边 AB, BC, CA 依次被分割成

 $AF: FB = \lambda: \mu$, $BD: DC = \nu: \lambda$, $CE ... EA = \mu: \nu$, 其中 λ, μ, ν 均为正实数,则三角形 ABC 的 顶点与对边分点的连线交于一点M,并且对于任意一点O有

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{\lambda + \mu + \nu} (\mu \overrightarrow{OA} + \lambda \overrightarrow{OB} + \nu \overrightarrow{OC}).$$

*19. 用向量法证明:三角形 ABC 的 三条角平分线交于一点N。并且对于任意一点O有

$$\overrightarrow{ON} = \frac{\overrightarrow{aOA} + \overrightarrow{bOB} + \overrightarrow{cOC}}{a+b+c},$$

其中a,b,c分别是A,B,C所对的边的边长。

- *20. 设 A_1, A_2, \dots, A_n 是正 n 边形的 顶 点, O 是它的对称中 心。证明 $\overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_2} + \dots + \overrightarrow{OA_n} = 0$.
- *21. 设一个区域G,如果连结它的任意两点的线段上的每一点都是G的点,则称G是**凸的。**证明:由同一点出发的向量

$$\mathbf{x} = k_1 \mathbf{a}_1 + k_2 \mathbf{a}_2 + \dots + k_m \mathbf{a}_m$$

的终点组成的区域是凸的,其中 k_1, \dots, k_m 都是非负实数,并且 $k_1 + \dots + k_m = 1$.

§ 2 仿射坐标系和直角坐标系

向量法的优点在于比较直观,但是向量的运算不如数的运**算** 简洁,为了取长补短,我们给向量引进它的坐标,同时给点也引 进它的坐标,把向量法与坐标法结合起来使用。

2.1 向量和点的仿射坐标、直角坐标

定理1.1 空间中任意给定三个不共面的向量 e_1, e_2, e_3 ,则任意一个向量 m 可以唯一表示成 e_1, e_2, e_3 的线性组合。

证明 可表性。取一点O,作 $\overrightarrow{OA_1}$, $\overrightarrow{OA_2}$, $\overrightarrow{OA_3}$, \overrightarrow{OM} 分别表示 e_1 , e_2 , e_3 ,m。过M作一直线与 OA_3 平行,且与 OA_1 和 OA_2 决定的平面交于N。过N作一直线与 OA_2 平行,并且与 OA_1 交于P。因为




图 1.11

$$\overrightarrow{OP} \parallel e_1, \overrightarrow{PN} \parallel e_2, \overrightarrow{NM} \parallel e_3,$$

所以分别存在实数 x,y,z 使得

$$\overrightarrow{OP} = xe_1$$
, $\overrightarrow{PN} = ye_2$, $\overrightarrow{NM} = ze_3$.

从而

$$m = \overrightarrow{ON} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PN} + \overrightarrow{NM} = xe_1 + ye_2 + ze_3.$$
 唯一性。若

$$\overrightarrow{OM} = xe_1 + ye_2 + ze_3 = x_1e_1 + y_1e_2 + z_1e_3,$$

则得

$$(x-x_1)e_1 + (y-y_1)e_2 + (z-z_1)e_3 = 0.$$

因为 e₁,e₂,e₃ 不共面, 所以。

$$x - x_1 = y - y_1 = z - z_1 = 0$$
,
 $x = x_1$, $y = y_1$, $z = z_1$

聊

定义1.5 空间中任意三个有次序的不共面的 向 量 e_1, e_2, e_3 称为空间中的一组基。对于空间中任一向量 m_1 若

$$\boldsymbol{m} = x\boldsymbol{e}_1 + y\boldsymbol{e}_2 + z\boldsymbol{e}_3,$$

则把有序三元实数组(x,y,z)称为 m 在基 e_1,e_2,e_3 中的坐标。

向量有了坐标后,我们再对空间中的点也引进坐标。由于空间中取定一个点O以后,任意一个点M与向量OM 互 相 唯 一 决定,因此我们把向量OM 称为点M的定位向量(或矢径)。

定义1.6 空间中一个点O和一组基 e_1,e_2,e_3 合 在一起称为空间的一个仿射标架或仿射坐标系,记作 $[O,e_1,e_2,e_3]$,其中O称为原点。对于空间中任意一点M,把它的 定 位 向 量 OM 在基 e_1,e_2,e_3 中的坐标称为点M在仿射标架 $[O,e_1,e_2,e_3]$ 中 的 坐标。

由定义1.6知,点M在[O, e_1 , e_2 , e_3]中的坐标为(x, y, z)的 充分必要条件是:

$$\overrightarrow{OM} = xe_1 + ye_2 + ze_3.$$


以后我们把向量 m 在基 e_1 , e_2 , e_3 中的坐标也称为 m 在仿射标架[O, e_1 , e_2 , e_3]中的坐标。

空间中取定了一个仿射标架后,由定理1.1知,空间中全体向量的集合与全体有序三元实数组的集合之间就建立了一一对应,通过定位向量,空间中全体点的集合与全体有序三元实数组的集合之间也建立了一一对应。

设[O; e_1 , e_2 , e_3]为空间的一个仿射标架,过原点O,且分别以 e_1 , e_2 , e_3 为方向的有向直线分别称为x 轴,y 轴,x 轴,统称为坐标轴。由每两根坐标轴决定的平面称为坐标平面,它们分别为 xOy, yOz, zOx 平面。坐 标平面把空间分成八个部分,称为八个 卦限(如图1.12),在每个卦限内,点的坐标的符号是不变的。

将右手的拇指和食指分别指着 x 轴和 y 轴的方向,如果中指 所指的方向与 z 轴方向在 xOy 平 面同侧,则称此坐标系为 **右 手 系**,否则称为**左手系**(如图1.13)。

野 限 坐 标	Ţ	I	I	IV	v	٧ī	VI	YMI.
3	+	_	-	+	+		-	+
<i>y</i>	+	+		_	+	+		
z	+	+	+	+	_		-	-



定义1.7 如果 e_1 , e_2 , e_3 两两垂直,并且它们都是单位向量,则[O, e_1 , e_2 , e_3]称为一个**直角标架**或**直角坐标系**.

君 e_1 , e_2 , e_3 两两垂直,则它们一定不共面,因此直角标架是特殊的仿射标架。

点(或向量)在直角坐标系中的坐标称为它的**直角坐标**,在仿射坐标系中的坐标称为它的**仿射坐标**。

类似地可讨论平面上的仿射坐标系和直角坐标系。

2.2 用坐标作向量的线性运算

取定仿射标架 $[O;e_1,e_2,e_3]$, 设a的坐标是 (a_1,a_2,a_3) , b的

學标是(b₁,b₂,b₃), 则

$$a + b = (a_1e_1 + a_2e_2 + a_3e_3) + (b_1e_1 + b_2e_2 + b_3e_3)$$

= $(a_1 + b_1)e_1 + (a_2 + b_2)e_2 + (a_3 + b_3)e_3$,

所以 $\alpha + b$ 的坐标是 $(a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$ 。这 说明,向量和的坐标等于对应坐标的和。

对于任意实数 4, 有

 $\lambda \alpha = \lambda (a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3) = (\lambda a_1) e_1 + (\lambda a_2) e_2 + (\lambda a_3) e_3$, 所以 $\lambda \alpha$ 的坐标是(λa_1 , λa_2 , λa_3)。这说明: α 乘以 实 数 λ ,则它的坐标就都乘上同一个实数 λ 。

由上述得: a-b 的坐标是 $(a_1-b_1,a_2-b_2,a_3-b_8)$ 。

定理1.2 向量的坐标等于其终点坐标减去其起点坐标。

证明 对于向量 \overrightarrow{AB} , 设 A,B 的坐标 分别 是 (x_1,y_1,z_1) , (x_2,y_2,z_2) , 它们也分别是 \overrightarrow{OA} , \overrightarrow{OB} 的坐标。因为 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$, 所以 \overrightarrow{AB} 的坐标是 $(x_2-x_1,y_2-y_1,z_2-z_1)$.

点M的坐标是它的定位向量OM的坐标,向量的坐标等于其 终点坐标减去其起点坐标,这两句话表明了点的坐标与向量的坐 标之间的关系。

2.3 三点(或两向量)共线的条件

定理1.3 在三个点 A,B,C 所 在 的 平面上取一个仿射标架 $[O,e_1,e_2]$, 设 A,B,C 的坐标分别是

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3),$$

則三点 A,B,C 共线的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$
 (1.5)

证明 必要性。设三点 A,B,C 共线,则由例1.2知,存在不 全为零的实数 λ,μ,ν 使得

$$\lambda \overrightarrow{OA} + \mu \overrightarrow{OB} + \nu \overrightarrow{OC} = 0, \quad \underline{\Pi} \quad \lambda + \mu + \nu = 0. \quad (1.6)$$

(1,6)中向量的等式用坐标写出就是

$$\begin{cases} \lambda x_1 + \mu x_2 + \nu x_3 = 0, \\ \lambda y_1 + \mu y_2 + \nu y_3 = 0, \end{cases}$$
 (1.7)

用 $\nu = -(\lambda + \mu)$ 代入(1,7)式得

$$\begin{cases} \lambda(x_1 - x_3) + \mu(x_2 - x_3) = 0, \\ \lambda(y_1 - y_3) + \mu(y_2 - y_3) = 0. \end{cases}$$
 (1.8)

因为 λ,μ,ν 不全为零,于是据(1.6)知, λ,μ 不 全 为零。从而未知量为x,y的齐次线性方程组

$$\begin{cases} (x_1 - x_3)x + (x_2 - x_3)y = 0, \\ (y_1 - y_3)x + (y_2 - y_3)y = 0 \end{cases}$$
 (1.9)

有非零解: $x = \lambda, y = \mu$ 。因此它的系数行列式

$$\begin{vmatrix} x_1 - x_3 & x_2 - x_3 \\ y_1 - y_3 & y_2 - y_3 \end{vmatrix} = 0.$$
 (1.10)

于是有

$$\begin{vmatrix} x_1 - x_3 & x_2 - x_3 & x_3 \\ y_1 - y_3 & y_2 - y_3 & y_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

即得

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = 0.$$

充分性、如果(1,5)式成立,则(1,10)式成立。从 而 齐次线性方程组(1,9)有非零解。 $x=\lambda,y=\mu$ 。于 是 得(1,8)式。令 $\nu=-(\lambda+\mu)$,则得(1,7)式,所以(1,6)成立。据例1.2 知,A,B,C 共线。

定理1.4 设两向量 a,b 在空间仿射 标 架 $[O,e_1,e_2,e_3]$ 中的 坐标分别是 (a_1,a_2,a_3) , (b_1,b_2,b_3) 。则 a 与 b 共线的充分必要条

件是

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix} = 0.$$
 (1.11)

证明 必要性。设α与b共线。假如 $\alpha=0$,则(1.11) 显然成立。下设 $\alpha=0$,于是有实数k使得 $b=k\alpha$,所以

$$b_i = ka_i, i = 1, 2, 3.$$

从而

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & ka_1 \\ a_2 & ka_2 \end{vmatrix} = 0.$$

同理, (1.11)中的其余两个行列式也为零。

充分性。设(1.11)式成立。如果 a,b 中有一个为 0 ,则结论显然成立。下设 $a \neq 0$, $b \neq 0$ 。于是不妨 设 $a_1 \neq 0$, $b_2 \neq 0$ (其余情况可类似讨论)。因为

$$0 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1,$$

所以 $a_1b_2 = a_2b_1$ 。 从而有

$$\frac{b_1}{a_1} = \frac{b_2}{a_2}.$$

把这个比值记作 k ,则得 $b_1 = ka_1$, $b_2 = ka_2$ 。因为

$$0 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix} = a_1b_3 - a_3b_1 = a_1(b_3 - ka_3),$$

所以 $b_3 = ka_3$ 。于是有

$$(b_1, b_2, b_3) = (ka_1, ka_2, ka_3),$$

从而得 b=ka,因此 a 与 b 共线。

2.4 线段的定比分点

对于线段 AB(A
ightharpoonup B), 如果点 C 满足 $\overrightarrow{AC} = \lambda \overrightarrow{CB}$, 则称 点 C 分线段 AB 成定比 λ . 当 $\lambda > 0$ 时, \overrightarrow{AC} 与 \overrightarrow{CB} 同向,点 C 是线段

AB內部的点,称 C 为 內分点,当 $\lambda < 0$ 时, \overrightarrow{AC} 与 \overrightarrow{CB} 反向, C 是线段 AB 外部的点,称 C 为外分点, $\lambda = 0$ 时, C 点与 A 点重合; 假如 $\lambda = -1$,则得 $\overrightarrow{AC} = -\overrightarrow{CB}$,即 $\overrightarrow{AB} = 0$,矛盾,所以 $\lambda = -1$.

命题1.6 设A,B的坐标分别是 (x_1,y_1,z_1) , (x_2,y_2,z_2) ,则分线段AB成定比 $\lambda(\lambda + 1)$ 的分点C的坐标是

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}, z = \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda}.$$
 (1.12)

证明 设C点的坐标是(x,y,z), $\overrightarrow{AC} = \lambda \overrightarrow{CB}$, 用坐标写出就是

$$\begin{cases} x - x_1 = \lambda(x_2 - x), \\ y - y_1 = \lambda(y_2 - y), \\ z - z_1 = \lambda(z_2 - z). \end{cases}$$

解得

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}, z = \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda}.$$


推论1.3 设 A, B 的坐标分别为 (x_1,y_1,z_1) , (x_2,y_2,z_2) , 则线段 A B 的中点的坐标为

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}, \quad z = \frac{z_1 + z_2}{2}.$$

例1.3 用坐标法证明,四面体对梭中点的连线交于一点。

证明 设四面体ABCD的棱AB, AC,AD,BC,CD,DB 的中点分别是 B',C',D',E,F,G.

取仿射标架[$A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$],则各点坐标分别为:A(0,0,0),B(1,0,0),C(0,1,0),D(0,0,1), $B'\left(\frac{1}{2},0,0\right)$, $C'\left(0,\frac{1}{2},0\right)$,



$$D'\left(0,0,\frac{1}{2}\right), E\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right), F\left(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right), G\left(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right).$$

设 B'F 与 D'E 交于点 M(x,y,z), 设 $\overrightarrow{B'M} = k \overrightarrow{MF}$, $\overrightarrow{D'M}$ = $l \overrightarrow{ME}$, 则 M 的 坐标为,

$$x = \frac{\frac{1}{2} + k \cdot 0}{1 + k} = \frac{0 + l \cdot \frac{1}{2}}{1 + l}, \quad y = \frac{0 + k \frac{1}{2}}{1 + k} = \frac{0 + l \frac{1}{2}}{1 + l},$$
$$z = \frac{0 + k \frac{1}{2}}{1 + k} = \frac{\frac{1}{2} + l \cdot 0}{1 + l},$$

解得 l=1, k=1。 从而M的坐标为 $\left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$ 。

设B'F与C'G交于M',同理可求得M' 坐标为 $\left(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)$,

所以 M与M' 重合, 即 B'F,D'E,C'G 交于一点M.

注 此题在写出各点坐标后,也可以先求出 B'F 的 中 点坐标为 $\left(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)$, D'E的中点坐标为 $\left(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)$, C'G的中点坐标为 $\left(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)$, 这说明点 $M\left(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)$ 是 B'F,D'E,C'G的公共点,从而得证。

在用坐标法解决问题时,一定要注意针对问题的特点选取合适的坐标系。

习 題 1.2

- 1. 在一个仿射坐标系中画出下列各点: P(1,3,4), Q(-1,1,3), M(-1,-2,-3).
- 2. 给定直角坐标系,设点M的坐标为(x,y,z),求它分别

对于 xOy 平面, x 轴和原点的对称点的坐标。

3. 设平行四边形 ABCD 的对角线交干M点,设

$$\overrightarrow{DP} = \frac{1}{5} \overrightarrow{DB}$$
, $\overrightarrow{CQ} = \frac{1}{6} \overrightarrow{CA}$.

取仿射标架[A, \overrightarrow{AB} , \overrightarrow{AD}], 求点 M,P,Q 的坐标以及向量 \overrightarrow{PQ} 的坐标。

- 4. 对于平行四边形 ABCD, 求 A,D, \overrightarrow{AD} , \overrightarrow{DB} 在 仿 射标 架[C, \overrightarrow{AC} , \overrightarrow{BD}]中的坐标。
- 5. 设 ABCDEF 为正六边形,求各顶点以及向量 \overrightarrow{DB} , \overrightarrow{DF} 在[A, \overrightarrow{AB} , \overrightarrow{AF}]中的坐标。
- 6. 已知 $\overrightarrow{OA} = e_1$, $\overrightarrow{OB} = e_2$, $\overrightarrow{OC} = e_3$ 是以原点 O 为顶点的平行六面体的三条棱,求此平行六面体过点 O 的 对 角 线 与平面 ABC 的交点 M 在仿射标架 $[O;e_1,e_2,e_3]$ 下的坐标。
- 7. 设 α , b, c 的 坐 标 分 别 是(1,5,2),(0,-3,4),(-2,3,-1), 求下列向量的坐标:
 - 1) 2a b + c; 2) -3a + 2b + 4c.
- 8. 已知平行四边形 ABCD 中顶点 A,B,C 的 坐 标 分别为 (1.0,2),(0.3,-1),(2.-1.3),求D 点和对角线交点M 的坐标。
- 9. 判断下列各组的三个向量 a,b,c 是否共面? 能否将 c表示成 a,b 的线性组合? 若能表示,则写出表示式。
 - 1) a(5,2,1), b(-1,4,2), c(-1,-1,5);
 - 2) a(6,4,2), b(-9,6,3), c(-3,6,3);
 - 3) a(1,2,-3), b(-2,-4,6), c(1,0,5).
- 10. 设点C分线段AB成5:2, 点A的坐标为(3,7,4), 点C的坐标为(8,2,3), 求点B的坐标。
- 11. 用坐标法证明: 三角形 ABC 的三条 中线 变于 一点。 若 A,B,C 的坐标分别为 (x_1,y_1,z_1) , (x_2,y_2,z_2) , (x_3,y_3,z_3) , 求 $\triangle ABC$ 的重心的坐标。

12. 在 $\triangle ABC$ 中, 设 P, Q, R 分别是直线 AB, BC, CA 上的点, 纤且

 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{PB}$, $\overrightarrow{BQ} = \mu \overrightarrow{QC}$, $\overrightarrow{CR} = \nu \overrightarrow{RA}$. 证明 P , Q , R 共线的充分必要条件是 $\lambda \mu \nu = -1$.

§ 3 向量的内积

有关长度、角度问题如何利用向量来解决?从力学中知道,若力F使质点A位移S,则F做的 功W为。

 $W = |F_1||S| = |F||S|\cos a$, 其中 F_1 是 F 沿 S 方向的分力, α 是 F 与 S 的夹角。在求功W 的式子里出现了向量的长度,两向量的夹角,从这物理背景受




图 1.15

到启发,为了解决有关长度、角度问题,需要考虑类似于功W那样的数量,它是由向量 F 和 S 确定的。由于求功 W 的 第一步是求分力 F_1 ,所以先来考虑类似于分力 F_1 那样的向量。

3.1 射影和分量

给了向量 α 和单位向量 e,显然 α 可以分解成:

图 1.16

$$\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2$$
,

其中 $a_1 \parallel e$, $a_2 \perp e$. 幷且这样的分解 法是唯一的,这是因为假如还有 $a = b_1 + b_2$, $b_1 \parallel e$, $b_2 \perp e$,

则 得
$$(a_1 - b_1) + (a_2 - b_2) = 0$$
, 即

 $\alpha_1 - b_1 = b_2 - \alpha_2$ 。因为容易说明

$$(a_1 - b_1) \ /\!\!/ e, \ (b_2 - a_2) \perp e,$$
 $a_1 - b_1 = b_2 - a_2 = 0,$
 $a_1 = b_1, \ a_2 = b_2.$

即

所以

定义1.8 若向量 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$, 其中 α_1 / e , $\alpha_2 \perp e$, e 是单位向

量,则称 α_1 是 α 在方向 e 上的內射影(简称射影),称 α_2 是 α 沿方向 e 下的外射影。

定义1.9 若 α_1 是 α 在方向 e(单位向量)上的内射影,则 存在唯一的实数 λ 使得 $\alpha_1 = \lambda e$,这个实数 λ 被称为 α 在 方 向 e 上的分量,记作 $\prod_{\alpha} \alpha_n$

约定向是 a 与 b 的夹角 $\langle a,b \rangle$ (或记成 $\langle b,a \rangle$)是指不大于 π 的那个角,即, $0 \leq \langle a,b \rangle \leq \pi$.

命题1.7 向量 α 在方向 ε(单位向量)上的分量为:

$$\prod_{e} a = |a|\cos(a,e). \tag{1.13}$$

证明 用 λ 表示 Π . α , 则 $\alpha_1 = \lambda e$, 所以 $|\lambda| = |\alpha|$. 由直角三角形的解法知,

$$|\alpha_1| = |\alpha| |\cos\langle\alpha,e\rangle|$$

当< α ,e>为锐(钝)角时, α_1 与e同(反)向,从而 λ >0(λ <0)。因此 $\prod_{\alpha} \alpha = \lambda = |\alpha| \cos \langle \alpha, e \rangle$ 。

命题1.8 设 e 为一个单位向量,则对任意向量 a, b 有

$$\prod_{\bullet} (a+b) = \prod_{\bullet} a + \prod_{\bullet} b, \qquad (1.14)$$

$$\prod_{\bullet} (\lambda \alpha) = \lambda(\prod_{\bullet} \alpha). \tag{1.15}$$

证明 建立直角标架 $[O, e_1, e_2, e_3]$, 由图1.17知, $\alpha = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PN} + \overrightarrow{NM}$

 $= xe + ye_2 + ze_3$, 其中 $\overrightarrow{OP} = xe, \overrightarrow{PN} = ye_2$, $\overrightarrow{NM} = ze_3$. 由三垂线定理 知, $MP \perp OP$.所以 \overrightarrow{OP} 是 a 在方向 e 上 的內射影,从 而得 $\prod .a = x$. 这说明 $\prod .a$ 就是 a 的第一个直角坐标,




图 1.17

于是据"向量和的坐标等于对应坐标的和"便得到:

$$\prod_{\bullet} (a+b) = \prod_{\bullet} a + \prod_{\bullet} b_{\bullet}$$

$$\prod_{\bullet}(\lambda \, \alpha) = \lambda(\prod_{\bullet} \alpha)_{\bullet}$$

3.2 向量的內积的定义和性质

类似于功规样的数量,我们引进向量的内积的概念。

定义1.10 两个向量 a 与 b 的内积(记作 $a \cdot b$) 規定为一个 変数: $a \cdot b := |a| |b| \cos(a,b)$, (1.16)

若 a 与 b 中有一个为 0,则 a · b ≔ 0。

若 6 ≒ 0、则由(1,13)和(1,16)得

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = (\prod_{b} \circ \boldsymbol{a}) |\boldsymbol{b}|, \qquad (1.17)$$

(1.17)式表明了向量的内积与分量的关系。

由(1.16)式可得:

$$|\alpha| = \sqrt{\alpha \cdot \alpha}, \qquad (1.18)$$

$$\cos\langle a,b\rangle = \frac{a \cdot b}{|a||b|}, \quad \exists a \neq 0, b \neq 0.$$
 (1.19)

(1.18)和(1.19)表明可以利用向量的內积来解决有关长度和 角度的问题。

由定义 1.10 可得到, $\alpha \perp b$ 的充分必要条件是 $\alpha \cdot b = 0$.

定理1.5 对于任意的向量 a,b,c, 任意实数 l, 有

- (1) a·b=b·a (对称性),
- (2) $(\lambda a) \cdot b = \lambda(a \cdot b)$ (线性),
- (3) $(a+c) \cdot b = a \cdot b + c \cdot b$ (线性),
- (4) 若 a ≠ 0, 则 a · a > 0 (正定性).

证明 由定义(1.10)立即得到

$$a \cdot b = b \cdot a$$

由(1.17), (1.15)和(1.14)得

$$(\lambda a) \cdot b = \prod_{b} \circ (\lambda a) |b| = \lambda (\prod_{b} \circ a) |b| = \lambda (a \cdot b),$$

$$(a+c) \cdot b = \prod_{b} \circ (a+c) |b| = (\prod_{b} \circ a + \prod_{b} \circ c) |b|$$
$$= a \cdot b + c \cdot b.$$


由定义1,10立即得到: 者 α \neq 0, 则 α · α = $|\alpha|^2 > 0$. 由内积的对称性和线性还可得到:

$$a \cdot (\lambda b) = \lambda (a \cdot b),$$

 $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$

例1.4 证明三角形的三条 高 线 交于一点。

证明 设 $\triangle ABC$ 的两条高线 BE,CF 交干M。连接 AM。因为 BE 上 AC,所以 BM · $\overrightarrow{AC} = 0$,即, $(\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AB})$ · $\overrightarrow{AC} = 0$,即, \overrightarrow{AM} · $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB}$ · \overrightarrow{AC} .



因为 $CF \perp AB$, 所以 $\overrightarrow{CM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, 从而得

$$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$$
.

于是有 \overrightarrow{AM} · $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AM}$ · \overrightarrow{AB} ,即得 \overrightarrow{AM} · $\overrightarrow{BC} = 0$ 。这 表 明 $AM \perp BC$ 。 延长 AM 与 BC 变于 D ,则 AD 为 BC 边上的高。所以三角形 ABC 的三条高线变于一点 M 。

3.3 用坐标计算向量的内积

首先取一个仿射坐标系 $[O; e_1, e_2, e_3]$, 设 a,b 的坐标分别是 $(a_1, a_2, a_3), (b_1, b_2, b_3),$ 则

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (a_{1}\mathbf{e}_{1} + a_{2}\mathbf{e}_{2} + a_{3}\mathbf{e}_{3}) \cdot (b_{1}\mathbf{e}_{1} + b_{2}\mathbf{e}_{2} + b_{3}\mathbf{e}_{3})$$

$$= a_{1}b_{1}\mathbf{e}_{1} \cdot \mathbf{e}_{1} + a_{1}b_{2}\mathbf{e}_{1} \cdot \mathbf{e}_{2} + a_{1}b_{3}\mathbf{e}_{1} \cdot \mathbf{e}_{3}$$

$$+ a_{2}b_{1}\mathbf{e}_{2} \cdot \mathbf{e}_{1} + a_{2}b_{2}\mathbf{e}_{2} \cdot \mathbf{e}_{2} + a_{2}b_{3}\mathbf{e}_{2} \cdot \mathbf{e}_{3}$$

$$+ a_{3}b_{1}\mathbf{e}_{3} \cdot \mathbf{e}_{1} + a_{3}b_{2}\mathbf{e}_{3} \cdot \mathbf{e}_{2} + a_{3}b_{3}\mathbf{e}_{3} \cdot \mathbf{e}_{3}. \tag{1.20}$$

可见只要知道基向量 e_1, e_2, e_3 之间的内积(9个数,实质上只有6个数)就可以求出任意两个向量的内积。这九个数称为仿射标架[O_1e_1, e_2, e_3]的**度量参数。**

现在设 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 是直角坐标系,则有:

$$e_i \cdot e_i = |e_i|^2 = 1$$
, $e_i \cdot e_j = 0$, $i \neq j$.

于是由(1,20)得到

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3, \tag{1.21}$$

因此有

定理1.6 在直角坐标系中,两个向量 的 内积等于它们的对应坐标的乘积之和。

由定理1.6即得,向量 $a(a_1,a_2,a_3)$ 的长度为:

$$|a| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}, \qquad (1.22)$$

两点 $A(x_1,y_1,z_1),B(x_2,y_2,z_2)$ 之间的距离为:

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$
. (1.23)

注意(1.21),(1.22),(1.23)三个式子只在直角坐标系中才成立。

3.4 方向角和方向余弦

在直角坐标系中,还可以用向量 a 与基向量的内积来计算 a 的坐标。设 a 在直角标架[O; e_1 , e_2 , e_8]中的坐标为(a_1 , a_2 , a_8),则有

$$a = a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3$$

两边用 e₁作內积,得

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{e}_1 = a_1$$

同理可得

$$a \cdot e_2 = a_2, \quad a \cdot e_3 = a_3.$$

这说明向量 α 与基向量 e_j 的内积就是 α 的第 j 个直角坐 标 (j=1,2,3)。

特别地,单位向量a⁰的直角坐标为:

$$x = \alpha^0 \cdot e_1 = \cos\langle\alpha^0, e_1\rangle = \cos\langle\alpha, e_1\rangle,$$

$$y = \alpha^0 \cdot e_2 = \cos\langle\alpha, e_2\rangle,$$

$$z = a^0 \cdot e_3 = \cos\langle a, e_3 \rangle$$
.

我们把一个向量 a 与直角标架中的基向量 e1, e2, e8 所成的角 α, β, γ 称为方向 α 的**方向角**, 把方向角的余弦 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 称 为方向 4 的方向余弦。由上述知, 4 的 方向余弦就等于单位向量 α⁰的 直角坐标。从而有:

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1. \tag{1.24}$$

习 题 1.3

- 1. 已知|a|=3, |b|=2, $|a|>=\frac{\pi}{6}$, $\pi 3a+2b$ 的內积.
- 2. 设OABC是--个四面体, |OA| = |OB| = 2, |OC| = 1, $\angle AOB = \angle AOC = \frac{\pi}{3}, \ \angle BOC = \frac{\pi}{6}, \ P \neq AB$ 的中点, M 是 △ABC 的重心。求 | OP | , | OM | 和 < OP . OM >.
 - 3、 证明下列各对向量互相垂直。
 - (1) 直角坐标分别为(3,2,1)和(2,-3,0)的两个向量;
 - (2) $a(b \cdot c) b(a \cdot c)$ 与 c.
 - 4. 证明。 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$.
 - 5. 证明,对任意向量 a,b 都有 $|a + b|^2 + |a - b|^2 = 2|a|^2 + 2|b|^2$

当α与δ不共线时,说明此等式的儿何意义。

- 6. 下列等式是否正确(习惯上把 a · a 记成 a²)。
- (1) $|\alpha|\alpha=\alpha^2$,

$$(2) \ a(a \cdot b) = a^2b,$$

(3)
$$(a \cdot b)^2 = a^2b^2$$
, (4) $(a \cdot b)c = a(b \cdot c)$.

$$(4) (a \cdot b)c = a(b \cdot c).$$

在直角坐标系中,已知a.b.c的坐标分别为(3.5.7), (0,4,3)和(-1,2,-4), 设

$$u = 3a + 4b - c$$
, $v = 2b + c$.

求 u・v, [u], |v|和<u,v>.

8. 已知 $\triangle ABC$ 的頂点A,B,C的直角坐标分别为(2,5,0),

(11,3,8)和(5,11,12)。求各边和各中线的长度。

- 9. 设 △ABC 的 三 个 顶 点 A,B,C 的 直 角 坐 标 分 别 为 (2,4,3),(4,1,9),(10,-1,6)。证明△ABC 是直角三角形。
- 10、证明:三角形三条中线的长度的平方和等于三边长度的 平方和的³。
 - 11. 证明: 三角形的三边的垂直平分线交子一点。
- 12. 证明:如果一个四面体有两对对棱互相垂直,则第三对对棱也必垂直,并且三对对棱的长度的平方和相等。
- 13, 设方向 a 的直角坐标为(1,2,-2), 求它的方向角和方向余弦。
 - 14. 下述推断是否正确, 若 $\alpha \cdot c = b \cdot c$, 且 $c \Rightarrow 0$,则 $\alpha = b$.
 - 15. 证明: 设三个向量 a,b,c 不共面, 如果向量 x 满足 $x \cdot a = 0$, $x \cdot b = 0$, $x \cdot c = 0$,

M = 0


*16. 证明, 三向量 a,b,c 共面的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} a \cdot a & a \cdot b & a \cdot c \\ b \cdot a & b \cdot b & b \cdot c \\ c \cdot a & c \cdot b & c \cdot c \end{vmatrix} = 0.$$

§ 4 向量的外积

从力学中知道,作用在A点上的力F关于支点O的力矩M的大小为

$$|M| = |F_2| |\overrightarrow{OA}| = |F| |\overrightarrow{OA}| \sin \langle F, \overrightarrow{OA} \rangle$$



力矩M的方向为: 让右手四指从 OA 弯向F(转角小于 π),则拇指指向为 M的方向。本节我们来研究类似于从 OA 和F求力矩M这样的向量运算。

4.1 向量的外积的定义

定义1.77 两个向量 α 与b的外积(记作 $\alpha \times b$)仍是一个向量,它的长度规定为。

$$|\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}| := |\boldsymbol{a}| |\boldsymbol{b}| \sin(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}),$$
 (1.25)

它的方向规定为:与a,b均垂直,科且使($a,b,a \times b$)成右手系,即,当右手四指从 a 弯向 b(转角小于 π)时,拇指的指向就是 $a \times b$ 的方向。

如果 α , b 中有一个为 0, 则 $\alpha \times b = 0$.


由定义立即看出, $a \times b = 0$ 的充分必要条件是 a = b 共线。因此要特别注意,若 $a \times b = 0$,不能断定 a,b 中必有一个为 0。这是与数的乘法很不一样的地方。

4.2 向量的外积的几何意义,平面的定向

外积的几何意义。当a与b不共线时,从(1.25)看出,[a×b]表示以a,b为邻边的平行四边形的面积。为了说明a×b的方向的几何意义,我们需要先给出所谓**平面的定向**的概念。

平面的定向,就是平面上的旋转方向。在平面几何中,常用"反时针方向"与"顺时针方向"来描述平面上的两个旋转方向。对于放在三维空间中的平面,这种说法不足以描述平面上的旋转方向。从这一侧看来是反时针的旋转方向,从另一侧看就成了顺时针的。因此通常用另一种方法来描述:

给了平面 π_0 上的一对不共线向量,如果规定了它们的先后顺序,则从第一个向量到第二个向量的转角小于 π 的旋转方向就称为平面 π_0 的一个定向。譬如,设 α_0 , b_0 不 共 线,如果规定先 α_0 后 b_0 的顺序,则从 α_0 到 b_0 的转角小于 π 的 旋转方向是平面 π_0 的一个定向,如图 1.20 所示。但是如果规定先 b_0 后 α_0 的 顺序,则从 b_0 到 α_0 的转角小于 π 的旋转方向是 平 面 π_0 的另一个定向,它与前述定向相反,如图 1.21 所示。



平面的两个定向,也可以用平面的两侧来代表:如果右手四指沿平面上取定的旋转方向弯曲,拇指必指向平面的一侧。这样,平面的两个定向就对应于平面的两侧,而平面的两侧又可用垂直于该平面的两个方向(或单位向量)来刻划,因此通常也用垂直于平面的方向来表示平面的定向:设 e₁ 是与平面 π₀ 垂直的向量,如果右手四指从 α₀ 弯向 b₀ (转角小于 π)时拇指的指向 为 e₁ 的方向,则 e₁ 表示的平面 π₀ 的定向就是由 α₀ 到 b₀ 的 旋转方向 (转角小于 π),见图 1.20。设 e₂ 与 e₁ 方向相反,则 e₂ 表示的平面 π₀ 的定向就是由 b₀ 到 α₀ 的旋转方向,见图 1.21。

现在来看外积 $a \times b$ 的方向的几何意义。设 a,b 是平面 π_0 上不共线的两个向量,由于 $a \times b$ 与 π_0 垂直,并且 $a \times b$ 的方向就是当右手四指从 a 弯向 b (转角小于 π) 时拇指的指向,因此由上一段知道, $a \times b$ 的方向就代表了平面 π_0 上的从 a 到 b 的旋转方向,这就是外积 $a \times b$ 的方向的几何意义。

考虑平面 π。上的一个平行四边形,它的两条邻边分别用α, b 表示,我们规定它的边界的环行方向为从 a 到 b 的旋转方向 (转角小于 π),这时称这个不行四




图 1.22

边形是定向的。现在假定我们已经用单位向量 e规定了 平 面 #0

4.3 向量的外积的运算规律

命题1.9 若 $\alpha \neq 0$,则 $a \times b = a \times b_2$, 其中 b_2 是 b 沿方向 a 的外射影.




图 1.23


证明 设 $b=b_1+b_2$, 其中 $b_1/\!\!/a$, $b_2\perp a$. 山直角三角形的解法知,

$$|b_2| = |b| \sin \langle a, b \rangle$$
,

于是 $|a \times b| = |a||b|\sin\langle a,b\rangle = |a||b_2| = |a \times b_2|$ 。由图 1.23 易看出, $a \times b$ 与 $a \times b$ 的方向相同,所以

$$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}_{2}$$

命题1.10 设 e 是单位向量, $b \perp e$,则 $e \times b$ 等于 b 按右手螺旋规律绕 e 旋转 90° 得到的向量 b'.



. 图 1.24




图 1,25

证明 $|e \times b| = |e| |b| \sin \langle e, b \rangle = |b| = |b'|$, 又由图1.24 看出, $e \times b$ 与 b' 同尚, 所以 $e \times b = b'$.

推论1.4 若 $[O; e_1, e_2, e_8]$ 为右手直角坐标系,则有

$$e_1 \times e_2 = e_3, \ e_2 \times e_3 = e_1, \ e_3 \times e_4 = e_2.$$

定理1.7 外积适合下列运算规律: 对于任意向量 α,b,c 和任意实数 λ ,有

- (1) $a \times b = -b \times a$ (反交換律),
- (2) $(\lambda \alpha) \times b = \lambda(\alpha \times b)$,
- (3) $a \times (b+c) = a \times b + a \times c$ (左分配律), $(b+c) \times a = b \times a + c \times a$ (右分配律).

证明 (1) 由定义 1.11 立即得到。

(2) $|(\lambda \boldsymbol{a}) \times \boldsymbol{b}| = |(\lambda \boldsymbol{a})| |(\boldsymbol{b})| \sin(\lambda \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = |(\lambda \boldsymbol{a})| |(\boldsymbol{a})| |(\boldsymbol{b})| \sin(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = |(\lambda \boldsymbol{a})| |(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})| = |(\lambda \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})| |(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})| |($


 $\lambda > 0$ 时, $\lambda \alpha$ 与 α 同向,所以 $\lambda \alpha \times b$ 与 $\lambda (\alpha \times b)$ 同向; $\lambda < 0$ 时, $\lambda \alpha \times b$ 与 $\alpha \times b$ 反向,从而 $\lambda \alpha \times b$ 与 $\lambda (\alpha \times b)$ 同向,因此有 $\lambda \alpha \times b = \lambda (\alpha \times b).$

(3) 先证左分配律。若 $\alpha = 0$,则结论显然成立。下设 $\alpha \neq 0$,因为

 $a \times (b+c) = (|a|a^0) \times (b+c) = |a|[a^0 \times (b+c)],$ 所以只要考虑 $a^0 \times (b+c)$ 。设 $b = b_1 + b_2$,其中 $b_1 / a^0 \perp b_2$,设 $c = c_1 + c_2$,其中 $c_1 / a^0 \perp c_2$ 。于是

$$b + c = (b_1 + c_1) + (b_2 + c_2).$$

因为 (b_1+c_1) $\|a^0, (b_2+c_2)\bot a^0,$ 于是据命题 1.9 待: $a^0 \times (b+c) = a^0 \times (b_2+c_2)$.



再据命题 1.10知, $a^0 \times (b_2 + c_2)$ 等于 $(b_2 + c_2)$ 绕 a^0 右 旋 90° 得到的向量 $a^0 \times b = a^0 \times b_2$ 是 将 b_2 绕 a^0 右旋 90° 得到的向量 b_2' , $a^0 \times c = a^0 \times c_2$ 是将 c_2 绕 a^0 右旋 90° 得到的向量 c_2' . 因为 $b_2, c_2, b_2 + c_2$ 可连成一

个三角形,所以把它们绕 a^0 右旋 90° 得到的向量 b_2' , c_2' , d_2' 也一定可以连成一个三角形,于是 $d'=b_2'+c_2'$, 即

$$\boldsymbol{a}^0 \times (\boldsymbol{b}_2 + \boldsymbol{c}_2) = \boldsymbol{a}^0 \times \boldsymbol{b}_2 + \boldsymbol{a}^0 \times \boldsymbol{c}_{2\bullet}$$

从面得

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = |\mathbf{a}| [\mathbf{a}^0 \times (\mathbf{b} + \mathbf{c})] = |\mathbf{a}| [\mathbf{a}^0 \times (\mathbf{b}_2 + \mathbf{c}_2)]$$

$$= |\mathbf{a}| (\mathbf{a}^0 \times \mathbf{b}_2 + \mathbf{a}^0 \times \mathbf{c}_2)$$

$$= |\mathbf{a}| (\mathbf{a}^0 \times \mathbf{b} + \mathbf{a}^0 \times \mathbf{c})$$

$$= \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}_2$$

再证右分配律。

$$(b+c) \times a = -a \times (b+c) = -(a \times b + a \times c)$$
$$= -a \times b + (-a \times c)$$
$$= b \times a + c \times a$$

4.4 用坐标计算向量的外积

先取一个仿射标架 $[O,e_1,e_2,e_3]$, 设 a,b 的坐标分别是 (a_1,a_2,a_3) , (b_1,b_2,b_3) 。则

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3) \times (b_1 \mathbf{e}_1 + b_2 \mathbf{e}_2 + b_3 \mathbf{e}_3)$$

$$= (a_1 b_2 - a_2 b_1) \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 + (a_3 b_1 - a_1 b_3) \mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_1$$

$$+ (a_2 b_3 - a_3 b_2) \mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_3, \qquad (1.27)$$

由此可见,只要知道基向量之间的外积,就可求出 a × b.

现在设[O, e₁, e₂, e₃]是右手直角标架,据推论 1.4,由(1.27) 得到

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_2b_3 - a_3b_2)\mathbf{e}_1 + (a_3b_1 - a_1b_3)\mathbf{e}_2 + (a_1b_2 - a_2b_1)\mathbf{e}_3.$$
(1.28)

于是我们有

定理1.8 设 a, b 在右手直角坐标系中的坐标分别为

$$(a_1, a_2, a_3), (b_1, b_2, b_3),$$

则 a×b 的坐标为

从面

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = \sqrt{(a_2b_3 - a_3b_2)^2 + (a_3b_1 - a_1b_3)^2 + (a_1b_2 - a_2b_1)^2}$$
 (1.30)

由外积的几何意义知, (1.30)式也是以 a, b 为邻边的平行四边形的面积公式。

注 (1.28),(1.29),(1.30)只在右手直角坐标系中才成立。 作为一种记忆方式,(1.28)可以形式地写成。

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{cases} \mathbf{e_1} & a_1 & b_1 \\ \mathbf{e_2} & a_2 & b_2 \\ \mathbf{e_3} & a_3 & b_3 \end{cases} . \tag{1.28}$$

4.5 二 重 外 积

命题1.17 对任意向量 a,b,c,有

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}. \tag{1.31}$$

(1.31)称为二重外积公式。

证明 取一个右手直角坐标系,设

$$\alpha(a_1,a_2,a_3)\,, \delta(b_1,b_2,b_3)\,, \epsilon(c_1,c_2,c_8)_{\bullet}$$

设 $b \times c$ 的些标为 (d_1, d_2, d_3) ,设 $a \times (b \times c)$ 的坐标 为 (h_1, h_2, h_3) 。由(1,29)得:

$$h_1 = a_2 d_3 - a_3 d_2 = a_2 (b_1 c_2 - b_2 c_1) - a_3 (b_3 c_1 - b_1 c_3)$$

$$= b_1 (a_2 c_2 + a_3 c_3) - c_1 (a_2 b_2 + a_3 b_3)$$

$$= b_1 (a \cdot c - a_1 c_1) - c_1 (a \cdot b - a_1 b_1)$$

$$= (a \cdot c) b_1 - (a \cdot b) c_1.$$

同型可得

$$h_2 = (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c}) h_2 - (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}) c_2, \quad h_3 = (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c}) h_3 - (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}) c_3.$$

所以

$$a \times (b \times c) = (a \cdot c)b - (a \cdot b)c_{\bullet}$$

由公式(1.31)和外积的反交换律可得到。

$$(a \times b) \times c = -c \times (a \times b) = -(c \cdot b)a + (c \cdot a)b$$

从而在一般情况下, $a \times (b \times c) + (a \times b) \times c$, 即向量的外积不适合结合律。

请读者证明下述的雅科比(Jacobi)等式:

$$\alpha \times (b \times c) + b \times (c \times a) + c \times (a \times b) = 0$$
, (1.32)

习 题 1.4

- 1. 证明: $(a \times b)^2 = a^2b^2 (a \cdot b)^2$.
- 2. 证明: $a \times b = c \times d$, $a \times c = b \times d$, 则 a d = b + c 共线.
 - 3. 在右手直角坐标系中, 设 a, b 的坐标分别是 (5, -2.1).(4.0.6),

求 $a \times b$ 和以 a,b 为邻边的平行四边形的面积。

4. 在右手直角坐标系中,设 a,b,c 的坐标分别是

$$(1,0,-1),(1,-2,0)$$
和 $(-1,2,1),$

求

$$(3a+b-c)\times(a-b+c),$$

- 5. 证明: $(a-b)\times(a+b)=2(a\times b)$, 拜且说明它的几何意义。
- 6. 证明: 若a+b+c=0, 则 $a\times b=b\times c=c\times a$, 幷且说 明其几何意义。
 - 7。证明三角形的重心分原三角形成三个等积的三角形。
- 8. 在华面右手直角坐标系 $[O; e_1, e_2]$ 中,设 $\triangle ABC$ 的三个顶点 A, B, C 的坐标分别为

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3).$$

证明 △ABC 的面积为

$$s = \pm \left| \begin{array}{ccc} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{array} \right|,$$

幷且说明正负号的几何意义,

- 9. 下述推断是否正确? 若 c×a=c×b, 幷且 c = 0, 则 a = b.
 - 10. 设 x 与 x x y 共线, 试讨论 x 与 y 的关系。
 - 11. 就下列各种情形,讨论 × 与 y 的关系(a ÷ 0)。
 - (1) $a \cdot x = a \cdot y$;
 - (2) $\boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{x} = \boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{y}$;
 - (3) $a \cdot x = a \cdot y$, 拜且 $a \times x = a \times y$.
- *12. 设 $a \neq 0$, $\overrightarrow{OP} = x$, 求满足 方 程 $a \times x = b$ 的点P的 轨迹。
- *13. 设 a,b,c 都不是 0, x · a = h \(\pm 0, x \times b = c, 求 x \) (讨 论 各种情况)。
- 14. (1) 已知 | e | = 1, e ⊥ r, 将 r 绕 e 右旋角度 θ 得 r₁,试用 e, r, θ 表示 r₁.
- (2) 给定三点 O, A, P, O ⇒ A, 将 P 绕 OA 右旋角 度 θ 得 到
 P₁, 试用OA, OP, θ 表示OP₁.

§ 5 向量的混合积

5.1 向量的混合积的几何意义和性质

如何利用向量来计算几何体的体积?由于计算几何体的体积可以归结为计算平行六面体的体积,因此我们来讨论平行六面体 ABCD-A'B'C'D'(如图1.27)。设 $\overrightarrow{AB}=a$, $\overrightarrow{AD}=b$, $\overrightarrow{AA'}=c$,则 底面积为 $|a\times b|$,高为 $|\overrightarrow{AH}|$,其中 \overrightarrow{AH} 是 c 在方向 $a\times b$ 上 的内射影,因此

$$|\overrightarrow{AH}| = \left| \prod_{(a \times b)^0} c \right|.$$

从而平行六面体的体积为:

$$V = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| \left| \prod_{(\mathbf{a} \times \mathbf{b})^0} \mathbf{c} \right| = \left| |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| \prod_{(\mathbf{a} \times \mathbf{b})^0} \mathbf{c} \right|$$
$$= |\mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})| = |(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}|.$$

a×b·c称为向量a,b,c的混合积。 上述表明。|a×b·c|表示以a,b,c为棱 的平行六面体的体积。 若a×b·c>0, 则⟨a×b,c>为锐角,由于(a,b,a×b) 构成右手系,于是(a,b,c)此时也 构成右手系。类似的讨论知,若 a×b·c<0,则(a,b,c)构成左手系。 因此a×b·ch正负可判断(a,b,c)是 右手系还是左手系。如果在平行六面 体的同一顶点上的三条棱之间规定好 一个顺序(a,b,c),则称这个平行六




图 1.27

面体的定向为(a,b,c)。于是混合积 $a \times b \cdot c$ 既表示了这个定向平行六面体的体积,又表示了它的定向,所以把 $a \times b \cdot c$ 称为这个定向平行六面体的定向体积。

由混合积的几何意义立即得到,

命题1.12 三个向量 α, b, c 共面的充分必要 条 件 是 $\alpha \times b \cdot c = 0$.

混合积有以下两条常用的性质:

- (1) $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c} = \boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c} \cdot \boldsymbol{a} = \boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$;
- (2) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c}$

证明 (1) 因为 $a \times b \cdot c$, $b \times c \cdot a$, $c \times a \cdot b$ 都表示以 a,b,c 为同一顶点上的三条棱的平行六面体的体积,所以它们相等,又因为若(a,b,c)为右(c)年系,则(b,c,a)和(c,a,b)均为右(c)年系,所以

$$a \times b \cdot c = b \times c \cdot a = c \times a \cdot b$$

(2) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{b} \times \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c}$

性质(2)说明三个有序向量 a,b,c 的混合积 与"×","•"的位置无关,因此可把 $a \times b \cdot c$ 记成(a,b,c),要注意的是, $a \cdot b \times c$ 仍然是要先作外积 $b \times c$,后作內积 $a \cdot (b \times c)$,反之则沒有意义。

5.2 用坐标计算向量的混合积

取一个仿射标架[O, e₁, e₂, e₃]。 设 α , b, c 的坐标分别为(a_1 , a_2 , a_3), (b_1, b_2, b_3) , (c_1, c_2, c_3) 。 则

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \left[(a_1 b_2 - a_2 b_1) \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 + (a_3 b_1 - a_1 b_3) \mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_1 \right. \\ + (a_2 b_3 - a_3 b_2) \mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_3 \right] \cdot (c_1 \mathbf{e}_1 + c_2 \mathbf{e}_2 + c_3 \mathbf{e}_3) \\ = \left[(a_1 b_2 - a_2 b_1) c_3 + (a_3 b_1 - a_1 b_3) c_2 \right. \\ + (a_2 b_3 - a_3 b_2) c_1 \right] \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3 \\ = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3.$$
 (1.33)

由于 e_1, e_2, e_3 不共面,所以 $e_1 \times e_2 \cdot e_3 \neq 0$ 。于是得到

命题1.13 任意取定一个仿射标架[O; e_1 , e_2 , e_3], 设向量a,b,c 的坐标分别是

 $(a_1,a_2,a_3),(b_1,b_2,b_3),(c_1,c_2,c_3),$

厠

$$\frac{\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c}}{\boldsymbol{e}_1 \times \boldsymbol{e}_2 \cdot \boldsymbol{e}_3} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}. \tag{1.34}$$

定理7.9 若 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 为右手直角标架, α, b, c 的坐标分别为

$$(a_1, a_2, a_3), (b_1, b_2, b_3), (c_1, c_2, c_3),$$

胍

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} . \tag{1.35}$$

证明 因为[O;e1,e2,e3]为右手直角标架,所以 e1×e2=e3.

从而 $e_1 \times e_2 \cdot e_3 = e_3 \cdot e_3 = 1$. 于是由(1.34)立即得到(1.35)。

定理 1.9 表明,以 a,b,c 为棱的平行六面体的定向体积等于 以这三个向量的右手直角坐标为列组成的三阶行列式。这是三阶 行列式的几何意义。

5.3 三向量(或四点)共面的条件

定理1.10 设 a,b,c 的仿射坐标分别为 $(a_1,a_2,a_3),(b_1,b_2,b_3),(c_1,c_2,c_3),$

则 a,b,c共面的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0.$$

证明 由命题 1,12 和 1,13 立即得到。

推论1.5 设四个点 A,B,C,D 的仿射垫标分别为

$$(x_i, y_i, z_i)$$
, $i = 1, 2, 3, 4$.

则 A,B,C,D 共面的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ z_1 & z_2 & z_3 & z_4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

这里我们指出,四阶行列式可以 沿 任 意一行(或一列)展 开,譬如上述四阶行列式沿第四行展开得

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ z_1 & z_2 & z_3 & z_4 \end{vmatrix} = (-1)^{4+1} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} x_2 & x_3 & x_4 \\ y_2 & y_3 & y_4 \\ z_2 & z_3 & z_4 \end{vmatrix}$$

$$+ (-1)^{4+2} \cdot 1 \cdot \begin{bmatrix} x_1 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_3 & y_4 \\ z_1 & z_3 & z_4 \end{bmatrix}$$

$$+ (-1)^{4+3} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_4 \\ z_1 & z_2 & z_4 \end{vmatrix}$$

$$+ (-1)^{4+4} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix}.$$

幷且四阶行列式也具有类似于二阶、三阶行列式那样的性质。

推论1.5的证明 A,B,C,D 共面也 就 是 $\overrightarrow{DA},\overrightarrow{DB},\overrightarrow{DC}$ 共面,从而充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} x_1 - x_4 & x_2 - x_4 & x_3 - x_4 \\ y_1 - y_4 & y_2 - y_4 & y_3 - y_4 \\ z_1 - z_4 & z_2 - z_4 & z_3 - z_4 \end{vmatrix} = 0,$$

上式左边的三阶行列式等于

$$\begin{bmatrix} x_1 - x_4 & x_2 - x_4 & x_3 - x_4 & x_4 \\ y_1 - y_4 & y_2 - y_4 & y_3 - y_4 & y_4 \\ z_1 - z_4 & z_2 - z_4 & z_3 - z_4 & z_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ z_1 & z_2 & z_3 & z_4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

最后这个等式成立是因为把左边的四阶行列式的第四列分别加到第一、二、三列上,这时行列式的值不变。综上述便得到我们所要的结论。

5.4 拉格朗日恒等式及其应用

定理1.11 对任意四个向量 a,b,c,d,q

$$(a \times b) \cdot (c \times d) = \begin{vmatrix} a \cdot c & a \cdot d \\ b \cdot c & b \cdot d \end{vmatrix}. \tag{1.36}$$


(1.36)称为拉格朗日(Lagrange)恒等式。

证明
$$(a \times b) \cdot (c \times d) = a \cdot b \times (c \times d)$$

= $a \cdot [(b \cdot d)c - (b \cdot c)d]$

$$= (b \cdot d)(a \cdot c) - (b \cdot c)(a \cdot d)$$
$$= \begin{vmatrix} a \cdot c & a \cdot d \\ b \cdot c & b \cdot d \end{vmatrix}.$$

拉格朗日恒等式很有用,有人还称它 为二维的勾股定理,这是因为由它可以证 出下面例 1.5 所述的命题。






图 1,28

证明 设O-ABC是三棱锥,其中 $\angle AOB = \angle AOC = \angle BOC = 90^{\circ}$ 。 $\triangle ABC$ 是它的斜面。 我们有

$$|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|^{2} = (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC})$$

$$= \begin{vmatrix} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} & \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \\ \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} & \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AC} \end{vmatrix}$$

$$= |\overrightarrow{AB}|^{2} |\overrightarrow{AC}|^{2} - (\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC})^{2}$$

$$= (|\overrightarrow{OA}|^{2} + |\overrightarrow{OB}|^{2})(|\overrightarrow{OA}|^{2} + |\overrightarrow{OC}|^{2})$$

$$- [(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) \cdot (\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA})]^{2}$$

$$= |\overrightarrow{OA}|^{4} + |\overrightarrow{OB}|^{2} |\overrightarrow{OA}|^{2} + |\overrightarrow{OA}|^{2} |\overrightarrow{OC}|^{2}$$

$$+ |\overrightarrow{OB}|^{2} |\overrightarrow{OC}|^{2} - |\overrightarrow{OA}|^{4}$$

$$= (|\overrightarrow{OB}| |\overrightarrow{OA}|)^{2} + (|\overrightarrow{OA}| |\overrightarrow{OC}|)^{2}$$

$$+ (|\overrightarrow{OB}| |\overrightarrow{OC}|)^{2},$$

由此即得我们所要的结论。

*5.5 向量代数在球面三角中的应用

设在中心为O,半径为R的球面上,有不在同一大圆弧上的 三点 A,B,C。 分别连结其中两点 的 大 圆 弧 $\alpha = B\widehat{C}$, $\beta = \widehat{CA}$,




图 1.29

 $y = \stackrel{\frown}{AB}$ 围成一个区域,称为球面三角形,A,B,C 是它的顶点; α,β,ν 是它的边,用边所在的大圆弧的弧度来量度。边 β 与 ν 所 夹的角是指 β 与 ν 分别所在的平面组成的二面角,仍记作 A,称为球面三角形的**角**。

我们可以用向量法证明球面三角的下 述公式:

(1) $\cos \alpha = \cos \beta \cos \gamma + \sin \beta \sin \gamma \cos A$ (余弦公式);

(2)
$$\frac{\sin a}{\sin A} = \frac{\sin \beta}{\sin B} = \frac{\sin \gamma}{\sin C}$$
 (正弦公式).

证明 (1) 设a,b,c分别是 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}$ 方向的单位 向量。显然角A是 $a \times b$ 与 $a \times c$ 的夹角。据拉格则目恒等式有

$$(a \times b) \cdot (a \times c) = \begin{vmatrix} a \cdot a & a \cdot c \\ b \cdot a & b \cdot c \end{vmatrix}$$
$$= a^{2}(b \cdot c) - (a \cdot c)(b \cdot a)$$
$$= \cos a - \cos \beta \cos \gamma,$$

叉有

$$(a \times b) \cdot (a \times c) = |a \times b| |a \times c| \cos(a \times b, a \times c)$$

= $\sin(a, b) \sin(a, c) \cos A$
= $\sin \beta \cos A$,

所以

 $\cos \alpha = \cos \beta \cos \gamma + \sin \beta \sin \gamma \cos A$.

(2) 由二重外积公式得:

$$(a \times b) \times (a \times c) = (a \times b \cdot c)a,$$

 $(a \times b) \times (b \times c) = (a \times b \cdot c)b,$
 $(a \times c) \times (b \times c) = -(a \times c \cdot b)c$
 $= (a \times b \cdot c)c,$

所以

 $|(a \times b) \times (a \times c)| = |(a \times b) \times (b \times c)| = |(a \times c) \times (b \times c)|_{\bullet}$: 由外积的定义可得:

 $\sin\langle a, b\rangle \sin\langle a, c\rangle \sin A = \sin\langle a, b\rangle \sin\langle b, c\rangle \sin B$ = $\sin\langle a, c\rangle \sin\langle b, c\rangle \sin C$,

即 $sinysin\beta sin A = sinysin a sin B = sin\beta sin a sin C_{\bullet}$ 山此即得正弦公式。

习 题 1.5

- 1. 证明: |a×b·c|≤|a||b||c|.
- 2. 证明: 如果 $a \times b + b \times c + c \times a = 0$, 则 a,b,c 共面.
- 3. 在右手直角坐标系中,一个四面体的顶点 A,B,C,D的坐标分别是

(1,2,0),(-1,3,4),(-1,-2,-3),(0,-1,3), 求它的体积。

- 4. 证明: $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{b} \times \mathbf{c}, \mathbf{c} \times \mathbf{a}) = (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})^2$.
- 5. 证明: $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) + (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{d}) + (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{d}) = 0$.
- 6. 证明: $a \times [b \times (c \times d)] = (b \cdot d)(a \times c) (b \cdot c)(a \times d)$.
- *7. 证明: (1) $(a \times b) \times (c \times d) = (a, b, d)c (a, b, c)d$;
 (2) $(a \times b) \times (c \times d) = (a, c, d)b (b, c, d)a$.
- *8. 证明:对任意四个向量 a,b,c,d,f(b,c,d)a+(c,a,d)b+(a,b,d)c+(b,a,c)d=0.
 - 9. 若 x, y 与 x × y 共面, 讨论 x 与 y 的关系。
 - 10.证明: $[\mathbf{v}_1 \times (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2)] \times [\mathbf{v}_2 \times (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2)]$ = $|\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2|^2 \cdot (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2)$.
- 11, 证明: 若 v₁ 与 v₂ 不共线,则 v₁×(v₁× v₂)与v₂×(v₁× v₂)不共线。
 - 12, 设 e₁, e₂, e₃ 不共面, 证明: 任一向量 a 可以表示成:

$$\mathbf{a} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_3}{\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3} \mathbf{e}_1 + \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_1}{\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3} \mathbf{e}_2 + \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2}{\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3} \mathbf{e}_3.$$

13、用向量法证明: 若三元一次方程组的系数行列式不等于零,则它有唯一的一个解。

*14. 设 a,b,c 不共面,设向量 x 满足:

$$a \cdot x = f$$
, $b \cdot x = g$, $c \cdot x = h$.

证明

$$x = \frac{f(b \times c) + g(c \times a) + h(a \times b)}{a \times b \cdot c}$$
.

第二章 空间的平面和直线

本章将把坐标法和向量法结合起来研究空间中平面和直线的 方程以及它们的性质。

§1 仿射坐标系中平面的方程, 两平面的相关位置

1.1 平面的参数方程和普通方程

读者已经知道,确定一个平面的条件是:不在一直线上的三点,或者一条直线和此直线外的一点;或者两条相交直线;或者两条平行直线。为了便于用向量法,我们采用"一个点和两个不共线的向量确定一个平面"作为讨论的出发点。

取定一个仿射标架 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 。已知一个点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$,向量 $v_1(X_1, Y_1, Z_1)$ 和向量 $v_2(X_2, Y_2, Z_2)$,其中 v_1 与 v_2 不共线,我们来求由点 M_0 和 v_1 , v_2 确定的平面 π 的方程。




图 2.1

$$\overline{M_0M} = \lambda v_1 + \mu v_{2\bullet}$$

用坐标写出即得:

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda X_1 + \mu X_2, \\ y = y_0 + \lambda Y_1 + \mu Y_2, \\ z = z_0 + \lambda Z_1 + \mu Z_2, \end{cases}$$
 (2.1)

(2.1)称为平面 π 的参数方程, 其中 λ, μ 称为参数, 它们可取任意实数、

又有 M_0M_1, v_1, v_2 共面的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & X_1 & X_2 \\ y - y_0 & Y_1 & Y_2 \\ z - z_0 & Z_1 & Z_2 \end{vmatrix} = 0, \qquad (2.2)$$

即

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$
 (2.3)

其中

$$A = \begin{vmatrix} Y_1 & Y_2 \\ Z_1 & Z_2 \end{vmatrix}, B = -\begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ Z_1 & Z_2 \end{vmatrix}, C = \begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ Y_1 & Y_2 \end{vmatrix},$$

$$D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0).$$

(2.3)称为平面π的**普通方程**。由于 0₁ 与 0₂ 不共线,据定理 1.4 知, A,B,C 不全为零,因此平面π的方程(2.3)是三元一次方程。 我们来看平面 π 的方程(2.3)中系数的几何意义。

定理2.1 设平面 π 的方程是(2.3),则向量 $\omega(r,s,t)$ 平行于 平面 π 的充分必要条件是

$$Ar + Bs + Ct = 0. (2.4)$$

证明 ω // 平面π的充分必要条件是ω, ν, ν, 共面,从而

$$\begin{vmatrix} \mathbf{r} & X_1 & X_2 \\ s & Y_1 & Y_2 \\ t & Z_1 & Z_2 \end{vmatrix} \approx 0,$$

$$A\mathbf{r} + B\mathbf{s} + C\mathbf{t} = 0.$$

即:

因为平面 π 的方程(2.3)中 A, B, C 不全为零,譬如说 $A \neq 0$,则从(2.4)可解得。 $\omega_1\left(-\frac{B}{A},1,0\right)$, $\omega_2\left(-\frac{C}{A},0,1\right)$,于是它们均平 行于 平面 π ,且据定理1.4知,它们不共线。由于 与平面 π 平行的两个不共线的向量决定了平面 π 的方向,因此平面方程中

一次项的系数决定了这个平面的方向。

推论2.1 设平面π的方程是(2.3),则平面π平行于x轴(或y轴,或z轴)的充分必要条件是A=0(或B=0,或C=0),平面π通过原点的充分必要条件是D=0.

证明 因为 e_1 的坐标是 (1,0,0), 所以 e_1 // 平面 π 的 充 分 必要条件是

$$A \bullet 1 + B \bullet 0 + C \bullet 0 = 0,$$

即 A=0. 关于 e_2 或 e_3 平行于平面 π 的情形可类似讨论。

原点 O(0,0,0)在平面π上的充分必要条件是 D=0.

定理2.2 在空间中取定一个仿射坐标系,则平面的方程必定是三元一次方程; 反之,任意一个三元一次方程表示一个平面。

证明 定理的前半部分已经在前面说明。现在看后半部分。 任给一个三元一次方程

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0,$$
 (2.5)

不妨设
$$A_1 \neq 0$$
. 取 点 $M_1 \left(-\frac{D_1}{A_1}, 0, 0\right)$, 取 $\mu_1 \left(-\frac{B_1}{A_1}, 1, 0\right)$,

 $\mu_2\left(-\frac{C_1}{A_1}, 0, 1\right)$,显然它们不共线。由点 M_1 和 μ_1 , μ_2 决定的 平 面 π_1 的方程为:

$$\begin{vmatrix} x + \frac{D_1}{A_1} & -\frac{B_1}{A_1} & -\frac{C_1}{A_1} \\ y - 0 & 1 & 0 \\ z - 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$


ឤ

$$A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0.$$

这说明方程(2.5)表示一个平面 π_1 , 它经过点 M_1 , 且平 行 于 μ_1 和 μ_2 .

例2.1 画出平面x + 2y - z = 0.

解 因为D=0,所以此平面过原点。解方程



求得两个不共线向量 $\omega_1(2,-1,0)$, $\omega_2(1,0,1)$. 以原点为起点画出 ω_1,ω_2 . 所求平面 就是由原点和 ω_1,ω_2 决定的平面(如图 2.2).

如果平面的方程 Ax + By + Cz + D = 0 满足 $A \cdot B \cdot C \cdot D \Rightarrow 0$,则此平面与三根坐标轴均相交,且交点不是原点,因此这三个 交 点 不 共线,把它们画出来,它们决定的平

面就是所求平面。如果平面的方程 中 B=0, $A \Rightarrow 0$, $C \Rightarrow 0$, $D \Rightarrow 0$, 则此平面与 y 轴平行,与 x 轴、x 轴均相交,且交点不是原点。把这两个交点画出来,再分别过它们画与 y 轴平行的直线,由此即得所求平面。共余情况如何画平面,请读者思考。

1.2 两平面的相关位置

两平面的相关位置有三种可能情形: (1) 相交于一条直线, (2) 平行; (3) 重合。如何从两平面的方程判断它们属于何种情形?

定理2.3 取定一个仿射标架,设平面π1和π2的方程分别是1

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0,$$

$$A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0.$$
(2.6)

则

- (1) π₁ 与 π₂ 相 **交**的充分必要条件是它们方程中的一次项系 数不成比例₁
- (2) π₁ 与 π₂ 平 行的充分必要条件是它们方程中一次项系数 成比例,但常数项不与这些系数成比例;
- (3) π₁ 与 π₂ 重 合的充分必要条件是它们方程中所有系数成 比例。

证明 充分性。

(1) 设 π_1 与 π_2 的方程中一次项系数不成比例,则 坐 标 为 (A_1,B_1,C_1) 的向量 a_1 与坐标为 (A_2,B_2,C_2) 的向量 a_2 不共线,从而据定理1.4知,下述三个行列式

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} A_1 & C_1 \\ A_2 & C_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix}$$

不全为零。不妨设第一个行列式不为零。则在方程组(2,6)中令z=0,得

$$\begin{cases}
A_1 x + B_1 y + D_1 = 0, \\
A_2 x + B_2 y + D_2 = 0.
\end{cases}$$
(2.7)

因为方程组(2.7)的系数行列式不为零,所以它有唯一解:

$$x=x_0,y=y_0,$$

于是 $x=x_0$, $y=y_0$, z=0 是方程组(2.6)的解,即 π , 与 π_2 有公共点,且第三个坐标为零的公共点只有一个(x_0 , y_0 , 0)。因为 (2.7)的第一个方程有无穷多个解,所以可取到它的另一个解 $x=x_1$, $y=y_1$, 于是点(x_1 , y_1 , 0)是 π_1 上的点,但不是 π_2 上的点。所以 π_1 与 π_2 相交。

(2) 由已知条件得,存在一个实数 λ≒0,使得:

$$A_2 = \lambda A_1$$
, $B_2 = \lambda B_1$, $C_2 = \lambda C_1$, $D_2 \rightleftharpoons \lambda D_{1}$

于是方程组(2.6)成为:

$$\begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0, \\ A_1 x + B_1 y + C_1 z + \frac{D_2}{\lambda} = 0. \end{cases}$$

因为 $D_1
ightharpoonup \frac{D_2}{\lambda}$, 所以此方程组无解, 即 π_1 与 π_2 沒有公共点, 从 而 π_1 与 π_2 平行。

(3) 由已知条件得,存在实数 à \ 0,使得:

$$A_2 = \lambda A_1, B_2 = \lambda B_1, C_2 = \lambda C_1, D_2 = \lambda D_1$$

于是方程组(2.6)成为:

$$\begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0, \\ \lambda (A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1) = 0. \end{cases}$$

显然第一个方程的解全是第二个方程的解,反之亦然,所以 π ,与 π 2重合。

必要性。

利用以上结果,采用反证法即得。

1.3 三平面恰交于一点的条件

命题2.1 设三个平面在仿射坐标系中的方程分别为:

$$A_{1}x + B_{1}y + C_{1}z + D_{1} = 0,$$

$$A_{2}x + B_{2}y + C_{2}z + D_{2} = 0,$$

$$A_{3}x + B_{3}y + C_{3}z + D_{3} = 0.$$
(2.8)

则这三个平面恰交于一点的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{vmatrix}
eq 0.$$

证明 上述三个平面恰交于一点的充分必要条件 是 方 程 组 (2.8)有唯一解,从而它的系数行列式不等于零。

习 题 2.1

- 1. 在给定的仿射坐标系中,求下列平面的普通方程和参数方程。
 - (1) 过点(-1,2,0),(-2,-1,4),(3,1,-5);
 - (2) 过点(1,0,-2)和(-1,3,2), 平行于 v(1,-2,4);
 - (3) 过点(3,1,-2)和 z 轴;
 - (4) 过点(2,0,-1)和(-1,3,4), 平行于y轴;
 - (5) 过点(-1,-5,4), 平行于平面 3x-2y+5=0.
 - 2. 在给定的仿射坐标系中, 画出下列平面。
 - (1) 2x + 3y + z 6 = 0; (2) 4x + 3z + 2 = 0;

(3)
$$3x - y + 4z = 0$$
; (4) $3y + 2 = 0$.

3. 证明,经过三个定点 (x_i,y_i,z_i) , i=1,2,3的平面的方程为

$$\begin{vmatrix} x & x_1 & x_2 & x_3 \\ y & y_1 & y_2 & y_3 \\ z & z_1 & z_2 & z_3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

4. 在给定的仿射坐标系中,设平面π的方程为:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1,$$

其中 $abc \neq 0$, 说明 a,b,c 的几何意义。

5. 坐标满足方程

$$(ax + by + cz + d)^{2} - (ax + \beta y + \gamma z + \delta)^{2} = 0$$

的点的轨迹是什么?

6. 判断下列各对平面的相关位置。

(1)
$$2x + y - 3z - 1 = 0$$
 is $\frac{x}{3} + \frac{y}{6} - \frac{z}{2} + 2 = 0$;

(2)
$$x-2y+z-2=0$$
 与 $3x+y-2z-1=0$;

(3)
$$3x + 9y - 6z + 2 = 0$$
 $= 32x + 6y - 4z + \frac{4}{3} = 0.$

7. 在给定的仿射坐标系中,证明:通过点(x_0,y_0,x_0) 幷且 与平面 Ax + By + Cz + D = 0 平行的平面的方程为:

$$A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0$$
.

8. 下述三个平面是否恰交于一点?

$$2x + 3y - z + 1 = 0$$
, $x - 2y + 5z - 3 = 0$, $2x + y + z + 5 = 0$.

9. 证明:分别由方程

$$ax + by + cz + d = 0,$$

$$ax + \beta y + \gamma z + \delta = 0,$$

$$\lambda(ax + by + cz) + \mu(ax + \beta y + \gamma z) + k = 0.$$

给出的三个平面,当 $k = \lambda d + \mu \delta$ 时,沒有公共点。

10、证明、任何一个经过相交两平面 π, 和 π₂;

$$A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = \dot{0},$$

$$A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0$$

的交线!的平面方程能写成:

$$\lambda(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0,$$
(2.9)

其中 λ , μ 是不全为零的实数(我们把经过一条直线的所有平面称为**平面束**。本题说明,平面束的方程形如(2.9),其中 λ , μ 取 逼不全为零的实数)。

11. 求经过点 $M_0(1,-2,0)$, 并且 经过两平面 2x-y+z-3 = 0 与 x+2y-z+1=0 的交线的平面方程.

*12. 设平面 π . Ax + By + Cz + D = 0 与连接两点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 的线段相交于点M,且 $\overrightarrow{M_1M} = k\overrightarrow{MM_2}$ 。证明

$$k = -\frac{Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D}{Ax_2 + By_2 + Cz_2 + D}.$$

*13、设有三个平行平面

$$\pi_i$$
: $A_i x + B_i y + C_i z + D_i = 0$, $i = 1, 2, 3$.


一直线 l 与 π_1 、 π_2 , π_3 分别交于 P ,Q ,R 。 求 Q 分有向线 段 \overrightarrow{PR} 的 比值。

§ 2 直角坐标系中平面的方程, 点到平面的距离

2.1 直角坐标系中平面方程的系数的几何意义

确定一个平面的条件还可以 是:一个点和一个与这平面垂直 的非零向量。与一个平面垂直的 非零向量称为这个平面的 法 向 量。

取一直角标架 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 。 我们来 求 过 点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 且法向量为 n(a,b,c)的平面 π 的 方程。



点 M(x,y,z) 在平面 π 上 的

充分必要条件是 $M_0M \perp n$, 从而 $M_0M \cdot n = 0$, 于是得

$$a(x-x_0) + b(y-y_0) + c(z-z_0) = 0,$$

$$ax + by + cz + h = 0;$$
(2.10)

 $\mathbf{H}\mathbf{p} \qquad ax + by + cz + h = 0,$

1

其中 $h = -(ax_0 + by_0 + cz_0)$ 。(2.10)就是所求平面 π 的方程。

由此可见,在直角坐标系中, 平面方程的一次项系数是这个 平面的一个法向量 n 的坐标。

2.2 点到平面的距离

命题2.2 在直角坐标系中,点 $P_1(x_1,y_1,z_1)$ 到平面 π : Ax + By + Cz + D = 0

的距离为:

$$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$
 (2.11)

证明 作 P_1 到平面 π 的垂线, 设垂 足 为 $P_0(x_0,y_0,z_0)$, 则

 P_1 到不面 π 的距离为 $d=|\overrightarrow{P_0P_1}|$. 平面 π 的一个法向量为n(A,B,C),因为 $\overrightarrow{P_0P_1}$ // n,所以

$$\overline{P_0P_1} = \delta n^0 \tag{2.12}$$

(2.12)的两边用 nº 作內积得:

$$\delta = \overrightarrow{P_0 P_1} \cdot n^0 = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \left[A(x_1 - x_0) + B(y_1 - y_0) + C(z_1 - z_0) \right]$$

$$= \frac{Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \qquad (2.13)$$

于是得

$$d = \{ \overrightarrow{P_0 P_1} \} = \| \delta \| = \frac{\| Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D \|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

(2,12)中的δ 称为点 P₁ 到平面 π 的离差。(2,13)给出 了 求 离差的公式。

2.3 三元一次不等式的几何意义

取定一个直角坐标系, 坐标适合方程

$$Ax + By + Cz + D = 0$$
 (2.14)

的点在此方程表示的平面 π上、坐标适合不等式

$$Ax + By + Cz + D > 0$$
 (2.15)

的点 P(x,y,z),设 P 到平面 π 引的垂线的垂足 为 P_0 ,由(2.13) 和(2.12)知, P_0P 与 n(A,B,C)同向。因此,所有坐标适合不等式(2.15)的点都在平面 π 的同一侧(n 所指的一侧)。同 理,所有坐标适合不等式

$$Ax + By + Cz + D < 0$$
 (2.16)

的点在平面π的另一侧(-n 所指的一侧)。

由上述知,平面 π 把空间中的所有不在 π 上的点分成了两部 54

分,第一部分中的点的坐标都适合(2.15),第二部分中的点的坐标都适合(2.16)。换句话说,若 $M_1(x_1,y_1,z_1)$ 和 $M_2(x_2,y_2,z_2)$ 不在平面 π 上,则 M_1 与 M_2 位于平面 π 同侧的充分必要 条 件 是

 $F_1 = Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D$ 与 $F_2 = Ax_2 + By_2 + Cz_2 + D$ 同号。这个结论在仿射坐标系中也成立(见习题2.2的第16题)。

2.4 两个平面的夹角

两个平面的夹角是指两个平面交成两个相邻的二面角中**任一**个. 易知其中一个等于两个平面的法向量的夹角.

设在直角坐标系中,两平面 π,的方程是

$$A_i x + B_i y + C_i z + D_i = 0$$
, $i = 1, 2$.

则 π_1 与 π_2 的一个夹角 θ 满足:

$$\cos\theta = \frac{n_1 \cdot n_2}{|n_1| |n_2|} = \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}.$$

从而得到两个平面 和 和 和 垂直的充分必要条件是:

$$A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0. (2.17)$$

例2.2 设在直角坐标系中, 平面 π_1 和 π_2 的方程分别是 2x-y+2z-3=0 和 3x+2y-6z-1=0.

求由 π_1 和 π_2 构成的二面角的角平分面的方程,在此二面角**内**有 点 $P_0(1,2,-3)$ 。

解 点 M(x,y,z) 在所求的角平分面上的充分必要条件是, M到 π_1 的距离 d_1 等于M到 π_2 的距离 d_2 , 并且M与 P_0 或者都在 π_i 的同侧 (i=1,2), 或者都在 π_i 的同侧 (i=1,2), 或者M在 π_1 与 π_2 的交线上。 因为 P_0 的坐标适合:

$$2 \times 1 - 2 + 2 \times (-3) - 3 = -9 < 0,$$

 $3 \times 1 + 2 \times 2 - 6 \times (-3) - 1 = 24 > 0,$

所以M的坐标适合:

$$\frac{|2x-y+2z-3|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}} = \frac{|3x+2y-6z-1|}{\sqrt{3^2+2^2+(-6)^2}},$$

幷且适合:

$$\begin{cases} 2x - y + 2z - 3 \le 0, \\ 3x + 2y - 6z - 1 \ge 0, \end{cases}$$

或者

$$\begin{cases} 2x - y + 2z - 3 \geqslant 0, \\ 3x + 2y - 6z - 1 \leqslant 0. \end{cases}$$

整理得 23x-y-4z-24=0。这 就是所求二面角的角平分面的方程。

习 题 2.2

- 1. 在直角坐标系中,求下列平面的方程。
- (1) 过点 P(-1,2,0), 一个法向量 n(3,1,-2);
- (2) 过点 $M_1(3,-1,4),M_2(1,0,-3)$, 垂直于平面2x+5y+z+1=0.
- 2. 证明:在直角坐标系中,通过点 (x_0,y_0,z_0) ,并且与平面 $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ 和 $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ 都垂直的平面的方程为:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & A_1 & A_2 \\ y - y_0 & B_1 & B_2 \\ z - z_0 & C_1 & C_2 \end{vmatrix} = 0.$$

3. 在直角坐标系中, 平面π的方程为

$$Ax + By + Gz + D = 0,$$

其中所有系数都不为零。设此平面与三根坐标轴分别 交 于 M_1 , M_2 , M_3 , 求 $\Delta M_1 M_2 M_3$ 的面积和四面体 $OM_1 M_2 M_3$ 的体积。

- 4. 在直角坐标系中,求点到平面的距离。
 - (1) 点(0,2,1)到平面 2x-3y+5z-1=0;
 - (2) 点(-1,2,4)到平面x-y+1=0.
- 5. 在直角坐标系中,求平面

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

$$Ax + By + Cz + D_1 = 0$$

之间的距离、

- 6. 在直角坐标系中, 平面 π 的方程为 Ax + By + D = 0, 求 z 轴 到平面 π 的距离。
- 7. 在直角坐标系中,如果一个平面与三根坐标轴均相交,则三个截距倒数的平方和等于原点到此平面的距离的 倒数 的 平方。
 - 8. 在直角坐际系中,求与平面 Ax + By + Cz + D = 0

平行且与它的距离为 d 的平面的方程。

9. 在直角坐标系中,设

 π_1 : $Ax + By + Cz + D_1 = 0$ 与 π_2 : $Ax + By + Cz + D_2 = 0$ 平行,求与 π_1, π_2 等距离的点的轨迹。

- 10. 在直角坐标系中,求平面 z = ax + by + c 与 xOy 平 面的 夹角。
 - 11. 给定直角坐标系, 在平面束

 $\lambda(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$ 中求出与华丽 Ax + By + Cz + D = 0 垂直的平面的方程。

12、在直角坐标系中, 设 π_i 的方程为 $A_ix + B_iy + C_iz + D_i = 0$. i = 1.2.

设π,与π,相交,求π,与π,交成的二面角的角平分面的方程。

*13、求到两个给定平面的距离为定比的点的轨迹。

 $Ax + By + Cz + D + d^2 = 0$ 与 $Ax + By + Cz + D - d^2 = 0$ 之间。

*15.证明, 空间中满足条件 $|x|+|y|+|z|<\alpha$ (a>0)的点位于中心在原点, 顶点在坐标轴上, 且顶点与中心的距离为 α 的


八面体的内部,

*16.在仿射坐标系中,设 $M_1(x_1,y_1,z_1),M_2(x_2,y_2,z_2)$ 都不在平面 π , Ax + By + Cz + D = 0上,且 $M_1 \rightleftharpoons M_2$ 。证明, M_1 与 M_2 在平面 π 的同侧的充分必要条件是,

 $F_1 = Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D \ \, \text{与} \, \, F_2 = Ax_2 + By_2 + Cz_2 + D$ 同号。

§ 3 直线的方程,直线、平面间的相关位置

3.1 直线的方程



一个点和一个非零向量决定一条直线。取一个仿射标架 $[O;e_1,e_2,e_3]$,已知点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$,非零向量 o(X,Y,Z)。现在来求过点 M_0 且 方向向量为 v 的直线 l 的方程。

点 M(x,y,z)在直线 l 上的充 分必要 条 件 是 $M_0M \parallel v$, 即 $M_0M = tv$, t 是实数。设 M_0 , M 的 定 位 向量分别用 r_0 , r 表示,则由上式得

$$\mathbf{r} = \mathbf{r_0} + t\mathbf{v_\bullet} \tag{2.18}$$

(2.18) 称为直线的向量式参数方程, t 称为参数,它可以取任意 实 数,参数 t 的 几 何意义是:点M 在直线 l 上的 仿 射 标 架 $[M_0; v]$ 中的坐标。

将(2.18)用坐标写出,得

$$\begin{cases} x = x_0 + tX, \\ y = y_0 + tY, \\ z = z_0 + tZ, \end{cases}$$
 (2.19)

(2.19) 称为直线**的参数方程**,参数 t 可取任意实数。 消去参数 t ,因为 v = 0 ,不妨设 X = 0 ,则得

$$t=\frac{x-x_0}{X},$$

如果 $Y \rightleftharpoons 0$,则得

$$\frac{x - x_0}{X} = \frac{y - y_0}{Y},$$
 (2.20)

如果 Y = 0, 则 $y - y_0 = 0$, 于是 如果规定分母为零时就表示分子也为零,则(2.20)式仍然成立。

同理可得

$$\frac{x - x_0}{X} = \frac{z - z_0}{Z}, \qquad (2.21)$$

因而有

$$\frac{x - x_0}{X} = \frac{y - y_0}{Y} = \frac{z - z_0}{Z}.$$
 (2.22)

(2.22) 称为直线 l 的标准方程(或点向式方程),它实际上是两个方程(2.20)和(2.21)的联立方程组。标准方程中的(X,Y,Z)称为直线 l 的方向系数,它是 l 的方向向量 v 的坐标。由于对任意非零实数 k , kv 也是 l 的方向向量,所以(kX,kY,kZ) 也是 l 的方向系数。

如果已知直线 l 上两点 $M_1(x_1,y_1,z_1), M_2(x_2,y_2,z_2)$,则 M_1M_2 为 l 的一个方向向量,从而得 l 的方程为:

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}.$$
 (2.23)

(2.23) 称为直线 l 的两点式方程。

任意一条直线可以看成是某两个相交平面的交线。设直线 l 是相交平面 n, 和 n, 的交线, n, 的方程为

$$A_i x + B_i y + C_i z + D_i = 0$$
, $i = 1, 2$,

它们的一次项系数不成比例。则

$$\begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0, \\ A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0 \end{cases}$$
 (2.24)

是直线 [的方程, 称为 [的普通方程。

山直线 l 的标准方程(2,22)可写出它的普通方程。若 $X \rightleftharpoons 0$,则(2,22)可写成。

$$\begin{cases} -\frac{x - x_0}{X} = \frac{y - y_0}{Y}, \\ -\frac{x - x_0}{X} = \frac{z - z_0}{Z}. \end{cases}$$
 (2.25)

(2.25) 就是 l 的普通方程,第一个方程表示 平 行 于 z 轴的平面,第二个方程表示平行于 y 轴 的 平面。对 于 X=0,而 $Y \neq 0$ (或 $Z \neq 0$)的情况可类似讨论。

山直线 l 的普通方程(2.24)可写出 l 的标准方程。先找直线 l 上的一个点 M_0 ,如果

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \neq 0$$

则令 z=0, 再去解 x,y 的一次方程组,求得唯一的一个解 $x=x_0$, $y=y_0$ 。于是 $M_0(x_0,y_0,0)$ 在 l 上。然后再找 l 的一个方 向 向 量 v(X,Y,Z),因为 $v /\!\!/ \pi_l$, i=1,2,所以有

$$\begin{cases} A_1X + B_1Y + C_1Z = 0, \\ A_2X + B_2Y + C_2Z = 0. \end{cases}$$

介

$$X = \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix}, \quad Y = -\begin{vmatrix} A_1 & C_1 \\ A_2 & C_2 \end{vmatrix}, \quad Z = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix},$$

则

$$A_i X + B_i Y + C_i Z = \begin{vmatrix} A_i & B_i & C_i \\ A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{vmatrix} = 0.$$
 $i = 1, 2.$

所以坐标为

$$\left(\begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} A_1 & C_1 \\ A_2 & C_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \right) \tag{2.26}$$

的向量 σ 与 $\pi_i(i=1,2)$ 平行。由于 π_1 与 π_2 方程中的一次项系数不成比例,所以(2.26)中的三个行列式不变为零(据定理1.4)。这说明 σ = 0,于是坐标为(2.26)的向量 σ 就是 ℓ 的一个 方向向量。有了 ℓ 上的一个点 M_0 和它的一个方向向量。,就 可以立即写出它的标准方程。

由于直角坐标系是特殊的仿射坐标系,所以上述一切结论在直角坐标系中都成立。利用右手直角坐标系的特殊性,在由直线的普通方程写出它的标准方程时,求上的方向向量。可以更加直观,因为 $v\perp n_i$,其中 n_i 是 π_i 的法向量,i=1,2;所以可以取 $v_i=n_1\times n_2$,由于 n_i 的坐标是 (A_i,B_i,C_i) ,所以 $v=n_1\times n_2$ 的坐标是(2,26)。

3.2 两条直线的相关位置

在仿射坐标系中,设直线 i, 过点 $M_i(x_i,y_i,z_i)$,方向向量为 $o_i(X_i,Y_i,Z_i)$,i=1,2.

 l_1 与 l_2 平行的充分必要条件是 $v_1 /\!\!/ v_2$,但 $\overline{M_1 M_2 \backslash\!\!/ v_1}$ 。即存在实数 λ ,使得 $v_2 = \lambda v_1$,但对一切实数 μ 都 有 $\overline{M_1 M_2} \stackrel{\checkmark}{+} \mu v_1$ 。

 l_1 与 l_2 重合的充分必要条件是 v_1 $\|v_2\|$ M_1M_2 。即存在实数 λ,μ 使得

$$v_2 = \lambda v_1$$
, $\overline{M_1 M_2} = \mu v_1$.

 l_1 与 l_2 相交的充分必要条件是 $\overline{M_1M_2}, v_1, v_2$ 共面,且 v_1 火 v_2 。即,

$$\Delta := \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & X_1 & X_2 \\ y_2 - y_1 & Y_1 & Y_2 \\ z_2 - z_1 & Z_1 & Z_2 \end{vmatrix} = 0, \qquad (2.27)$$

且对一切实数 â, 都有 v2 + λv1.

 l_1 与 l_2 异面的充分 必 要 条 件 是 M_1M_2, v_1, v_2 不 共 面。 即 $\Delta \Rightarrow 0$ 。

3.3 直线和平面的相关位置

在仿射坐标系中,设直线 l 过点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$,一个方向向量为 v(X,Y,Z)。设平面 π 的方程为 Ax+By+Cz+D=0。

l 与 π 平行的充分必要条件是 v / π ,且 M_0 不在 π 上,即 AX + BY + CZ = 0 且 $Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \Rightarrow 0$.

l 在平面 π 上的充分必要条件是 $v /\!\!/ \pi$,且 M_0 在 π 上,即 AX + BY + CZ = 0 且 $Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$.

L 与π相交的充分必要条件是v X π , 即 $AX + BY + CZ \neq 0$.

此时,将1的参数方程

$$\begin{cases} x = x_0 + tX, \\ y = y_0 + tY, \\ z = z_0 + tZ \end{cases}$$

代入π的方程中,得

$$A(x_0 + tX) + B(y_0 + tY) + C(z_0 + tZ) + D = 0,$$

解得

$$t = -\frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{AX + BY + CZ},$$
 (2.28)

再代回到 l 的参数方程中, 可求出 l 与π的交点的坐标。

3.4 例

例2.3 在直角坐标系中,直线 1 的方程为

$$\frac{x+1}{-2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+2}{-3}$$
,

求过 l 拜且平行于 z 轴的平面 π 的方程以及 l 在 xOy 平面上的投影的方程, 并且 画图。

解 因为1的普通方程是

$$\begin{cases} \frac{x+1}{-2} = \frac{y-1}{1}, \\ \frac{x+1}{-2} = \frac{z+2}{-3}, \end{cases}$$

第一个方程表示的平面就是经过 l 且平行于 z 轴的平面,因此所求平面 π 的方程为


$$\frac{x+1}{-2}=\frac{y-1}{1},$$

 $\mathbf{H} \mathbf{J} \qquad \qquad x + 2y - 1 = 0.$

l 在 xOy 平 面 上的 投影与 是平面 π 与 xOy 平 面 的 交线, 所以与的方程是

$$\begin{cases} x + 2y - 1 = 0, \\ z = 0, \end{cases}$$

为了画平面 π , 先求出它与 x 轴的交点 (1,0,0), 它与 y 轴交



点 $\left(0,\frac{1}{2},0\right)$. 为了画直线l, 先求出l与xOy 平面的交点 $\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},0\right)$, l与xOz 平面的交点 (1,0,1).

例2.4 在仿射坐标系中,求过点 $M_0(0,0,-2)$, 与平面 π_1 : 3x-y+2z-1=0

平行,且与直线

$$l_1$$
, $\frac{x-1}{4} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z}{1}$

相交的直线!的方程。

解法一 先求 l 的一个 方 向 向量 v(X,Y,Z)。 因为 l 过 点 M_0 ,且 l 与 l_1 相交,所以有

$$\begin{vmatrix} 1-0 & 4 & X \\ 3-0 & -2 & Y \\ 0-(-2) & 1 & Z \end{vmatrix} = 0,$$

$$X+Y-2Z=0.$$

即

又因为 1 与 元 平行, 所以在

$$3X - Y + 2Z = 0$$

联立上述两个方程解得:

$$X=0$$
. $Y=2Z$.

令Z=1,得Y=2,所以l的方程为

$$\frac{x}{0}=\frac{y}{2}=\frac{z+2}{1}.$$

解法二 l 在过点 M_0 ,且与平面 π_1 平行的平面 π_2 上,设 π_2 的方程为

$$3x - y + 2z + D = 0,$$

将 M_0 的坐标代入, 求得 D=4。 所以 π_2 的方程为

$$3x - y + 2z + 4 = 0$$
.

l 又在过点 M_0 以及直线 l 的平面 π_3 上, π_3 的方程为

$$\begin{vmatrix} x-0 & 4 & 1-0 \\ y-0 & -2 & 3-0 \\ z-(-2) & 1 & 0-(-2) \end{vmatrix} = 0,$$

即

$$x+y-2z-4=0.$$

因为 [是 元] 与 元] 的 交线, 所以 [的方程为

$$\begin{cases} 3x - y + 2z + 4 = 0, \\ x + y - 2z - 4 = 0. \end{cases}$$

解法三 设 l 与 l 的 交 点为 $M_2(x_2,y_2,z_2)$,因 为 M_2 在 l

上,又 $\overline{M_0M_0}/\pi_1$,所以有

$$\begin{cases} \frac{x_2-1}{4} = \frac{y_2-3}{-2} = \frac{z_2}{1}, \\ 3(x_2-0) - (y_2-0) + 2(z_2+2) = 0, \end{cases}$$

解之, 得 M_2 的坐 标为 $\left(0,\frac{7}{2},-\frac{1}{4}\right)$, 因此 l 的方程为

$$\frac{x}{0} = \frac{y}{\frac{7}{2}} = \frac{z+2}{-\frac{1}{4}+2}$$

IJ

$$\frac{x}{0} = \frac{y}{2} = \frac{z+2}{1}$$
.

习 题 2.3

- 1. 在给定仿射坐标系中,求下列直线的方程。
- (1) 过点(-2,3,5), 方向系数为(-1,3,4);
- (2) 过点(0,3,1)和(-1,2,7)。
- 2. 在给定的直角垫标系中,求下列直线的方程。
- (1) 过点(-1,2,9), 垂直于平面 3x + 2y z 5 = 0;
- (2) 过点(2,4,-1), 与三根坐标轴夹角相等。
- 3. 将下列直线的普通方程化成标准方程。

(1)
$$\begin{cases} 3x - y + 2 = 0, \\ 4y + 3z + 1 = 0; \end{cases}$$
 (2)
$$\begin{cases} y - 1 = 0, \\ z + 2 = 0. \end{cases}$$

4. 在给定的直角坐标系中,求下列直线 在 xOy 面上 的 投影, 并画图。

(1)
$$\frac{x+1}{0} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{2}$$
; (2) $\begin{cases} 2x+3y+1=0, \\ 4x+3y+z-1=0. \end{cases}$

5. 判断下列各对直线的位置。

(1)
$$\frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{1}$$
, $\frac{x}{-1} = \frac{y-6}{2} = \frac{z+5}{3}$,

(2)
$$\begin{cases} x+y+z=0, \\ y+z+1=0; \end{cases} \begin{cases} x+z+1=0, \\ x+y+1=0. \end{cases}$$

6. 求直线与平面的交点,

(1)
$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z+2}{-1}$$
 $= 3x + 2y + z = 0;$

(2)
$$\left\{ \begin{array}{ll} 2x + 3y + z - 1 = 0, \\ x + 2y - z + 2 = 0 \end{array} \right.$$
 与 xOz 平面。

7. 求直线 l

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

与 z 轴相交的条件。

- 8. 在仿射坐标系中,求下列平面的方程。
- (1) 过直线 l_1 且平行于直线 l_2 , 其中 l_1 , l_2 的方程 分 别是:

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-1}, \qquad \frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-2}.$$

(2) 过直线与:

$$\begin{cases} 2x - y - 2z + 1 = 0, \\ x + y + 4z - 2 = 0. \end{cases}$$

并且在 y 轴和 z 轴上有相同的非零截距。

(3) 经过两平面

$$\pi_1$$
: $4x - y + 3z - 1 = 0$ 和 π_2 : $x + 5y - z + 2 = 0$ 的交线,并且经过点(1,1,1)。

- 9. 在给定的直角坐标系中,求下列平面方程。
- (1) 与平面 π_1 : 6x 2y + 3z + 15 = 0 平行,且这两个平面与点(0,-2,-1)等距;
 - (2) 经过 z 轴,且与平面 $2x + y \sqrt{5}z 7 = 0$ 交成 60° 角。
 - (3) 经过点(2,0,-3), 且垂直于两平面 π_1 : x-2y+4z-7=0 和 π_2 : 3x+5y-2z+1=0.
 - 10. 在给定的仿射率标系中,求下列直线的方程。
 - (1) 过点(1,0,-1), 平行于直线 l_{11}

$$\begin{cases} x+y+z=0, \\ x-y=0. \end{cases}$$

(2) 过点(11,9,0), 与直线与和与均相变, 其中 l₁,l₂ 的方程分别是:

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{4} = \frac{z-5}{3}, \qquad \frac{x}{5} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+1}{2},$$

(3) 平行于向量(8,7,1), 且与直线 l_1 和 l_2 均相 变, l_1 , l_2 的 方程分别是:

$$\frac{x+13}{2} = \frac{y-5}{3} = \frac{z}{1}$$
, $\frac{x-10}{5} = \frac{y+7}{4} = \frac{z}{1}$.

- 11. 在给定的直角坐标系中,求下列直线的方程。
- (1) 过点(2,-1,3), 与直线与

$$\frac{x-1}{-1} = \frac{y}{0} = \frac{z-2}{2}$$

相交且垂直(简称正交);

(2) 过点(4,2,-3), 平行于 平面 x+y+z-10=0, 且与直线 \boldsymbol{l}_1

$$\begin{cases} x + 2y - z - 5 = 0, \\ z - 10 = 0 \end{cases}$$

正交;

(3) 从点(2,-3,-1)引向直线

$$\frac{x-1}{-2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{1}$$

的垂线;

- (4) 经过点 M_0 , 且与直线 $r=r_1+tv$ 正变。
- 12、 在 $\triangle ABC$ 中, 设 P, Q, R 分别是直线 AB, BC, CA上的点,并且

$$\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{PB}$$
, $\overrightarrow{BQ} = \mu \overrightarrow{QC}$, $\overrightarrow{CR} = \nu \overrightarrow{RA}$.

证明: AQ,BR,CP 共点的充分必要条件是 $\lambda\mu\nu=1$ (注: \bigstar AQ,

BR,CP 彼此平行,则也认为它们有一个公共点。这在第七章 § 1 将详细讲)。

13. 用坐标法证明契维定理, 若三角形的三边 依次被分割

$$\lambda:\mu,\nu:\lambda,\mu:\nu$$
,

其中 λ,μ,ν 均为正实数,则此三角形的顶点与对边分点的连线交于一点。

14. 求出直线し

$$\begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0, \\ A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0 \end{cases}$$

和平面"

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

平行或1在π上的条件。

*15. 证明:如果直线与

$$\left\{ \begin{array}{l} A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0, \\ A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0 \end{array} \right.$$

与直线し

$$\left\{ \begin{array}{l} A_3 x + B_3 y + C_3 z + D_3 = 0, \\ A_4 x + B_4 y + C_4 z + D_4 = 0 \end{array} \right.$$

相交,那末

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 & D_3 \\ A_4 & B_4 & C_4 & D_4 \end{vmatrix} = 0.$$

16. 证明:任何与直线与

$$\left\{ \begin{array}{l} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_3 = 0. \end{array} \right.$$

和直线し

$$\left\{ \begin{array}{l} A_3x + B_3y + C_3z + D_3 = 0, \\ A_4x + B_4y + C_4z + D_4 = 0. \end{array} \right.$$

都相交的直线 (的方程为:

$$\left\{ \begin{array}{l} \lambda(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)+\mu(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0, \\[1mm] \lambda'(A_3x+B_3y+C_3z+D_3)+\mu'(A_4x+B_4y+C_4z+D_4)=0, \\[1mm] \\ \pm \theta \ \lambda, \mu \ \mathbb{E}$$
不全为零的实数, λ', μ' 也是不全为零的实数。

- -17. 证明,到三角形的三个顶点等距 离的 点的几何轨迹是一条直线。
- *18. 在直角坐标系中,给定点 A(1,0,3)和 B(0,2,5),直线1

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{3}$$
,

设 A', B' 各为 A, B 在 l 上的重 足,求 |A'B'| 以及 A', B' 的坐 标。

*19. 在仿射坐标系中,求出过点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$, 并且与平面

$$\pi_{i}$$
: $A_{i}x + B_{i}y + C_{i}z + D_{i} = 0$, $i = 1, 2$


都平行的直线的方程。

§ 4 点、直线和平面之间的度量关系

本节均在右手直角坐标系中讨论。

4.1 点到直线的距离

设直线 l 过点 M_0 ,方向向量为 v。 由图 2.6 看出,点 M 到直线 l 的距离 d 是以 $\overline{M_0}$ M , v 为邻边的平行四边形的底边 v 上的高,因此有



$$d = \frac{|\overrightarrow{M_0 M} \times v|}{|v|}. \tag{2.29}$$

4.2 两条直线之间的距离

定义2.1 两条直线上的点之间的最短距离称为这两条直线间的距离。

如果 $l_1 /\!\!/ l_2$,则 l_1 上的一个点到 l_2 的距离就是 l_1 与 l_2 间的距离,如果 l_1 与 l_2 相交或重合,则 l_1 与 l_2 之间的距离为零。

下设 l_1 与 l_2 异面, l_i 过点 M_i ,方向向量为 v_i ,i=1,2,且 v_1 $\downarrow v_2$, M_1 $\neq M_2$.

定义2.2 分别与两条异面直线 l_1, l_2 垂直相交 (即正交)的直线 l_1 称为 l_1 与 l_2 的公垂线,两垂足的连线段称为公垂线段。

命题2.4 两条异面直线 4 与 4 的公垂线存在且唯一。

证明 存在性。因为 01 X 02, 所以 01 与 01 × 02 不 共线。于是




图 2.7

 $M_1, v_1, v_1 \times v_2$ 决定 一个平面 π_1 。同理, $M_2, v_2, v_1 \times v_2$ 决定 一个平面 π_2 。因为 $v_1 \times v_2$,根据习题 1.5 第 11 题 我们 知, $v_1 \times (v_1 \times v_2)$ 与 $v_2 \times (v_1 \times v_2)$ 不 共线,而它们分别 是 π_1 和 π_2 的法 向量,于是 π_1 与

 π_2 必相交,设交线为l,l的方向向量为:

$$[v_1 \times (v_1 \times v_2)] \times [v_2 \times (v_1 \times v_2)],$$

据习题 1.5 第 10 题知,这个向量等于 $|v_1 \times v_2|^2(v_1 \times v_2)$,因此, $v_1 \times v_2$ 就是 l 的一个方向向量,由于

$$v_1 \times v_2 \perp v_i$$
, $i = 1, 2$,

所以


$$l \perp l_i$$
, $i = 1, 2$.

因为 l 与 l_i 都在 π_i 內,且 $v_1 \times v_2 \setminus v_i$,所以 l 与 l_i 相 交, i=1,

2. 这表明 π, 与 π, 的交线 l 就是 l, 与 l, 的公垂线。

唯一性。假如l' 也是 l_1 与 l_2 的公乘线,则l'的方向向量垂直于 v_i , i=1,2,从而 $v_1 \times v_2$ 就是l'的一个方向向量。因为l'在由 l_1 和 $v_1 \times v_2$ 决定的平面 π_i 内,i=1,2,所以l'是 π_1 与 π_2 的交线,于是l'与l重合。

命题2.5 两条异面直线与与12的公垂线段的长就是1.与12之间的距离。



证明 设 P_1P_2 是 l_1 与 l_2 的公垂线段。在 l_1 上任取一点 Q_1 ,i=1,2。作出由 M_1 , v_1 , v_2 决定的平面 π ,于是公垂线 $P_1P_2\bot\pi$ 。由 Q_2 作 π 的垂线,设垂足为N,因为 l_2 // π ,所以 $|P_1P_2|=|Q_2N|$ 。于是

$$|Q_2Q_1| \geqslant |Q_2N| = |P_1P_2|.$$

所以 $|P_1P_2|$ 是 l_1 与 l_2 上的点之间的最短距离。

命题2.6 设两条异面直线 l_1, l_2 分别过点 M_1, M_2 , 方向向量 分别为 v_1, v_2 , 则 l_1 与 l_2 之间的距离为:

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_1 M_2 \cdot v_1 \times v_2}|}{|\overrightarrow{v_1 \times v_2}|}. \tag{2.30}$$

证明 设 l_1 与 l_2 的公垂线段为 P_1P_2 ,因为公垂线的方向向量为 $v_1 \times v_2$,所以 $\overline{P_1P_2} /\!\!/ v_1 \times v_2$ 。记 $e = (v_1 \times v_2)^0$,则

$$d = |\overrightarrow{P_1P_2}| = |\overrightarrow{P_1P_2} \cdot e| = |(\overrightarrow{P_1M_1} + \overrightarrow{M_1M_2} + \overrightarrow{M_2P_2}) \cdot e|$$

$$= |\overrightarrow{M_1M_2} \cdot e|$$

$$= |\overrightarrow{M_1M_2} \cdot |\overrightarrow{v_1} \times |\overrightarrow{v_2}|| = |\overrightarrow{M_1} |\overrightarrow{M_2} \cdot |\overrightarrow{v_1} \times |\overrightarrow{v_2}||$$

$$= |\overrightarrow{M_1M_2} \cdot |\overrightarrow{v_1} \times |\overrightarrow{v_2}|| = |\overrightarrow{M_1} |\overrightarrow{M_2} \cdot |\overrightarrow{v_1} \times |\overrightarrow{v_2}||.$$


公式(2.30)的几何意义是, 两条异面直线与 与4 之间的距离 d 等于以 $\overline{M_1M_2}$, v_1,v_2 为棱的平行六面体的体积 除以以 v_1,v_2 为 邻边的平行四边形的面积,

两条直线的夹角,直线和平面的夹角 4.3

两条直线的夹角规定为它们的 方向 向量的夹角或 定义2.3 它的补角。

直线 l 与平面 π(l 不垂直于 π)的夹角规定为 l 与 定义2.4 它在 π 上的垂直投影所夹的锐角 θ , 当 ℓ 上 π 时, ℓ 与 π 的夹角规 定为 $\frac{\pi}{2}$.

设平面π的法向量为 n,l 的方向向量为 v, 则从图 2.9看出:



IJ

 $\theta = \frac{\pi}{2} - \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{n} \rangle ,$

 $\theta = \langle v, n \rangle - \frac{\pi}{2}$.

2.9

 $\sin \theta = |\cos(\mathbf{v}, \mathbf{n})|$

因此

2.4

- 求下列点到直线的距离.
- (1) 点(-1,-3,5), 直线

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+1}{-3}$$

(2) 点(1,0,2), 直线

$$\begin{cases} 2x - y - 2z + 1 = 0, \\ x + y + 4z - 2 = 0. \end{cases}$$

2. 求下列各对直线之间的距离。

(1)
$$\frac{x+1}{-1} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+5}{2}$$
 $\frac{x}{3} = \frac{y-6}{-9} = \frac{z+5}{-6}$

(2)
$$\frac{x}{2} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-1}{-1}$$
 $= \frac{x-1}{4} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+1}{-1}$;

(3)
$$\begin{cases} x+y-z+1=0, & = 5 \\ x+y=0 \end{cases} \begin{cases} x-2y+3z-6=0, \\ 2x-y+3z-6=0. \end{cases}$$

3. 求下列各对直线的公垂线的方程。

(1)
$$x-1=\frac{y}{-3}=\frac{z}{3}$$
 $f_{j}=\frac{x}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z}{-2};$

(2)
$$\begin{cases} x+y-1=0, & \text{if } \begin{cases} x-z+1=0, \\ 2y+z-2=0. \end{cases}$$

4. 求下列各对直线的夹角,

(1)
$$\frac{x+1}{-1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+4}{2}$$
 if $\frac{x-1}{-2} = \frac{y}{4} = \frac{z-1}{-3}$;

(2)
$$\begin{cases} x+y+z-1=0, & \exists j \\ x+y+2z+1=0 \end{cases} \begin{cases} 3x+y+1=0, \\ y+3z+2=0. \end{cases}$$

5. 求下列直线与平面的夹角。

(1)
$$\pi \mathcal{L}_{x}^{x-1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-1}$$
, $\sqrt{x} = x - 2y + 4z - 1 = 0$;

(2) 直线
$$\{ \frac{x-y-z+2=0}{2x-3y+3=0}, \quad \mp \ln \quad 2x-z+1=0.$$

- 6. 求平面 Ax + By + Cz + D = 0 与坚标轴的 夹角,在怎 样的条件下,此平面与三根坐标轴成等角。
 - 7. 设异面直线 4,42的方程分别为:

$$\frac{x-x_1}{X_1} = \frac{y-y_1}{Y_1} = \frac{z-z_1}{Z_1}, \qquad \frac{x-x_2}{X_2} = \frac{y-y_2}{Y_2} = \frac{z-z_2}{Z_2},$$

求与与心等距离的平面的方程。

- 8. 已知两条异面直线 4₁ 和 4₂,证明:连接 4₁ 上任一点和 4₂ 上任一点的线段的中点轨迹是公垂线段的垂直平分面。
- 9. 在直角坐标系中,点P不在坐标平面上,从P点到 xOz, xOy平面分别作乘线,乘足为M和N。设直线 OP 与平面 OMN, xOy, yOz, zOx 的夹角分别为 θ , α , β , γ 。则

$$\csc^2\theta = \csc^2\alpha + \csc^2\beta + \csc^2\gamma.$$

第三章 常见曲面

本章将介绍一些常见曲面,一方面了解如何利用曲面的几何 特性建立它的方程,另一方面熟悉如何利用方程研究曲面的几何 性质,本章的讨论均在右手直角坐标系中进行,

§1 球面和旋转面

1.1 球面的普通方程

我们来求球心为 $M_0(x_0,y_0,z_0)$, 半径为R的球面的方程。点 M(x,y,z)在这个球面上的充分必要条件是 $M_0M = R$, 即,

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2.$$
 (3.1)

展开得

$$x^{2} + y^{2} + z^{2} + 2b_{1}x + 2b_{2}y + 2b_{3}z + c = 0,$$
 (3.2)


典中, $b_1 = -x_0$, $b_2 = -y_0$, $b_3 = -z_0$, $c = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - R^2$.

(3.1)或(3.2)就是所求球面方程,它是一个三元二次方程,沒有交叉项(指 xy,xz,yz 项),平方项的系数相同。反之,任一形如(3.2)的方程经过配方后可写成:

$$(x+b_1)^2+(y+b_2)^2+(z+b_3)^2+c-b_1^2-b_2^2-b_3^2=0$$
,

当 $b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 > c$ 时,它表示一个球心在 $(-b_1, -b_2, -b_3)$,半径 为 $\sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2} - c$ 的球面;当 $b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 = c$ 时,它表示一个点 $(-b_1, -b_2, -b_3)$;当 $b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 < c$ 时,它沒有轨迹(或者说它表示一个虚球面)。

1.2 球面的参数方程,点的球面坐标



 $\begin{cases} x = R \cos\theta \cos\varphi, & 0 \le \varphi < 2\pi, \\ y = R \cos\theta \sin\varphi, & -\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}. \end{cases}$

如果球心在原点, 半径为 R, 在球面上任 取一点 M(x,y,z), 从 M作 xOy 面 的 垂线, 垂 足为 N, 连 OM, ON. 设 x 轴到 ON 的角度为 φ , ON 到 OM 的 角 度 为 θ (M 在 xOy 面上 方 时, θ 为 正, 反之为负), 则有

$$0 \leqslant \varphi < 2\pi,$$

$$-\frac{\pi}{2} \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{2}.$$
(3.3)

(3.3)称为球心在原点,半径为R的球面的**参数方程**,有两个参数 φ , θ ,其中 φ 称为**经度**, θ 称为纬度。球面上的每一个点(除去它与z轴的交点)对应唯一的一对实数 (θ , φ),因此(θ , φ) 称为球面上点的曲纹坐标。

因为室间中任一点 M(x,y,z) 必在以原点为球心,以R=10M 为半径的球面上,而球面上的点 (除去它与 z 轴 的交点外)又由它的曲纹坐标(θ , φ)唯一确定,因此,除去 z 轴外,室间中的点M由有序三元实数组(R, θ , φ)唯一确定。我们把 (R, θ , φ) 称为空间中点M的 球面坐标(或空间极坐标),其中 $R \ge 0$,

 $-\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}$, $0 \le \varphi \le 2\pi$. 点M的球面坐标 (R, θ, φ) 与M的直角 坐标 (x, y, z)的关系为

$$\begin{cases} x = R \cos \theta \cos \varphi, & R \geqslant 0, \\ y = R \cos \theta \sin \varphi, & -\frac{\pi}{2} \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{2}, \\ z = R \sin \theta, & 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi, \end{cases}$$
 (3.4)

1.3 曲面和曲线的普通方程、参数方程

从球面的方程(3,2)和球面的参数方程(3,3)看到,一般来说,曲面的普通方程是一个三元方程 F(x,y,z)=0。曲面的参数方程是含两个参数的方程:

$$\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v), & a \leq u \leq b, c \leq v \leq d, \\ z = z(u,v), \end{cases}$$
 (3.5)

其中,对于(u,v)的每一对值,由(3.5)确定的点(x,y,z) 在此曲面上;而此曲面上任一点的坐标都可由(u,v) 的某一对值通过(3.5)表示。于是通过曲面的参数方程(3.5),曲面上的点(可能要除去个别点)便可以由数对(u,v)来确定,因此(u,v)称为曲面上点的曲纹坐标。

空间中曲线的普通方程是两个三元方程的联立:

$$\begin{cases} F(x,y,z) = 0, \\ G(x,y,z) = 0. \end{cases}$$

即空间中曲线可以看成是两个曲面的交线,曲线的参数方程是含有一个参数的方程,

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), & a \leq t \leq b, \\ z = z(t), \end{cases}$$
 (3.6)

其中,对于 $t(a \le t \le b)$ 的每一个值,由(3.6)确定的点(x,y,z)在此曲线上,而此曲线上任一点的坐标都可由 t 的某个值通过(3.6)表示。


$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \\ z = 0. \end{cases}$$

而这个圆的参数方程是:

$$\begin{cases} x = R \cos \varphi, \\ y = R \sin \varphi, & 0 \le \varphi < 2\pi. \\ z = 0, \end{cases}$$

1.4 旋 转 面

球面可以看成是一个半圆绕它的直径旋转一周所形成的曲面。现在来研究更一般的情形。



定义3.1 一条曲线 Γ 绕 一条直线 ℓ 旋转所得的曲面称为**旋转面**。 ℓ 称为轴, Γ 称为母线。

母线 Γ 上每个点 M_0 绕l 旋转得到一个圆,称为纬圆,纬圆与轴垂直。过l 的 半平面与旋转面的交线称为经线(或子午线)。经线可以作为母线,但 母 线不一定 是经线。

已知轴l过点 $M_1(x_1,y_1,z_1)$,方向向量为v(l,m,n), 母线 Γ 的方程为;

$$\begin{cases}
F(x,y,z) = 0, \\
G(x,y,z) = 0.
\end{cases}$$

我们来求旋转面的方程,

点 $M(x,y_0,z)$ 在旋转面上的充分必要条件是M在经过母线 Γ 上某一点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 的纬圆上(如图3.2)。即,有母线 Γ 上的一点 M_0 使得M和 M_0 到轴 L 的距离相等(或到轴上一点 M_1 的距

离相等); 幷且 M_0M 上 l_0 因此, 有

$$\begin{cases} F(x_0, y_0, z_0) = 0, \\ G(x_0, y_0, z_0) = 0, \\ |\overrightarrow{MM}_1 \times v| = |\overrightarrow{M}_0 \overrightarrow{M}_1 \times v|, \\ l(x - x_0) + m(y - y_0) + n(z - z_0) = 0. \end{cases}$$

从这个方程组中消去参数 x_0, y_0, z_0 , 就得到 x, y, z 的方程, 它就

是所求旋转面的方程。

现在设旋转轴为 z 轴, 母线 l 在 yOz 平面上, 其方程为

$$\begin{cases} f(y,z)=0, \\ x=0. \end{cases}$$

则点 M(x,y,z) 在旋转面上的充分必要条件是:

$$\begin{cases} f(y_0, z_0) = 0, \\ x_0 = 0, \\ x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2, \\ 1 \cdot (z - z_0) = 0. \end{cases}$$

消去参数 xo.yo.zo, 得

$$f(\pm\sqrt{x^2+y^2},z)=0.$$
 (3.7)

(3.7)就是所求旋转面的方程。由此看出,为了得到 yOz 平 面上的曲线 Γ 绕 z 轴旋转所得的旋转面方程,只要 将 母 线 Γ 在 yOz 平面上的方程中 y 改成 $t \sqrt{x^2 + y^2}$, z 不动。坐标平面上的曲线 绕坐标轴旋转所得旋转面方程都有类似的规律。

例3.1 母线 Γ

$$\begin{cases} y^2 = 2pz, \\ x = 0 \end{cases}$$

绕之轴旋转所得旋转面方程为

$$x^2 + y^2 = 2pz$$
,


这个曲面称为旋转抛物面(如图3.3)。

例3.2 母线 Γ

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ z = 0 \end{cases}$$

绕×轴旋转所得曲面方程为


$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2 + z^2}{b^2} = 1,$$



这个曲面称为旋转双叶双曲面(如图3.4)。「绕y轴旋转 所得曲面方程为

$$\frac{x^2+z^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1,$$

这个曲面称为旋转单叶双曲面(如图3.5)。



例3.3 圆

$$\begin{cases} (x-a)^2 + z^2 = r^2, \\ y = 0 \end{cases} (0 < r < a)$$

绕2轴旋转所得曲面为

$$(\pm \sqrt{x^2 + y^2} - a)^2 + z^2 = r^2$$




图 3.6

这个曲面称为环面(如图3.6)。

例3.4 设与和4.是两条异面直线,它们不垂直。求4.绕4、旋转所得曲面的方程。

解 设与和 l_2 的距离为 a 。以 l_1 为 z 轴,以 l_1 和 l_2 的公垂线为 x 轴,且使 l_2 与 x 轴的交点为 (a,0,0) ,建立一个右手直角坐标系。设 l_2 的方向向量为 v(l,m,n) ,因为 l_2 与 x 轴垂直,所以 $v \cdot e_1 = 0$,得 l = 0 。因为 l_2 与 l_1 异面,所以 $v \cdot x \cdot e_3$,于是 $m \neq 0$ 。因此可设 v 的坐标为 (0,1,b) 。因为 l_1 与 l_2 不垂直,所以 $v \cdot e_3 \neq 0$,于是 $b \neq 0$ 。因此, l_2 的参数方程为

$$\begin{cases} x = a, \\ y = t, & -\infty < t < +\infty, \\ z = bt, \end{cases}$$

点M在旋转面上的充分必要条件是

$$\begin{cases} x_0 = a, \\ y_0 = t, \\ z_0 = bt, \\ x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2, \\ 1 \cdot (z - z_0) = 0. \end{cases}$$

消去参数 x₀, y₀, z₀, t, 得

$$x^2 \in y^2 = a^2 + \frac{z^2}{b^2},$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{a^2b^2} = 1.$$

这是一个旋转单叶双曲面,

习 题 3.1

- 1. 求下列球面的中心和半径。
- (1) $x^2 + y^2 + z^2 12x + 4y 6z = 0$;
- (2) $x^2 + y^2 + z^2 2x + 4y 6z 22 = 0$.
- 2. 求下列球面的方程,

- (1) 以点 A(1,0,3), B(2,-1,4)的连线段为直径;
- (2) 过点(1,-1,1),(1,2,-1),(2,3,0)和坐标原点;
- (3) 过点(1,2,5), 与三个坐标平面相切;
- (4) 过点(2,-4,3), 且包含圆:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 5, \\ z = 0. \end{cases}$$

3. 过球面上一点与此点所作半径相垂直的平面叫做**切面。** 给定球面

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 4z - 20 = 0$$

求过这球面上一点(2,4,2)的切面方程。

- 4. 平面 Ax + By + Cz + D = 0(A > 0),B, C, D < 0) 与三个坐标平面组成一个四面体,求内切于这个四面体的球面方程。
 - 5、 求下列圆的中心和华径。

(1)
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 12x + 4y - 6z = 0, \\ 2x + y + z + 1 = 0, \end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \\ Ax + By + Cz + D = 0. \end{cases}$$

- 6. 求过三点(3,0,0),(0,2,0),(0,0,1)的圆的方程。
- 7. 证明曲线

$$\begin{cases} x = 3 \sin t, \\ y = 4 \sin t, \\ z = 5 \cos t \end{cases}$$

是一个圆, 幷求该圆的中心及半径。

*8. 证明: 曲线

$$x = \frac{t}{1 + t^{2} + t^{4}},$$

$$y = \frac{t^{2}}{1 + t^{2} + t^{4}},$$

$$z = \frac{t^{3}}{1 + t^{2} + t^{4}}$$

(-∞</<+∞)表示一条球面曲线, 幷且求它所在的球面。

9. 求旋转面的方程,

(1)
$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{2}$$
 $\frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{2}$ $\frac{x}{2}$

(2)
$$\frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$$
 $\frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{2}$ $\frac{x}{2}$

(3)
$$x-1=\frac{y}{-3}=\frac{z}{3}$$
 绕 z 轴旋转;

(4)
$$x-1=\frac{y}{-3}=\frac{z}{-3}$$
 $\frac{x}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z}{-2}$ $\frac{x}{2}$

(5)
$$\begin{cases} z = ax + b, \\ z = cy + d \end{cases}$$
 (a,b,c,d\(\psi\)0) 绕 z 轴旋转;

(7)
$$\begin{cases} (x-2)^2 + y^2 = 1, \\ z = 0 \end{cases}$$
 绕 y 轴旋转;

(8)
$$\begin{cases} xy = a^2, \\ z = 0 \end{cases}$$
 绕这曲线的渐近线旋转;

(9)
$$\begin{cases} y = x^3, \\ z = 0 \end{cases}$$
 绕 y 轴旋转;

(10)
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ z = x^2 \end{cases}$$
 绕 z 轴旋转。

*10. 证明: $z = \frac{1}{x^2 + y^2}$ 表示一个旋转面,并且求它的母线和转轴。

- 11. 适当选取坐标系,求下列轨迹的方程。
- (1) 到两定点距离之比等于常数的点的轨迹;
- (2) 到两定点距离之和等于常数的点的轨迹;

(3) 到定平面和定点等距离的点的轨迹。

§ 2 柱面和锥面


2.1 桂面方程的建立

定义3.2 一条直线 1 沿着一条客间曲线 C 平行 移动时 所形成的曲面称为**程面。 1** 称为母线, C 称为准线。

按定义, 平面也是柱面,

对于一个柱面,它的准线和母线都不唯一,但母线方向唯一 (除去平面外),与每一条母线都和交的曲线均可作为准线,

设一个柱面的母线方向为v(l,m,n), 准线C的方程为



 $\begin{cases} F(x,y,z) = 0, \\ G(x,y,z) = 0. \end{cases}$

我们来求这个柱面的方程.

点 M(x,y,z) 在 此 柱 面 上 的充分 必 要 条 件是M在某一条 母 线 上,即,有准 线 C 上一 点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 使得M 在 过 M_0 , 且方向为 v 的直线上(如图3.7).

因此,有

$$\begin{cases} F(x_0, y_0, z_0) = 0, \\ G(x_0, y_0, z_0) = 0, \\ x = x_0 + lu, \\ y = y_0 + mu, \\ z = z_0 + nu. \end{cases}$$

消去 x₀, y₀, z₀, 得

$$\begin{cases}
F(x-lu,y-mu,z-nu)=0, \\
G(x-lu,y-mu,z-nu)=0.
\end{cases}$$

再消去参数u,得到x,y,z的一个方程,就是所求柱面的方程。 如果给的是准线C的参数方程

$$\begin{cases} x = f(t), \\ y = g(t), & a \le t \le b, \\ z = h(t), \end{cases}$$
 (3.8)

则同理可得柱面的参数方程为

$$\begin{cases} x = f(t) + lu, \\ y = g(t) + mu, \\ z = h(t) + nu, \end{cases} a \le t \le b,$$

$$(3.9)$$

2.2 圆柱面,点的柱面坐标

现在來看圆柱面的方程。圆柱面有一条对称轴 l ,圆柱面上每一个点到轴 l 的距离都相等,这个距离称为圆柱面的半径。圆柱面的准线可取成一个圆 C ,它的母线方向与准线圆垂直。如果知道准线圆的方程和母线方向,则可用 2.1 中所述方法求出圆柱面的方程。如果知道圆柱面的半径为 r ,母线方向为v(l,m,n),以及圆柱面的对称轴 l_0 经过点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$,则 点 M(x,y,z) 在此圆柱面上的充分必要条件是M 到轴 l_0 的距离等于 r ,即

$$\frac{|\overrightarrow{MM_0} \times v|}{|v|} = r.$$


由此出发可求得圆柱面的方程。特别地,若圆柱面的半径为 r, 对称轴为 z 轴,则这个圆柱面的方程为

$$x^2 + y^2 = r^2 ag{3.10}$$

空间中任意一点 M(x,y,z)必在以 $r=\sqrt{x^2+y^2}$ 为 半径,以 z 轴为对 x 轴的圆柱面上,显然这个圆柱面的参数方程为

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, & 0 \le \theta < 2\pi, \\ y = r \sin \theta, & -\infty < u < +\infty. \end{cases}$$

因此,圆柱面上的点M被数偶(θ ,u) 所确定。从而空间中任一点M被有序 三元实数组(r, θ ,u) 所确定。(r, θ ,u) 称为点M的柱面坐标。点M的柱面坐




标与它的直角坐标的关系是。

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, & r \ge 0, \\ y = r \sin \theta, & 0 \le \theta < 2\pi, \\ z = u, & -\infty < u < +\infty. \end{cases}$$
 (3.11)

2.3 柱面方程的特点

从(3.10)看到,母线平行于z轴的圆柱面的方程中不含z(即z的系数为零),这个结论对于一般的柱面也成立,即,我们有

定理3.1 若一个柱面的母线平行于 z 轴(或 x 轴,或 y 轴),则写的方程中不含 z (或 x , 或 y),反之,一个三元方程如果不含 z (或 x , 或 y),则它一定表示一个母线平行于 z 轴(或 x 轴,或 y 轴) 的柱面,



28 3.9

证明 设一个柱面的母线平 行于z轴,则这个柱面的每条母 线心与xOy面相交,从而这个 柱面与xOy面的交线C可以作 为准线,设C的方程是

$$\begin{cases} f(x,y) = 0, \\ z = 0. \end{cases}$$

点M在此柱面上的充分必要条件是,有准线C上一点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$

使得M在过M。且方向为v(0,0,1)的直线上,因此,有

$$f(x_0, y_0) = 0,$$

$$z_0 = 0,$$

$$x = x_0,$$

$$y = y_0,$$

$$z = z_0 + u.$$

消去 x₀, y₀, z₀, 得

$$\begin{cases} f(x,y) = 0, \\ z = u_{\bullet} \end{cases}$$

由于参数 4 可以取任意实数值,于是得到这个柱面的方程为

$$f(x,y)=0$$

反之,任给一个不含 z 的三元方程 g(x,y)=0,我们考虑以曲线 G',

$$\begin{cases} g(x,y) = 0, \\ z = 0 \end{cases}$$

为准线,以z轴方向为母线方向的柱面,由上述议论知,这个柱面的方程为g(x,y)=0。因此,方程g(x,y)=0表示一个母线平行于z轴的柱面。

母线平行于 x 轴或 y 轴的情形可类似讨论。

例如,方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$ 表示母线平行于 z 轴的柱面,它与 xOy 面的交线为

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ z = 0. \end{cases}$$

这条交线是椭圆,因而这个柱面称为椭圆柱面(如图3.10)。

类似地,方程

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + 1 = 0, \qquad x^2 + 2py = 0$$

分别表示母线平行于 z 轴的双曲柱面, 抛物柱面(分别如图3.11





图 3,11



M. M.

图 3.12

图 3.13

2.4 锥面方程的建立

定义3.3 在空间中,由曲线C上的点与不在C上的 一个定点 M_0 的连线组成的曲面称为**锥面**。 M_0 称为顶点,C 称为准线,C 上的点与 M_0 的连线称为母线、

一个锥面的准线不唯一,与每一条母线都相交的曲线均可作为准线。

设一个锥面的顶点为 $M_0(x_0,y_0,z_0)$, 准线C的方程为

$$\begin{cases} F(x,y,z) = 0, \\ G(x,y,z) = 0. \end{cases}$$

我们来求这个锥面的方程。

点 M(x,y,z) 在此锥面上的充分必要条件是:M 在一条母线上,即,准线上有一点 $M_1(x_1,y_1,z_1)$ 使得 M_1 在直线 M_0M 上。因此,有

$$\begin{cases} F(x_1, y_1, z_1) = 0, \\ G(x_1, y_1, z_1) = 0, \\ x_1 = x_0 + (x - x_0)u, \\ y_1 = y_0 + (y - y_0)u, \\ z_1 = z_0 + (z - z_0)u. \end{cases}$$

消去 x1, y1, Z1 得

$$\begin{cases}
F(x_0 + (x - x_0)u, & y_0 + (y - y_0)u, & z_0 + (z - z_0)u) = 0, \\
G(x_0 + (x - x_0)u, & y_0 + (y - y_0)u, & z_0 + (z - z_0)u) = 0,
\end{cases}$$

再消去#,得到x,y,z的一个方程,就是所求锥面的方程。

2.5 圆锥面

对于圆锥面,它有一根对称轴 l ,它的每一条母线与轴 l 夹的锐角都相等,这个锐角称为圆锥面的**半顶角**。与轴 l 垂直的平面截圆锥面所得交线为圆。如果已知准线圆方程和顶 点 M_0 的坐标,则用 2.4 所述方法可求得圆锥面方程。如果已知顶点的坐标和轴 l 的方向向量 v 以及半顶角 a ,则点 M(x,y,z) 在圆锥面上的充分必要条件是:

$$\langle \overrightarrow{M_0M}, \nu \rangle = a \quad \text{if } \pi - a,$$

因此,有

$$|\cos\langle \overrightarrow{M_0M}, v \rangle| = \cos a. \tag{3.12}$$

由(3,12)可求得圆锥面的方程。

例3.5 求以三根坐标轴为母线的圆锥面的方程。

解 显然这个圆锥面的顶点为原点 O, 设轴 I 的方向 为 v, 因为三根坐标轴为母线, 所以由(3,12)得

$$|\cos\langle e_1, v \rangle| = |\cos\langle e_2, v \rangle| = |\cos\langle e_3, v \rangle|$$

因此,轴 l 的一个方向向量 o 的坐标为 (1,1,1) 或 (1,1,-1) 或 (1,-1,1) 或 (1,-1,-1)。 考虑 o 的坐标为 (1,1,1),其余三种情形可类似讨论。

因为点 M(x,y,z) 在这个圆锥面上的充分必要条件是

$$|\cos\langle \overrightarrow{OM}, v \rangle| = |\cos\langle e_1, v \rangle|,$$

訓

$$\frac{|\overrightarrow{OM} \cdot v|}{|\overrightarrow{OM}| |v|} = \frac{|e_1 \cdot v|}{|v|},$$

于是得

$$xy + yz + xz = 0. (3.13)$$

这就是所求的一个圆锥面的方程。

2.6 维面方程的特点

方程(3.13)的特点是:每一项都是二次的,称为二次齐次方程。如果令F(x,y,z) = xy + yz + xz,则有

 $F(tx,ty,tz) = t^2(xy + yz + xz) = t^2F(x,y,z)$. (3.14) 关系式(3.14)可反映方程(3.12)是二次齐次方程的这一特点。一般地,有

定义3.4 F(x,y,z)称为是x,y,z的n次齐次函数(n是整数),如果

$$F(tx,ty,tz)=t^{\mathfrak{n}}F(x,y,z)$$

对于定义域中一切x,y,z以及对于任意非零实数 ι 都成 立。 此时,方程 F(x,y,z)=0 称为 x,y,z的 n 次**齐次方程**。

定理3.2 x,y,z的齐次方程表示的曲面(添上原点) 一定是以原点为顶点的锥面。

证明 设 F(x,y,z)=0是 n 次齐次方程,它表示的曲面添上原点后记作 S 。在 S 上任取一点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$, M_0 不是原 点。于是直线 OM_0 上任一点 $M_1 \rightleftharpoons O$ 的坐标 (x_1,y_1,z_1) 适合

$$\begin{cases} x_1 = x_0 t, \\ y_1 = y_0 t, & t \Rightarrow 0, \\ z_1 = z_0 t, \end{cases}$$
 (3.15)

从而有

$$F(x_1, y_1, z_1) = F(x_0t, y_0t, z_0t) = t^n F(x_0, y_0, z_0) = 0,$$
(3.16)

因此 M_1 在 S 上。于是整条直线 OM_0 都在 S 上,所以 S 是由过原点的一些直线组成的,这说明 S 是锥面。

定理3.3 在以锥面的顶点为原点的直角坐标系里,锥面可以用x,y,z的齐次方程表示。

证明从略,

习 類 3.2

- 1. 求半径为 2 , 对称轴为 $x = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ 的圆柱面方程。
- 2. 设圆柱面的对称轴为:

$$\begin{cases} x = t, \\ y = 1 + 2t, \\ z = -3 - 2t, \end{cases}$$

且已知点 $M_1(1,-2,1)$ 在这个圆柱面上,求这个圆柱面方程。

3. 已知圆柱面的三条母线为:

$$x = y = z$$
, $x + 1 = y = z - 1$, $x - 1 = y + 1 = z$,

求这个圆柱面的方程。

- 4. 求柱面方程。
- (1) 准线为

$$\begin{cases} y^2 = 2z, \\ x = 0, \end{cases}$$

母线平行于 x 轴;

(2) 准线为

$$\begin{cases} xy=4,\\ z=0, \end{cases}$$

母线方向为(1,-1,1);

(3) 准线为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ 2x^2 + 2y^2 + z^2 = 2, \end{cases}$$

母线方向为(-1,0,1);

(4) 准线为

$$\begin{cases} x = y^2 + z^2, \\ x = 2z. \end{cases}$$

母线垂直于准线所在平面,

5。 求准线为

$$\begin{cases} \frac{x^2}{4} + y^2 = 1, \\ \mathbf{z} = 0 \end{cases}$$

的圆柱面的方程,这样的圆柱面有几个?

- 6. 求顶点为(1,2,3), 轴与平面 2x + 2y z + 1 = 0 垂 直, 母线与轴夹角为 $\frac{\pi}{6}$ 的圆锥面的方程。
- 7. 求顶点为(1,2,4), 轴与平间 2x + 2y + z = 0垂直, 且经过点(3,2,1)的圆锥面的方程。
- 8. 给定球面 $x^2 + y^2 + z^2 + 2x 4y + 4z 20 = 0$, 求以(2,6,10) 为顶点的切锥面的方程。
 - 9. 求锥面方程。
 - (1) 顶点为(4,0,-3), 准线为

$$\begin{cases} \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1, \\ z = 0. \end{cases}$$

(2) 顶点为原点, 准线为

$$\begin{cases} x^2 - \frac{y^2}{4} = 1, \\ y = -5. \end{cases}$$

(3) 顶点为原点,准线为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 3, \\ x^2 + y^2 + 2z - 5 = 0. \end{cases}$$

(4) 顶点为(0,0,2R), 准线为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2Rz, \\ ax + by + cz + d = 0. \end{cases}$$

10. 已知锥面S的顶点为(2,5,4),S与yOz平面的交线为一圆,这个圆的圆心为(0,1,1),半径为2,求这个锥面方程。

- *11. 已知球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外切柱面的母线 垂 直 于平面x + y 2z 5 = 0,求这个柱面方程。
 - *12. 证明: 球面的外切柱面是圆柱面。
- *13. 过x 轴和y 轴分别作动平面,交角 α 是 常 数,求交线的轨迹方程,并且证明它是一个锥面。

§3 二次曲面

前面两节,我们抓住几何特征很明显的球面,旋转面,柱面,锥面建立它的方程。本节则对于比较简单的二次方程,从方程出发去研究图形的性质。

我们已经知道二次方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0, \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + 1 = 0, \quad x^2 + 2py = 0$$

分别表示椭圆柱面,双曲柱面和抛物柱面。而二次方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$

则表示二次锥面。现在再研究几个二次方程表示的图形。

3.1 椭 球 面

方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1(a,b,c > 0)$$
 (3.17)

表示的图形称为椭球面。它有以下性质:

(1) 对称性。因为方程(3.17)中用-x代x,方程不变,于是若点P(x,y,z)在椭球面(3.17)上,则P点关于yOz面的对称点(-x,y,z)也在此椭球面上,所以此椭球面关于yOz面对称。同理,由于(3.17)中用-y代y(-z代z)方程不变,所以此椭球面关于xOz面(xOy面)对称。因为方程(3.17)中同时

用-x代x,用-y代y,方程不变, 所以图形关于z轴对称。 类似的理由知,图形关于y轴、x 轴也对称。因为(3.17)中同时 用-x代x,-y代y,-z代z,方程不变,所以图 形 关于原 点对称,总而言之,三个坐标面都是椭球面(3.17)的对称平面, 三根坐标轴都是它的对称轴,原点是它的对称中心。


- (2) 范围。由方程(3.17)立即看出: $|x| \leq a, |y| \leq b, |z| \leq c.$
- (3) 形状。曲面(3.17)与xOy面的交线为:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ z = 0. \end{cases}$$

这是在 xOy 面 上 的一个椭圆。同理 可 知, 曲 面(3.17)与 yOz 面(xOz 面)的交线也是椭圆。

用平行于 xOy 面的平面 z=h 截曲面(3.17)得 到 的交线 (称 为截口)为:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{h^2}{c^2}, \\ z = h_{\bullet} \end{cases}$$



3.15).

当 | h | < c 时,截口是椭圆; 当 | h | = c 时,截口是一个点;当 | h | > c 时,无轨迹。

(4) 等高线。把 平行于 xOy 面的 截 口投影到 xOy 面上 得到的投影线称为等 高线(见下 页的图

3.2 单叶双曲面和双叶双曲面

方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (a, b, c > 0)$$
 (3.18)

表示的图形称为单叶双曲面。它有下述性质:


- (1) 对称性, 三个坐标面都是此图形的对称平面, 三根坐标 轴都是它的对称轴,原点是它的对称中心。
 - (2) 范围, 山方程(3.18)得;


$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^7} = 1 + \frac{z^2}{c^2} > 1,$$

所以此曲面的点全在柱面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

的外部或柱面上。





3.16

(3) 形状, 此曲面与 xOy 面的变线为

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ z = 0, \end{cases}$$

这是一个椭圆, 称为此曲面的腰椭圆。

此曲面与xOz面,yOz面的交线分别为:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, & \begin{cases} \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ x = 0, \end{cases}$$

它们都是双曲线。

此曲面的平行于 xOy 面的截口为

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{h^2}{c^2}, \\ z = h, \end{cases}$$

这是椭圆, 幷且当 [4] 增大时, 截口椭圆的长、短半轴:

$$a' = a\sqrt{1 + \frac{h^2}{c^2}}, \ b' = b\sqrt{1 + \frac{h^2}{c^2}}$$

均增大。

(4) 渐近锥面。锥面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0 {(3.19)}$$

称为单叶双曲面(3,18)的渐近锥面。

用平面 z=h 截此锥面, 截口为

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2}, \\ z = h, \end{cases}$$

这个椭圆的长、短半轴分别为:

$$a'' = a \frac{|h|}{c}$$
, $b'' = b \frac{|h|}{c}$.

因为

96

$$a' - a'' = a\sqrt{1 + \frac{h^2}{c^2}} - a\frac{|h|}{c} = \sqrt{1 + \frac{h^2}{c^2} + \frac{|h|}{c}},$$

所以 $\lim_{\|b\|\to\infty} (a'-a'')=0$, 同理 $\lim_{\|b\|\to\infty} (b'-b'')=0$. 这说明,

当 | h | 无限增大时,单叶双曲面的截口椭圆与它的渐 近 锥面的截口椭圆任意接近,即,单叶双曲面与它的渐近锥面无限地任意接近。


方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1(a, b, c > 0)$$
 (3.20)

表示的图形称为**双叶双曲面**。它有下 述性质:

- (1) 对称性。关于坐标面,坐标轴,原点均对称。
 - (2) 范围。由(3.20)得|z|≥c。
- (3) 形状。此曲 面 与 xOy 面 无 交点,与 xOz 面,yOz 面 的 交 线分 别为。

$$\begin{cases} \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1, \\ y = 0, \end{cases} \begin{cases} \frac{z^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ x = 0, \end{cases}$$



它们都是双曲线。用平面 $z=h(|h| \ge c)$ 去 截 此 曲面得到的截口为 $\int x^2 y^2 h^2$

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2} - 1, \\ z = h, \end{cases}$$

这是椭圆或一个点。

(4) 渐近锥面, 锥面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$

也是双叶双曲面(3,20)的渐近锥面。

3.3 椭圆抛物面和双曲抛物面

方程

$$\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z(p, q > 0)$$
 (3.21)

表示的曲面称为椭圆抛物面。它有下述性质:

- (1) xOz 面, yOz 面是它的对称平面; z 轴是对称轴。
- (2) 范围, 2≥0.
- (3) 形状, 它与xOz面, yOz面的交线分别为:

$$\begin{cases} x^2 = 2pz, \\ y = 0, \end{cases} \qquad \begin{cases} y^2 = 2qz, \\ x = 0, \end{cases}$$

这些都是拋物线。用平面 $z=h(h\geq 0)$ 去截此曲面得到的截口为,

$$\begin{cases} \frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2h, \\ z = h, \end{cases}$$

它们是椭圆或一个点(见图3.18)。

方程

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z(p, q > 0)$$
 (3.22)




图 3.18




图 3.19

表示的曲面称为双曲抛物面(或马鞍面)。

xOz面, yOz面都是双曲抛物面(3.22)的对称平面; z轴是它的对称轴。

它与xOy面的交线为:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 0, \\ z = 0, \end{cases}$$

这是一对和交直线 (过原点)。双曲 拠物 面(3,22)与 xOz 面, yOz 面的交线分别为。

$$\begin{cases} x^2 = 2f \mathbf{z}, \\ y = 0, \end{cases} \begin{cases} y^2 = -2q\mathbf{z}, \\ x = 0, \end{cases}$$

这些都是抛物线。用平面 $z = h(h \pm 0)$ 去截此曲面,得到的截口为,

$$\begin{cases} \frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2h, \\ z = h, \end{cases}$$

这是双曲线,当h>0 时,实轴平行于x 轴,当h<0 时,实 轴平行于y 轴(见图3.19)。

当平行移动抛物线 $y^2 = -2qz$, x = 0, 使它的顶点 沿抛物线 $x^2 = 2pz$, y = 0 移动时,便得到 马 鞍 面(3.22)。这 是 因 为,点 M(x,y,z) 在此轨迹上的充分必要条件是,M在以抛物线

$$\begin{cases} x^2 = 2pz \\ y = 0 \end{cases}$$

上的一个点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 为顶点且轴平行于z轴,形状、开口与

$$\begin{cases} y^2 = -2qz \\ x = 0 \end{cases}$$

一样的抛物线上,即有

$$\begin{cases} x_0^2 = 2pz_0, \\ y_0 = 0, \\ y^2 = -2q(z - z_0), \\ x = x_0. \end{cases}$$

消去 x₀,y₀,z₀, 得到

$$y^2 = -2q\left(z - \frac{x^2}{2p}\right),$$

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z.$$

3.4 二次曲面的种类

到目前为止,我们学过的二次曲面有以下十七种。

(一) 椭球面。

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1;$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = -1;$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0.$$

(二) 双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1;$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1.$$

(三) 拋物面

$$\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z;$$

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z.$$

(四) 二次锥面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0_{\bullet}$$

(五) 二次柱面

[9] 椭圆柱面:
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$
;

[10] 虚椭圆柱面:
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1;$$

[11] **a**线:
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0;$$

[12] 双曲柱面:
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1;$$

[13] 一对相交平面:
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0;$$

[14] 拋物柱面:
$$x^2 = 2py$$
;

[15] 一对乎行平面:
$$x^2 = a^2$$
;

[16] 一对虚平行乎面:
$$x^2 = -a^2$$
;

[17] 一对重合平面:
$$x^2 = 0$$
.

在高等代数课程中,我们将证明二次曲面只有这个七种。

习 題 3.3

1.已知椭球面的对称轴与坐标轴重合,且通过椭圆

$$\begin{cases} \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1, \\ z = 0, \end{cases}$$

以及点 $M(1,2,\sqrt{23})$, 求这个椭球面的方程。

2. 已知椭圆抛物面的顶点为原点,对称 平 面 为 xOz 面和 yOz 面,且 过点(1,2,5) 和 $\left(\frac{1}{3},-1,1\right)$,求这个椭圆抛物面的方

程.

- 3. 已知马鞍面的鞍点为原点,对称平面 为xOz 面 和 yOz 面,且过点(1,2,0)和 $\left(\frac{1}{3},-1,1\right)$,求这个马鞍面的方程。
 - 4. 求经过两条抛物线;

$$\begin{cases} x^2 - 6y = 0, \\ z = 0 \end{cases} \quad \text{fi} \quad \begin{cases} z^2 + 4y = 0, \\ x = 0 \end{cases}$$

的二次曲面的方程。

5. 给定方程

$$\frac{x^2}{a^2-k}+\frac{y^2}{b^2-k}+\frac{z^2}{c^2-k}=1 \quad (a>b>c>0),$$

问当 k 取异于 a^2,b^2,c^2 的各种实数值时,它表示怎样的曲面?

- 6. 适当选取坐标系,求下列轨迹的方程。
- (1) 到两定点距离之差等于常数的点的轨迹;
- (2) 到一定点和一定平面(定点不在定平面上)距离之比等于常数的点的轨迹,
- (3) 设有一个固定平面和垂直于它的一条定直线,求到定平面与到定直线的距离相等的点的轨迹;
- (4) 求与两给定直线等距离的点的轨迹,已知两直线之间的距离为a,灭角为a。
- 7. 设一个定点与一条二次曲线不在同一平面上,证明,以 定点为顶点,以这条二次曲线为准线的锥面是二次曲面。
 - *8、由構球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

的中心 O 任意引三条相互垂直的射线,与曲面分别交 于 P_1, P_2, P_3 ,设 $|\overrightarrow{OP}_i| = r_i$,i = 1, 2, 3。证明:

$$\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{1}{r_3^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}$$

*9. 证明: 用通过坐标轴的平面和椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$
 (a>b>c>0)

§4 直 纹 面

我们看到,柱面和锥面都是由直线组成的,这样的曲面称为 直纹面,确切地说

定义3.4 一曲面 S 称为直纹面,如果存在一族 直 线使得这一族中的每一条直线全在 S 上,拜且 S 上的每个点都在这一族的某一条直线上。这样一族直线称为 S 的一族直母线。

二次曲面中哪些是直纹面? 二次柱面(九种)和二次 锥 面(一种)都是直纹面。椭球面(三种)不是直纹面,因为它 有 界。双叶双曲面不是直纹面,因为当它由方程(3.20)给出时,平行于 xOy 面的直线不可能全在 S 上,与 xOy 面 相 交的直线也不会全在 S 上。类似地可知,椭圆抛物面不是直纹面。剩下两种二次曲面:单叶双曲面和双曲抛物面,我们现在来说明它们都是直纹面。

定理3.4 单叶双曲面和双曲抛物面都是直纹面。

证明 设单叶双曲面8的方程是

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \qquad (3.23)$$

点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 在单叶双曲面 S 上的充分必要条件是

$$\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} - \frac{z_0^2}{c^2} = 1,$$

移项拜且分解因式得

$$\left(\frac{x_0}{a} + \frac{z_0}{c}\right)\left(\frac{x_0}{a} - \frac{z_0}{c}\right) = \left(1 + \frac{y_0}{b}\right)\left(1 - \frac{y_0}{b}\right),\tag{3.24}$$

即

$$\begin{vmatrix} \frac{x_0}{a} + \frac{z_0}{c} & \uparrow + \frac{y_0}{b} \\ 1 - \frac{y_0}{b} & \frac{x_0}{a} - \frac{z_0}{c} \end{vmatrix} = 0,$$
 (3.25)

或

$$\begin{vmatrix} x_0 + \frac{z_0}{c} & 1 - \frac{y_0}{b} \\ 1 + \frac{y_0}{b} & \frac{x_0}{a} - \frac{z_0}{c} \end{vmatrix} = 0.$$
 (3.26)

因为 $1 + \frac{y_0}{b}$ 与 $1 - \frac{y_0}{b}$ 不全为零,所以下述方程组

$$\begin{cases} \left(\frac{x_0}{a} + \frac{z_0}{c}\right) X + \left(1 - \frac{y_0}{b}\right) Y = 0, \\ \left(1 - \frac{y_0}{b}\right) X + \left(\frac{x_0}{a} - \frac{z_0}{c}\right) Y = 0 \end{cases}$$
(3.27)

是 X,Y 的一次齐次方程组。由(3.25)知,(3.27)有 非 零解,即 有不全为零的实数 μ_0,ν_0 使得

$$\begin{cases} \mu_0 \left(\frac{x_0}{a} + \frac{z_0}{c} \right) + \nu_0 \left(1 + \frac{y_0}{b} \right) = 0, \\ \mu_0 \left(1 - \frac{y_0}{b} \right) + \nu_0 \left(\frac{x_0}{a} - \frac{z_0}{c} \right) = 0. \end{cases}$$


这表明点 Mo 在直线

$$\begin{cases} \mu_0 \left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c} \right) + \nu_0 \left(1 + \frac{y}{b} \right) = 0, \\ \mu_0 \left(1 - \frac{y}{b} \right) + \nu_0 \left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c} \right) = 0 \end{cases}$$

$$(3.28)$$

上。现在考虑一族直线:

$$\begin{cases} \mu\left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) + \nu\left(1 + \frac{y}{b}\right) = 0, \\ \mu\left(1 - \frac{y}{b}\right) + \nu\left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) = 0, \end{cases}$$
 (3.29)



其中 μ , ν 取所有不全为零的实数。若(μ ₁, ν ₁)与(μ ₂, ν ₂)成 比 例,则它们确定(3.29)族中的同一条直线,若它们不成比例,则它们确定不同的直线。所以直线族(3.29)实际上只依赖于一个参数。 μ 与 ν 的比值。上面证明了:单叶双曲面 S 上的任 一点 M_0 在直线族(3.29)的某一条直线(3.28)上。现在从族(3.29)中任取一条直线 I_1 ,它对应于(μ ₁, ν ₁),且在 I_1 上任取 一点 M_1 (x_1,y_1,z_1),则有

$$\begin{cases} \mu_1 \left(\frac{x_1}{a} + \frac{z_1}{c} \right) + \nu_1 \left(1 + \frac{y_1}{b} \right) = 0, \\ \mu_1 \left(1 - \frac{y_1}{b} \right) + \nu_1 \left(\frac{x_1}{a} - \frac{z_1}{c} \right) = 0. \end{cases}$$

$$(3.30)$$

因为 µ, , v, 不全为零, 所以(3.30)式说明二元一次齐次方程组

$$\begin{cases} \left(\frac{x_1}{a} + \frac{z_1}{c}\right)X + \left(1 + \frac{y_1}{b}\right)Y = 0, \\ \left(1 - \frac{y_1}{b}\right)X + \left(\frac{x_1}{a} - \frac{z_1}{c}\right)Y = 0 \end{cases}$$
(3.31)

有非零解,从而(3.31)的系数行列式等于零。于是由本证明的开始部分知, $M_1(x_1,y_1,z_1)$ 在单叶双 曲 间 S 上。所以,S 是 直 纹面,且直线族(3.29)是它的一族直母线。

类似地,用(3.26)可得S的另一族直母线:

$$\begin{cases} \mu\left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) + \nu\left(1 - \frac{y}{b}\right) = 0, \\ \mu\left(1 + \frac{y}{b}\right) + \nu\left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) = 0, \end{cases}$$
 (3.32)

其中 μ,ν 取所有不全为零的实数。

类似的方法可以证明双曲抛物面也是直纹面, 若它的方程是

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z, (3.33)$$

则它有两族直母线:

$$\begin{cases} \left(\frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}}\right) + 2\lambda = 0, \\ z + \lambda \left(\frac{x}{\sqrt{p}} - \frac{y}{\sqrt{q}}\right) = 0, \end{cases}$$
 (3.34)

和

$$\begin{cases} \lambda \left(\frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}} \right) + z = 0, \\ 2\lambda + \left(\frac{x}{\sqrt{p}} - \frac{y}{\sqrt{q}} \right) = 0, \end{cases}$$
 (3.35)

其中 à 取所有实数。

习 题 3.4

- 1. 求单叶双曲面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \frac{z^2}{16} = 1$ 的过点(2,3,-4)的母线。
- 2. 求直线族

$$\frac{x-\lambda^2}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-\lambda}{0}$$

所形成的曲面,

求与下列三条直线同时共面的直线所产生的曲面。

$$l_1$$
: $\begin{cases} x = 1, \\ y = z, \end{cases}$ l_2 : $\begin{cases} x = -1, \\ y = -z, \end{cases}$ l_3 : $\frac{x-2}{-3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z+2}{5}$.

4. 求所有与直线

$$l_1$$
: $\frac{x-6}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{2}$ At l_2 : $\frac{x}{3} = \frac{y-8}{2} = \frac{z+4}{-2}$

都共面,且与平面

$$\pi_1 \cdot 2x + 3y - 5 = 0$$

平行的直线所构成的曲面方程。

5. 设有直线 41 和 42, 它们的方程分别是:

$$\begin{cases} x = \frac{3}{2} + 3t, \\ y = -1 + 2t, \\ z = -t; \end{cases} \begin{cases} x = 3t, \\ y = 2t, \\ z = 0. \end{cases}$$

求所有由 1,12上有相同参数 t 值的点的连线所构成的曲面方程。

- 6. 证明, 马鞍面同族的所有直母线都平行于同一个平面, 纤且同族的任意两条直母线异面。
 - 7. 证明:马鞍面异族的任意两条直母线必相交。
- *8、证明:单叶双曲面同族中的任意三条直母线都不平行于同一个平面。

- *9. 证明,单叶双曲面同族的两条直母线异面。
- *10. 证明:单叶双曲面异族的两条直母线共面。
- 11. 求马鞍面的正交直母线的交点轨迹。
- *12. 给定单叶双曲面 S:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$
 (a,b,c>0),

求 经 过 S 上 一 点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$,沿 方 向(X, Y, Z) 的 直 线 是 S 的直母线的条件;山此证明:经过 S 上每一 点 恰 有 两条直母线。


- *13、证明,单叶双曲面的每条直母线都与腰椭圆相交。
- *14. 设 l₁, l₂ 是异面直线,它们都与 xOy 面 相 交, 证明: 与 l₁, l₂ 都共面并且与 xOy 面 平 行的直线所组成的 曲 面 是马鞍。面。
- *15. 设三条直线 l_1, l_2, l_3 两两异面,且平行于同一平面,证明,与 l_1, l_2, l_3 都相交的直线所组成的曲面是乌鞍面.

§ 5 曲面的交线, 曲面所围成的区域

5.1 画空间图形常用的三种方法


在纸上画空间图形时,常用的有三种方法。

(1) 斜二测法(即斜二等轴测投影法)。让 z 轴铅直向上, y



轴水平向右, x 轴与 y 轴、 z 轴分别成135°角。规定 y 轴与 z 轴的单位长度相等; 而 x 轴的单位长度为 y 轴单位长度的 一 半(图 3.22)。

- (2) 正等测法(即正等轴 测 投 影 法)。让 z 轴铅直向上, x 轴、 y 轴、 z 轴两两成120°角, 规定三 根 轴 的 单位长度相等。(如图3.23)。
- (3) 正二测法(即正二等轴测投影法). 让 z 轴铅直向上, x 轴与z 轴的夹角为90°+ α , 其中 α 是锐角,且 $tg\alpha \approx \frac{5}{8}$; y 轴与 z 轴的夹角为90°+ β , 其中 β 是锐角,且 $tg\beta \approx \frac{1}{8}$. 规定 z 轴和 y 轴的单位长度相等, x 轴的单位长度约为 y 轴单位长度的一半。 有时,也让 x 轴与 z 轴夹角为90°+ β ,其中 $tg\beta \approx \frac{1}{8}$; 让 y 轴的负向与 z 轴的夹角为90°+ α ,其中 $tg\alpha \approx \frac{5}{8}$; 此时 x 轴与 z 轴的单位长度相等, y 轴的单位长度约为 z 轴单位长度的一半。




一般来说,采用正二测法画出的图形较逼真。我们现在用正二测法画空间中的一个圆,它的方程是:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ y = 2. \end{cases}$$

先过点 M(0,2,0) 分别作 * 轴、 x 轴的平行线, 并截取ME = ME

=1(z轴单位长),截取 MF = MF' = 1(x 轴单位长)。过E, E',F, F'分别作x 轴、z 轴的平行线,相交成一个平行四边形 ABCD,再作它的內切椭圆,使切点为 E, E',F, F'。则所 闽 的这个內切椭圆就是我们所要画的空间中的圆(注:在闽 出直 线 EE',FF' 后,也可用描点法画出我们所要画的图)。



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1,$$

只要先画 出 用 $z = \pm c$ 截曲面所得的截口椭圆以及腰椭圆,再画 出曲面与 xOz 面,yOz 面相交所得的双曲线,最后画出必要的轮廊线就可以了(如图3.16)。

5.2 曲线在坐标面上的投影,曲面的交线的画法

空间中任一点M以及它在三个坐标面上的投影点 M_1, M_2, M_3

这四个点中,只要知道了共中两个点,就可以画出另外两个点。譬如,若知道了 M_2 , M_3 两个点,则只要分别过 M_2 , M_3 画出投影线(平行于相应坐标轴的直线),它们的交点就是M点,再过M画投影线(平行于 2 轴),它与 xOy 面的交点就是 M_1 。

根据上述道理,为了闽出两个山面的 交线 Γ ,就只要先画出 Γ 上 每个点在某两 个坐标面上的投影。

曲线 Γ 上的所有点在xOy 面上的投影。影组成的曲线称为 Γ 在xOy 面上的投影。显然曲线 Γ 在xOy 面上 的投影就是以 Γ 为准线、母线平行于z 轴的柱面与xOy




图 3.27

面的交线,这个柱面称为 Γ 沿z轴的投影柱面。类似地可考虑 Γ 在 xOz 面、yOz面上的投影。

例3.6 求曲线 Γ :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4, \\ x^2 + y^2 - 2x = 0 \end{cases}$$
 (3.36)

在各坐标面上的投影的方程, 拜且画出 曲 线 Γ 及其在 各 坐标面上的投影(这条曲线 Γ 称为维维安尼曲线)。

解 Γ 沿 z 轴的投影柱面的方程应当不含 z ,且 Γ 上的点应适合这个方程,显然方程(3.37)就符合要求。但是要注意,一般说来,投影柱面可能只是柱面(3.37)的一部分,这要根据曲线 Γ 上的点的坐标有哪些限制来决定。对于本题 来说,由 方程(3.36)知, Γ 上的点应满足


$$|x| \leq 2, |y| \leq 2, |z| \leq 2;$$

显然满足方程(3.37)的点均满足这些要求,因此整个柱面(3.37) 都是 Γ 沿 z 轴的投影柱面,从面 Γ 在 xOy 面 上 的投影的方程是

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2x = 0, \\ z = 0, \end{cases}$$
 (3.38)

为了求广治 y 轴的投影柱面,应当从广的 方程中 设法得到一个不含 y 的方程,用(3.36)减去(3.37)即得

$$z^2 + 2x = 4. (3.39)$$



由于 Γ 上的点应满足 $|z| \le 2$,所以 Γ 沿 y 轴的投影 柱 面 只是柱面(3,39)中满足 $|z| \le 2$ 的那一部分,于是 Γ 在xOz 面 上的投 影的方程是

$$\begin{cases} z^2 + 2x = 4, \\ y = 0, \end{cases}$$
 (3.40)

其中 | 定 | ≤ 2.

类似地可求得 Γ 在yOz面上的投影的方程为:

$$\begin{cases} 4y^2 + (z^2 - 2)^2 = 4, \\ x = 0. \end{cases}$$
 (3.41)

 Γ 在 xOy 面上的投影是一个 圆,在 xOz 面上的投影是抛物线的一段,这两个投影比较好画,因此先画出 Γ 的这两个投影,然后就可画出曲线 Γ 以及它在 yOx 面 上 的投影。由于曲线 Γ 关于 xOy 面对称,所以我们只画出 xOy 面 上 方的 那 一部分(如图3.28)。

例 3.7 求曲线Γ

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - z^2 = 0, \\ 2x - z^2 + 3 = 0 \end{cases}$$
 (3.42)

在 xOy 面和 xOz 面上的投影的方程, 并且画出这两个投影和曲线 Γ (在 xOy 面上方的部分)。

解 先看 Γ上的点的坐标有哪些限制。从方程(3.42)得:

$$|x| \leqslant |z|, |y| \leqslant |z|.$$

再代入(3,43)中得:

$$0 = 2x - z^2 + 3 \le 2x - x^2 + 3 = -(x-1)^2 + 4,$$

于是得

$$-1 \leqslant x \leqslant 3$$
.


 Γ 在 xOy 面上的投影为:

$$\begin{cases} (x-1)^2 + y^2 = 4, \\ z = 0, \end{cases}$$
 (3.44)

 Γ 在 xOz 面上的投影为:

$$\begin{cases} 2x - z^2 + 3 = 0, \\ y = 0, \end{cases}$$
 (3.45)

共中 - 1≤x≤3.



5.3 曲面所围成的区域的画法

几个曲面或平面所围成的空间的区域可用几个不等式联立起来表示。如何画出这个区域?关键是要画出相应曲面的交线,随之,所求区域也就表示出来了。

例3.8 用不等式组表示出下列曲面或平面所围 成 的区域, 并画图。

$$x^2 + y^2 = 2z$$
, $x^2 + y^2 = 4x$, $z = 0$.

解 $x^2 + y^2 = 2z$ 是椭圆抛物面, $x^2 + y^2 = 4x$ 是圆柱面,z = 0 是 xOy 面。因此 它们所围成的区域应当是在 xOy 面 上 方, 在




图 3,30

椭圆抛物面下方,在圆柱面里面。于是这个区域可表示成

$$\begin{cases} z \geqslant 0, \\ x^2 + y^2 \geqslant 2z, \\ x^2 + y^2 \leqslant 4x. \end{cases}$$

$$(3.46)$$

为了同出这个区域,关键是要画出椭圆抛物面与圆柱面的交 $终\Gamma_{\bullet}$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2z, \\ x^2 + y^2 = 4x. \end{cases}$$
 (3.47)

 Γ 在 xOy 面上的投影为:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4x, \\ z = 0. \end{cases}$$
 (3.48)

 Γ 在 xOz面上的投影为:

$$\begin{cases} z = 2x, \\ y = 0, \end{cases} \qquad 0 \leqslant x \leqslant 4. \tag{3.49}$$

由 Γ 的两个投影可画出 Γ ,再画出圆柱面和椭圆抛物面,则所求 的区域就画出来了(如图3.30)。

习 題 3.5

1. 画出下列曲面。

(1)
$$x^2 - y = 0$$
;

(2)
$$4x^2 + 4y^2 - z^2 = 0$$
;

(3)
$$\frac{x^2}{4} + y^2 + z^2 = 1$$
;

(4)
$$\frac{x^2}{4} + y^2 - z^2 = 1$$
;

(5)
$$\frac{x^2}{4} + y^2 - z^2 = -1;$$
 (6) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 2z;$

(6)
$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 2z$$
;

(7)
$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 2z.$$

2. 求下列曲线在 xOy 面和 yOz 面 上 的 投 影 的 方程, 拜

且.画出这两个投影和曲线本身。

(1)
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4, \\ y^2 + z^2 = 1; \end{cases}$$
 (2)
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4, \\ z = 2y; \end{cases}$$
 (3)
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 5, \\ z^2 + y^2 = 4z \end{cases}$$

3. 求下列曲线在 xOy 面和 xOz 面 上 的投影的方程, 并且 画出这两个投影和曲线本身.

(1)
$$\begin{cases} x^2 + y^2 - z^2 = 0, \\ 2x - z^2 + 1 = 0; \end{cases}$$
 (2)
$$\begin{cases} \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} - \frac{z^2}{4} = 1, \\ x - 2 = 0; \end{cases}$$

(3)
$$\begin{cases} z = 4 - x^2 - \frac{1}{4}y^2, \\ z = 3x^2 + \frac{1}{4}y^2. \end{cases}$$

4. 用不等式组表达下列曲面或平面所围成的空间区域, 幷 且画图。

(1)
$$x^2 + y^2 = 16$$
, $z = x + 4$, $z = 0$;

(2)
$$x^2 + y^2 = 4$$
, $y^2 + z^2 = 1$;

(2)
$$x^2 + y^2 = 4$$
, $y^2 + z^2 = 1$;
(3) $x^2 \div y^2 + z^2 = 5$, $x^2 + y^2 = 4z$.

5. 面出下列不等式组表示的区域。

(1)
$$x^2 + y^2 \le 1$$
, $y^2 + z^2 \le 1$, $x \ge 0$, $y \ge 0$, $z \ge 0$;
(2) $x^2 + y^2 \ge 4z$, $x + y \le 1$, $x \ge 0$, $y \ge 0$, $z \ge 0$.

(2)
$$x^2 + y^2 \geqslant 4z$$
, $x + y \leqslant 1$, $x \geqslant 0$, $y \geqslant 0$, $z \geqslant 0$.

第四章 坐标变换

前两章我们是在选定的一个坐标系中研究平面、 直 线 和 曲 面。但是在许多情形中,往往在事先给定的坐标系中,一个图形的方程比较复杂,这时我们需要选择另一个合适的坐标系,使这个图形的方程变得比较简单。为此就需要研究同一个点在两个坐标系中的坐标之间的关系,这样的关系式称为坐标变换公式。本章就是研究坐标变换公式及其应用。

§ 1 平面的仿射坐标变换

1.1 点的仿射坐标变换公式

平面上给了两个仿 射 坐 标 系: $[O;e_1,e_2]$ 和 $[O';e_1',e_2']$. 为说话方便起见,前一个称为旧坐标系,简记作 I;后一个称为新坐标系,简记作 I. 点M(或向量 α)在 I 中的坐标称为它的 I 坐标(或旧坐标);在 I 中的坐标称为它的 I 坐标(或旧坐标);在 I 中的坐标称为它的 I 坐标(或新坐标)。为了研究同一个点M的 I 坐标与 I 坐标的关系,就首先要明确 I 与I 的相对位置。




图 4.1

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M} = (x_0 e_1 + y_0 e_2) + (x' e'_1 + y' e'_2)
= (x_0 e_1 + y_0 e_2) \div x' (a_{11} e_1 + a_{21} e_2)
+ y' (a_{12} e_1 + a_{22} e_2)
= (a_{11} x' + a_{12} y' + x_0) e_1 + (a_{21} x' + a_{22} y' + y_0) e_2,$$

所以

$$\begin{cases} x = a_{11}x' + a_{12}y' + x_{0}, \\ y = a_{21}x' + a_{22}y' + y_{0}, \end{cases}$$
(4.1)

公式(4.1)称为平面 上 坐 标 系 \mathbb{I} 到 \mathbb{I} 的点的仿射坐标变换公式。它把任意一点M的 \mathbb{I} 坐标x,y表示成它的 \mathbb{I} 坐标x',y'的一次多项式。

定理4.1 平面上点的仿射坐标变换公式(4.1)中的系数行列 式不等于零,即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0.$$

证明 假如(4.1)中系数行列式等于零,则由定理1.4知, e'1与 e'2 共线,矛盾。所以结论成立。

由于公式(4.1)中系数行列式(记作d) 不 等 于 零,因 此 把 (4.1)看成x',y'的方程组,可以求得唯一解:

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{d} & x - x_0 - a_{12} \\ y - y_0 - a_{22} & = \frac{1}{d} (a_{22}x - a_{12}y - a_{22}x_0 + a_{12}y_0), \\ y' = \frac{1}{d} & a_{11} - x - x_0 \\ a_{21} - y - y_0 & = \frac{1}{d} (-a_{21}x + a_{11}y + a_{21}x_0 - a_{11}y_0). \end{cases}$$

公式(4,2)是把平面上任意一点M的 II 坐标x',y' 表示成它的 I 坐标 x,y 的一次多项式,称它是 I 到 I 的点的仿射坐标变换公式。

1.2 向量的仿射坐标变換公式

现在来看平面上的向量 m 的 I 坐 标(u,v)与 它 的 II 坐 标

(u',v')之间的关系。 设 $m = M_1 M_2$, 共 中 M_i 的 I 坐 标 \mathcal{A} (x_i,y_i) , I 坐 标 $\mathcal{A}(x_1',y_1')$, i = 1,2 。 则有

$$u = x_{2} - x_{1} = (a_{11}x'_{2} + a_{12}y'_{2} + x_{0}) - (a_{11}x'_{1} + a_{12}y'_{1} + x_{0})$$

$$= a_{11}(x'_{2} - x'_{1}) + a_{12}(y'_{2} - y'_{1}) = a_{11}u' + a_{12}v',$$

$$v = y_{2} - y_{1} = (a_{21}x'_{2} + a_{22}y'_{2} + y_{0}) - (a_{21}x'_{1} + a_{22}y'_{1} + y_{0})$$

$$= a_{21}u' + a_{22}v',$$

肕

$$\begin{cases}
 u = a_{11}u' + a_{12}v', \\
 v = a_{21}u' + a_{22}v'.
\end{cases}$$
(4.3)

(4.3)称为平面上坐标系 I 到 II 的向量的仿射坐标变 换 公式,它把任一向量 m 的 I 坐标 u,v表示成它的 II 坐标 u',v'的一次 齐 次 多项式(即沒有常数项),这是与点的坐标变换公式不同的地方。 平面上的点和向量是有本质区别的两种对象,如果只从一个坐标系来看,则点和向量的坐标都是有序实数偶,看不出点和向量的区别,但是如果取两个仿射坐标系(它们的原点不重合),通过坐标变换,则点和向量的区别就明显了:点的坐标变换公式(4.1)中有常数项,而向量的坐标变换公式(4.3)中沒有常数项。

由于(4.3)中系数行列式不为零,因此可反解出:

$$\begin{cases} u' = \frac{1}{d} \left(a_{22}u - a_{12}v \right), \\ v' = \frac{1}{d} \left(-a_{21}u + a_{11}v \right). \end{cases}$$

$$(4.4)$$

这是 Π 到 Π 的向量的仿射坐标变换公式。由(4.4)看出, Π 的 基向量 \mathbf{e}_1 , \mathbf{e}_2 的 Π 坐标分别是

$$\left(\frac{a_{22}}{d}, -\frac{a_{21}}{d}\right), \left(-\frac{a_{12}}{d}, \frac{a_{11}}{d}\right).$$

习 题 4.1

1、 对平行四边形 ABCD取仿射坐标系 I 为 $[A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}]$.

 Π 为[C; AC, BD] 求 Π Π 的 点 的 坐标变换公式和向量的坐标变换公式,并且求 A,D,\overline{AB} $\overline{AD},\overline{DB}$ 的 Π 坐标和 Π 坐标。

- 2. 设 ABCDEF 为正六边形,取仿射坐标系 I 为 $[A, \overline{AB}, \overline{AF}]$, Π 为 $[D, \overline{DB}, \overline{DF}]$, 求 I 到 Π 的点的坐标变换公式和向量的坐标变换公式,求各顶点的 I 坐标和 Π 坐标,求 CF, BE 的 I 坐标和 Π 坐标。
 - 3. 设仿射坐标系 1 到 11 的点的坐标变换公式为:

$$\begin{cases} x = -y' + 3, \\ y = x' - 2. \end{cases}$$

- (1) 求Ⅱ的原点 O'的 I 坐标, Ⅱ的基向量 e₁,e₂的 I 坐标; 求Ⅰ的原点 O的 Ⅱ坐标, 基向量e₁,e₂的 Ⅱ坐标;
 - (2) 求直线 l₁: 2x-y+1=0在坐标系Ⅱ中的方程;
 - (3) 求直线 l_2 : 3x' + 2y' 5 = 0在坐标系 I 中的方程。

§ 2 矩阵及其运算

2.1 矩阵的概念以及矩阵的运算

为了使坐标变换公式易于记忆并且简化计算和证明,我们把向量的坐标变换公式(4.3)中的系数按原来顺序排成一张2行、2 列的表:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix},$$

称它为一个2×2矩阵。一般地,有

定义4.1 $s \cdot n$ 个实数 $a_{ij}(i=1,2,\cdots,s;\ j=1,\cdots,n)$ 排成的s行、n列的一张表

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix}$$
(4.5)

称为一个 s×n 矩阵。

矩阵通常用大写拉丁字母 A,B,C,\dots 表示,譬如矩阵(4.5)可简记成A 或 $A_{s\times n}$ 或(a_{ij}) $_{s\times n}$ 。A的位于第 i 行第 j 列交叉处的元素称为A的(i,j)元。

n×n矩阵也称为n级矩阵或n级方阵。

元素全为零的 $s \times n$ 矩阵称为 $s \times n$ 零矩阵,记作 $0_{s \times n}$ 或 0_s

定义4.2 两个矩阵A和B,如果它们的行数相同,列数也相同,并且对应元素都相等,则称它们是相等的矩阵,记作A=B。

矩阵不是一个数,而是由一些数组成的一张表,但是基于许 多实际问题的背景,使我们可以给矩阵规定几种运算。

(一) 矩阵的加法和数量乘法

定义4.3 若 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$ 都是 $s \times n$ 矩阵,则

$$A + B := \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{s1} + b_{s1} & a_{s2} + b_{s2} & \cdots & a_{sn} + b_{sn} \end{pmatrix},$$

这种运算称为矩阵的加法。

定义4.4 岩 $A = (a_{ij})_{s \times n}$, k是实数,则

$$kA := \begin{pmatrix} ka_{11} & \cdots & ka_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ ka_{s1} & \cdots & ka_{sn} \end{pmatrix},$$

这种运算称为矩阵的数量乘法。

$$A - B := A + (-B),$$

这称为矩阵的减法。

容易川定义直接验证,矩阵的加法和数量乘法满足下述规律;对于任意 $s \times n$ 矩阵A,B,C,任意实数k,l,有

(1)
$$A+B=B+A$$
; (2) $(A+B)+C=A+(B+C)$;

(3)
$$A + 0 = A$$
; (4) $A + (-A) = 0$;

(5)
$$1 \cdot A = A$$
; (6) $k(lA) = (kl)A$;

(7)
$$(k+l)A = kA + lA$$
; (8) $k(A+B) = kA + kB$.

(二)矩阵的乘法

为了能把向量的坐标变换公式(4.3)用矩阵的形式 简 洁地表示出来,我们规定矩阵的第三种运算如下:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u' \\ v' \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} a_{11}u' + a_{12}v' \\ a_{21}u' + a_{22}v' \end{pmatrix},$$

这种运算称为矩阵的乘法,它是把左矩阵的第二行与右矩阵的第 *j* 列的对应元素的乘积之和作为乘积矩阵的(*i*,*i*) 元, *i* = 1,2; *j* = 1,2。由此看出,只有左矩阵的列数与右矩阵的行数 相同的两个矩阵才能做乘法运算;并且乘积矩阵的行数等于左矩阵的行数,乘积矩阵的列数等于右矩阵的列数。一般地,有

定义4.5 设 $A = (a_{ij})$ 是 $s \times n$ 矩阵 $, B = (b_{ij})$ 是 $n \times r$ 矩阵, 则规定A乘以B得到一个 $s \times r$ 矩阵(记作 AB), AB的(i,i)元是 A的第 i 行与B的第 i 列的对应元素乘积之和,即

$$AB \text{ fi}(i,j) \ \pi := \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj},$$
 (4.6)

其中 $i = 1, 2, \dots, s, j = 1, \dots, r$.

例如,

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 6 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 2 + 3 \times 0 & 1 \times 4 + 3 \times 5 \\ 0 \times 2 + 6 \times 0 & 0 \times 4 + 6 \times 5 \\ 7 \times 2 + 0 \times 0 & 7 \times 4 + 0 \times 5 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 19 \\ 0 & 30 \\ 14 & 28 \end{pmatrix} .$$

利用矩阵的乘法和两个矩阵相等的定义,我们可以把向量的

坐标变换公式(4.3)写成下述形式:

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u' \\ v' \end{pmatrix}, \tag{4.7}$$

再利用矩阵的加法,还可以把点的坐标变换公式(4,1)写成

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}, \tag{4.8}$$

其中矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

称为坐标系Ⅰ到Ⅱ的过渡矩阵,它的第1列是Ⅱ的第一个基向量 e(的Ⅰ坐标,第2列是e2的Ⅰ坐标。

只有1列的矩阵称为列矩阵(简称为列),常用希腊字母 α , β , γ ,…表示列。

如果令

$$\gamma = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}, \quad \gamma' = \begin{pmatrix} u' \\ v' \end{pmatrix}, \quad \alpha = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \\
-\alpha' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}, \quad \alpha_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}, \quad \alpha = \begin{pmatrix} x_0 \\$$

则公式(4.7),(4.8)可分别写成简洁的形式如下:

$$\gamma = A\gamma',$$
 $\alpha = A\alpha' + \alpha_{0},$
(4.7)'
(4.8)'

矩阵的乘法适合下列规律,对于任意矩阵 A,B,C(要求它们能做下述运算),任意实数 k,有

- (1) (AB)C = A(BC)(乘法的结合律);
- (2) A(B+C) = AB + AC(左分配律);
- (3) (B+C)A = BA + CA(右分配律);
- (4) k(AB) = (kA)B = A(kB)(乘法与数乘关系)。

但是要特别注意,矩阵的乘法不适合交换律。例如,设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix},$$

则

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

上述例子还说明: $A \Rightarrow 0$, $B \Rightarrow 0$, 但是有可能AB = 0. 因此, 从 AB = 0, $A \Rightarrow 0$, 推不出 B = 0. 进而从 AB = AC, $A \Rightarrow 0$, 推不出 B = C.

主对角线(从左上角到右下角)上的元素全为1, 并且其余元素全为零的,n 级矩阵

$$\begin{pmatrix}
1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1
\end{pmatrix}$$

称为n级单位矩阵,记作 E_n 或 E_n 容易看出,有

$$A_{s \times n}E_n = A_{s \times n}, E_sA_{s \times n} = A_{s \times n}$$

特别地,对于任意n级矩阵A、有

$$EA = AE = A_{\bullet}$$

(三) 矩阵的转置

定义4.6 把一个矩阵 $A_{s\times n}$ 的行、列互換得到的矩阵称为A 的转置,记作 A^{t} (或A')。

例如, 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix},$$

肵

$$A^* = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}.$$

显然, 若A是 $s \times n$ 矩阵, 则A'是 $n \times s$ 矩阵, 拜且有 A'的(i,i)元 = A的(i,i)元。

矩阵的转置满足下列规律:

(1)
$$(A^t)^t = A$$
;

(2)
$$(A+B)^i = A^i + B^i$$
,

(3)
$$(kA)^4 = kA^4$$
;

(3)
$$(kA)^t = kA^t$$
; (4) $(AB)^t = B^tA^t$.

特别要注意(4)。举一个例子、设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix},$$

则

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 16 & 11 \\ 28 & 19 \end{pmatrix},$$

$$(AB)' = \begin{pmatrix} 2 & 16 & 28 \\ 1 & 11 & 19 \end{pmatrix};$$

$$B'A' = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 16 & 28 \\ 1 & 11 & 19 \end{pmatrix}.$$

定义4.7 n级矩阵 A 如果满足。A' = A,则 称 A 是对称矩 阵.

显然,若A是对称矩阵,则

$$A$$
的 (i,j) 元 = A 的 (j,i) 元.

例如,矩阵

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & e & d \\ c & d & f \end{pmatrix}$$

都是对称矩阵。

2.2 矩阵的分块

设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix},$$

若全

$$\beta = \binom{2}{3}$$
,

则可以把A写成下述形式:

$$A = \begin{pmatrix} E_2 & \beta \\ 0_{1\times 2} & 4E_1 \end{pmatrix}.$$

象这样把一个矩阵看成由若干个小矩阵组成,称为**矩阵的分块**,它的好处是. 使得矩阵的结构更明显清楚, 并且使矩阵的运算可以通过这些小矩阵进行, 从而可以简化矩阵的计算和证明. 例如, 再设

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 7 \end{pmatrix},$$

슈

$$\hat{o} = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix},$$

奾

$$B = (E_2, \delta)$$

直接用矩阵的乘法定义得

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 22 \\ 0 & 1 & 31 \end{pmatrix};$$

如果我们把小矩阵当作"数"看待采用矩阵乘法法则,得

$$BA = (E_2, \delta) \begin{pmatrix} E_2 & \beta \\ 0 & 4E_1 \end{pmatrix} = (E_2, \beta + 4\delta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 22 \\ 0 & 1 & 31 \end{pmatrix},$$

这与前述结果一致。因此,在计算 BA时,我们确实可以先把矩阵 A,B分块,然后把小矩阵当作"数"看待采用矩阵乘法法则,这称为矩阵的分块乘法。当然,为了使矩阵的分块乘法能够进行,必须使左矩阵的列的分法与右矩阵的行的分法一致,即,左矩阵的列组数应等于右矩阵的行组数,并且左矩阵的每个列组所含列数应等于右矩阵的相应行组所含行数。

利用矩阵的分块乘法, 若矩阵 B 的 m 列 依 次 记 为 $B^{(1)}$, $B^{(2)}$, ... , $B^{(m)}$, 则有

$$AB = (A)(B^{(1)}, B^{(2)}, \cdots, B^{(m)}) = (AB^{(1)}, AB^{(2)}, \cdots, AB^{(m)}).$$
(4.9)

若矩阵A的 s 行依次记为 A_1, A_2, \dots, A_s . 则有

$$AB = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_s \end{pmatrix} (B) = \begin{pmatrix} A_1 B \\ A_2 B \\ \vdots \\ A_s B \end{pmatrix}. \tag{4.10}$$

类似地可讨论矩阵的分块加法,分块数乘和分块 转置。 譬如,若

$$A = \begin{pmatrix} E_2 & \beta \\ 0_{1\times 2} & 4E_1 \end{pmatrix},$$

Mil

$$A^{i} = \begin{pmatrix} E_{2} & 0_{2\times 1} \\ \beta^{i} & 4E_{1} \end{pmatrix}.$$

2.3 方阵的行列式

对于一个 2 级或 3 级方阵 $A = (a_{ij})$,它的元素按原来顺序可以组成一个 2 级或 3 级行列式,称 为 **方 阵 A 的行列式**, 记 作 |A|。在高等代数课程里,我们将把行列式概念推广到 n 级行列式,从而对于 n(n > s) 级方阵,也可以谈论它的行列式。

 $|A| \neq 0$,则称 A 是非奇异的,否则称为奇异的。

由定理4.1知,仿射坐标系 I 到 I 的过渡矩阵 A 是非奇异的。 定理4.2 若 A 和 B 都 是 n 级矩阵,则

$$|AB| = |A| \cdot |B|.$$

证明 我们只证n=2的情形,至于一般的n,在高等代数课程中我们再证明。设 $A=(a_{ij}),\;B=(b_{ij}),\;\mathbb{M}$

$$\begin{split} |AB| &= \left| \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{matrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{pmatrix} \\ &= \left| \begin{matrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} \\ a_{21}b_{11} & a_{21}b_{12} \\ a_{21}b_{11} & a_{22}b_{22} \\ \end{matrix} \right| + \left| \begin{matrix} a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} \\ a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} \\ \end{matrix} \right| \\ &= 0 + b_{21}b_{12} \left| \begin{matrix} a_{12} & a_{11} \\ a_{22} & a_{21} \\ \end{matrix} \right| + b_{11}b_{22} \left| \begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ \end{matrix} \right| + 0 \\ &= \left| \begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ \end{matrix} \right| (b_{11}b_{22} - b_{21}b_{12}) = \left| \begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{21} \\ \end{matrix} \right| \cdot \left| \begin{matrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ \end{matrix} \right| \\ &= |A| \cdot |B| \end{split}$$

2.4 可逆矩阵

(4.7)'式把向量 **m** 的 I 坐标 γ 表示成它的 II 坐标 γ' 的一次 齐次多项式。我们又知道,由于 $|A| \neq 0$,因此可以通过解方程组 把 **m** 的 II 坐标 γ' 表示成它的 I 坐标 γ 的一次齐次多项式。如果 我们引进可逆矩阵的概念,则这一反解过程可以简明 地 表 示 出 来。

定义4.8 若对于
$$n$$
级矩阵 A ,存在矩阵 B ,使得 $AB=BA=E$, (4.11)

则称A是**可逆矩阵**,称B是A的逆矩阵。

不难看出,满足(4.11)的矩阵B必是n级矩阵,并且它是唯一的。通常把A的逆矩阵记作 A^{-1} 。

由定义4.8立即看出, 若A可遵, 则A-1 也可逆, 拜且

$$(A^{-1})^{-1} = A$$
. (4.12)

定理4.3 矩阵 A 可逆的充分必要条件是 $|A| \rightleftharpoons 0$ (即, A 非奇异)。

证明 必要性。若矩阵 A 可逆,则 有 $AA^{-1}=E$ 。于是有 $|AA^{-1}|=|E|$,从而 $|A||A^{-1}|=1$ (这里用到了|E|=1这一事实,若 n=2 或 3 ,读者可直接验证它,若 n>3 ,在高等代数课程中将证明它)。因此 $|A| \neq 0$ 。

充分性。这里只证 n=2 的情形,至于 n>2 的情形证明思想一样,但放在高等代数课程中证。设 $A=(a_{ij})$ 是 2 级 矩 阵,且 $[A] \Rightarrow 0$ 。令

$$A^* = \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}, \tag{4.13}$$

则

$$AA^* = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |A| & 0 \\ 0 & |A| \end{pmatrix} = |A|E,$$

同理有 A*A = |A|E。从而有

$$A\left(\frac{1}{|A|}A^*\right) = \left(\frac{1}{|A|}A^*\right)A = E,$$

所以A可逆, 幷且

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*. \tag{4.14}$$

用可逆矩阵的概念及定理 4.3 ,我们得知仿射坐标系 I 到 II 的过渡矩阵 A 是可逆矩阵,因此从(4.7)'式立即得到

$$\gamma' = A^{-1}\gamma_*$$

由定理4.3还可得到

命题4.1 若对于方阵A,存在方阵B,使得AB=E,则A是可逆矩阵,并且 $A^{-1}=B$ 。

证明 因为 AB=E, 所以|A||B|=1, 从而 $|A| \neq 0$, 因此

A可逆。于是 A^{-1} 存在,在 AB = E 的两边左乘 A^{-1} 得 $A^{-1}(AB) = A^{-1}E$ 、

即得 $B = A^{-1}$.

利用命题4.1容易证明可逆矩阵的下述性质:

- (1) 若A, B均是n级可逆矩阵,则AB也可逆,拜且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
- (2) 若A 可逆,则 A^{t} 也可逆,幷且 $(A^{t})^{-1} = (A^{-1})^{t}.$
- (3) 若A可逆,则

$$|A^{-1}| = |A|^{-1}$$

2.5 正交矩阵

定义4.9 若一个n 级矩阵A 适合 AA' = E,

则称 A 是正**交矩阵。**

例如,E是正交矩阵,又如

$$\left(\begin{array}{ccc} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{array}\right), \left(\begin{array}{ccc} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

都是正交矩阵.

由命题4.1立即得到

命題4.2 n 级矩阵 A 是正交矩阵的充分必要条件为 $A^{-1} = A^{1}$.

从而也有 n 级矩阵 A 是正交矩阵的充分必要条件为

$$A^{\iota}A = E_{\bullet}$$

容易证明正交矩阵有下述性质:

(1) 若A,B都是n级正交矩阵,则AB也是正交矩阵,

- (2) A^{A} 是正交矩阵,则 A^{A} (即 A^{-1}) 也是正交矩阵;
- (3) 者 A 是正交矩阵,则|A|=1 或 -1 (在证 明 这 条 性 质时,要用到|A'|=|A| 这一事实)。

命题4.3 A是正交矩阵的充分必要条件为: A 的每一行元素的平方和等于1,每两行对应元素的乘积之和等于零,即

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik}^{2} = 1, \qquad i = 1, 2, \dots, n; \qquad (4.15)$$

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik} a_{jk} = 0, \quad i \triangle : j.$$
 (4.16)

证明 对于任一n级矩阵 A=(aii)都有

$$(AA^i)$$
的 (i,j) 元 = $\sum_{k=1}^{n} [A \otimes (i,k)]$ 元] $\cdot [A^i \otimes (k,j)]$ 元] = $\sum_{k=1}^{n} a_{ik} a_{jk}$,

类似地有

$$(A^{i}A)$$
的 (i,j) 元 = $\sum_{k=1}^{n} a_{ki}a_{kj}$.

现在设A是正交矩阵,则AA' = E。于是得

$$(AA^{i})$$
的 (i,i) 元 = 1, $i=1,2,\cdots,n$, (AA^{i}) 的 (i,i) 元 = 0, $i \Rightarrow i$. (4.17)

从而得(4.15)和(4.16)。

反之,若对于矩阵A,(4.15)和(4.16)成立,则得(4.17),从而 AA' = E,即 A 为正交矩阵。

类似地可证明

命题4.4 A 是正交矩阵的充分必要条件为: A 的每一列元素的平方和等于1,每两列对应元素的乘积之和等于零。

1. 谡

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 7 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 5 & -1 & 7 \end{pmatrix},$$

 $\Re A + B$, A - B, $5A^4 + 3B^4$.

2. 计算

(1)
$$\binom{5}{2} \binom{3}{7} \binom{0}{1} \binom{1}{0}$$
; (2) $\binom{0}{1} \binom{1}{0} \binom{5}{2} \binom{3}{7}$; (3) $\binom{0}{0} \binom{2}{3} \binom{1}{0} \binom{1}{0}$; (4) $\binom{1}{0} \binom{1}{0} \binom{0}{0} \binom{2}{0}$;

(5)
$$\begin{pmatrix} 7 & -1 \\ -2 & 5 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$$
; (6) $(-1,3,2) \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix}$;

(7)
$$\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix}$$
 (-1,3,2); (8) $(x_1,x_2,x_3) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$.

3. 判断下列矩阵是否可逆?若可逆,求它的逆矩阵。

(1)
$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -4 & 6 \end{pmatrix}$$
; (2) $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$;

(3)
$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$
, 其中 $ad - bc \Rightarrow 0$.

- 4. 证明可逆矩阵的性质(1),(2),(3),
- 5. 判断下列矩阵是否正交矩阵、

$$\begin{pmatrix}
\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\
\sqrt{\frac{2}{2}} & \frac{\sqrt{2}}{2}
\end{pmatrix},
\begin{pmatrix}
\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{2}{3} \\
0 & -\frac{2\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{3} \\
-\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{2}{3}
\end{pmatrix}.$$

6. 证明正交矩阵的性质(1),(2),(3)。

§ 3 平面直角坐标变换

设 I [O; e₁, e₂], II [O'; e'₁, e'₂]都是直角坐标系,本章 § 1 和 § 2 中关于仿射坐标变换的一般结论和方法对于直角坐标变换都成立。本节来进一步研究直角坐标变换的特殊性。

3.1 直角坐标变换公式

设 O' 的 I 坐标为 (x_0, y_0) , e'_1 , e'_2 的 I 坐标分别为 (a_{11}, a_{21}) , (a_{12}, a_{22}) 。则 I 到 I 的过渡矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

定理4.4 设 \mathbb{I} 和 \mathbb{I} 都是直角坐标系, 则 \mathbb{I} 到 \mathbb{I} 的过渡矩阵 A 是正交矩阵,并且 \mathbb{I} 到 \mathbb{I} 的过渡矩阵是 A'

证明 因为 $|e_1'|=1$, $|e_2'|=1$, $|e_1'|=e_2'$,并且 I 是直角坐标系,所以有

 $a_{11}^2 + a_{21}^2 = 1$, $a_{12}^2 + a_{22}^2 = 1$, $a_{11}a_{12} + a_{21}a_{22} = 0$. (4.18) 由命题4.4知,A是正交矩阵。

II 到 I 的过渡矩阵为 A^{-1} , 由于A 是正交 矩 阵 , 所 以 A^{-1} = A^{*} .

Ⅰ到Ⅱ的点的直角坐标变换公式为:

$$\binom{x}{y} = \binom{a_{11}}{a_{21}} - \binom{a_{12}}{a_{22}} \binom{x'}{y'} + \binom{x_0}{y_0}.$$
 (4.19)

于是,Ⅱ到Ⅰ的点的直角坐标变换公式为:

$$\binom{x'}{y'} = \binom{a_{11}}{a_{21}} \quad a_{12} - 1 \binom{x - x_0}{y - y_0} = \binom{a_{11}}{a_{12}} \quad a_{21} \binom{x - x_0}{y - y_0}.$$
 (4.20)

Ⅰ到Ⅱ的向量的直角坐标变换公式为:

$$\binom{u}{v} = \binom{a_{11} - a_{12}}{a_{21} - a_{22}} \binom{u'}{v'}.$$
 (4.21)

Ⅱ到Ⅰ的向量的直角坐标变换公式为:

$$\binom{u'}{v'} = \binom{a_{11} - a_{21}}{a_{12} - a_{22}} \binom{u}{v}. \tag{4.22}$$

3.2 直角坐标变换中的过渡矩阵

直角坐标系 I 到 II 的过渡矩阵 A 虽然有四个数,但是由于它是正交矩阵,满足(4.18)中的三个方程,因此只有一个数是自由的。下面来详细讨论这点。

平面上的仿射坐标系 $[O,e_1,e_2]$ 称为右手系,如果从 e_1 反 时针旋转小于180°的角便与 e_2 重合。 反之称为左手系。 对于直角坐标系来说,若 e_1 旋转90°与 e_2 重合,则为右手系; 若 e_1 旋转-90°与 e_2 重合,则为左手系。

设 I [O; e1, e2], Ⅱ [O'; e1, e2]都是右手直角坐标系,

$$O'(x_0, y_0), e'_1(a_{11}, a_{21}), e'_2(a_{12}, a_{22}).$$

则有

$$a_{11} = e'_1 \cdot e_1 = \cos\langle e'_1, e_1 \rangle$$
, $a_{21} = e'_1 \cdot e_2 = \cos\langle e'_1, e_2 \rangle$, $a_{12} = e'_2 \cdot e_1 = \cos\langle e'_2, e_1 \rangle$, $a_{22} = e'_2 \cdot e_2 = \cos\langle e'_2, e_2 \rangle$. 设 e_1 反时针旋转 θ 角便与 e'_1 重合(如图4.2), 分别讨论

$$0 \leqslant \theta < \frac{\pi}{2}$$
, $\frac{\pi}{2} \leqslant \theta < \pi$, $\pi \leqslant \theta < \frac{3\pi}{2}$, $\frac{3\pi}{2} \leqslant \theta < 2\pi$

这四种情况,可得

$$\begin{split} a_{11} &= \cos \langle \bm{e}_1' \,, \bm{e}_1 \rangle = \cos \theta \,, \\ a_{21} &= \cos \langle \bm{e}_1' \,, \bm{e}_2 \rangle = \sin \theta \,, \\ a_{12} &= \cos \langle \bm{e}_2' \,, \bm{e}_1 \rangle = -\sin \theta \,, \\ a_{22} &= \cos \langle \bm{e}_2' \,, \bm{e}_2 \rangle = \cos \theta \,. \end{split}$$

从而【到Ⅱ的过渡矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$




图 4.2

容易算出,|A|=1。

*读者可类似上述讨论得到:设 θ 仍表示 e_1 到 e_1 的 转角,若 I 是右手直角坐标系, I 是左手直角坐标系,则 I 到 I 的过渡 矩阵为

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$$
.

若 I 是左手直角坐标系, II 是右手直角坐标系,则 I 到 II 的过渡矩阵是

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ -\sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}.$$

若 Ⅰ和 Ⅱ 都是左手直角坐标系,则 Ⅰ 到 Ⅱ 的过渡矩阵是

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$
.

定义4.10 平面(或空间)的两个坐标系,如果它们都是右手系,或者它们都是左手系,则称它们是**同定向的**,如果一个是左手系,另一个是右手系,则称它们是**反定向的**。

从上面的讨论可以得到

命题4.5 设 I 和 II 都是平面的直角坐标系,设 I 到 II 的过渡矩阵是A,则 I 和 II 同定向的充分必要条件为|A|=1,从而它们是反定向的充分必要条件为|A|=-1.

如无特别声明, 个后所取的直角坐标系都是右手系。

3.3 移轴公式和转轴公式

设 $I[O;e_1,e_2]$ 和 $II[O';e'_1,e'_2]$ 都是右 手 直 角 坐 标 系, $O'(x_0,y_0)$, e_1 到 e'_1 的转角为 θ ,则 I 到 II 的点的坐标变换公式为

$$\binom{x}{y} = \binom{\cos\theta}{\sin\theta} - \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \binom{x'}{y'} + \binom{x_0}{y_0}.$$
 (4.23)

若 $\theta = 0$, 则(4.23)成为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{cases} x = x' + x_0, \\ y = y' + y_0, \end{cases} \tag{4.24}$$

(4.24)就是移轴公式。

岩O'与O重合,则(4,23)成为

$$\binom{x}{y} = \binom{\cos\theta - \sin\theta}{\sin\theta} \binom{x'}{y'}, \qquad (4.25)$$

(4.25)称为转轴公式。

(4.23), (4.24), (4.25)说明, 平面上任一右手直角坐标变换可以经过移轴和转轴得到,即对于右手直角坐标系 $I[O;e_1,e_2]$ 和 $II[O',e'_1,e'_2]$, 有

$$[O, e_1, e_2] \xrightarrow{\otimes \text{th}} [O', e_1, e_2] \xrightarrow{\otimes \text{th}} [O', e_1', e_2'];$$

$$[O, e_1, e_2] \xrightarrow{\otimes \text{th}} [O, e_1', e_2'] \xrightarrow{\otimes \text{th}} [O', e_1', e_2'];$$

上述结论对于任意两个同定向的直角坐标系仍成立,但对于 反定向的两个直角坐标系不成立。

例4.1 在平面上,设x'轴,y'轴在原坐标系中的方程分别为。

136

ΞŸ

且新、旧坐标系都是右手直角坐标系。求 I 到 II 的点的坐标变换公式,直线 l_1 : 2x-y+3=0 在新坐标系中的方程; 直线 l_2 : x'+2y'-1=0 在原坐标系中的方程。

解 设原坐标系为 [[O;e₁,e₂],新坐标系为 [[[O';e¹,e²₂]. 解方程组

$$\begin{cases} 3x - 4y + 1 = 0, \\ 4x + 3y - 7 = 0 \end{cases}$$

得 x=1,y=1。因此, O' 的 I 坐标是(1,1)。

因为 x' 轴的标准方程为:

$$x + \frac{1}{3} = \frac{y}{3},$$

所以 x' 轴的方向系数为(4,3),于是 e' 的 I 坐标为 $\left(\frac{4}{5},\frac{3}{5}\right)$ 或者 $\left(-\frac{4}{5},-\frac{3}{5}\right)$ 、下面取 e' 的 I 坐标为 $\left(\frac{4}{5},\frac{3}{5}\right)$,则由 (4.23) 得 I 到 I 的点的坐标变换公式为:

$${x \choose y} = \begin{cases} \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{cases} {x' \choose y'} + {1 \choose 1}.$$
 (4.26)

 l_1 : 2x-y+3=0 在新坐标系中的方程为:

$$2\left(\frac{4}{5}x' - \frac{3}{5}y' + 1\right) - \left(\frac{3}{5}x' + \frac{4}{5}y' + 1\right) + 3 = 0,$$
$$x' - 2y' + 4 = 0.$$

Ⅱ到Ⅰ的点的坐标变换公式为:

跙

$${x' \choose y'} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} {x-1 \choose y-1}.$$
 (4.27)

 l_2 : x' + 2y' - 1 = 0 在原坐标系中的方程为:

$$\left[\frac{4}{5}(x-1)+\frac{3}{5}(y-1)\right]+2\left[-\frac{3}{5}(x-1)+\frac{4}{5}(y-1)\right]-1=0,$$

即

$$2x - 11y + 14 = 0$$

例4.2 在平面右手直角坐标系中,求分式线性函数

$$y = \frac{ax + b}{cx + d}$$
, $\pm \phi$ $ad \pm bc$, $c \pm 0$

的图象。

解 先将所给函数适当变形,从而看出应怎样作坐标变换才能使此图形的方程简单。

$$y = \frac{ax + b}{cx + d} = \frac{\frac{a}{c}x + \frac{b}{c}}{x + \frac{d}{c}} = \frac{\frac{a}{c}\left(x + \frac{d}{c} - \frac{d}{c}\right) + \frac{b}{c}}{x + \frac{d}{c}} = \frac{a}{c} + \frac{\frac{bc - ad}{c^2}}{x + \frac{d}{c}},$$

于是得

$$\left(y - \frac{a}{c}\right)\left(x + \frac{d}{c}\right) = \frac{bc - ad}{c^2}.$$

从而看出只要作移轴

$$\begin{cases} x' = x + \frac{d}{c}, \\ y' = y - \frac{a}{c}, \end{cases}$$

١

覞


$$\begin{cases} x = x' - \frac{d}{c}, \\ y = y' + \frac{a}{c}, \end{cases}$$

则该图形在新坐标系(其原点 O' 的旧坐标为(-d/o, a/o)中的方程为

$$x'y' = \frac{bc - ad}{c^2}.$$

这是以新坐标系的 x' 轴, y' 轴 为渐近线的等轴双曲线。 x' 轴, y' 轴在原坐标系中的方程 分别 为:

$$y - \frac{a}{c} = 0$$
, $x + \frac{d}{c} = 0$.



习 題 4.3

- 1. 在直角坐标系 Oxy 中,以直线 l ; 4x-3y+12=0 为新坐标系的 x' 轴,取通过点 A(1,-3) 且垂直于 l 的 直 线 为 y' 轴,写出点的坐标变换公式;并且求直线 l_1 : 3x-2y+5=0 在新坐标系中的方程。
 - 2. 设 x' 轴和 y' 轴任原直角坐标系中的方程分别为: 12x-5y-2=0 和 5x+12y-29=0.

写出点的坐标变换公式; 幷且求点 A(-2,0) 的新坐标。 设某椭圆的长轴、短轴分别在 x' 轴、y' 轴上,其长、短半轴的长分别为3、2、求这个椭圆在原坐标系中的方程。

- 3. 如果坐标系 I 和 II 都是右手直角坐标系,且 II 的原点 O' 的 I 坐标是 (1,2), e_1 到 e'_1 的转角是 $\frac{\pi}{3}$,求 I 的原点 O 的 II 坐标以及直线 l : x-y=1 在 II 中的方程。
- 4. 作直角坐标变换,已知点 A(6,-5),B(1,-4) 的 新 坐标分别为(1,-3),(0,2),求点的坐标变换公式。
 - 5. 在直角坐标系 Oxy 中, 已 知 三点 A(2,1), B(-1,2),

C(1,-3),如果将坐标原点移到B点,并且坐标轴旋转角度 $\alpha = \operatorname{arctg} \frac{3}{4}$,求点的坐标变换公式,并且求A,B,C在新坐标系中的坐标。

6. 设新旧坐标系都是右手直角坐标系,坐标变换公式为:

(1)
$$\begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2}x' + \frac{\sqrt{2}}{2}y' + 5, \\ y = -\frac{\sqrt{2}}{2}x' + \frac{\sqrt{2}}{2}y' - 3, \end{cases}$$
 (2)
$$\begin{cases} x' = -y + 3, \\ y' = x - 2, \end{cases}$$

其中(x,y)与(x',y')分别表示同一个点的旧坐标与新坐标,求新坐标系的原点的旧坐标,并且求坐标轴旋转的角 θ .

7. 已知一曲线在给定的右手直角坐标系中的方程为 $y = 4x^2 - 8x + 5$,

试作一直角坐标变换, 使这条曲线的新力程中不含有 × 的一次项以及常数项, 并且作图。

8. 求分式线性函数

$$y = \frac{2x + 3}{x + 4}$$

的图象, 幷且画图。

- 9. 在右手直角坐标系 Oxy 中,设 一 抛 物线的对称轴是: x-y-z=0,顶点是(4,2),焦点是(2,0),求它的方程。
- 10. 已知一抛物线的准线 l 的方程为: x-y+2=0, 焦点为 F(2,0), 求这抛物线的方程, 其中 Oxy 是右手直角坐标系。
- 11. 在右手直角坐标系 Oxy 中,已知一个椭圆的长轴和短轴分别在直线 l_1 : x+y=0和 l_2 : x-y+1=0 上,并且这椭圆的 半轴 长为a=2, b=1,求这个椭圆的方程。
- 12. 在右手直角坐 标系 Oxy 中,求 经 过 点 A(-2,-1) 和 B(0,-2),并且长轴和短轴分别在 直 线 $l_1: x-y+1=0$ 和 $l_2: x+y+1=0$ 上的椭圆的方程。

*13. 在右手直角坐标系 I 中, 设两直线 4:

$$A_i x + B_i y + C_i = 0$$
 (i = 1,2)

互相垂直,取 l_1, l_2 为右手直角坐标系 Π 的 O'y' 轴、O'x' 轴,试 求 Π 到 Π 的点的坐标变换公式。

§ 4 空间坐标变换

4.1 仿射坐标变换

定理4.5 若 $I[O,e_1,e_2,e_3]$ 和 $I[O',e_1',e_2',e_3']$ 都是空间的仿射坐标系,设 O' 的 I 坐标是 (x_0,y_0,z_0) ,设 e', 的 I 坐标是 (a_{1i},a_{2i},a_{3i}) ,j=1,2,3。则 I 到 II 的点的仿射坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}, \tag{4.28}$$

I 到 II 的向量的仿射坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1' \\ u_2' \\ u_3' \end{pmatrix}; \tag{4.29}$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

称为 I 到 II 的过渡矩阵,它的第 i 列是 e'_i 的 I 坐标(i=1,2,3)。

证明 设点M的 I 坐标为 (x,y,z), Ⅱ 坐标为(x',y',z'),

则

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M}$$

$$= (x_0 e_1 + y_0 e_2 + z_0 e_3) + (x' e_1' + y' e_2' + z' e_3')$$

$$= x_0 e_1 + y_0 e_2 + z_0 e_3 + x' (a_{11} e_1 + a_{21} e_2 + a_{31} e_3)$$


$$+ y' (a_{12} e_1 + a_{22} e_2 + a_{32} e_3) + z' (a_{13} e_1 + a_{23} e_2 + a_{33} e_3)$$

$$= (x_0 + a_{11} x' + a_{12} y' + a_{13} z') e_1 + (y_0 + a_{21} x' + a_{22} y')$$

$$+ a_{23}z')e_2 + (z_0 + a_{31}x' + a_{32}y' + a_{33}z')e_3$$

从而得

$$\begin{cases} x = a_{11}x' + a_{12}y' + a_{13}z' + x_0, \\ y = a_{21}x' + a_{22}y' + a_{23}z' + y_0, \\ z = a_{31}x' + a_{32}y' + a_{33}z' + z_{0*} \end{cases}$$



设m的 I 坐标为(u₁,u₂,u₃), II 坐标为(u₁', u₂',u₃'),由 (4,28) 易得(4.29)。

图 4.4

要条件是|A|>0.

证明 因为 I 到 I 的过渡 矩阵 A 的第 i 列是 e_i' 的 I 坐标,由于 e_1' , e_2' , e_3' 不共面,所以 |A| $\Rightarrow 0$,即 A 非奇异。

由公式 (1,34) 得

$$\frac{\mathbf{e}_1' \times \mathbf{e}_2' \cdot \mathbf{e}_3'}{\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3} = |A|,$$

因此 I 与 I 同定向的充分必要条件是 |A| > 0.

推论4.1 平面上的两个仿射坐标系 $I[O;e_1,e_2]$ 和 $I[O',e_1',e_2']$ 同定向的充分必要条件是I到II的过渡矩阵A的行列式|A|>0.

证明 令 $e_3 = e_1 \times e_2$,考虑空间的两个仿射坐标系 I_{11} $[O; e_1, e_2, e_3]$ 和 I_{11} $[O'; e'_1, e'_2, e_3]$,利用定理4.6易证得推论4.1,详细推导请读者自己练习。

由 (4.28) 可以得到Ⅱ到Ⅰ的点的坐标变换公式为:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{pmatrix}.$$
 (4.30)

4.2 直角坐标变换

定理4.5和4.6在直角坐标系中当然也成立。现在进一步研究 直角坐标变换的特殊性。

定理4.7 设 $\mathbb{I}[O;e_1,e_2,e_3]$ 和 $\mathbb{I}[O';e'_1,e'_2,e'_3]$ 都是直角坐标系,则 \mathbb{I} 到 \mathbb{I} 的过渡矩阵 A 是正交矩阵,从而 \mathbb{I} 到 \mathbb{I} 的过渡矩阵是 A'

证明 设 e', 的 I 坐标是 (a_{1j}, a_{2j}, a_{3j}) , j = 1, 2, 3. 因为 II 是直角坐标系,所以 $|e'_j| = 1$, (j = 1, 2, 3); $e'_j \perp e'_i$, 当 $i \neq j$. 又 因为 I 是直角坐标系,所以上述条件用坐标写出就是:

$$a_{1j}^2 + a_{2j}^2 + a_{3j}^2 = 1$$
, $j = 1, 2, 3$;
 $a_{1i}a_{1j} + a_{2i}a_{2j} + a_{3i}a_{3j} = 0$, $i \neq j$.

这些条件说明Ⅰ到Ⅱ的过渡矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

是正交矩阵,从而 II 到 II 的过渡矩阵是 $A^{-1}=A^{\prime}$ 。

由于正交矩阵的行列式等于+1或-1,因此空间的两个直 角坐标系同定向的充分必要条件是它们的过渡矩阵的行列式等 于+1。

4.3 例

例4.3 证明:在右手直 角 坐 标 系 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 中,方 程 f(2x+y-3z,x-2y)=0 表示的图形是柱面; 并且求出它的母线 方向和一条准线的方程。

证明 如果能选择一个合适的直角坐标系,使得这个图形的方程中不含某一个坐标,则此图形就是柱面。观察原 方程 的 特点,知道如果令

$$x' = k(2x + y - 3z), \quad y' = l(x - 2y),$$

则该图形方程变成 $f\left(\frac{x'}{k}, \frac{y'}{l}\right) = 0$ 。我们要求 $\Pi[O; e_1', e_2', e_3']$ 也是 右手 直 角坐 标 系,由 Π 到 I 的直角坐标变换公式知,此时 e_1', e_2' 的 I 坐标分别是 (2k, k, -3k), (l, -2l, 0),由于 $|e_1'|$ = $|e_2'| = 1$,所以应当取

$$k = \frac{1}{\sqrt{2^2 + 1^2 + (-3)^2}} = \frac{1}{\sqrt{14}}, \quad l = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

由于 $e_1' \cdot e_2' = \frac{2}{\sqrt{14}} \times \frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{14}} \times \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\right) + \frac{-3}{\sqrt{14}} \times 0 = 0$, 所以 $e_1' \perp e_2'$ 。 再令 $e_3' = e_1' \times e_2'$,即得 $II[O, e_1', e_2', e_3']$ 为右手 直角坐标系。 e_3' 的 I 坐标易算出为 $\left(-\frac{6}{\sqrt{70}}, -\frac{3}{\sqrt{70}}, -\frac{5}{\sqrt{70}}\right)$ 。 从 而 II 到 I 的点的坐标变换公式为

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{\sqrt{14}}(2x + y - 3z), \\ y' = \frac{1}{\sqrt{5}}(x - 2y), \\ z' = -\frac{1}{\sqrt{70}}(6x + 3y + 5z). \end{cases}$$

所给图形在耳中的方程为

$$f(\sqrt{14}x',\sqrt{5}y')=0,$$

因此它是柱面。它的母线方向 $v \parallel e_3'$,所以可取v为(6,3,5);它的准线在 Π 中的方程为

$$\begin{cases} f(\sqrt{14}x', \sqrt{5}y') = 0, \\ z' = 0, \end{cases}$$

从而准线在I中的方程为

$$\begin{cases} f(2x + y - 3z, x - 2y) = 0, \\ 6x + 3y + 5z = 0. \end{cases}$$

4.4 代数曲面(线)及其次数

空间(或平面)的任一点M对于不同坐标系的坐 标 是 不 同 的,因而作为点的轨迹的图形在不同坐标系中的方程也就不同, 但是有

定理4.8 若图形 S 在仿射坐标系 I 中的方程 F(x,y,z) = 0 的左端是 x,y,z 的 n 次多项式,则 S 在任意一个仿射坐标系 I 中的方程 G(x',y',z') = 0 的左端是 x',y',z' 的 n 次多项式。

证明 因为 I 到 I 的点的坐标变换公式中 x,y,z 均 表 示 成 x',y',z' 的一次多项式,所以若 F(x,y,z)是多项式,则用 I 到 II 的坐标变换公式代入 F(x,y,z)中得到的 G(x',y',z')必是x',y',z' 的多项式,并且 G(x',y',z')的次数 m 不超过 F(x,y,z) 的次数 n 。同理,因为用 II 到 I 的点的坐标变换公式代入 G(x',y',z')中即得 F(x,y,z),所以 $n \leq m$ 。于是m = n 。

定理 4.8 说明,一个图形的方程的左端是否为多项式以及这多项式的次数与坐标系的 选 择 无 关,它们都是图形 本 身 的 性质。

若图形 S 的方程的左端是多项式,则称 S 是**代数曲面**,并且 把这个多项式的次数称为这个**代数曲面的次数。**

平面上的图形有类似的性质。若平面上图形 8 的方程的左端是多项式,则称 8 是代数曲线, 并且把这个多项式的次数称为这条代数曲线的次数。 譬如,椭圆、双曲线、抛物线的标准方程是二次的,由此可知,它们不论在哪一个仿射坐标系中的方程也都是二次的,所以它们都称为二次曲线。

习题 4.4

1. 设 OABC 为四面体,L,M,N 依次是△ABC 的三边AB,BC,CA 的中点。取 ↓[O,OA,OB,OC], ∏[O,OL,OM,ON].

- (1) 录 I 到 II 的点的坐标变换公式和向量的坐标 变 换 公式, 再求 II 到 I 的点(向量)的坐标变换公式;
 - (2) 求 A,B,C, AB, AC 的 II 坐标。
- 2. 设 I [O, e₁, e₂, e₃]和 II [O', e₁', e₂', e₃']都 是 右手直角 坐标系, 已知O'的 I 坐标是(2,1,2), e₁'与O'O同向, O'y'轴与Oy 轴交于点 A(0,9,0), e₂'与O'A 同向。求 I 到 II 的点的 坐 标 变 换公式。
- 3. 在右手直角坐标系 I [O₁e₁,e₂,e₃] 中,已给三个互相垂 直的华面

 π_1 ; x+y+z-1=0, π_2 ; x-z+1=0, π_3 ; x-2y+z+2=0. 确定新的坐标系 $\Pi[O'; e_1', e_2', e_3']$ 使得 π_1, π_2, π_3 分别为 y'z', z'x', x'y' 坐标面;且 O 在新坐标系的第一卦 限內。求 Π Π 的点的坐标变换公式。

- 4. 在右手直角坐标系 Oxyz 中, 曲面 S 的方程为
- (1) $(2x+y+z)^2-(x-y-z)^2=y-z$;
- (2) 9x²-25y²+16z²-24xz+80x-60z=0。
 试判断 S 是什么曲面?
- 5. 画出下列曲面的简图,这些曲面在右手直角坐标系 Oxyz 中的方程分别为

(1)
$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + z = 1$$
; (2) $x^2 + 2xy + y^2 + z^2 = 1$;

- (3) z = xy; (4) z = xy x y 2.
- 6. 设 $I[O; e_1, e_2]$ 和 $I[O; e_1', e_2']$ 都是夹角为 ω 的同定向的斜角坐标系(即 $[e_i] = [e_i'] = 1$,i = 1, 2; $\langle e_1, e_2 \rangle = \langle e_1', e_2' \rangle$ $= \omega$),且 e_1 到 e_2' 的转角为 $\frac{\pi}{2}$ 。求 I 到 II 的点的坐标变换公式。
- 7。 已知 elr, |e|=1, 将 r绕 e 右旋角度 θ 得 r_i , 试用 e, r_i , 表示 r_i .
 - 8. 给定三点 O, A, P(Q \(\dag{\text{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex

 P_1 , 试用 OA , OP , θ 表示 OP_1 .

*9. 将右手直角坐标系 I [O; e₁, e₂, e₃] 绕方向 v(1,1,1) 右旋 π, 原点不动,得坐标系 II [O; e₁', e₂', e₃']。求 I 到 II 的点的坐标变换公式。

10. 在直角坐标系中, 若 xOy 平面上的曲线

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_1x + 2a_2y + a_0 = 0$$

是椭圆(双曲线、抛物线), 问二次曲面

$$z = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_1x + 2a_2y + a_0$$

是什么曲面?

11. 如果

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} = 0,$$

则曲面

 $(a_1x + b_1y + c_1z)^2 + (a_2x + b_2y + c_2z)^2 + (a_3x + b_3y + c_3z)^2 = 1$ 是什么曲面?

*12. 证明,在直角坐标系 Oxyz 中,顶点在 原点的二次锥面

 $a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{88}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{28}yz + 2a_{13}xz = 0$ 有三条互相垂直的直母线的充分必要条件是

$$a_{11} + a_{22} + a_{33} = 0_{\bullet}$$

*13. 设与和与是两条不相交的直线,分别通过与和与作两个互相垂直的平面,证明交线的轨迹是单叶双曲面。

*14. 设 I [O; e₁, e₂, e₈]和 II [O; e₁', e₂', e₈']是有相同原点的右手直角坐标系。则 I 到 II 的坐标变换可以分三个 阶 段 来 完成:

(i)
$$\begin{cases} x = x''\cos\psi - y''\sin\psi, \\ y = x''\sin\psi + y''\cos\psi, \\ z = z'', \end{cases}$$

(iii)
$$\begin{cases} x'' = x''', \\ y'' = y'''\cos\theta - z \sin\theta, \\ z'' = y'''\sin\theta + z'''\cos\theta, \\ x''' = x'\cos\varphi - y'\sin\varphi, \\ y = x'\sin\varphi + y'\cos\varphi, \\ z = z'. \end{cases}$$

其中角 ψ , θ , φ 称为**欧拉角**,它们完全确定了 I 到 II 的坐标变换。 试指出这三个阶段的坐标变换是怎么作 的?角 ψ , θ , φ 各 是 哪 个角? 试写出用 ψ , θ , φ 表示的 I 到 II 的点的坐标变换公式。

第五章 二次曲线方程的化简及其性质

平面上的二次曲线除了椭圆(包括圆)、双曲线、抛物线外,还有沒有别的?如何从所给的二次方程判别它代表什么二次 曲线?它的形状和位置如何?二次曲线有哪些几何性质?这些就是本章所要研究的问题。本章所取的坐标系都是右手直角坐标系。

平面上二次曲线的一般方程是

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_1x + 2a_2y + a_0 = 0.$$
 (5.1)

其中 a11, a12, a22 不全为零。

方程(5.1)的左端是x,y的二次多项式,简记作F(x,y),把F(x,y)的二次项部分

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 ag{5.2}$$

简记作 $\varphi(x,y)$ 。利用矩阵的乘法可以把 $\varphi(x,y)$ 写成下述形式:

$$\varphi(x,y) = (x,y) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}. \tag{5.3}$$

由 $\varphi(x,y)$ 中 x^2,y^2 项的系数作为主对角元,xy 项的系数的 一 半 作为(1,2)元组成的对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \tag{5.4}$$

称之为 $\varphi(x,y)$ 的矩阵。

利用矩阵的乘法,还可以把F(x,y)写成下述形式;

$$F(x,y) = (x,y,1) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_2 \\ a_1 & a_2 & a_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (5.5)$$

其中矩阵

$$P = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{1} \\ a_{12} & a_{22} & a_{2} \\ a_{1} & a_{2} & a_{0} \end{pmatrix}$$
 (5.6)

$$P = \begin{pmatrix} A & \delta \\ \delta^{i} & a_{0} \end{pmatrix}. \tag{5.7}$$

再令 $a^i = (x,y)$, 则 F(x,y)可以表示成

$$F(x,y) = (a^{T},1) \begin{pmatrix} A & \delta \\ \delta^{T} & a_{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad (5.8)$$

于是方程(5.1)可以写成

$$(a^{i},1)\begin{pmatrix} A & \delta \\ \delta^{i} & a_{0} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix} = 0.$$
 (5.9)

§1 二次曲线方程的化简

为了判别在右手直角坐标系 I [O, e₁, e₂] 中的二次方程(5.1) 当系数取各种值时,它能表示哪几种曲线,容易想到的办法是: 作右手直角坐标变换,使得二次曲线(5.1)在新坐标系中的方程比较简单,易于辨认出它表示什么曲线。由于任一右手直角坐标变换都可由移轴和转轴得到,所以我们首先来研究在转轴下二次方程(5.1)的系数变化规律。

1.1 作转轴消去交叉项

设 $\Pi[O; e_1', e_2']$ 是由 Π 经过转轴得到的,转角为 θ 。则 Π 到 Π 的点的坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}. \tag{5.16}$$

令

$$T = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \quad a = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad \alpha' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix},$$

则转轴公式(5,10)可以写成

$$a = Ta'$$

由(5.10)可以得到

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a' \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{5.11}$$

用(5.11)代入方程(5.9)中,得到二次曲线(5.1)的新方程为:

$$(a'',1)\begin{pmatrix} T' & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & \delta \\ \delta' & a_0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} T & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a' \\ 1 \end{pmatrix} = 0, \qquad (5.12)$$

벬

$$(a'',1) \begin{pmatrix} T'AT & T'\delta \\ \delta'T & a_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a' \\ 1 \end{pmatrix} = 0.$$
 (5.12)

由于 (T'AT)' = T'A'T = T'AT, 所以 T'AT 仍为对称矩阵,于是新方程的二次项部分 $\varphi'(x',y')$ 的矩阵为 T'AT, 一次项系数的一半组成的列是 $T'\delta$; 常数项是 a_0 . 这说明: 经过转轴,新方程的二次项系数只与原方程的二次项系数及转角 θ 有关; 新方程的一次项系数只与原方程的一次项系数及转角 θ 有关; 经过转轴,常数项不变。

既然二次方程的二次项系数在转轴下是会改变的,因此我们只要适当选取转角 θ ,就有可能消去交叉项(即,xy项)。从 T^iAT 可求得新方程的交叉项系数的一半(它就是 T^iAT 的(1,2)元)为。

$$(a_{22} - a_{11})\sin\theta\cos\theta + a_{12}(\cos^2\theta - \sin^2\theta)$$

$$=\frac{1}{2}(a_{22}-a_{11})\sin 2\theta+a_{12}\cos 2\theta. \tag{5.13}$$

因此,当 $a_{12} = 0$ 时,新方程的交叉项系数为零的充分必 要 条 件 是

$$\operatorname{ctg} 2\theta = \frac{a_{11} - a_{22}}{2a_{12}}.$$
 (5.14)

选取满足(5.14)的 0,则新方程成为

$$a_{11}'x'^2 + a_{22}'y'^2 + 2a_1'x' + 2a_2'y' + a_0' = 0,$$
 (5.15)

其中 $a_0' = a_0$; $\delta' = T'\delta$, 这里 $\delta' = \binom{a_1'}{a_2'}$. 现在来求 a_{11}' 和 a_{22}' ,

它们分别是 $T^{*}AT$ 的(1,1)元和 (2,2)元。因为 T 是正 交矩阵,所以 $T^{*}=T^{-1}$ 。于是有

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} a_{11}' & 0 \\ 0 & a_{22}' \end{pmatrix},$$

从而有

$$AT = T \begin{pmatrix} a_{11}' & 0 \\ 0 & a_{22}' \end{pmatrix},$$

加

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11}' & 0 \\ 0 & a_{22}' \end{pmatrix},$$

比较等式两边的矩阵的主对角元便得到:

$$a_{11}\cos\theta + a_{12}\sin\theta = a_{11}'\cos\theta,$$
 (5.16)

$$-a_{12}\sin\theta + a_{22}\cos\theta = a_{22}'\cos\theta. \tag{5.17}$$

假如 $\cos\theta = 0$,则由(5.16)得 $a_{12}\sin\theta = 0$,由于 $a_{12} \neq 0$,因此得 $\sin\theta = 0$,这不可能,所以 $\cos\theta \neq 0$ 。从(5.16)和(5.17)分别得到

$$a_{11}' = a_{11} + a_{12} \operatorname{tg} \theta,$$
 (5.18)

$$a_{22}' = a_{22} - a_{12} \operatorname{tg} \theta_{\bullet}$$
 (5.19)

例5.1 作转轴消去下述二次方程的交叉项

$$5x^2 + 4xy + 2y^2 - 24x - 12y + 18 = 0$$

解 选取转角θ使得它满足

ctg
$$2\theta = \frac{a_{11} - a_{22}}{2a_{12}} = \frac{5 - 2}{4} = \frac{3}{4}$$
,

即

$$2\mathbf{t}\mathbf{g}^2\theta + 3\mathbf{t}\mathbf{g}\theta - 2 = 0.$$

解得 $tg\theta = \frac{1}{2}$ 或-2。取 $tg\theta = \frac{1}{2}$,且取 θ 为锐角,则

$$\sin\theta = \frac{1}{\sqrt{5}}, \qquad \cos\theta = \frac{2}{\sqrt{5}}.$$

于是

$$a_{11}' = a_{11} + a_{12} + a_{13} + a_{14} + a_{15} = 6$$

$$a_{22}' = a_{22} - a_{12} \operatorname{tg} \theta = 2 - 2 \times \frac{1}{2} = 1,$$

$$\begin{pmatrix} a_1' \\ a_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -12 \\ -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6\sqrt{5} \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$a_0' = a_0 = 18$$

因此转轴后的新方程为

$$6x'^2 + y'^2 - 12\sqrt{5}x' + 18 = 0$$

转轴公式为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}.$$

1.2 作移轴进一步化简方程

经过转轴消去交叉项后,就可以通过配方,再作移轴,把二

次方程行一步化筒,这时需要区分几种情况:

情形1, a₁₁'与 a₂₂'同号

山于椭圆的标准方程中平方项的系数是同号的,因此我们把 消去交叉项后,平方项系数同号的二次曲线称为**椭圆型曲线**。此 时把新方程(5.15)配方得

$$a_{11}'\left(x' + \frac{a_{1}'}{a_{11}'}\right)^{2} + a_{22}'\left(y' + \frac{a_{2}'}{a_{22}'}\right)^{2} + a_{0}' - \frac{a_{1}'^{2}}{a_{11}'} - \frac{a_{2}'^{2}}{a_{22}'} = 0,$$

作移轴

$$\begin{cases} x^* = x' + \frac{a_1'}{a_{11}'}, \\ y^* = y' + \frac{a_2'}{a_{22}'}, \end{cases}$$
 (5.20)

则二次方程(5.15)变成

$$a_{11}' x^{*2} + a_{22}' y^{*2} + e_{1}^{*} = 0,$$
 (5.21)

其中

$$c_1^* = -\left(\frac{a_1'^2}{a_{11}'} + \frac{a_2'^2}{a_{22}'}\right) + a_0'$$

$$\frac{x^{*2}}{a_1^2} + \frac{y^{*2}}{b_1^2} = 1, \qquad (5.22)$$

其中 $a_1^2 = \frac{-c_1^*}{a_{11}'}$, $b_1^2 = \frac{-c_1^*}{a_{22}'}$. 显然(5,22)是椭圆的标准方程。

[1.2] 若 c₁*与 a₁₁/ 同号,则类似得

$$\frac{x^{*2}}{a_2^2} + \frac{y^{*2}}{b_2^2} = -1, \qquad (5.23)$$

其中 $a_2^2 = \frac{c_1^*}{a'_{11}}$, $b_2^2 = \frac{c_1^*}{a'_{23}}$. 显然方程(5,23)无轨迹,有时也称(5,23)表示一个虚椭圆、

[1.3] 若 c_1 * = 0,则(5.21)可写成

$$\frac{x^{*2}}{a_3^2} + \frac{y^{*2}}{b_3^2} = 0, ag{5.24}$$

其中 $a_3^2 = \frac{1}{|a'_{11}|}$, $b_3^2 = \frac{1}{|a'_{22}|}$. 显然(5.24)表示一个点0*(移轴后的坐标系的原点).

情形2。 a11' 与 a22' 异号

由于双曲线的标准方程中平方项的系数异号,因此我们把消去交叉项后,平方项系数异号的二次曲线称为**双曲型曲线**。此时类似于情形 1,方程(5.15)经配方,再作移 轴(5.20)可 以 变 成(5.21)。

[2.4] 若 $c_1* \div 0$, 将(5.21)两边同除以 $-c_1*$, 得

$$\frac{x^{*2}}{a_1^2} - \frac{y^{*2}}{b_2^2} = 1$$
, 当 c_1 *与 a_{11} *异号; (5.25)

或

$$-\frac{x^{*2}}{a_s^2} + \frac{y^{*2}}{b_s^2} = 1, \quad \text{if } c_1^* = 1, \quad \text{if } a_{11}^* = 1.$$

其中

$$a_4^2 = \frac{-c_1^*}{a_{11}'}, \quad b_4^2 = \frac{c_1^*}{a_{22}'}, \quad a_5^2 = \frac{c_1^*}{a_{11}'}, \quad b_5^2 = \frac{-c_1^*}{a_{22}'}.$$

显然(5.25)和(5.26)均表示双曲线。(5.26)可将坐标轴再转 $\frac{\pi}{2}$,变成(5.25)形式。

[2.5] 若 $c_1^* = 0$,则(5.21)可化成

$$\frac{x^{*2}}{a_3^2} - \frac{y^{*2}}{b_3^2} = 0, {(5.27)}$$

把左边分解因式, 可看出这个方程表示一对相交直线。

情形3. a'11 与 a'22 中有一个为零(不可能全为零)

由于抛物线的标准方程中平方项系数有一个为零,所以把消去交叉项后,平方项系数有一个为零的二次曲线称 为 **拋 物型 曲**线。

此时不妨设 $a'_{11}=0$, $a'_{22}=0$ (如果 $a'_{11}=0$, $a'_{22}=0$, 则可将坐标 轴再转 $\frac{\pi}{2}$,即作坐标变换 x'=-y, y'=x; 从而 新 方 程中 $\overline{a_{11}}$

 $=0, \vec{a}_{22} \neq 0$)。这时方程(5.15)成为

$$a_{22}'y'^{2} + 2a_{1}'x' + 2a_{2}'y' + a_{0}' = 0, (5.28)$$

配方得

$$a_{22}' \left(y' + \frac{a_2'}{a_{22}'} \right)^2 + 2a_1'x' + a_0' - \frac{a_2'^2}{a_{22}'} = 0.$$
 (5.29)

[3,6] 若 41 + 0, 则作移轴

$$\begin{cases} x^* = x' + \frac{a'_{22}a'_{0} - a'_{2}^{2}}{2a'_{1}a'_{22}}, \\ y^* = y' + \frac{a'_{2}}{a'_{22}}, \end{cases}$$
 (5.30)

则(5,29)成为

$$a_{22}'y^{*2} + 2a_1'x^* = 0, (5.31)$$

显然这是抛物线的方程。

若 a'₁ = 0,则(5.29)成为

$$a_{22}' \left(y' + \frac{a_2'}{a_{22}'} \right)^2 + c_2^* = 0$$
, ## $c_2^* = a_0' - \frac{a_2'^2}{a_{22}'}$.

作移轴

$$\begin{cases} x^* = x', \\ y^* = y' + \frac{a_2'}{a_{22}'}, \end{cases}$$
 (5.32)

得

$$a_{22}^{\prime}y^{*2} + c_{2}^{*} = 0, \tag{5.33}$$

[3.7] 若 c 与 a 异号,则由(5.33)得

156

$$y^{*2} = \frac{-c^{*2}}{a_{22}}.$$
 (5.34)

显然,这个方程表示一对平行直线、

 a_{22} [3.8] 若 a_{22} 同号,则易看出为程(5.33) 无轨迹,有时称它表示一对虚平行直线。

[3,9] 若
$$c_2^* = 0$$
,则由(5.33)得
$$y^{*2} = 0.$$
 (5.35)

显然,这个方程表示一对重合直线(与 x*轴重合)。

综上述,经过直角坐标变换把二次曲线方程化简后,可以看出,二次曲线共有九类,其中椭圆型曲线有三类,椭圆,虚椭圆, 一个点,双曲型曲线有两类:双曲线,一对相交直线;抛物型曲线有四类:抛物线,一对平行直线,一对虚平行直线,一对重合直线。

椭圆,双曲线, 抛物线这三类统称为圆锥曲线。

1.3 例

例5.2 确定例5.1中的二次方程表示的二次曲线的类型、形状和位置, 并且画图。

解 例5.1中已通过转轴(转角 θ 是锐角,且 $tg\theta=1/2$)把二次 方程化简成

$$6x'^2 + y'^2 - 12\sqrt{5}x' + 18 = 0$$

因为 411 与 422 同号, 所以这是椭圆型曲线, 配方得

$$6(x'-\sqrt{5})^2+y'^2-12=0$$
,

作移轴

$$\begin{cases} x^* = x' - \sqrt{5}, \\ y^* = y', \end{cases}$$

貋

$$6x^{*2} + y^{*2} - 12 = 0,$$

$$\frac{x^{*2}}{2} + \frac{y^{*2}}{12} = 1.$$

这是椭圆,长轴在 y^* 轴上,长半轴为 $\sqrt{12}$,短半轴为 $\sqrt{2}$.

由例 5.1 的转轴公式和上述移轴公式,可得出总的坐标变换 公式为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^* + \sqrt{5} \\ y^* \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{cases} x = \frac{2}{\sqrt{5}}x^* - \frac{1}{\sqrt{5}}y^* + 2, \\ y = \frac{1}{\sqrt{5}}x^* + \frac{2}{\sqrt{5}}y^* + 1. \end{cases}$$




图 5.1

因此,最后的坐标系O*x*y*的原点O*在Oxy中的坐标为(2,1),而x轴到y*轴的转角 θ 满足 $tg\theta = \frac{1}{2}$,且 θ 为锐角。于是可确定出椭圆的位置。图就可以

例5.3 确定下述 二次方程表示的二次曲 线的类型、形状和位置, 并且画图。

画出了.

 $4x^2 + 8xy + 4y^2 + 13x + 3y + 4 = 0$

解 选取θ使满足

$$\operatorname{ctg} 2\theta = \frac{4-4}{8} = 0,$$

所以 $2\theta = \frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{3\pi}{2}$, 即, $\theta = \frac{\pi}{4}$ 或 $\frac{3\pi}{4}$ 。取 $\theta = \frac{\pi}{4}$, 于是

$$tg\theta = 1$$
, $cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $sin\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

从而

$$a'_{11} = a_{11} + a_{12} \operatorname{tg} \theta = 4 + 4 \times 1 = 8,$$

 $a'_{22} = a_{22} - a_{12} \operatorname{tg} \theta = 4 - 4 \times 1 = 0,$

$$\begin{pmatrix} a_1' \\ a_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{13}{2} \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

$$= \left(\begin{array}{c} 1\sqrt{2} \\ -\frac{5}{2}\sqrt{2} \end{array}\right),$$

$$a_0' = a_0 = 4$$

所以转轴后方程为


$$8x'^2 + 8\sqrt{2}x' - 5\sqrt{2}y' + 4 = 0$$

这是抛物型曲线,配方得

$$8\left(x' + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - 5\sqrt{2}y' = 0,$$

作移轴

$$\begin{cases} x^* = x' + \sqrt{\frac{2}{2}}, \\ y^* = y', \end{cases}$$



得新方程为 $8x^{*2}-5\sqrt{2}y^*$ = 0. 即

$$x^{*2} = \frac{5\sqrt{2}}{8}y^*$$
.

这是抛物线, 开口 朝着 y* 轴

正向,焦参数
$$p = \frac{5}{16}\sqrt{2}$$
.

总的坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^* - \frac{\sqrt{2}}{2} \\ y^* \end{pmatrix},$$

圳

$$\begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2} x^* - \frac{\sqrt{2}}{2} y^* - \frac{1}{2}, \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2} x^* + \frac{\sqrt{2}}{2} y^* - \frac{1}{2}. \end{cases}$$

于是 O*x*y*的原点 O* 在 Oxy 中的 坐标为 $\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$, x 轴 到 x* 轴 的转角为 $\frac{\pi}{A}$, 这样就可回图了。

习 题 5.1

- 1. 通过直角坐标变换确定下列二次方程表示的 曲线的 类型、形状和位置,并且画图。
 - (1) $11x^2 + 6xy + 3y^2 12x 12y 12 = 0;$
 - (2) $5x^2 + 12xy 22x 12y 19 = 0$;
 - (3) $x^2 2xy + y^2 10x 6y + 25 = 0$:

- (4) $3x^2 + 4xy + 2y^2 + 8x + 4y + 6 = 0$;
- (5) $x^2 + xy 2y^2 11x y + 28 = 0$;
- (6) $9x^2 8xy + 24y^2 32x 16y + 138 = 0$;
- (7) $6x^2 + 12xy + y^2 36x 6y = 0$;
- (8) $4x^2 4xy + y^2 2x 14y + 7 = 0$
- 2. 给定方程

$$(A_1x + B_1y + C_1)^2 + (A_2x + B_2y + C_2)^2 = 1$$

其中

$$A_1B_2 - A_2B_1 = 0$$
, $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$.

试经过适当坐标变换把上述方程化成标准形式, 并且指出此方程表示什么曲线。

§ 2 二次曲线的不变量

上节中,我们已经会通过转轴和移轴,把二次曲线方程化简成标准形式,由此确定曲线的类型、形状和位置。但是在不少问题中,常常希望直接从原二次方程的系数来判别它代表的曲线的类型和形状,本节就来解决这个问题。解决此问题的途径是:先讨论在直角坐标变换下,二次方程的系数(看成参变量)的哪些函数其函数值是保持不变的,然后我们就能确定原方程的系数与经过转轴和移轴得到的最简方程的系数之间的关系,从而就可用原方程的系数来直接判别曲线的类型和形状。

2.1 二次曲线的不变量和半不变量

曲线的方程一般是随着坐标系的改变而改变的,但是既然这些方程都是代表同一条曲线,它们就应该有某些共同性,也就是说它们的系数应该有某些共同的特性是不随坐标系的改变而变化的。刻划这种共同性的量,我们称它为不变量。确切地说

定义5.1 曲线方程系数的一个确定的 函数,如果 在任意一

个直角坐标变换下它的函数值不变,那么就称这个函数是这条曲线的一个**正交不变量**,简称为**不变量**。

不变量既然与直角坐标系的选择无关,于是它就反映了曲线本身的几何性质,因此找出曲线方程的不变量是解析几何研究中的一个重要课题。

定理5.1 在给定的直角坐 标系中,设二次 曲 线的 方程 为(5.1)。令

$$I_1 = a_{11} + a_{22}, \quad I_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix}, \quad I_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_2 \\ a_1 & a_2 & a_0 \end{vmatrix},$$

则 I_1, I_2, I_3 都是二次曲线的不变量。

证明 先证 I_1, I_2, I_3 在转轴下不变。

作转轴 a = Ta',§1中已算出转轴后新方程(5.12)的二次项部分 p'(x',y')的矩阵为 T^*AT ,于是

$$I'_2 = |T'AT| = |T'||A||T| = |T||A||T|$$

= $|T|^2|A| = |A| = I_2$

 I_1 是新方程 (5.12) 的平方项系数之和,亦即 T^*AT 的主对角元之和。川 t_{ij} 表示 T 的(i,j)元,则

$$\begin{split} I'_1 &= \sum_{i=1}^2 (T^i A T) \, \mathfrak{h}(i,i) \, \tilde{\pi} \\ &= \sum_{i=1}^2 \sum_{k=1}^2 [T^i \, \mathfrak{h}(i,k) \, \tilde{\pi}] \cdot [A T \, \mathfrak{h}(k,i) \, \tilde{\pi}] \\ &= \sum_{i=1}^2 \sum_{k=1}^2 t_{ki} \sum_{l=1}^2 a_{kl} t_{li} \\ &= \sum_{k=1}^2 \sum_{k=1}^2 t_{ki} \sum_{l=1}^2 a_{kl} \left(\sum_{i=1}^2 t_{ki} t_{li} \right) \underbrace{(**)}_{a_{11}} a_{11} + a_{22} = I_1, \end{split}$$

其中(*)步利用了连加号可以交換次序的性质;(**)步利用了T

是正交矩阵,因此,当k
eq l 时, $\sum_{i=1}^{2} t_{ki} t_{li} = 0$;当k = l 时,

$$\sum_{i=1}^{2} t_{ki} t_{li} = 1.$$

 I_3' 是新方程(5.12)的矩阵 P'的行列式,由(5.12)'知,

$$P' = \begin{pmatrix} T^{\prime} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & \delta \\ \delta^{\prime} & a_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T^{\prime} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} P \begin{pmatrix} T & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

所以

$$I_3' = |P'| = \left| \begin{array}{cc} T' & 0 \\ 0 & 1 \end{array} \right| |P| \left| \begin{array}{cc} T & 0 \\ 0 & 1 \end{array} \right|$$
$$= |T'| |P| |T| = |T|^2 |P| = |P| = I_3,$$

这里用到了T是正交矩阵,从而|T|=1或-1。

再证 I_1, I_2, I_3 在移轴下不变。

作移轴

$$\begin{cases} x = x^* + x_0, \\ y = y^* + y_0, \end{cases}$$
 (5.36)

将此移轴公式代入原二次方程(5.1)得

$$a_{11}(x^* + x_0)^2 + 2a_{12}(x^* + x_0)(y^* + y_0) + a_{22}(y^* + y_0)^2 + 2a_1(x^* + x_0) + 2a_2(y^* + y_0) + a_0 = 0,$$

整理得

$$a_{11}x^{*2} + 2a_{12}x^{*}y^{*} + a_{22}y^{*2} + 2(a_{11}x_{0} + a_{12}y_{0} + a_{1})x^{*}$$

$$+ 2(a_{12}x_{0} + a_{22}y_{0} + a_{2})y^{*} + a_{11}x_{0}^{2} + 2a_{12}x_{0}y_{0}$$

$$+ a_{22}y_{0}^{2} + 2a_{1}x_{0} + 2a_{2}y_{0} + a_{0} = 0,$$
(5.37)

这就是曲线 (5.1) 经过移轴后的新方程。如果新方程的系数用带 "*"号表示,则可写出新方程系数与原方程系数的关系:

$$\begin{cases} a_{11}^* = a_{11}, & a_{12}^* = a_{12}, & a_{22}^* = a_{22}, \\ a_{1}^* = a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_1, \\ a_{2}^* = a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_2, \\ a_{0}^* = F(x_0, y_0) = a_{11}x_0^2 + 2a_{12}x_0y_0 + a_{22}y_0^2 \\ &+ 2a_1x_0 + 2a_2y_0 + a_0, \end{cases}$$

$$(5.38)$$

由(5.38)即得

$$I_{1}^{*} = a_{11}^{*} + a_{22}^{*} = a_{11} + a_{22} = I_{1};$$

$$I_{2}^{*} = \begin{vmatrix} a_{11}^{*} & a_{12}^{*} \\ a_{12}^{*} & a_{22}^{*} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} = I_{2};$$

$$I_{3}^{*} = \begin{vmatrix} a_{11}^{*} & a_{12}^{*} & a_{1}^{*} \\ a_{12}^{*} & a_{22}^{*} & a_{2}^{*} \\ a_{1}^{*} & a_{2}^{*} & a_{0}^{*} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{11}x_{0} + a_{12}y_{0} + a_{1} \\ a_{12} & a_{22} & a_{12}x_{0} + a_{22}y_{0} + a_{2} \\ a_{11}x_{0} + a_{12}y_{0} + a_{1} & a_{12}x_{0} + a_{22}y_{0} + a_{2} & F(x_{0}, y_{0}) \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{1} \\ a_{12} & a_{22} & a_{2} \\ a_{11}x_{0} + a_{12}y_{0} + a_{1} & a_{12}x_{0} + a_{22}y_{0} + a_{2} & a_{1}x_{0} + a_{2}y_{0} + a_{0} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{1} \\ a_{12} & a_{22} & a_{2} \\ a_{11}x_{0} + a_{12}y_{0} + a_{1} & a_{12}x_{0} + a_{22}y_{0} + a_{2} & a_{1}x_{0} + a_{2}y_{0} + a_{0} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{1} \\ a_{12} & a_{22} & a_{2} \\ a_{11}x_{0} + a_{12}x_{0} + a_{12}x_{0} + a_{22}y_{0} + a_{2} & a_{1}x_{0} + a_{2}y_{0} + a_{0} \end{vmatrix}$$

其中第(1)步是分别把第 1 列的 $-x_0$ 倍和第 2 列的 $-y_0$ 倍加 到第 3 列,第(2) 步 是 分 别把 第 1 行的 $-x_0$ 倍和第 2 行的 $-y_0$ 倍加 到第 3 行。

综上述知, I_1,I_2,I_3 是不变量。

定理5.2 设二次曲线在直角坐标系 Oxy 中 的方程为(5.1),

$$K_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_1 \\ a_1 & a_0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_2 \\ a_2 & a_0 \end{vmatrix},$$

则在转轴下, K_1 不变,并且对于 $I_2 = I_8 = 0$ 的二次曲线, K_1 在移轴下也不变。称 K_1 是二次曲线的半不变量。

证明 作转轴 $\alpha = T\alpha'$,则因为 $\delta' = T'\delta$,所以有

$$K'_{1} = \begin{vmatrix} a'_{11} & a'_{1} \\ a'_{1} & a'_{0} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a'_{22} & a'_{2} \\ a'_{2} & a'_{0} \end{vmatrix}$$

$$= (a'_{11} + a'_{22})a_{0} - (a'_{1}^{2} + a'_{2}^{2}) = I'_{1}a_{0} - \delta'^{4}\delta'$$

$$= I_{1}a_{0} - (T^{4}\delta)^{4}(T^{4}\delta) = I_{1}a_{0} - \delta^{4}TT^{4}\delta$$

$$= I_{1}a_{0} - \delta^{4}\delta = I_{1}a_{0} - (a_{1}^{2} + a_{2}^{2}) = K_{1}.$$

对于 $I_2 = I_3 = 0$ 的二次 曲线,由 $I_2 = 0$,得 $a_{11}a_{22} = a_{12}^2$,即, $a_{11}: a_{12} = a_{12}: a_{22}$,此时 a_{11} 和 a_{22} 至少有一个不 为零(否则 会有 $a_{11} = a_{22} = a_{12} = 0$,矛盾),不妨设 $a_{22} \neq 0$,记 $a_{11}: a_{12} = a_{12}: a_{22} = l$ 。 此时有

$$I_{3} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{1} \\ a_{12} & a_{22} & a_{2} \\ a_{1} & a_{2} & a_{0} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} la_{12} & la_{22} & a_{1} \\ a_{12} & a_{22} & a_{2} \\ a_{1} & a_{2} & a_{0} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & a_{1} - la_{2} \\ a_{12} & a_{22} & a_{2} \\ a_{1} & a_{2} & a_{0} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & a_{1} - la_{2} \\ a_{12} & a_{22} & a_{2} \\ a_{1} & a_{2} & a_{0} \end{vmatrix}$$
$$= (a_{1} - la_{2}) \begin{vmatrix} a_{12} & a_{22} \\ a_{1} & a_{2} \end{vmatrix} = (a_{1} - la_{2}) \begin{vmatrix} 0 & a_{22} \\ a_{1} - la_{2} & a_{2} \end{vmatrix}$$
$$= -a_{22}(a_{1} - la_{2})^{2},$$

因为 $I_3 = 0$, $a_{22} \neq 0$, 所以 $a_1 - la_2 = 0$. 于是得到 $a_{11} : a_{12} = a_{12} : a_{22} = a_1 : a_2 = l. \tag{5.39}$

现在作移轴 $\alpha = \alpha^* + \alpha_0$, 由(5.38)得

$$\begin{vmatrix} a_{11}^{*} & a_{1}^{*} \\ a_{1}^{*} & a_{0}^{*} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{11}x_{0} + a_{12}y_{0} + a_{1} \\ a_{11}x_{0} + a_{12}y_{0} + a_{1} & F(x_{0}, y_{0}) \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}y_{0} + a_{1} \\ a_{11}x_{0} + a_{12}y_{0} + a_{1} & a_{12}x_{0}y_{0} + a_{22}y_{0}^{2} + a_{1}x_{0} + 2a_{2}y_{0} + a_{0} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}y_{0} + a_{1} \\ a_{12}y_{0} + a_{1} & a_{22}y_{0}^{2} + 2a_{2}y_{0} + a_{0} \end{vmatrix}$$
(5.40)

若 (羊0,(5,40)式等于

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \frac{1}{t}a_{11}y_0 + a_1 \\ \frac{1}{t}a_{11}y_0 + a_1 & \frac{1}{t^2}a_{11}y_0^2 + 2\frac{1}{t}a_1y_0 + a_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_1 \\ \frac{1}{t}a_{11}y_0 + a_1 & \frac{1}{t}a_1y_0 + a_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_1 \\ a_1 & a_0 \end{vmatrix},$$

$$\left|\begin{array}{cc} a_{11}^* & a_{1}^* \\ a_{1}^* & a_{0}^* \end{array}\right| = \left|\begin{array}{cc} a_{11} & a_{1} \\ a_{1} & a_{0} \end{array}\right|.$$

类似地可证

$$\left|\begin{array}{cc} a_{22}^{\bullet} & a_{2}^{\bullet} \\ a_{2}^{\bullet} & a_{0}^{\bullet} \end{array}\right| = \left|\begin{array}{cc} a_{22} & a_{2} \\ a_{2} & a_{0} \end{array}\right|.$$

因此, $K_1^* = K_1$ 。这表明,对于 $I_2 = I_3 = 0$ 的二次曲线, K_1 在移轴下也是不变的。

注意,对于任意二次曲线, K_1 在移轴下其函数值可能变化。

2.2 利用不变量确定二次曲线的类型和形状

设二次曲线的方程(5.1)经过直角坐标变换化成了最简形式。 情 1 形和2. 椭圆型和双曲型曲线,此时最简方程为

$$a_{11}'x^{*2} + a_{22}'y^{*2} + c_1^* = 0.$$

当 a'_{11} 与 a'_{22} 同(异) 号时,为椭圆型(双曲型)。由于 I_1 和 I_2 是不变量,所以有

$$\begin{cases}
a'_{11} + a'_{22} = I_1, \\
a'_{11}a'_{22} = I_2,
\end{cases} (5.41)$$

于是, a'_{11} 与 a'_{22} 同号的充分必要条件是 $I_2>0$ 。这表明,若 $I_2>0$,则曲线为椭圆型;若 $I_2<0$,则为双曲型。从(5,41)还看出, a'_{11} 和 a'_{22} 是一元二次方程

$$\lambda^2 - I_1 \lambda + I_2 = 0, (5.42)$$

的两个实根。称(5,42)是二次曲线 (5.1) 的特征方程,它的两个实根称为二次曲线 (5.1) 的特征根,记作 λ_1, λ_2 。注意由于方程 (5,42)的判别式

$$I_{1}^{2} - 4I_{2} = (a_{11} + a_{22})^{2} - 4(a_{11}a_{22} - a_{12}^{2})$$
$$= (a_{11} - a_{22})^{2} + 4a_{12}^{2} \ge 0,$$

所以此方程一定有两个不等或相等的实根。

因为 I_3 也是不变量。所以有

$$I_3 = \begin{vmatrix} a'_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a'_{22} & 0 \\ 0 & 0 & c_1^* \end{vmatrix} = a'_{11}a'_{22}c_1^* = I_2c_1^*,$$

从而得

$$c_1^* = \frac{I_3}{I_2}. (5.43)$$

这样椭圆型或双曲型曲线的最简方程(5.21)可写成:

$$\lambda_1 x^{*2} + \lambda_2 y^{*2} + \frac{I_3}{I_2} = 0. ag{5.44}$$

由最简方程(5.44)可以确定二次曲线的形状,并且得出判别曲线所属的类的方法:在 $I_2>0$ 时,若 I_3 与 I_1 异号,则曲线(5.1)是椭圆,若 I_3 与 I_1 同号,则曲线(5.1)是虚椭圆;若 $I_3=0$,则曲线(5.1)是一个点。在 $I_2<0$ 时,若 I_3 =0,则曲线(5.1)是一个点。在 $I_2<0$ 时,若 I_3 =0,则曲线(5.1)是一对相交直线。

情形3. 抛物型曲线。

[3.6] 抛物线, 其最简方程为

$$a'_{22}y^{*2} + 2a'_{1}x^{*} = 0$$
, 其中 $a'_{22} \neq 0$, $a'_{1} \neq 0$.

由于 I_1, I_2, I_3 是不变量,因此有

$$I_1 = a'_{22}, I_2 = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & a'_{22} \end{vmatrix} = 0,$$

$$I_{3} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & a'_{1} \\ 0 & a'_{22} & 0 \\ a'_{1} & 0 & 0 \end{vmatrix} = -a'_{22}a'_{1}^{2} = -I_{1}a'_{1}^{2}.$$

于是最简方程(5,31)可写成

$$I_1 y^{*2} \pm 2\sqrt{-\frac{I_3}{I_1}} x^* = 0.$$
 (5.45)

[3.7]一[3.9] 此时最简方程为 $a'_{2}y^{*2} + c_{2}^{*} = 0$, 其中 $a'_{2} \neq 0$.

算出 $I_1 = a'_{22}$, $I_2 = 0$, $I_3 = 0$ 。由于 $I_2 = I_3 = 0$,因此, K_1 在 转 轴 和移轴下均不变,从而有

$$K_1 = \left| \begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 0 & c_2^* \end{array} \right| + \left| \begin{array}{cc} a_{22}' & 0 \\ 0 & c_2^* \end{array} \right| = a_{22}' c_2^* = I_1 c_2^*,$$

于是最简方程(5.33)可写成

$$I_1 y^{*2} + \frac{K_1}{I_1} = 0. ag{5.46}$$

综上述知, $I_2=0$ 时,曲线(5.1)为抛物型。此时,若 I_3 =0,

型别	类 别	识别标志	化简后方程
(1)椭圆型	1. 椭圆。 2. 虚椭圆。 3. 一个点。	I ₃ 与 I ₁ 异号, I ₄ 与 I ₁ 同号, I ₅ = 0;	$\lambda_1 x^{*2} + \lambda_2 y^{*2} + \frac{I_3}{I_2}$ = 0, 其中 λ_1, λ_2 是 方程 $\lambda^2 - I_1 \lambda + I_2 = 0$ 的两个实根。
(I)双曲型 I2<0	4. 双曲线。 5. 一对相交直线;	$I_3 = 0,$ $I_3 = 0;$	
(I) 拋物型 I ₂ =0	6. 抛物线;	I 2 ≥ 03	
	7. 一对平行直线, 8. 一对虚平行直线, 9. 一对重合直线。	$I_{3} = 0, K_{1} < 0,$ $I_{3} = 0, K_{1} > 0,$ $I_{5} = 0, K_{1} = 0,$	$I_1 y^{*2} + \frac{K_1}{I_1} = 0.$

则曲线(5.1)为抛物线,其形状由方程(5.45)可确定,若 $I_3 = 0$,则又分三种情况: $K_1 < 0$ 时,曲线(5.1)为一对平行直线(从方程(5.46)可以看出); $K_1 > 0$ 时,为一对虚平行直线; $K_1 = 0$ 时,为一对重合直线。

从上面看到,利用二次曲线的不变量 I_1,I_2,I_3 和半不变量 K_1 ,就能完全确定曲线的类型和形状。把上述结果列成一个表(见上页)。

2.3 例

例5.4 判断下列二次曲线的类型, 并且确定其形状。

(1)
$$x^2 - 3xy + y^2 + 10x - 10y + 21 = 0$$
;

(2)
$$x^2 + 4xy + 4y^2 - 20x + 10y - 50 = 0$$

解 (1)
$$I_1 = 1 + 1 = 2$$
;

$$I_2 = \begin{vmatrix} 1 & -\frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & 1 \end{vmatrix} = -\frac{5}{4}.$$

因为 I_2 <0,所以这是双曲型曲线。

$$I_3 = \begin{vmatrix} 1 & -\frac{3}{2} & 5 \\ -\frac{3}{2} & 1 & -5 \\ 5 & -5 & 21 \end{vmatrix} = -\frac{5}{4}.$$

因为 I_a $\neq 0$,所以这是双曲线。

解特征方程 $\lambda^2-2\lambda-\frac{5}{4}=0$, 得

$$\lambda_1 = -\frac{1}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{5}{2}.$$

又 $\frac{I_3}{I_2}=1$. 于是方程可化简成;

$$-\frac{1}{2}x^{*2}+\frac{5}{2}y^{*2}+1=0,$$

賏

$$\frac{x^{*2}}{2} - \frac{y^{*2}}{\frac{2}{5}} = 1.$$

于是这条双曲线的 实半轴 $a=\sqrt{2}$, 虛半 轴 $b=\sqrt{\frac{2}{5}}=\frac{1}{5}\sqrt{10}$.

(2)
$$I_1 = 1 + 4 = 5$$
; $I_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0$.

这是抛物型曲线。

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -10 \\ 2 & 4 & 5 \\ -10 & 5 & -50 \end{bmatrix} = -625.$$

因为 I_3 = 0, 所以这是 抛物线。 计算 $\sqrt{-\frac{I_3}{I_1}} = \sqrt{\frac{625}{5}} = 5\sqrt{5}$. 于是方程可化简成:

$$5y^{*2} \pm 10\sqrt{5}x^* = 0,$$

$$y^{*2} \pm 2\sqrt{5}x^* = 0.$$

肌

因此这条抛物线的 焦参数 $p = \sqrt{5}$.

例5.5 按参数 λ 的值讨论下述曲线的类型。

$$\lambda x^2 - 2xy + \lambda y^2 - 2x + 2y + 5 = 0$$

解 $I_1 = 2\lambda$,

$$I_2 = \lambda^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda + 1)$$
,

$$I_8 = 5\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 5(\lambda + \frac{3}{5})(\lambda - 1),$$

$$K_1 = 10\lambda - 2 = 2(5\lambda - 1)$$
.

- (1) 当 $|\lambda| > 1$ 时, $I_2 > 0$,属椭圆型。
- 1.1) 当 $\lambda > 1$ 时, $I_1 > 0$, $I_2 > 0$,因此是虛椭圆;

- 1.2) 当 $\lambda < -1$ 时, $I_1 < 0$, $I_2 > 0$,因此是椭圆。
- (2) 当 | 시 < 1 时, /2 < 0, 属双曲型。
- 2.1) 当 $-1 < \lambda < 1$, 且 $\lambda = -\frac{3}{5}$ 时, $I_3 = 0$, 是双曲线;
- 2.2) 当 $\lambda = -\frac{3}{5}$ 时, $I_3 = 0$,是一对相交直线。
- (3) 当[λ]=1时, $I_2=0$,属抛物型。
- 3.1) 当 $\lambda = 1$ 时, $I_3 = 0$, $K_1 = 8 > 0$, 是一对虚平行直线;
- 3.2) 当 $\lambda = -1$ 时, $I_3 \neq 0$, 是拋物线。




图 5.3

习 题 5.2

- 1. 判断下列二次曲线的类型, 并且确定其形状。
- (1) $6xy + 8y^2 12x 26y + 11 = 0$;
- (2) $x^2 + 2xy + y^2 8x + 4 = 0$;
- (3) $5x^2 + 8xy + 5y^2 18x 18y + 9 = 0$;
- (4) $5x^2 16xy + 29y^2 + 10x 34y + 9 = 0$;
- (5) $x^2 + xy 2y^2 11x y + 28 = 0$;
- (6) $8x^2 + 8xy + 2y^2 6x 3y 5 = 0$
- 2. 当λ取何值时,方程

$$\lambda x^2 + 4xy + y^2 - 4x - 2y - 3 = 0$$

表示一对直线?

3. 按参数 λ 的值讨论下列曲线的类型。

- (1) $(1 + \lambda^2)(x^2 + y^2) 4\lambda xy + 2\lambda(x + y) + 2 = 0$;
- (2) $x^2 4xy + 4y^2 + 8y + 3 + 2\lambda(-2xy x 1) = 0$.
- 4. 证明: 二次方程(5.1)表示一个圆的充分必要条件 是 I_1^2 = $4I_2$, $I_1I_3 < 0$.
- 5. 证明:二次方程(5.1)表示一条等轴双曲线或两条互相 垂直的直线的充分必要条件是 $I_1=0$.
- 6. 设二次方程(5.1)表示一对平行直线,证明,这对 平 行 直线间的距离为

$$d = \sqrt{-\frac{4K_1}{I_1^2}}.$$

7. 证明: 抛物线 $y^2 = 2px$ 满足 $I_1 I_3 < 0$.

§ 3 二次曲线的对称中心

上一节我们利用二次曲线的不变量和华不变量直接从原方程的系数确定了曲线的类型和形状,那末能否直接从原方程确定曲线的位置呢? 譬如,椭圆,只要能从原方程的系数求出它的对称中心和两根对称轴(长轴和短轴),则椭圆的位置就确定了。因此,从本节开始,我们来讨论如何直接从原方程判别二次曲线有沒有对称中心和对称轴,如果有的话,如何求出它们。我们还要讨论如何直接从原方程求出二次曲线的切线和法线,求出双曲线的渐近线等。由于二次曲线的对称轴、切线、渐近线都是直线,因此我们就从讨论直线与二次曲线的相关位置入手。

3.1 直线与二次曲线的相关位置

设二次曲线S的方程为(5.1),设直线l 过点 $M_0(x_0,y_0)$,方向向量为 $o(\mu,\nu)$,则l 的参数方程为:

$$\begin{cases} x = x_0 + \mu t, \\ y = y_0 + \nu t, \end{cases} - \infty < t < + \infty.$$
 (5.47)

为了讨论直线 l 与二次曲线 S 的 相 关 位 置,我们把(5.47)代入(5.1),经整理得:

$$\varphi(\mu, \nu) t^{2} + 2 [F_{1}(x_{0}, y_{0}) \mu + F_{2}(x_{0}, y_{0}) \nu] t + F(x_{0}, y_{0}) = 0,$$
 (5.48)

其中 F(x,y)是(5.1)的左端的多项式, $\varphi(x,y)$ 是 F(x,y)的 二次项部分,

 $F_1(x,y) := a_{11}x + a_{12}y + a_1, \quad F_2(x,y) := a_{12}x + a_{22}y + a_{2\bullet}$

情形 1. 若 $\varphi(\mu,\nu)$ \Rightarrow 0, 则(5.48) 是 t 的二次方程, 它 的判别式

 $\Delta = 4[F_1(x_0, y_0)\mu + F_2(x_0, y_0)\nu]^2 - 4\varphi(\mu, \nu)F(x_0, y_0).$

- 1.1) 若 *∆*>0,则 *l* 与 *S* 有两个不同交点;
- 1.2) 若A=0, 则 I 与 S 有两个重合变点;
- 1.3) 若 Δ <0, 则 ℓ 与 S 沒有交点, 但由于(5.48)有两个共轭复根, 因此称 ℓ 与 S 有两个虚交点。

情形2、 若 $\varphi(\mu,\nu)=0$,

- 2.4) 若 $F_1(x_0,y_0)\mu + F_2(x_0,y_0)\nu = 0$,则(5.48)是 t 的一 次 方程,从而 t 与 s 有一个交点;
- 2.5) 若 $F_1(x_0, y_0)\mu + F_2(x_0, y_0)\nu = 0$, 且 $F(x_0, y_0) = 0$, 则 (5.48)成了恒等式,即任一实数 t 都是(5.48)的解,从而整条直线 t 都在二次曲线 s 上,
- 2.6) 若 $F_1(x_0, y_0)\mu + F_2(x_0, y_0)\nu = 0$, 且 $F(x_0, y_0) \neq 0$, 则 (5.48) 无解,从而 l = S 沒有交点。

定义5.2 设二次曲线 S 的方程为(5.1),若非零向量 v 的坐标(μ , ν)满足 $\varphi(\mu$, ν) = 0,则称 v 是 S 的渐近方向;若满足 $\varphi(\mu,\nu)$ = 0,则称 v 是 S 的非渐近方向。

定理5.3 椭圆型曲线(即 $I_2>0$)沒有渐近方向,双曲型曲线($I_2<0$)有两个渐近方向,抛物型曲线($I_2=0$)有一个渐近方向。

$$\mu : \nu \approx -a_{12} : a_{11} = -a_{22} : a_{12}.$$

证明 设 $v(\mu,\nu)$ 是二次曲线S的渐近方向,则有 $a_{11}\mu^2 + 2a_{12}\mu\nu + a_{22}\nu^2 = 0$, (5.49)

因为μ,ν不全为零,不妨设ν+0,则由(5.49)得

$$a_{11} \left(\frac{\mu}{\nu}\right)^2 + 2a_{12} \frac{\mu}{\nu} + a_{22} = 0$$

既然一元二次方程 $a_{11}z^2 + 2a_{12}z + a_{22} = 0$ 有 实 根 $\frac{\mu}{\nu}$,因此它的判别式 $\Delta = 4a^{22} - 4a_{11}a_{22} \ge 0$,即 $I_2 \le 0$ 。这说明, $I_2 > 0$ 时, S 没有渐近方向。

 I_2 <0时,由于 Δ >0,因此上述一元二次方程有两个不等实根,从而得到 S的两个渐近方向, I_2 =0 时,由于 Δ =0,因此该二次方程有相等的两个实根,从而得到 S的一个渐近方向:

$$\frac{\mu}{\nu} = \frac{-2a_{12}}{2a_{11}} = -\frac{a_{12}}{a_{11}},$$

由 $I_2=0$ 还可推出

$$-\,a_{12};a_{11}=\,-\,a_{22};a_{12\bullet}$$

3.2 二次曲线的对称中心

读者已经知道,椭圆和双曲线都有一个对称中心,而抛物线 沒有对称中心。其他几种二次曲线有沒有对称中心?如果一条二 次曲线有对称中心,如何直接从原方程求出它的对称中心?本小 节就来讨论这些问题。

定义5.3 点 O' 称 为曲线 S 的对称中心(简称为中心),如果 S 上任一点 M_1 关于O' 的对称点 M_2 仍在 S 上。

定理5.4 点 $O'(x_0, y_0)$ 是二次曲线 S (它 的方程是(5.1)) 的对称中心的充分必要条件为 O' 的坐标(x_0, y_0)是方程组

$$\begin{cases} F_1(x,y) = 0, \\ F_2(x,y) = 0 \end{cases}$$
 (5.50)

的解.

174

证明 必要性。设 $O'(x_0,y_0)$ 是二次曲线S的对称中心,任取S的一个非渐近方向 (μ,ν) ,则过 $O'(x_0,y_0)$ 且方向为 (μ,ν) 的直线 l 与S有两个(不同的,或重合的,或虚的)交点 $M_1(x_1,y_1)$ 和 $M_2(x_2,y_2)$ 。由于O'是S的对称中心,所以O'是 线段 M_1M_2 的中点,于是

$$x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}, \qquad y_0 = \frac{y_1 + y_2}{2}.$$
 (5.51)

设 M₄对应的参数值为4,则有

$$\begin{cases} x_i = x_0 + \mu t_i, \\ y_i = y_0 + \nu t_i, \end{cases}$$
 $i = 1, 2.$ (5.52)

将(5.52)代入(5.51)得

$$2x_0 = 2x_0 + \mu(t_1 + t_2), \quad 2y_0 = 2y_0 + \nu(t_1 + t_2),$$

于是得

$$\mu(t_1 + t_2) = 0$$
, $\nu(t_1 + t_2) = 0$.

由于 μ,ν 不全为零,因此, $t_1+t_2=0$ 。

因为 $M_i(i=1,2)$ 是 l 与 S 的交点,所以它 对 应 的 参 数 值 $t_i(i=1,2)$ 是 l 的二次方程(5.48)的根。据韦达定理得

$$t_1 + t_2 = \frac{-2}{\varphi(\mu, \nu)} [F_1(x_0, y_0) \mu + F_2(x_0, y_0) \nu]_{\bullet}$$

再由 t₁+t₂=0,得

$$\mu F_1(x_0, y_0) + \nu F_2(x_0, y_0) = 0. \tag{5.53}$$

(5.53)对于S的任意非渐近方向 (μ,ν) 都成立,取S的两个 不 共 线的非渐近方向 $\sigma_1(\mu_1,\nu_1)$ 和 $\sigma_2(\mu_2,\nu_2)$,则得

$$\begin{cases} \mu_1 F_1(x_0, y_0) + \nu_1 F_2(x_0, y_0) = 0, \\ \mu_2 F_1(x_0, y_0) + \nu_2 F_2(x_0, y_0) = 0, \end{cases}$$
 (5.54)

这说明 $(F_1(x_0,y_0),F_2(x_0,y_0))$ 是齐次线性方程组

$$\begin{cases} \mu_1 x + \nu_1 y = 0, \\ \mu_2 x + \nu_2 y = 0 \end{cases}$$
 (5.55)

的解,由于四与四,不共线,因此,

$$\begin{vmatrix} \mu_1 & \nu_1 \\ \mu_2 & \nu_2 \end{vmatrix} \rightleftharpoons 0,$$

从而方程组(5.55)只有零解, 所以有

$$\begin{cases}
F_1(x_0, y_0) = 0, \\
F_2(x_0, y_0) = 0.
\end{cases}$$

充分性。 若点 O' 的坐标 (x_0, y_0) 是 方 程 组(5.50)的 解,则 $F_1(x_0, y_0) = 0$, $F_2(x_0, y_0) = 0$.

作移轴, 使 O' 为新坐标系原点, 于是移轴公式为

$$\begin{cases} x = x' + x_0, \\ y = y' + y_0, \end{cases}$$

代入S的原方程(5.1),得到S的新方程为。

 $a_{11}x'^2 + 2a_{12}x'y' + a_{22}y'^2 + F(x_0, y_0) = 0$. (5.56) (5.56)中用-x'代x',用-y'代y',方程不变,所以O'是 S 的对称中心。

定理5.5 $I_2 \neq 0$ 时,二次曲线 S 有唯一的对称中心, $I_2 = 0$,且 $I_3 = 0$ 时,S 有无穷多个对称中心,它们组成一条直线,称它是 S 的中心直线,其方程为 $F_1(x,y) = 0$ (或者 $F_2(x,y) = 0$); $I_2 = 0$,但 $I_3 \neq 0$ 时,S 沒有对称中心。

证明 方程组(5.50)就是

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{1} = 0, \\ a_{12}x + a_{22}y + a_{2} = 0, \end{cases}$$
 (5.50)

显然, I_2 $\div 0$ 时,方程组(5.56)'有唯一解,因此S 有唯一的对称中心。

 $I_2 = I_3 = 0$ 时,据定理5.2的证明过程知,

$$a_{11}: a_{12} = a_{12}: a_{22} = a_1: a_2 = l_{\bullet}$$

于是方程组(5.50)′可以写成

$$\begin{cases} l(a_{12}x + a_{22}y + a_{2}) = 0, \\ a_{12}x + a_{22}y + a_{2} = 0. \end{cases}$$

显然这个方程组有无穷多个解,从而 S 有无穷多个对称中心,并 且它们恰好组成一条直线

$$a_{12}x + a_{22}y + a_2 = 0_{\bullet}$$

 $I_2=0$,但 $I_3 \Rightarrow 0$ 时, $a_{11}:a_{12}=a_{12}:a_{22} \Rightarrow a_1:a_2$,因此方程组(5.50)′无解,从而 S 沒有对称中心。

我们把具有唯一对称中心的二次曲线称为中心型曲线,把沒有对称中心或者有无穷多个对称中心的二次曲线称为非中心型曲线,其中沒有对称中心的称为无心曲线,有无穷多个对称中心的称为线心曲线。于是椭圆型和双曲型曲线都是中心型曲线;而抛物型曲线是非中心型的,其中抛物线是无心曲线,一对 平 行 直线、一对虚平行直线、一对重合直线都是线心曲线。

习 题 5.3

1. 求直线

$$\begin{cases} x = 2 + 3t, \\ y = -1 + 2t \end{cases}$$

与下列二次曲线的交点。

(1)
$$2x^2 - 2xy + \frac{3}{2}y^2 - 2x = 0$$
;

- (2) $x^2 y^2 x y + 1 = 0$.
- 2. 下列二次曲线有沒有渐近方向? 若有,则求出它们。
- (1) $x^2 3xy 10y^2 + 6x 8y = 0$;
- (2) $x^2 + xy 2y^2 11x y + 28 = 0$;
- (3) $x^2 + 2xy + y^2 8x + 4 = 0$;
- (4) $8x^2 + 8xy + 2y^2 6x 3y 5 = 0$
- 3、 求下列二次曲线的对称中心。
- (1) $5x^2 + 8xy + 5y^2 18x 18y + 11 = 0$;
- (2) 2xy 4x + 2y + 11 = 0;
- (3) $4x^2 + 4xy + y^2 10x 5y + 6 = 0$

- (4) $x^2 2xy + y^2 3x + 2y 11 = 0$
- 4. 当 λ, μ 满足什么条件时,二次曲线 $x^2 + 6xy + \lambda y^2 + 3x + \mu y 4 = 0$
- (1) 有唯一的中心;
- (2) 沒有中心;
- (3) 有一条中心直线。
- 5. 若方程(5.1)表示一条中心型曲线,写出中心是原 点 的条件。
- 6. 设二次曲线 S 过点(2,3),(4,2),(-1,-3), 且以点(0,1)为中心,求S的方程。

§ 4 二次曲线的直径和对称轴

我们已经知道,椭圆、双曲线和抛物线都有对称轴,如何直接从它们的原方程求出它们的对称轴?

定义5.4 直线l 称为曲线S 的对称轴,如果对于曲线S 上的任一点 $M_1(x_1,y_1)$,它关于直线l 的对称点 $M_2(x_2,y_2)$ 也在 曲 线 S 上。




图 5.4 中点所在的直线。

我们把曲线 S 上的两个点的连线段称为 S 的一条弦。从定义5.4知道,若直线 l 是圆锥 曲线 S 的对称轴,则 l 经过 S 的某一组 平行弦的中点,并且 l 跟这组平行弦方向垂直(如图 5.4)。因此 为了研究圆锥曲线 S 的对称轴,我们就先来研究 S 的一组平行弦

4.1 二次曲线的直径

定理5.6 二次曲线S的沿非渐近方向 (μ,ν) 的平行弦的中点

都在一条直线上,它的方程是

$$\mu F_1(x,y) + \nu F_2(x,y) = 0, \qquad (5.57)$$

证明 任取沿非渐近方向(μ,ν)的一条弦 M_1M_2 , 由定理 5.4 的证明知, M_1M_2 的中点的坐标满足方程

$$\mu F_1(x,y) + \nu F_2(x,y) = 0,$$

(5.58)的一次项系数一定不全为零,因为假如

$$\begin{cases} a_{11}\mu + a_{12}\nu = 0, \\ a_{12}\mu + a_{22}\nu = 0, \end{cases}$$

则得

$$\mu(a_{11}\mu + a_{12}\nu) + \nu(a_{12}\mu + a_{22}\nu) = 0,$$

肌

$$a_{11}\mu^2 + 2a_{12}\mu\nu + a_{22}\nu^2 = 0\,,$$

亦即

$$\varphi(\mu,\nu)=0$$

这说明(μ , ν)是S的渐近方向,矛盾。因此(5.58)是x,y的一次方程,从而它表示一条直线。于是,沿(μ , ν)方向的平行弦的中点都在这条直线上。

定义5.5 二次曲线S的沿非渐近方向 (μ,ν) 的平行弦中点所在的直线称为S的共轭于方向 (μ,ν) 的直径。


由定理5.6知,二次曲线S的共轭于方向 (μ,ν) 的直径的方程。是

$$\mu F_1(x,y) + \nu F_2(x,y) = 0,$$

或者写成(5.58)的形式。

推论5.1 中心型曲线 或 线 心曲线的直径一定经过中心。

设 l 是 中心型 曲线 S 的共轭于非渐近方向(μ_1,ν_1)的 直径,则过中心,且方向为(μ_1,ν_1)的直线 l' 也是 S 的一条直径,事实上,易证 l' 是共轭于 l 的方向 (μ_2,ν_2)的直径。因此我们把 l 和



 ν 称为S的一对共轭直径(如图5.5)。

4.2 圆锥曲线的对称轴

设 l 是圆锥曲线 S 的对称轴,于是由本节开头一段知, l 是 S 的一条 直径, 并且 l 与它所共轭的非渐近 方 向(μ , ν)垂直。 因 此, l 的方程是

$$\mu F_1(x,y) + \nu F_2(x,y) = 0,$$

吅

$$(a_{11}\mu + a_{12}\nu)x + (a_{12}\mu + a_{22}\nu)y + a_1\mu + a_2\nu = 0$$

因为 ι 与(μ,ν)垂直, 所以有

$$-\mu(a_{12}\mu+a_{22}\nu)+\nu(a_{11}\mu+a_{12}\nu)=0,$$

벬

$$(a_{11}\mu + a_{12}\nu): \mu = (a_{12}\mu + a_{22}\nu): \nu$$
 (5.59)

为了从(5.59)解出 μ : ν ,我们以 ξ 表示(5.59)中两个比的公共 比值,于是得到方程组

$$\begin{cases} (a_{11} - \xi)\mu + a_{12}\nu = 0, \\ a_{12}\mu + (a_{22} - \xi)\nu = 0, \end{cases}$$
 (5.60)

因为μ,ν 不全为零, 所以

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \xi & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} - \xi \end{vmatrix} = 0,$$

即

$$\xi^2 - (a_{11} + a_{22})\xi + a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0$$
,

亦即

$$\xi^2 - I_1 \xi + I_2 = 0$$

这说明,(5.59)中的公共比值《是二次曲线》的特征根。把特征根《代入(5.60)中,求出 $\mu:\nu$,这称为属于《的**主方向**,若它是非渐近方向,则将它代到(5.57)即得《的对称轴的方程。

椭圆和双曲线的两条对称轴显然是一对共轭直径。

例5.6 求下列二次曲线的对称轴。

(1)
$$x^2 - 3xy + y^2 + 10x - 10y + 21 = 0$$
;

(2)
$$x^2 + 4xy + 4y^2 - 20x + 10y - 50 = 0$$

180

解 (1) $I_1 = 2$, $I_2 = -\frac{5}{4}$, $I_3 = -\frac{5}{4}$. 因此,这是双曲线。

解特征方程 $\lambda^2 - 2\lambda - \frac{5}{4} = 0$, 得 $\lambda_1 = -\frac{1}{2}$, $\lambda_2 = \frac{5}{2}$. 将它们分别代替(5.60)中的 ξ , 解 得, $\mu_1:\nu_1=1:1$, $\mu_2:\nu_2=-1:1$. 它们都是非渐近方向,将它们代入(5.57)中,求得两条对 称 轴 方 程为:

$$\left(x - \frac{3}{2}y + 5\right) + \left(-\frac{3}{2}x + y - 5\right) = 0,$$
$$-\left(x - \frac{3}{2}y + 5\right) + \left(-\frac{3}{2}x + y - 5\right) = 0.$$

整理得

ŊŢ

$$x + y = 0$$
 $\pi x - y + 4 = 0$.

(2) $I_1=5$, $I_2=0$, $I_3=-625$ 。 因此,这是抛物线。解 $\lambda^2-5\lambda=0$, 得 $\lambda_1=0$, $\lambda_2=5$ 。 用 $\lambda_1=0$ 代替(5.60)中的 ξ ,解 得 $\mu_1:\nu_1=-a_{12}:a_{11}$, 这是渐近方向。用 $\lambda_2=5$ 代替(5.60) 中的 ξ ,解得 $\mu_2:\nu_2=1:2$,这是非渐近方向,将它代到(5.57)中便得到对 称轴的方程为

$$1 \cdot (x + 2y - 10) + 2(2x + 4y + 5) = 0,$$
$$x + 2y = 0.$$

*4.3 从原方程的系数确定圆锥曲线的位置

我们已经会直接从原方程的系数求椭圆、双曲线的对称中心 和对称轴,如果我们还能确定椭圆的对称轴哪根是长轴,双曲线 的对称轴哪根是实轴,则椭圆、双曲线的位置就完全确定了。

定理5.7 对于椭圆,若取绝对值较小的特征根为 λ_1 ,则 椭圆的长轴方向是属于 λ_1 的主方向。对于双曲线,若取与 I_3 同 号的特征根为 λ_1 ,则双曲线的实轴的方向是属于 λ_1 的主方向。

证明 对于椭圆S,设它在原直角坐标 系 $I[O; \epsilon_1, \epsilon_2]$ 中的

$$\lambda_1 x^{*2} + \lambda_2 y^{*2} + \frac{I_3}{I_2} = 0,$$

者》、是绝对值较小的特征根,则易看出椭圆的长轴在 x*轴上,即长轴方向为 e_1 。设 e_1 的 I 坐 标 为 (b_{11},b_{21}) , e_2 的 I 坐 标 为 (b_{12},b_{22}) 。则转轴公式为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix},$$

其中Ⅰ到Ⅱ的过渡矩阵

$$T = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$

是正交矩阵。转轴后的方程的二次项部分的矩阵为 T'AT。由于再作移轴时,二次项的系数不改变,因此转轴后的方程的二次项系数为:

$$a_{11}' = \lambda_1, \quad a_{22}' = \lambda_2, \quad a_{12}' = 0$$

因此有

$$T \cdot AT = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

因为 $T^* = T^{-1}$,所以由上式得

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix},$$

比较等式两边的矩阵的(1,1)元和(2,1)元,得

$$\begin{cases} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} = \lambda_1b_{11}, \\ a_{12}b_{11} + a_{22}b_{21} = \lambda_1b_{21}. \end{cases}$$

期

$$\begin{cases} (a_{11} - \lambda_1)b_{11} + a_{12}b_{21} = 0, \\ a_{12}b_{11} + (a_{22} - \lambda_1)b_{21} = 0. \end{cases}$$

于是看出 b_{11} : b_{21} 就是属于 λ_1 的主方向,也就是长轴的方向 ≤ 1 就是属于 λ_1 的主方向。

对于双曲线 S,同上作转轴和移轴,使新方程 为 $\lambda_1 x^{*2} + \lambda_2 y^{*3} + \frac{I_3}{I_2} = 0$, 若取 λ_1 是与 I_3 同号的特征根,则易看出双曲线的实轴在 x^* 轴上,即实轴的方向是 e_1^* 。 由于上面已经证明 了 $e_1^*(b_{11},b_{21})$ 就 是属于 λ_1 的主方向,因此,双曲线的实轴方向是 λ_1 的 主方向。

例5.7 对于下述二次曲线,直接从原方程系数确定它的类型、形状和位置,并且画图。

$$x^2 - 3xy + y^2 + 10x - 10y + 21 = 0$$

解 在例5.4(1)中已算出:

$$I_1 = 2$$
, $I_2 = -\frac{5}{4}$, $I_3 = -\frac{5}{4}$,

这是双曲线。它的两个特征根为:

$$\lambda_1 = -\frac{1}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{5}{2}$$

它的标准方程是

$$\frac{x^{*2}}{2} - \frac{5}{2}y^{*2} = 1.$$

实半 轴 $a = \sqrt{2}$, 虛半 轴 $b = \frac{1}{5}\sqrt{10}$.

为了确定它的位置, 先求它的对称中心, 解方程组

$$\begin{cases} x - \frac{3}{2}y + 5 = 0, \\ -\frac{3}{2}x + y - 5 = 0, \end{cases}$$

4x = -2, y = 2. 因此对称中心 0' 为(-2,2).

再求对称轴,分别用 λ_1 , λ_2 代入(5.60) 中的 ξ , 解得 $\mu_1:\nu_1=1:1$, $\mu_2:\nu_2=-1:1$.

由于双曲线的对称轴必过中心, 所以方向为(1,1)的对称轴(即实轴), 4,的方程是,

$$\frac{x+2}{1}=\frac{y-2}{1},$$

Ш


$$x - y + 4 = 0.$$

方向为(-1,1)的对称轴与的方程是:

$$\frac{x+2}{-1} = \frac{y-2}{1}$$
,

IIII

$$x + y = 0$$



例5.8 对于下述二次 曲线,直接从原方程的系数

确定它的类型、形状和位置, 幷且画图。

$$x^2 + 4xy + 4y^2 - 20x + 10y - 50 = 0.$$

解 在例5.4(2)中已算出

$$I_1 = 5$$
, $I_2 = 0$, $I_3 = -625$,

这是抛物线。它的标准方程为

184

$$y^{*2} = 2\sqrt{5} x^*$$
.

在例 5.6(2) 中已录出它的对称轴的方程是

$$\mathbf{x} + 2\mathbf{y} = 0$$

方程组

$$\begin{cases} x^2 + 4xy + 4y^2 - 20x + 10y - 50 = 0, \\ x + 2y = 0, \end{cases}$$

期

$$\begin{cases} (x+2y)^2 - 20x + 10y - 50 = 0, \\ x+2y = 0, \end{cases}$$

亦即

$$\begin{cases} -20x + 10y - 50 = 0, \\ x + 2y = 0. \end{cases}$$




图 5.7

解得 x = -2, y = 1。所以顶点 O' 为(\(\pi 2, 1)).

考虑顶点右边的直线 x=0 与抛物线有无交点,为此看 方 程 411

$$\begin{cases} x^{2} + 4xy + 4y^{2} = 20x^{2} + 10y - 50 = 0, 14 \text{ } 20x^{2} \\ x = 0. \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} 4y^2 + 10y - 50 = 0, \\ x = 0. \end{cases}$$

由于第一个方程的判别式

$$\Delta = 10^2 - 4 \times 4 \times (-50) > 0,$$

所以此方程有实根,从而 x=0 与抛物线有交点,因此抛物 线 的 开口应当向右。

习 题 5.4

- 1. 求下列二次曲线的对称轴。
- (1) $5x^2 + 8xy + 5y^2 18x 18y + 9 = 0$;
- (2) 2xy 4x + 2y 3 = 0;
- (3) $x^2 4xy + 4y^2 5x + 6 = 0$
- 2. 岩 $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + a_0 = 0$ 表 示椭圆或双曲线,证明,对称轴是

$$a_{12}(x^2-y^2)-(a_{11}-a_{22})xy=0$$

3. 若方程(5.1)表示一条抛物线,证明: 顶点是原点的充分必要条件为:

$$a_{11}a_{1}^{2} + a_{22}a_{2}^{2} + 2a_{12}a_{1}a_{2} = 0$$
, $a_{0} = 0$.

- 4. 求曲线 $4xy 5y^2 + 2x + 6y + 1 = 0$ 的通过点(-4,2)的直 径和它的共轭直径。
 - 5. 证明: 圆的任意一对共轭直径彼此垂直。
- 6. 证明: 椭圆的任意一对共轭半径(即共轭直径上由 中 心 到椭圆上一点的距离)的长度的平方和是一常数。
- 7. 椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的一条弦在点(2,1)被等分,求出这条弦的斜率。
- 8. 求双曲线 $\frac{x^2}{9} \frac{y^2}{4} = 1$ 的被点(5,1)平分的弦与曲线的两个交点。
 - 9. 证明: 抛物型曲线的直径的方向一定是它的渐近方向。
 186

- 10. 证明,对于抛物线,沿渐近方向的每一条直线都是它的 直径。
- 11. 证明:对于中心型曲线,过中心且沿非渐近方向的直线都是它的直径。
- *12. 直接由方程的系数确定下列二次曲线的类型、形状和位置, 并且画图。

(1)
$$6xy + 8y^2 - 12x - 26y + 11 = 0$$
:

(2)
$$x^2 + 2xy + y^2 - 8x + 4 = 0$$
;

(3)
$$5x^2 + 8xy + 5y^2 - 18x - 18y + 9 = 0$$
;

(4)
$$x^2 - 4xy + 4y^2 + 8y + 3 = 0$$

*13. 求经过点(-2,-1)和(0,-2), 且以直线 x+y+1=0, x-y+1=0

为对称轴的二次曲线的方程。

*14. 设一条二次曲线 S 经过两条二次曲线 $x^2 + xy - 2y^2 + 6x - 1 = 0$ 和 $2x^2 - y^2 - x - y = 0$ 的四个交点,并且还经过(2, -2),求 S 的方程。

§5 二次曲线的切线,双曲线的渐近线

5.1 二次曲线的切线和法线

定义5.6 直线 l 如果与二次曲线 S 有两个重合的交点或者 l 在 S 上,则称 l 是 S 的切线, l 与 S 的交点称为切点。

首先来讨论怎样求经过二次曲线S上的一点 $M_0(x_0,y_0)$ 的切线l. 设切线l的方向是 (μ,ν) ,则l的参数方程是。

$$\begin{cases} x = x_0 + \mu t, \\ y = y_0 + \nu t, \end{cases} - \infty < t < + \infty.$$

代入二次曲线S的方程(5.1)中,得

$$\varphi(\mu,\nu)t^{2} + 2[\mu F_{1}(x_{0},y_{0}) + \nu F_{2}(x_{0},y_{0})]t + F(x_{0},y_{0}) = 0.$$
(5.48)

既然 l 是 S 的切线,因此 l 或者与 S 有两个重合的交点,或者 l 在 S 上。在前一情形有 $\varphi(\mu,\nu)$ \Rightarrow 0,且 t 的二次方程 (5.48) 的判别式 $\Delta=0$,由于 $M_0(x_0,y_0)$ 在 S 上,于是

$$\Delta = 4 [\mu F_1(x_0, y_0) + \nu F_2(x_0, y_0)]^2 - 4\varphi(\mu, \nu) F(x_0, y_0)$$

$$= 4 [\mu F_1(x_0, y_0) + \nu F_2(x_0, y_0)]^2.$$

因此 $\mu F_1(x_0, y_0) + \nu F_2(x_0, y_0) = 0. \tag{5.61}$

在后一情形, 有 $\varphi(\mu,\nu)=0$,且

$$\mu F_1(x_0, y_0) + \nu F_2(x_0, y_0) = 0.$$

总之,过二次曲线 S 上的点 $M_0(x_0,y_0)$ 的直线 l 如果是 S 的 切线,则 l 的方向(μ,ν)应满足(5.61)。 反之, 如果这样的直线 l 的方向(μ,ν)满足(5.61),则 l 或者在 S 上($\mathfrak{g}(\mu,\nu)=0$), 或者与 S 有两个重合的交点($\mathfrak{g}(\mu,\nu)$ $\mathfrak{s}(0)$,从而 l 是 S 的切线。

情形1. $F_1(x_0,y_0)$ 与 $F_2(x_0,y_0)$ 不全为零,则由(5.61)得

$$\mu: \nu = -F_2(x_0, y_0): F_1(x_0, y_0), \qquad (5.62)$$

因此过二次曲线S上的点 $M_0(x_0,y_0)$ 的切线l的方程为

$$\frac{x-x_0}{-F_2(x_0,y_0)} = \frac{y-y_0}{F_1(x_0,y_0)},$$

舠

188

$$(x - x_0)F_1(x_0, y_0) + (y - y_0)F_2(x_0, y_0) = 0, (5.63)$$

情形2. $F_1(x_0,y_0)=F_2(x_0,y_0)=0$. 此时任一方 向 (μ,ν) 都满足(5.61),从而过 $M_0(x_0,y_0)$ 的任意一条直线都是 S 的切线.

从上述讨论得到

定理5.8 设二次曲线 S 的方程为(5.1), $M_0(x_0,y_0)$ 是 S 上的一个点,如果 $F_1(x_0,y_0)$ 与 $F_2(x_0,y_0)$ 不全为零,则过 M_0 存在 S 的唯一的一条切线,它的方程是

$$(x-x_0)F_1(x_0,y_0)+(y-y_0)F_2(x_0,y_0)=0$$

如果 $F_1(x_0, y_0) = F_2(x_0, y_0) = 0$,则过 M_0 的 每一条直线都 是 S 的切线。

定义5.7 如果过曲线S上的点 $M_o(x_0,y_0)$ 的每一条 直 线 都

是S的切线,则称点M。是曲线S的奇(异)点。

现在再来讨论怎样求过二次曲线外 — 点 $M_1(x_1,y_1)$ 的 切 线 l ,此时 l 不可能整条直线在 S L ,因此 l 必与 S 有两个重合的交 点。设 l 的方向为(μ , ν),则它应满足

 $[\mu F_1(x_1, y_1) + \nu F_2(x_1, y_1)]^2 - \varphi(\mu, \nu) F(x_1, y_1) = 0, \quad (5.64)$ 因为 l 的方程为

$$\frac{x-x_1}{u}=\frac{y-y_1}{v},$$

所以对于切线 1 上的任意一个点(x,y),都有

$$\mu: \nu = (x - x_1) : (y - y_1).$$

不妨就取 $\mu = x - x_1$, $\nu = y - y_1$, 代入(5.64)得

$$[(x-x_1)F_1(x_1,y_1) + (y-y_1)F_2(x_1,y_1)]^2 - \varphi(x-x_1,y-y_1)F(x_1,y_1) = 0,$$
 (5.65)

(5.65)的左端是 $(x-x_1)$, $(y-y_1)$ 的二次齐次多项式。当它可以分解成两个实系数一次因式的乘积时,便得到两条切线。

例5.9 求二次曲线 $x^2-xy+y^2-1=0$ 通过点(0,2)的切线。

解 因为 $F(0,2)=3 \pm 0$,所以(0,2)不在曲线上。

$$F_1(0,2) = -1$$
, $F_2(0,2) = 2$,
 $\varphi(x-0,y-2) = x^2 - x(y-2) + (y-2)^2$.

由(5,65)得

$$[(-1)(x-0) + 2(y-2)]^2 - 3[x^2 - x(y-2) + (y-2)^2] = 0,$$

$$2x^2 + x(y-2) - (y-2)^2 = 0.$$

将左端分解因式得

$$[2x - (y - 2)][x + (y - 2)] = 0.$$

于是得到过(0,2)的两条切线的方程分别为:

$$2x - y + 2 = 0$$
 $\pi x + y - 2 = 0$.

注意在计算过程中不要把(x-0),(y-2)的括号去掉。

定义5.8 过曲线上一点,且垂直于过该点的切线的直线称为 曲线在这点的法线。 设 $M_0(x_0,y_0)$ 是二次曲线 S 上一点, 当 $F_1(x_0,y_0)$ 与 $F_2(x_0,y_0)$ 不全为零时, 过 M_0 的切线方向是

$$-F_2(x_0,y_0):F_1(x_0,y_0),$$

从而过M。的法线方向是

$$F_1(x_0, y_0): F_2(x_0, y_0)$$
,

因此过M。的法线方程为:

$$\frac{x - x_0}{F_1(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{F_2(x_0, y_0)}$$

5.2 双曲线的渐近线

定义5.9 沿渐近方向并且与双曲线 S 沒有交点的直线 L 称为双曲线 S 的渐近线。

设 (μ_i,ν_i) ,i=1,2,是双曲线S的渐近方向。设与是方向为 (μ_i,ν_i) 的渐近线,因为 l_i 与S无交点,所以与上任意一点 $M_0(x_0,y_0)$ 满足方程

$$\mu_i F_1(x, y) + \nu_i F_2(x, y) = 0.$$
 (5.66)

从而这就是渐近线与的方程。

因为双曲线的中心 O_1 的坐标 (x_1,y_1) 满足

$$F_1(x_1, y_1) = 0, F_2(x_1, y_1) = 0,$$

所以中心必在渐近线上。于是双曲线的渐近线也就是经过中心, 且方向为渐近方向的直线。

最后我们指出,本章 § 3, § 4, § 5 的内容除了涉及对称轴和 法线的内容外,其余均可在仿射坐标系中进行讨论,并且可得到 同样的有关结论。

习题 5.5

- 1. 求下列二次曲线在指定点处的切线方程和法线方程。
- (1) 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上的点 (x_0, y_0) 处;

- (2) 在双曲线 $\frac{x^2}{a^2} \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上的点 (x_0, y_0) 处,
- (3) 在抛物线 $y^2 = 2px$ 上的点(x_0, y_0)处。
- 2. 求下列二次曲线的经过所给点的切线方程。
- (1) $3x^2 + 4xy + 5y^2 7x 8y 3 = 0$, $\triangle(2,1)$;
- (2) $5x^2 + 7xy + y^2 x + 2y = 0$, 原点;
- (3) $5x^2 + 6xy + 5y^2 = 8$, 点(0,2 $\sqrt{2}$);
- (4) $2x^2 xy y^2 x 2y 1 = 0$, $\pm (0, 2)$.
- 3. 求曲线 $4x^2-4xy+y^2-2x+1=0$ 的过点 $M_0(1,3)$ 的切线和法线方程。
 - 4. 求下列二次曲线的切线方程,并且求出切点的坐标。
 - (1) $x^2 + 4xy + 3y^2 5x 6y + 3 = 0$ 的切线平行于 x + 4y = 0;
 - (2) $x^2 + xy + y^2 = 3$ 的切线平行于 x 轴。
- 5. 证明:过二次曲线与它的一条直径的交点的切线一定平 行于此直径的共轭方向。
- 6. 已知方程 $(A_1x+B_1y+C_1)^2+2(A_2x+B_2y+C_2)=0$, 其中

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} = 0, \quad A_1 A_2 + B_1 B_2 = 0.$$

证明:(1)它表示抛物线;

- (2) 直线 $A_1x + B_1y + C_1 = 0$ 是它的对称轴;
- (3) 直线 $A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 是过顶点的切线。
- 7. 证明: 抛物线 $y^2 = 2px$ 的切点为 (x_1, y_1) 的切线 与 x 轴 的交点为 $(-x_1, 0)$.
- *8. 从椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的两个焦点 F_1 和 F_2 分 别作椭圆的任意切线的垂线,垂足记为 T_1 和 T_2 。证明: T_1 的轨迹 和 T_2 的轨迹是以原点为中心的同一个圆。
 - *9、证明,两条边都与椭圆相切的直角的顶点(xo,yo)的轨

迹是一个圆。

*10.证明: 两条边与抛物线相切的直角的顶点位于准线上, 而连接切点的直线通过焦点。

- *11. 已知三角形 ABC, E是 AB 中点, 抛物线 与 CA, CB 分别在A, B 相切。证明 EC 与抛物线的对称轴平行。
- 12. 求下列双曲线的渐近线, 并且求曲线在以渐近线为坐标轴的坐标系中的方程。
 - (1) $12x^2 7xy 12y^2 17x + 31y 13 = 0$;
- (2) $6x^2 + 5xy 6y^2 + 39x + 26y 13 = 0$
- 13. 证明: 若方程(5.1)表示一条双曲线, 则它的渐近线分别与方程 $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 = 0$ 所代表的两条相交直线平行。
- 14. 证明: $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + a_0 = 0$ 表 示 一 条 双 曲线,则它的渐近线是 $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 = 0$.
 - 15. 证明: 岩方程 $AB(x^2-y^2)-(A^2-B^2)xy=C$

中, $C \Rightarrow 0$,A 与 B 不 全 为 零,则它表示一条双曲线,并且求出它的渐近线。

16. 证明:双曲线上的点到它的两条渐近线的距离的乘积等。 于常数。

*17.给定方程

 $(A_1x + B_1y + C_1)^2 - (A_2x + B_2y + C_2)^2 = 1$,

其中 $A_1B_2 - A_2B_1 = 0$, 证明它表示一条双曲线, 并且求出它的渐 近线。

(14) 我这个事情,一大主义的是第二人强。

电弧电子分类 海水 建铁矿 医神经炎 医神经炎

第六章 正交变换和仿射变换

迄今为止,我们在研究图形的性质时,采用了坐标法和向量法,还采用了坐标变换法。这些方法是解析几何中最 基本的方法,也是最重要的方法。此外,在研究图形的一些较复杂的性质时,还可以采用一种新的方法。譬如,试证:椭圆的任意一对共轭直径把椭圆分成四块面积相等的部分。如果用坐标法或坐标变换法去证都比较麻烦,有沒有比较简单的办法来证它呢?由于圆的任意一对共轭直径都彼此垂直,因此圆是具有上述性质的。这促使我们设想,如果有一种变换能把椭圆变成圆,并且这种变换把椭圆的一对共轭直径变成圆的一对共轭直径,而且使变换后图形的面积与原图形的面积的比值是一个常数(对各种图形都一样),那末就能证明椭圆也具有上述性质。这种方法称为点变换法,它的要点是。1)通过平面上的点变换σ把图形 8 变成图形 8′;2) 8 与 8′ 共同具有在这种点变换下不变的性质。

这一章就是要研究平面上以及空间中最常用的两种点变换: 正交变换和仿射变换。为此先要介绍映射的概念。 (1)

§1 映 射

1.1、映射的定义和例

定义6.1 集合 S到集合 S'的一个映射 σ 是指一个法则,它使 S中每一个元素 a 都有 S'中一个确定的 元素 a' 与之 对应。 a' 称为 a 在映射 σ 下的象,记作 $\sigma(a)$; a 称为 a' 在 σ 下的 原 . 此映射 σ 记作:

$$\sigma: S \rightarrow S', a \mapsto a'$$

或者记作: $a' = \sigma(a), a \in S$.

集合 5 到自身的映射 称为 5 的一个变换。

集合S到S'的两个映射 σ 和 τ 称为相等,如果对于任意 $a \in S$,都有 $\sigma(a) = \tau(a)$ 。


- 例6.1 定义域为 $(-\infty,\infty)$,函数值为实数的单值函数y=f(x)就是实数集合 R 到它自身的映射,例如, $y=2^*,y=x^3+x^2+1$, $y=\sin x$,等等,都是 R 到自身的映射,但 是 $y=\ln x$ 是 正实数集合 R⁺ 到实数集合 R 的映射。
- 例6.2 集合 S 的一个变换 σ 如果把 S 的每个元素 a 对应到它自身,即, $\sigma(a)=a$, $\forall a\in S$,则称 σ 是 S 的恒等变换或单位变换,记作 ε_s .

$$\begin{cases} x' = x + a, \\ y' = y + b, \end{cases} \tag{6.1}$$

亦即

$$\binom{x'}{y'} = \binom{x}{y} + \binom{a}{b}, \tag{6.1}$$

由于向量 $\overrightarrow{PP'}$ 的坐标为(x'-x,y'-y)=(a,b),



一 所以 PP'=v. 这说明,变换σ使平面上每一个点P都沿方向 v 移动了长为 v 向一段距离。称由 (6.1) 确定的变换σ是由 v 决定的平移。公式(6.1) 称为平面上点的平移公式, 它在形式上与点的坐标变换中的移轴公式类似,但是含意却完全不同:点的平移公式(6.1)中,(x,y) 和(x',y')

是不同的两个点在同一个坐标系中的坐 标, 而移轴公式中,

(x,y)和(x',y')是同一个点在两个不同的坐标系中的坐标。

例6.4 仍设 S 是平面上所有点组成的集合。在平面上取定一个直角坐标系 $[O;e_1,e_2]$ 。 合 τ 是 S 的这样一个 变 换, 它使平面上每一个点 P(x,y) 对应到一个确定的点 P'(x',y'),其中

$$\binom{x'}{y'} = \binom{\cos\theta}{\sin\theta} - \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \binom{x}{y}, \tag{6.2}$$

这里 θ 是一个确定的实数。我们把(6.2)中的系数矩阵简记作T,易看出了是正交矩阵。因为

$$|\overrightarrow{OP'}|^2 = x'^2 + y'^2 = (x', y') {x' \choose y} = (x, y) T^* T {x \choose y}$$


$$= (x, y) E {x \choose y} = (x, y) {x \choose y} = x^2 + y^2 = |\overrightarrow{OP}|^2,$$

$$\cos \langle \overrightarrow{OP}, \overrightarrow{OP'} \rangle = \frac{\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OP'}}{|\overrightarrow{OP}|| |\overrightarrow{OP}|} = \frac{xx' + yy'}{|\overrightarrow{OP}|^2}$$

$$= \frac{x(x \cos\theta - y \sin\theta) + y(x \sin\theta + y \cos\theta)}{x^2 + y^2}$$

$$= \cos\theta,$$

所以变换 τ 使平面上每一个点 P 都绕 O 点旋转 θ 角。称由(6.2) 确定的变换 τ 是**平面绕原点的旋转**,且转角为 θ 。 公式(6.2) 在形式上与转轴公式相似,但是含意完全不同,请读者想一想。



定义6.2 集合S到S'的映射 σ 如果使不同元素的象也不

同,即,如果 $a_1 + a_2$,则 $\sigma(a_1) + \sigma(a_2)$,那来称 σ 是**单尉**(或1-1的映射)。

显然,平面上任一平移,任一绕原点的旋转都是单射,函数 $y=2^{\circ}$ 是R 到自身的单射,面函数 $y=\sin x$ 不是单射。

定义6.3 集合 S 到 S' 的映射 σ , 如果对于 S' 中 每一个元素 α' , 在 S 中都有至少一个元素 α 使得 $\sigma(\alpha) = \alpha'$, 则 称 σ 是 **满** 射(或称 σ 是 S' 上的映射).

显然,平面上任一平移,任一绕原点的旋转都是满射,函数 $y=x^3$ 是 R 到自身的满射;而 $y=2^*$ 不是 R 到自身的满射,但它 是 R 到 R^+ 的满射。

定义6.4 集合 S到 S' 的映射 σ 如果既是单射,又是满射,则称 σ 是 \mathbf{Z} **对** \mathbf{S}' 的——**对应**,或称 σ 是 \mathbf{S} 到 \mathbf{S}' 上的1~1映射).

1.2 映射的乘法

在许多问题中,我们需要相继作两次映射,为此引进下述定义。

定义6.5 设 $\sigma.S \rightarrow S'$, $\tau.S' \rightarrow S''$. 相继施行映射 σ 和 τ , 得到一个S 到 S'' 的映射称为 τ 乘以 σ 的乘积,记作 $\tau\sigma$ 。即 $(\tau\sigma)(a):=\tau(\sigma(a))$ 》 $\phi \in S$

注意映射的乘法与次序有关, 有可能 τσ 有意义, 但是 στ 无意义, 即使 στ 和 τσ 都有意义, 电有可能 στ ≒τσ。这就是说,映射的乘法不适合交換律。

例6.5 设 σ 是平面绕原点的旋转,转角为 θ , 设 τ 是 由 σ 决定的平移, σ 的坐标为(α ,b),求 $\sigma\tau$ 和 $\tau\sigma$.

解 在给定的直角坐标系电,σ的公式是

$$\binom{x'}{y'} = \binom{\cos\theta - \sin\theta}{\sin\theta} \binom{x}{y};$$

τ 的公式是

$$\binom{x'}{y'} = \binom{x}{y} + \binom{a}{b}.$$

设 $P(x,y) \mapsto P''(x'',y'') \mapsto P'(x',y')$, 则 $\sigma\tau$ 的公式为:

$$\binom{x'}{y'} = \binom{\cos\theta}{\sin\theta} - \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \binom{x''}{y_{\mu}} = \binom{\cos\theta}{\sin\theta} - \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \binom{x}{y} + \binom{a}{b},$$
High

 $\begin{cases} x' = (x+a)\cos\theta - (y+b)\sin\theta, \\ y' = (x+a)\sin\theta + (y+b)\cos\theta. \end{cases}$ (6.3)

设 $Q(x,y) \mapsto Q''(x'',y'') \mapsto Q'(x',y')$,则 $\tau\sigma$ 的公式为:

$$\binom{x'}{y'} = \binom{x''}{y''} + \binom{a}{b} = \binom{\cos\theta}{\sin\theta} - \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \binom{x}{y} + \binom{a}{b},$$

벬

$$\begin{cases} x' = x\cos\theta - y\sin\theta + a, \\ y' = x\sin\theta + y\cos\theta + b. \end{cases}$$
 (6.4)

比较(6.3)和(6.4)知, στ キτσ。

定理6.1 映射的乘法适合结合律,即设

$$\sigma: S \rightarrow S'; \tau: S' \rightarrow S''; \psi: S'' \rightarrow S''',$$

∭

$$\psi(\tau\sigma) = (\psi\tau)\sigma$$

证明 显然等式两边都是S到S"的映射。任 $a \in S$,有

$$\llbracket \psi(\tau\sigma) \rrbracket(a) = \psi \llbracket (\tau\sigma)(a) \rrbracket = \psi(\tau(\sigma(a))),$$

$$[(\psi\tau)\sigma](a) = (\psi\tau)(\sigma(a)) = \psi(\tau(\sigma(a))).$$

因此

$$[\psi(\tau\sigma)](a) = [(\psi\tau)\sigma](a),$$

$$\psi(\tau\sigma) = (\psi\tau)\sigma,$$

从而

1.3 可逆映射和逆映射

定义6.6 设 $\sigma: S \rightarrow S'$, 如果存在 $\tau: S' \rightarrow S$, 使得 $\tau \sigma = \varepsilon_S$, $\sigma \tau = \varepsilon_{S'}$.

则称映射 σ 是可遵的,此时称 τ 是 σ 的逆映射。

如果 σ 是可逆的,则它的逆映射是唯一的,这是因为假 如 τ

和 τ₁ 都是 σ 的逆映射,则有

$$\tau_1 \sigma \tau = (\tau_1 \sigma) \tau = \varepsilon_S \tau = \tau,$$

$$\tau_1 \sigma \tau = \tau_1 (\sigma \tau) = \tau_1 \varepsilon_S, = \tau_1,$$

从而 $\tau = \tau_1$ 。 把 σ 的唯一的逆映射记作 σ^{-1} 。

定理6.2 设 σ 是S到S'的映射,则 σ 是 可 逆 的充分必要条件为 σ 是双射。

证明 必要性。若 σ 是可逆的,则有逆映射 σ^{-1} 存在,使得 $\sigma^{-1} = \varepsilon_s$, $\sigma^{-1} \sigma = \varepsilon_s$.

如果对于 $a_i \in S$, i = 1, 2, 有 $\sigma(a_1) = \sigma(a_2)$, 则得 $\sigma^{-1}(\sigma(a_1)) = \sigma^{-1}(\sigma(a_2)),$

从而得 $(\sigma^{-1}\sigma)(a_1)=(\sigma^{-1}\sigma)(a_2)$,即 $\varepsilon_s(a_1)=\varepsilon_s(a_2)$ 。于是 $a_1=a_2$ 。这说明 σ 是单射。

任 $a' \in S'$, 令 $a = \sigma^{-1}(a')$, 则有 $\sigma(a) = \sigma(\sigma^{-1}(a')) = (\sigma\sigma^{-1})(a') = \varepsilon_{S'}(a') = a',$

所以 σ 是满射。从而 σ 是双射。

充分性。设 σ 是双射。任取 $a' \in S'$,则存在唯一的 $a \in S$,使得 $\sigma(a) = a'$ 。于是可以定义

$$\tau$$
, $S' \rightarrow S$, $a' \mapsto a$,

其中 a 满足 $\sigma(a) = a'$. 显然 τ 是 S' 到 S 的映射, 拜且有 $\sigma \tau(a') = \sigma(a) = a'$, $\forall a' \in S'$,

因此, $\sigma \tau = \varepsilon_{s'}$.

任 $a \in S$, 记 $\sigma(a) = a'$, 则有

$$\tau\sigma(a)=\tau(a')=a\,,$$

因此, $\tau \sigma = \varepsilon_s$. 从而 σ 是可逆的映射。

例6.6 设 σ 是 平面的一个点变换,它的公式是

$$\begin{cases} x' = 2x + y + 5, \\ y' = 3x - y + 7. \end{cases}$$

求 σ 的逆变换 σ-1。

解 者 σ 把点 P(x,y)对应到 点 P'(x'y'), 则 σ⁻¹ 应把 点 198

 $P'(x'_1,y')$ 对应到点 P(x,y), 因此为了得到 σ^{*1} 的公式, 只要从。 σ 的公式中反解出x,y:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{5}x' + \frac{1}{5}y' - \frac{12}{5}, \\ y = \frac{3}{5}x' - \frac{2}{5}y' - \frac{1}{5}. \end{cases}$$

为了统一起见,对于每一个变换的公式,都把原象的 坐 标 写 成 (x,y), 把象的坐标写成(x',y'), 因此 σ^{-1} 的公式为:

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{5}x + \frac{1}{5}y - \frac{12}{5}, \\ y' = \frac{3}{5}x - \frac{2}{5}y - \frac{1}{5}. \end{cases}$$

习 題 6.1

1、 设 R 是全体实数组成的集合, 判别下列对应法则是否为 R 到自身的映射? 是否单射? 是否满射?

- $(1) x \mapsto x^2; \qquad (2) x \mapsto x^3;$

- (3) $x \to 2x + 1;$ (4) $x \mapsto x^2 x;$
- (5) $x \mapsto 2^x$; (6) $x \mapsto \ln x$;
- (7) $x \mapsto \cos x$; (8) $x \mapsto \operatorname{tg} x$.
- 2. 设 S 表示平面上所有点组成的集合, L 是平面上一条直 线。把平面上每 一 个点 P(x,y) 对 应 到 它 关 于 l 的对 称 点 P'(x',y'), 这是S的一个变换, 称 它是 平 面 对于直线 l 的反 射,称!是反射轴。求平面对于 z 轴的反射的公式。
- 3 求出平面对于直线 y=x 的反射公式。
- 4. 设平面上直线 l 的方程为 Ax + By + C = 0,求平面对于 直线。的反射的公式。
- 5. 设 l_1, l_2 是平面上两条平行直线,而 τ_1, τ_2 分别是平面对 于直线4.16的反射,证明: 7.78是一个平移。
 - 6. 设σ是平面的点变换,σ的公式为

$$\begin{cases} x' = 2x + y - 1, \\ y' = x - y + 3. \end{cases}$$

问:点(1,0),(-1,1)分别变成什么点?直线x+y-2=0变成什么图形?

7. 给了平面的两个点变换 σ_1 和 σ_2 ,它们的公式分别是

$$\begin{cases} x' = 2x + y + 5, \\ y' = 3x - y + 7; \end{cases} \begin{cases} x' = 2x - 3y + 4, \\ y' = -x + 2y - 5. \end{cases}$$

求 $\sigma_1\sigma_2$ 和 $\sigma_2\sigma_1$ 的公式。

8. 求平面的下列点变换的逆变换。

(1)
$$\begin{cases} x' = \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y - 2, \\ y' = \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y - 1; \\ (2) \begin{cases} x' = 2x + 3y - 7, \\ y' = 3x + 5y - 9. \end{cases}$$

- 9.在直角坐标系 $[O,e_1,e_2]$ 中,求出平面绕点 $M_0(x_0,y_0)$ 旋转 θ 角的变换公式。
- 10. 设 σ : $S \rightarrow S'$; τ : $S' \rightarrow S''$ 。证明: 岩 σ 和 τ 都是单(满)射,则 $\tau\sigma$ 也是单(满)射。

§ 2 平面的正交变换

,大**2.1**,车条变换的定义和例 8 min.

从§1及其习题6.1中,我们介绍了平面的些种点变换:平移,旋转,反射。它们在平面直角坐标系中的公式有一个共同的特点,即系数矩阵都是正交矩阵。本节我们就来研究具有这个特点的变换。

定义6.7 平面的一个点变换 σ ,如果它在一个直角坐标系中的公式为

200

$$\binom{x'}{y'} = \binom{a_{11} - a_{12}}{a_{21} - a_{22}} \binom{x}{y} + \binom{a_1}{a_2}, \tag{6.5}$$

其中系数矩阵

$$A \! := \! \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

是正交矩阵,则称σ是平面的正交(点)变换。

这个定义与直角坐标系的选择无关,这是因为如果 σ 在直角坐标系 I 中的公式为(6.5),设直角坐标系 I 到 II 的 过 渡 矩 阵是 T, II 的原点的 I 坐标为(x_0 , y_0),则 I 到 II 的点的 坐 标变换公式为

$$\binom{x}{y} = T\binom{\tilde{x}}{\tilde{y}} + \binom{x_0}{y_0}, \tag{6.6}$$

其中(\tilde{x}, \tilde{y})表示点(x, y)的 Π 坐标。用(6.6)代入(6.5)中得

$$T\binom{\tilde{x}'}{\tilde{y}'} + \binom{x_0}{y_0} = A \left[T\binom{\tilde{x}}{\tilde{y}} + \binom{x_0}{y_0} \right] + \binom{a_1}{a_2},$$

整理得

$$\begin{pmatrix} \tilde{x}' \\ \tilde{y}' \end{pmatrix} = T^{-1}AT\begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix} + T^{-1} \left[A\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_1 - x_0 \\ a_2 - y_0 \end{pmatrix} \right].$$
(6.7)

(6.7)就是 σ 在坐标系 Π 中的公式,其中系数矩阵是 $T^{-1}AT$,由于A和T都是正交矩阵,因此 $T^{-1}AT$ 仍是正交矩阵。这说明,岩 σ 在某一个直角坐标系中的公式的系数矩阵是正交矩阵,则它在任何一个直角坐标系中的公式的系数矩阵也是正交矩阵。

由定义6.7知, 平移, 旋转, 反射都是正交变换。

2.2 正交变换的性质

定理6.3 正交变换保持点之间的距离不变。

证明 设 σ 是正交变换,它在一个直角坐标系中 的 公 式 是 (6.5)。平面上任取两点 $P_1(x_1,y_1), P_2(x_2,y_3)$,它们在 σ 下的象是 $P_1'(x_1',y_1'), P_2'(x_2',y_2')$,则

$$\binom{x_i'}{y_i'} = A\binom{x_i}{y_i} + \binom{a_1}{a_2}, \quad i = 1, 2.$$

因此

$${x'_{2} - x'_{1} \choose y'_{2} - y'_{1}} = {x'_{2} \choose y'_{2}} - {x'_{1} \choose y'_{1}} = A{x_{2} \choose y_{2}} - A{x_{1} \choose y_{1}}.$$

$$= A{x_{2} - x_{1} \choose y_{2} - y_{1}}.$$

从而有

$$|P'_{1}P'_{2}|^{2} = (x'_{2} - x'_{1})^{2} + (y'_{2} - y'_{1})^{2}$$

$$= (x'_{2} - x'_{1}, y'_{2} - y'_{1}) \begin{pmatrix} x'_{2} - x'_{1} \\ y'_{2} - y'_{1} \end{pmatrix}$$

$$= (x_{2} - x_{1}, y_{2} - y_{1}) A^{t} A \begin{pmatrix} x_{2} - x_{1} \\ y_{2} - y_{1} \end{pmatrix}$$

$$= (x_{2} - x_{1}, y_{2} - y_{1}) E \begin{pmatrix} x_{2} - x_{1} \\ y_{2} - y_{1} \end{pmatrix}$$

$$= (x_{2} - x_{1}, y_{2} - y_{1}) E \begin{pmatrix} x_{2} - x_{1} \\ y_{2} - y_{1} \end{pmatrix}$$

$$= (x_{2} - x_{1})^{2} + (y_{2} - y_{1})^{2} = |P_{1}P_{2}|^{2}.$$

$$|P'_{1}P'_{2}| = |P_{1}P_{2}|.$$

所以

由正交矩阵的性质容易得到。正交变换的乘积还是正 充 变换;恒等变换是正交变换;正交变换是可逆的,并且它的逆变换仍是正交变换。

正交变换还有以下性质:

(1) 正交变换把直线变成直线。

证明 设 σ 是正交变换,它的公式为(6.5)。令

$$a' = {x' \choose y'}, \quad a = {x \choose y}, \quad a_0 = {a_1 \choose a_2},$$

则(6.5)可写成

$$\alpha' = A\alpha + \alpha_{0\bullet} \tag{6.5}$$

平面上任取一条直线 l: ax + by + c = 0, 令 $\beta' = (a,b)$, 则 l 的方程可写成

$$\beta^{\prime}\alpha + c = 0. \tag{6.8}$$

由
$$(6.5)$$
'得 $\alpha = A^{-1}(\alpha' - \alpha_0)$,代入 (6.8) 中,得 $\beta' A^{-1}(\alpha' - \alpha_0) + c = 0$,

即

$$\beta^{t} A^{-1} a' + c - \beta^{t} A^{-1} a_{0} = 0, \qquad (6.9)$$

假如 $\beta'A^{-1}=0$,则得 $\beta'=0$,即,a=b=0,矛盾。因此(6.9) 是x',y'的一次方程,从而(6.9)表示一条直线 l'. 上述 说 明,直线 l 上任一点在 σ 下的象必在直线 l' 上。 反之,由于 把 公式 (6.5)'代入方程(6.9)中就得到方程(6.8),这说明直线 l' 上的 每一个点在 σ 下的原象都在直线 l 上。 因此 σ 把直线 l 变成直线 l'

(2) 正交变换把线段变成线段, 幷且保持线段的分比不变。

证明 设正交变换 σ 把点 P, Q分别变成 P', Q'。则线段 PQ 上任一点 M的象 M' 在直线 P'Q'上,又由于 σ 保持点之间的距离 不变,因此

$$|P'M'| = |PM|, |Q'M'| = |QM|,$$

从而 M' 在线段 P'Q' 上、 反之, 同理,线段 P'Q' 上 的 任一 点 N' 的原象 N 必 在 线段 PQ 上、 所以 σ 把 线段 PQ 变 成 线段 P'Q'.

设点M是线段 PQ 的內分点, 使得

$$\frac{|PM|}{|MQ|} = \lambda,$$

则M在 σ 下的象 M' 在线段 P'Q' 上,从而 M' 是P'Q' 的內分点, Ħ.

$$\frac{|P'M'|}{|M'Q'|} = \frac{|PM|}{|MQ|} = \lambda.$$

A = 若点N是线段 PQ 的外分点,类似地可证得结论。

(3) 正交变换把平行直线变成平行直线。

证明 设 l_1/l_2 。设正交变换 σ 把 l_1 变成 直 线 l_1 , $l_{i=1,2}$ 。 假如 l_1 与 l_2 交于M',则M'的唯一的原象M既在 l_1 上,又在 l_2 上,这与与/与矛盾。所以片//5。

(4) 平面的一个正交点变换 σ 引起了平面的一个向量变换 σ (指平面上所有向量组成的集合S的变换)。

证明 平面上取定一个直角坐标系,设σ是正交点变换,它 的公式是(6.5)。考虑平面上任一向量m(u,v),取有向线段 PQ表示m, 其中P, Q 的坐标分别是 (x_1,y_1) , (x_2,y_2) , 则 $u=x_2$ $-x_1, v = y_2 + y_1$ 。设 σ 把 P,Q 分别变成 $P'(x'_1, y'_1), Q'(x'_2, y'_2)$, 頻由(6.5)得出

$$\binom{x_i'}{y_i'} = A\binom{x_i}{y_i} + \binom{a_1}{a_2}, \quad i = 1, 2.$$

下定符
$$\binom{x'_2 - x'_1}{y'_2 - y'_1} = A \binom{x_2 - x_1}{y_2 - y_1} = A \binom{u}{v}.$$
(6.10)

这说明,P'Q'的坐标 $(x_2'-x_1',y_2'-y_1')$ 只与 σ 和向量 m 有关,而 与m的有向线段表示中起点的选择无关,因此可以规定集合图型 的一个对应法则 σ ,它把m对应到P'Q',即

$$\vec{\sigma}(\mathbf{m}) = \vec{\sigma}(\overrightarrow{PQ}) := \overrightarrow{P'Q'},$$

由于上述议论知 & 是 & 的一个变换。

如果用(u',v')表示 $\sigma(m)$ 的坐标,则由(6.10)得到

$$\binom{u'}{v'} = A\binom{u}{v}. \tag{6.11}$$

(6.11)就是 6 的公式, 其中系数矩阵正好是原来正交 点 变 换σ 的公式(6.5)中的系数矩阵 A。 我们把公式中系数矩阵 为正 交矩 陈的向量变换称为正**交向量变换。于**是由上述知,正交点变换σ引 起一个正交向量变换 σ 。今后在谈到正交(点)变换 σ 在向量上的 作用时, 指的就是σ引起的向量变换σ在该向量上的作用。

- (5) 正交变换还具有以下性质:
- 1) 保持向量的加法, 即, $\overline{\sigma}(m_1+m_2)=\overline{\sigma}(m_1)+\overline{\sigma}(m_2)$;
- 2) 保持向量的数乘, 即, $\sigma(\lambda m) = \lambda \sigma(m)$;
- 3) 保持向量的内积不变, 即, $\sigma(m_1) \cdot \sigma(m_2) = m_1 \cdot m_2$;
- 4) 保持向量的长度不变,即, $|\sigma(m)|=|m|$;
- 5) 保持向量的夹角不变, 即, $\langle \bar{\sigma}(m_1), \bar{\sigma}(m_2) \rangle = \langle m_1, m_2 \rangle$.

证明 设正交向量变换产在直角坐标系中的公式 是(6.11)。 设 m_i 的坐标是 (u_i, v_i) , $\sigma(m_i)$ 的 坐 标 是 (u'_i, v'_i) , i=1,2, 设 $\sigma(m_1 + m_2)$ 的坐标是(u', v'),则

因此
$$\mathbb{E}[x] = \sigma(m_1 + m_2) = \sigma(m_1) + \sigma(m_2)$$
 語 $[x] = 0.32$ (多)

男 类似可能 σ(λm) = λσ(m)。

$$\overline{\sigma}(m_1) \cdot \overline{\sigma}(m_2) = u_1' u_2' + v_1' v_2' = (u_1', v_1') {u_2' \choose v_2'}$$

$$= (u_1, v_1) A^t A {u_2 \choose v_2}$$

The Control of the Control

$$= (u_1, v_1) E \binom{u_2}{v_2} = u_1 u_2 + v_1 v_2 = m_1 \cdot m_2.$$

由于 **《**保持向量的内积不变,从而它保持向量的长度不变, 也保持向量的夹角不变。

定理6.4 正交变 換 σ 把任意一个直 角标架 I 变成一个直角标架(记作 II),并且任一点 P 的 I 坐标等于它的象 P' 的 I 坐标。

证明 设 σ 把 I 的原点 O 变成 O′, 把 I 的 基 向 量 \bullet_i 变 成 \bullet_i' , i=1,2。因为 σ 保持向量的长度且保持向量的夹角不变,所以 \bullet_i' 仍为单位向量, \bullet_i' 与 \bullet_i' 仍 垂直,从而 Π [O′; \bullet_i' , \bullet_i'] 也是一个直角标架。

设P的 I 坐标是(x,y), 设P在 σ 下的象为P', 因为

$$\overrightarrow{O'P'} = \overline{\sigma}(\overrightarrow{OP}) = \overline{\sigma}(xe_1 + ye_2)$$

$$= x\overline{\sigma}(e_1) + y\overline{\sigma}(e_2) = xe'_1 + ye'_2,$$

所以P'的 \mathbb{I} 坐标是(x,y)。

推论6.1 正交变 换 σ 被 它在一个直 角 标 架 上的作用所确定。

证明 因为只要知道了 σ 把一个直角标架 I 变成直 角 标 架 II,则平面上每一个点P在 σ 下的象 P'也就确定了,P'的 II 坐标等于P的 I 坐标。

由推论6.1知,若两个正交变换 σ 和 τ 在一个直 角标 架上的作用一样,则 σ 和 τ 相等。

定理6.5 平面的正交变换或者是平移,或者是 绕平面上十点的旋转,或者是对于平面上一条直线的反射,或者是它们之间的乘积。

证明 设 σ 是平 面的一个正 交 变 换,取一 个 直 角 标架 $I[O; e_1,e_2]$,设 σ 把 I 变成 $II[O';e'_1,e'_2]$.

作由OO'决定的平移 τ_1 ,它把 I 变成 $[O';e_1,e_2]$,再作绕点O'的旋转 τ_2 ,使 e_1 转到 e_1' 上,此时 τ_2 把 $[O';e_1,e_2]$ 变成 $[O';e_1',e_2']$;

者 $e_2^* = e_2^t$ 、则 $t_2\tau_1$ 把 I 变成 II ,从 而 $t_2\tilde{\tau}_1 = \sigma$, 岩 $e_2^* = -e_2^t$,则再作对于直线 l (它经过点 O' ,方向为 e_1')的反射 τ_3 ,此 时 τ_3 把 $[O',e_1',e_2']$ 变成 $[O',e_1',e_2']$,因此 $\tau_3\tau_2\tau_1$ 把 I 变成 II ,从而 $\sigma = \tau_3\tau_2\tau_1$ 。

平移,旋转以及它们的乘积称为刚体运动。

定理6.6 若正交变换 σ 把直角标架 $I[O; e_1, e_2]$ 变成直角标架 $I[O', e'_1, e'_2]$,则 σ 在 I 中的公式为

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix},$$

其中,系数矩阵A正好是【到 Π 的过渡矩阵, (x_0,y_0) 是 Π 的 原点O'的 Π 坐标。

证明 设 σ 把点 P 变成 P',设 P 和 P' 的 I 坐标分别是 (x,y) 和 (x',y')。由定理 6.4 知, P' 的 I 坐标等于 P 的 I 坐标 (x,y)。设 I 到 I 的过渡矩阵为 A,设 I 的原点 O' 的 I 坐 标 为 (x_0,y_0) ,则对 P' 点用坐标变换公式得

$$\binom{x'}{x'} = A\binom{x}{y} + \binom{x_0}{y_0},$$

这个公式同时又表明了P的 I 坐标(x,y)与象P'的 I 坐 标(x',y')之间的关系,因此这就是 σ 在 I 中的公式。

习 題 6.2

1. 判断下述平面的点变换是否为正交变换? **持且求它的不** 动点。

$$\begin{cases} x' = \frac{4}{5}x - \frac{3}{5}y + 1, \\ y' = \frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y - 2, \end{cases}$$

2. 在平面的点变换

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y + 3, \\ y' = \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y - 1 \end{cases}$$

下,直线x+y-2=0变成什么直线?

- 3. 若把曲线2xy=a²绕原点旋转45°,求新的曲线方程。
- 给了正交变换σ在直角坐标系 I 中的公式为

$$\begin{cases} x' = \frac{\sqrt{2}}{2}x - \frac{\sqrt{2}}{2}y - 3, \\ y' = \frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y + 2. \end{cases}$$
变换

标变换
$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}\tilde{x} - \frac{\sqrt{3}}{2}\tilde{y} - 2, \\ y = \frac{\sqrt{3}}{2}\tilde{x} + \frac{1}{2}\tilde{y} - 1, \end{cases}$$

求 σ 在新坐标系中的公式。

- 5. 平面的正交变换 σ 若有两个不动点A,B,则直线AB上 占都是 σ 的不动点。 44 每个点都是 α 的不动点。
- 6. 设工和工2分别是平面对法直线与和12的反射,设与12交 于O点,且灭角为 θ ,证明, $\tau_2\tau_1$ 是绕O点的旋转,转角为 2θ 。7. 设平面的点变换 σ 的公式是

$$\begin{cases} x' = x\cos\theta - y\sin\theta + a, \\ y' = x\sin\theta + y\cos\theta + b, \end{cases}$$

证明, 当 $\theta = 2k\pi$ 时, σ 是绕一个定点的旋转。

8. 求满足下列条件的正交变换的公式, 绕原点 旋 转 角 度 $\theta = -\frac{3}{4}\pi$, 义要使点 $M_0(0,1)$ 变成 $M_0'(-2+\sqrt{2})$.

- 9. 设正 交 变 换 σ 把右 手 直 角 标 架 I [O, e₁, e₂] 变成 $\Pi[O', e', e'_n]$, 设e 到e'的转角为 θ , O'的 I 坐标是(x_0, y_0)。 证明。若Ⅱ为右手系,则σ的公式为

$$\begin{cases} x' = x\cos\theta + y\sin\theta + x_0, \\ y' = x\sin\theta + y\cos\theta + y_0; \end{cases}$$

若开为左平系,则6的公式为。

$$\left\{ egin{aligned} x' &= x \cos heta + y \sin heta + x_0, \ y' &= x \sin heta - y \cos heta + y_0. \end{aligned}
ight.$$

- 10. 正交变換 σ 的公式中若系数矩阵A的行列式 等于+1, 则称 σ 是第一类正交变换,若|A|=-1,则称 σ 是 第二类正交 变换。证明: 刚体运动是第一类正交变换; 刚体运动和一个反射 的乘积是第二类正交变换。
- 11. 判断下列变换是否为平面对于一直线的反射, 若是反射, 则求出反射轴。

(1)
$$\begin{cases} x' = x\cos 2\theta + y\sin 2\theta, \\ y' = x\sin 2\theta - y\cos 2\theta. \end{cases}$$

$$\begin{cases} x' = \frac{\sqrt{2}}{2}(x+y), \\ y' \Rightarrow \stackrel{\triangle}{\underline{y}}(x-y). \end{cases}$$
§ 3 平面的仿射变换

3.1 仿射变换的定义和例


定义6.8 平面的一个点变换了,如果它在一个仿射坐标系中

$$= \binom{x'}{y'} = \binom{a_{11}}{a_{21}} \cdot \binom{a_{12}}{a_{22}} \binom{x}{y} + \binom{a_1}{a_2}, \dots, \frac{a_{12}}{a_{12}} \binom{6.12}{a_{12}}$$

其中系数矩 阵 $A = (a_{ij})$ 是非奇异的(即 $|A| \neq 0$),则称 τ 是平面的仿射(点)变换。

这个定义与仿射坐标系的选择无关。其**理由类似于正交变换** 的定义与直角坐标系的选择无关的理由。

由于直角坐标系也是一种仿射坐标系,且正交矩阵是非奇异的,因此正交变换都是仿射变换,但是仿射变换比正交变换更广泛,看下面的例子。



例6.7 平面向着直线 1的压缩(拉伸)。设1的方向为e1,在1上取一点O, 建立仿射坐标系[O,e1,e], 其中e是事先给定的一个方向。

设(x,y)是平面上任一

点P的坐标,规定平面的一个点变换 τ ,它把P点 对 应 到点P'(x',y'),使得

$$\begin{cases} x' = x, \\ y' = ky, \end{cases} \tag{6.13}$$

其中 k 是正的常数(与点 P 无关),则称 τ 是平面沿方向 \bullet 向着直线 l 的压缩(拉伸),称 k 是压缩(拉伸)系数, 0 < k < 1 时, 是压缩; k > 1 时, 是拉伸; k = 1 时, 是恒等变换。 若方向 $\bullet \perp l$,则称 τ 是正压缩(拉伸),简称为压缩(拉伸)。 若 \bullet 与 l 不垂直,则称 τ 是斜压缩(拉伸)。 由于公式(6.13)中系数矩阵

$$\binom{1}{0} \binom{0}{k}$$

是非奇异的,因此 τ 是仿射变换。但是当k = 1时,显然它不是正交变换。

在习题 6.3 中还将介绍仿射变换的其他例子:同位相似,相似,错切等。

3.2 仿射变换的性质

由于非奇异矩阵一定是可逆矩阵,于是由可逆矩阵的性质容易得到:仿射变换的乘积仍是仿射变换;恒等变换是仿射变换; 仿射变换是可逆的,并且它的逆变换也是仿射变换。

仿射变换还有以下性质:

- (1) 仿射变换把直线变成直线。
- (2)仿射变换把平行直线变成平行直线。

这两条性质的证明与正交变换的相应性质的证明类似。

通常在仿射变换下,点之间的距离是会改变的,因此它不是一般仿射变换的不变量。

由于仿射变换把直线变成直线,因此它把共线的三点变成共 线的三点。又由于仿射变换的逆变换仍是仿射变换,所以仿射变 换把不共线的三点变成不共线的三点。

定义6.9 设A,B,C是共线的三点,在此直线 上 取定一个单位向量 e, 者 $AB=\lambda e$,则称 λ 是线段 AB 的代 数 长,就 用 AB

表示线段 AB 的代数长。称 \overline{BC} 为共线三点 A , B , C 的简单比值,记作(A , C , B),即

$$(A, \tilde{C}, B) := \frac{AB}{BG}$$

定理6.7 仿射变换保持共线三点的简单比值不变。

证明。设工是仿射变换。任取平面上共线三点 A,B,C,取它们所在的直线为 x 轴,建立一个直角坐标 系。设 A,B,C 的横坐标分别为 x_1,x_2,x_3 。设工把A,B,C分别变成A',B',C',则A',B',C'仍共线。

作一个正交变换 σ ,使得A',B',C' 所在的直线U 变成 x 轴,其中A',B',C' 分别变成 A'',B'',C'' 。设 A'',B'',C'' 的 横坐标分别为 x_1'' , x_2'' , x_3'' 。

设 στ 的公式为

$$\begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}.$$
 (6.14)

因为 $\sigma \tau$ 把A,B,C分别变成A'',B'',C'', 因此有

$$\begin{pmatrix} x_i'' \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_i \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}, \quad i = 1, 2, 3.$$

于是得

$$x_i'' = b_{i,1}x_i + b_{i,1}, i = 1, 2, 3$$

从而,是一个学生。

$$\frac{A''B''}{B''C''} = \frac{x_2'' - x_1''}{x_3'' - x_2''} = \frac{(b_{11}x_2 + b_1) - (b_{11}x_1 + b_1)}{(b_{11}x_3 + b_1) - (b_{11}x_2 + b_1)}$$

$$= \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_2} = \frac{AB}{BC}.$$

因为正交变换。《保持线段的分比不变,所以

$$\frac{A''B''}{B''C''} = \frac{A'B'}{B'C'}.$$

由此得到

$$\frac{A'B'}{B'C'} = \frac{AB}{BC},$$

抑

$$(A',C',B')=(A,C,B)$$

共线三点的简单比值是仿射变换的最简单且最基本的不变量。(A,C,B)实际上就是点B分线段AC的分比,从而有

推论6.2 仿射变换把线段变成线段, 并且 保 持线段的分比不变。

与正交点变换引起平面的一个向量变换类似,仿射点变 换 t 也引起平面的一个向量变换 t, 并且如果 t 的公式是(6.12), 则 t 的公式是

$$\begin{pmatrix} u' \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix},$$
 (6.15)

其中(v,v)是平面上任一向量m的坐标,(u',v')是 $\tau(m)$ 的坐标,系数矩阵是非奇异的,这样的向量变换 τ 称为**仿射向量变换。**

今后我们在谈到仿射(点)变换τ在向量上的作用时,指的就是τ引起的向量变换τ在该向量上的作用。

与正交向量变换类似, 仿射向量变换保持向量的加法和向量 的数乘。

定理6.8 仿射变换τ把任意一个仿射标架 I 变成一个仿射标架 (i) 设作 I),并且任一点 P 的 I 坐标等于它的象 P' 的 I 坐标。

证明 设工的原点O在 τ 下的象为O', I的基向量 e_i 在 τ 下的象为 e'_i ,i=1,2。设 $e_i=\overrightarrow{OA_i}$,设 A_i 在 τ 下的象为 A'_i ,则

$$e'_i = \overline{\tau}(e_i) = \overline{\tau}(OA_i) = O'A'_i, \quad i = 1, 2.$$

因为 O_1A_1,A_2 三点不共线,所以 O'_1A_1',A_2' 三点也不共线,从而 $\Pi[O'_1e_1',e_2']$ 也是一个仿射标架。

设P的 I 整标是 (x,y),即 $OP = xe_1 + ye_2$, 两 边用 T 作 用 得, $O'P' = xe'_1 + ye'_2$,所以 P' 的 II 坐标为(x,y).

定理6.9 平面上任给两组不共线 的 三 个 点: A_1, A_2, A_3 和 B_1, B_2, B_3 ,则存在唯一的仿射变换把 A_i 变成 B_i , i=1,2,3.

证明 因为 A_1,A_2,A_3 不共线,所以 $I[A_1;A_1A_2,\overline{A_1A_3}]$ 是 仿射标架。同理 $II[B_1;B_1B_2,\overline{B_1B_3}]$ 也是仿射标架。设 I 到 I 的 让渡矩阵是A,设 B_1 的 I 坐标是 (x_0,y_0) 。

在平面上建立一个对应法则x,它把任一点P 对应到点P',其中P' 的 \mathbb{I} 坐 标 等 于P 的 \mathbb{I} 坐 标 (x,y)。设P' 的 \mathbb{I} 坐 标 (x',y'),对P' 用仿射坐标变换公式得

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix},$$

这个公式同时也表明了P的 I 坐标与它的象P'的 I 坐标之间的关系,因此这就是 τ 在 I 中的公式,由于系数矩阵 A 非奇异,所以 τ 是仿射变换,由于 A 的 I 坐标与 B 的 I 坐标相同,所以

$$\tau(A_i) = B_i, i = 1, 2, 3.$$

关于唯一性。假如还有一个仿射变换 σ 把 A_i 变成 B_i , i=1, 2,3。则 σ 把 仿射标架 I 变成 仿射标架 I ,从而任一点 P 的 I 坐标等于 $\sigma(P)$ 的 I 坐标,于是 $\sigma(P) = \tau(P)$,所以 $\sigma = \tau$.

推论6.3 平面上任给两个仿射标架 I 和 II ,则 存 在唯一的 仿射变换把标架 I 变成标架 II .

3.3 仿射变换的变积系数

正交变换保持点之间的距离不变,保持向量之间的 夹角 不变,从而保持图形的面积不变。而一般的仿射变换会改变点之间的距离,也会改变向量之间的夹角,也会改变图形的面积。本小节来讨论仿射变换改变图形面积的规律。

设在平面上规定了一个定向,它用单位法向量。代表。用(a,b)表示以a,b为邻边并且边界的环行方向为 a 到 b 的旋转方向的定向平行四边形的定向面积,由(1.26)得

$$a \times b = (a, b)e$$

定理6.10 设仿射变换 τ 在仿射标架 $I[O;e_1,e_2]$ 中的公式为

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix},$$

对于任意不共线的向量 a,b, 设 $\overline{\tau}(a) = a'$, $\overline{\tau}(b) = b'$, 则有

$$\frac{(a',b')}{(a,b)} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}. \tag{6.16}$$

证明 由于 τ 是仿射变换,因此它把仿射标架 I 变 成仿射标架 II $[O',e'_1,e'_2]$ 。由 τ 在 I 中的公式 (6.15) 可算出 ϵ 的 I 坐标是 (a_{11},a_{21}) , e'_2 的 I 坐标是 (a_{12},a_{22}) 。

设a,b的 I 坐标分别为 $(u_1,v_1),(u_2,v_2),则<math>a',b'$ 的 I 坐标分别为 $(u_1,v_1),(u_2,v_2)$ 。在坐标系 I 中计算得

$$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = (u_1 \boldsymbol{e}_1 + v_1 \boldsymbol{e}_2) \times (u_2 \boldsymbol{e}_1 + v_2 \boldsymbol{e}_2)$$

$$= \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} (\boldsymbol{e}_1 \times \boldsymbol{e}_2).$$

因为 $a \times b \Rightarrow (a,b)e$, $e_1 \times e_2 = (e_1,e_2)e$, 所以

$$(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} (\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2). \tag{6.17}$$

公式(6.17)对于平面上任意向量a,b均成立,特别地对于ei,e; 也成立,因此有

$$(e'_1,e'_2) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} (e_1,e_2).$$

同样的道理, 在11中计算得

$$(a',b') = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} (e'_1,e'_2).$$

因此

$$\frac{(a',b')}{(a,b)} = \frac{(e'_1,e'_2)}{(e_1,e_2)} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}.$$

易知如果仿射变换 τ 在仿射坐标系 Π 中的公式的系数矩阵为 A,那末 τ 在仿射坐标系 Π 中的公式的系数矩阵为 $H^{-1}AH$, 其中 H 是 Π 到 Π 的过渡矩阵。因为

$$|H^{-1}AH| = |H^{-1}| |A| |H| = |H|^{-1} |A| |H|$$

= $|A|$,

所以仿射变换τ的公式中的系数矩阵的行列式与仿射标架的选择 无关。

定义6.10 仿射变换 τ 的公式中的系数矩阵的行列式称 为 τ 的行列式, 记作 d_{τ} 如果 $d_{\tau} > 0$,则称 τ 是第一类 的; 如果 d_{τ}

<0, 则称 * 是第二类的。

定理6.10表明, 仿射变换 r 按照同一个 比 值 d, 来改变所有 平行四边形的定向面积,不仅如此,还有 A.

推论6.4 若平面上任一有面积的区域 D 经过仿射变换 τ 变 成区域D',则有

$$\frac{S_{D'}}{S_{D}} = [d_{\tau}], (6.18)$$

其中 S_n , S_n 分别表示D', D的面积。

证明 用两组平行线分割区域力,由于仿射变换把平行线变 成平行线,因此相应地有两组平行线分割D'。用S1(S1)表示在 D(D')內的所有平行四边形面积的总和,用 $S_2(S'_2)$ 表示至少与 D(D')有一个公共点的平行四边形的面积的总和,则有

$$S_1' \leqslant S_{D'} \leqslant S_2', \qquad (6.19)$$

由于 $S_1' = S_1 | d_x |$, $S_2' = S_2 | d_x |$, 代入(6.19)得

$$S_1|d_{\tau}| \leqslant S_D, \leqslant S_2|d_{\tau}|, \qquad (6.20)$$

由于用两组平行线无限细分区域 D时,有

$$\lim S_1 = S_D$$
, $\lim S_2 = S_D$,

所以在(6,20)取极限得

$$S_D[d_{\tau}] \leqslant S_{D'} \leqslant S_D[d_{\tau}],$$

即得

$$S_{D}' = S_{D}[d_{\sigma}]_{\bullet}$$

 $S_D = S_D |d_\tau|$ 。 推论6.4说明,仿射变换τ接同一个比值 $|d_\tau|$ 改变平面上所 有(有面积的)图形的面积,因此把[d.] 称为仿射变换 c 的变积系 数.

求下述仿射变换的不动点。

$$\begin{cases} x' = 4x - y - 5, \\ y = 10, \dots, y \end{cases}$$

- (1) 求把点 $O_1E_1(1,0)_1E_2(0,1)$ 分别变成 A_1B_2C 的仿射变换公式;
 - (3) 求把点O, E_1 , E_2 分别变成A',B',C'的仿射变换公式;
 - (3) 求把点 A, B, C 分別变成 A', B', C' 的仿射变换公式。
- 3. 求把三条直线: x=0, x-y=0, y=1 依次变成3x-2y -3=0, x-1=0, 4x-y-9=0 的仿射变换的公式,
 - 4. 证明: 仿射变换

$$\begin{cases} x' = x \cos \theta - \frac{a}{b} y \sin \theta \\ y' = \frac{b}{a} x \sin \theta + y \cos \theta \end{cases}$$

把椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 变成它自身,但是当 $\theta = 2k\pi$ 时,此**椭圆上沒**有不动点。

5. 给了仿射变换 t:

$$\begin{cases} x' : z - 2x + 0y - 1, \\ y' = 4x - y + 3; \end{cases}$$

如果作仿射坐标变换:

$$\begin{cases} x = 2\tilde{x} - \tilde{y} + 4, \\ y = 3\tilde{x} + 2\tilde{y} + 5, \end{cases}$$

求工在新坐标系中的公式。

6. 如果一条直线与它在仿射变换工下的象重合,则称这条 直线为工的**不变直线。**求下述仿射变换的不变直线。

$$\begin{cases} x' = 7x - y + 1, \\ y' = 4x + 2y + 4. \end{cases}$$

7, 设仿射变换工在仿射坐标系 I 中的公式为

$$\begin{cases} x' = x + 2y, \\ y' = 4x + 3y_{\bullet} \end{cases}$$

- (1) 求 τ 的不变直线;
- (2) 以下的两条不变直线为新坐标轴,求下在新的仿射坐标系中的公式。
- 8. 证明:如果一个仿射变换有两个不 动 点 M_1 和 M_2 ,则 直线 M_1M_2 上的每个点在这仿射变换下不变。

$$\overrightarrow{OM'} = k\overrightarrow{OM},$$

其中 k 为正的常数,则称 τ 是同位相似(或位似),称 O 为位似中心,称 k 为位似系数。

- (1) 适当选取坐标系,求出位似 t 的公式;
- (2) 证明位似是仿射变换;
- (3) 证明位似保持角度不变;
- (4) 证明位似可以分解成某两个压缩的乘积。
- 10. 将纺射变换

$$\begin{cases} x' = 4x, \\ y' = 2y \end{cases}$$

分解成一个压缩和一个位似的乘积。

- 11. 平面的一个点变换 t, 如果使得 对应线段的长度之比为一个正常数 k, 则称 t 为相似、称 k 为相似系数。
 - (1) 证明相似保持角度不变;
 - (2) 证明相似是仿射变换;
 - (3) 写出相似在一个直角坐标系中的公式;
 - (4) 证明相似可以分解成一个正交变换与一个位似的乘积;
 - (5) 证明相似保持任意两条线段的比值不变。
 - 12. 设平面的一个仿射变换 r 使直线 l 上的每一点都不变,

设 t 把 A, B 分别变到 A', B', 证明:

- (1) 直线 *AB* 与 *A'B'* 或者同时平行于 *l* , 或者相交于 *l* 上一点;
 - (2) 直线 AA' 与 BB' 彼此平行。
- 13. 对于第12题中的 τ ,假如有一个点M和它的 象 点 M'的 连线 MM' #l,这时称 τ 为错切,称 l 为错切轴。证明:在适当 选取的仿射坐标系里,错切的公式是

$$\begin{cases} x' = x + ay, \\ y' = y, \end{cases}$$

幷且证明错切不改变图形的面积.

- 14. 证明: 不是错切的保持一直线 L 上每个点都不变的仿射变换是一个斜压缩,或者是一个斜压缩与一个反射的乘积。
- 15. 求保留两点 $M_1(x_1,y_1), M_2(x_2,y_2)$ 不变的平面 仿射变换公式。
- 16. 设在平面上给了两个三角形 ABC 和 DEF,问有几个仿射变换把 $\triangle ABC$ 变成 $\triangle DEF$?
- 17. 证明:平面上任给两个直角标架 I 和 II,都存在唯一的正交变换把 I 变成 II。
- 18. 设△ABC 的 AB,BC 边长分别为10cm,6cm, ∠ABC = 30°, 设仿射变换 τ:

$$\begin{cases} x' = 2x + y + 1, \\ y' = x - 4y + 2 \end{cases}$$

把 A,B,C 分别变成 A',B',C', 求 $\triangle A'B'C'$ 的面积。

§ 4 图形的度量性质和仿射性质

本章开头曾指出,研究图形性质可以采用点变换法,即,作一个点变换,把一个图形C变成另一个较简单的图形C'。所谓一个点变换 σ 把图形C变成C',是指 σ 引起了C(作为点的集合)

到 G' (点的集合)的一个双射。如果 σ 把图形 G 变成 G' ,则 G 和 G' 就共同具有在 σ 下不变的那些性质。为此本书 来 讨 论在正交 变换下不变的儿何性质和在仿射变换下不变的儿何性质。

4.1 度量性质和仿射性质

定义6.11 在任意正交变换下不变的几何 性 质(或几何量、几何概念)称为度量性质(或正交不变量、度量概念), 在 任 意仿射变换下不变的几何性质(或几何量、几何概念)称 为 仿 射 性质(或仿射不变量、仿射概念)。

因为正交变换都是仿射变换,所以在仿射变换下不变的性质 在正交变换下当然也不变,这说明仿射性质(仿射 概 念、仿射不 变量)都是度量性质(度量概念、正交不变量)。但是 反 之, 度量 性质不一定是仿射性质。下面列举出不是仿射性质的度量性质。

度量性质有: ① 乖直; ② 轴对称。


正交不变量有: ① 点之间的距离; ② 向量的 长度; ③ 两向量的夹角; ④ 图形的面积; ⑤二次曲 线 S 的 $^I_1, ^I_2, ^I_3$ (因 为 $^I_1, ^I_2, ^I_3$ 在直角坐 标变 换下不变,而 正交点变 换公式与直角坐标变换公式在形式上一样, 所以 $^I_1, ^I_2, ^I_3$ 在 正 交 点 变 换下不变).

度量概念有; ① 距离(长度); ② 角度; ③ 面积; ④ 对称轴。

现在来看哪些性质是仿射性质。.

仿射性质有,① 共线;② 平行;③ 相交;④ 共线点的顺序;⑤ 中心对称。

关于中心对称是仿射性质的理由: 设仿射变换 τ 把图形 C 变成 C',设 C 是中心对称图形,其对称中心为 O,设 O C τ 下的象是 O'。在 C' 上任取一点 P',它的原象 P 在 C 上。因为 C 中心对称,所以 P 关于 O 点的对称点 Q 在 C 上。设 Q \mapsto Q' ,则 Q' 在 C' 上。因为 O 是线段 PQ 的中点,所以 O' 是线段 P' Q' 的中点,






图 6.4

从而 Q' 是 P' 关于 Q' 的对称点。这就证明了,Q' 上任一点 P' 关于 Q' 点的对称点 Q' 仍在 Q' 上,因此 Q' 是中心对称 图形,其对称中心为 Q'。

仿射不变量有; ① 共线三点的简单比值; ② 代数曲线的次数。

仿射概念有:① 直线;② 线段,线段的 中点;③ 对称中心;④ 代数曲线;⑤ 二次曲线的渐近方向、非渐近方向;⑥ 二次曲线的直径;⑦ 中心型二次曲线的共轭直径;⑧ 二次曲线的切线。

*关于二次曲线的渐近方向、直径、共轭直径和 切 线是仿射概念的理由、平面上取定一个仿射坐标系,设二次曲线S的方程的二次项部分为

$$\varphi(x,y) = (x,y) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \tag{6.21}$$

其中 $\varphi(x,y)$ 的矩阵简记作 A.

设仿射变换工的公式为

$$\binom{x'}{y'} \approx B \binom{x}{y} + \binom{b_1}{b_2}, \tag{6.22}$$

则を的公式为

$$\binom{u'}{v'} = B \binom{u}{v}, \tag{6.23}$$

设 τ 把二次曲线 S 变成 S' ,从(6.22)反解出(x,y),再代入到(6.21)中可求得 S' 的方程的二次项部分为

$$\varphi'(x',y') = (x',y')(B^{-1})^{i}AB^{-1}\binom{x'}{y'},$$

对于任一向量v(u,v),设 v 把 v 变成 v'(u',v'),则有

$$\varphi'(u',v') = (u',v')(B^{-1})^{t}AB^{-1}\binom{u'}{v'} = \left[B^{-1}\binom{u'}{v'}\right]^{t}A\binom{u}{v}$$

$$= (u,v)A\binom{u}{v} = \varphi(u,v). \tag{6.24}$$

(6.24)说明, 若v(u,v)是S的渐近方向(非渐近方向),则v'(u',v')是S'的渐近方向(非渐近方向).

因为在仿射变换 τ 下,二次曲线 S 的 弦 变 成 S' 的 弦, S 的 不行弦变成 S' 的 平行弦, S 的 弦的中点 变 成 S' 的 相 应 弦的中点, 所以如果 I 是 S 的 直径, 则 I 在 τ 下的象 I' 是 S' 的 直 径。

设 l_1, l_2 是S的一对共轭直径(此时假设S是中心型曲线),设 l_1 的方向为 $v_i(u_i, v_i)$ 。由于 l_2 共轭于 l_1 的方向(u_1, v_1),所以 l_2 的方程据(5.58)为:

は、

$$(a_{11}u_1 + a_{12}v_1)x + (a_{12}u_1 + a_{22}v_1)y + a_1u_1 + a_2v_1 = 0$$
,
因此 $u_2: v_2 = -(a_{12}u_1 + a_{22}v_1): (a_{11}u_1 + a_{12}v_1)$,
即 $a_{11}u_1u_2 + a_{12}(u_1v_2 + u_2v_1) + a_{22}v_1v_2 = 0$.

设 r 把 4 变成 以, 把 n 变成 vi(ui, vi), i=1,2。则有

$$0 = a_{11}u_1u_2 + a_{12}(u_1v_2 + u_2v_1) + a_{22}v_1v_2$$

$$= (u_1, v_1) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_2 \\ v_2 \end{pmatrix} = (u'_1, v'_1) (B^{-1})^{t} A B^{-1} \begin{pmatrix} u'_2 \\ v'_2 \end{pmatrix}$$

$$= a'_{12} u'_1 u'_2 + a'_{12} (u'_1 v'_2 + v'_2 v'_1) + a'_{22} v'_1 v'_2, \qquad (6.25)$$

其中

$$(B^{-1})^{t}AB^{-1} = \begin{pmatrix} a'_{11} & a'_{12} \\ a'_{12} & a'_{22} \end{pmatrix},$$

因为(B^{-1})' AB^{-1} 是 S'的方程的二次项部分 $\varphi'(x',y')$ 的矩阵,所以 a'_{11},a'_{12},a'_{22} 是 S'的方程的二次项系数。由(6.25)知, l'_{11} 与 l'_{22} 是 S'的一对共轭直径。

因为渐近方向、非渐近方向是 仿 射 概 念,且相**交是仿射性** 质,所以二次曲线的切线是仿射概念。

4.2 变换群与几何学

度量性质是在所有正交变换下不变的性质,因此需要来讨论 平面的所有正交变换组成的集合H,从正交变换的性质知道,H有下述性质:

- (1) 对于任意 $\sigma, \tau \in H$, 有 $\sigma \tau \in H$,
- (2) 恒等变换ε在H里;
- (3) 任 $\sigma \in H$, 则 σ 可逆, 且 $\sigma^{-1} \in H$.

类似地,平面上所有仿射变换组成的集合也有这三条性质。

定义6.12 集合S到自身的一些双射组成的集合G,如果满足。

- (1) 对于任意 $\sigma, \tau \in G$, 都有 $\sigma \tau \in G$;
- (2) $\varepsilon_s \in G$;
- (3) 任意 $\sigma \in G$, 有 $\sigma^{-1} \in G$;

则称G是集合S的一个变换群。

于是,平面的所有正交变換组成的集合H是平面的一个变換群,称H为平面的**正交变換群**,平面的所有仿射变換组成的集合H。也是平面的一个变換群,称H。为平面的**仿射变换群**。

集合S到自身的所有双射组成的集合显然是S的变换群,称它为S的全变换群。

德国数学家克莱因(F.Klein)在1872年运用 变 换群的思想来区分各种几何学,他提出,每一种几何都是研究图形在一定的变换群下不变的性质。这就是著名的爱尔朗根纲领(Erlangen Program)。于是,研究图形在正交变换群下不变的性质(即,度量性质)的几何学称为欧几里得几何学,研究图形在 仿 射变换群下不变的性质(即仿射性质)的几何学称为仿射几何学。

4.3 图形的正交等价和仿射等价

利用所给的变换群可以把平面上所有图形进行分类。

定义6.13 平面上的图形 C_1 和 C_2 称为正交等价,如果存在一个正交变换 σ 把 C_1 变成 C_2 ,记作 $C_1 \sim C_2$ 。

正交等价是平面上图形之间的一种关系,它具有:

- (1) 反身性, 即任一图形 $C \sim C$, (因为 ε 把 $C \mapsto C$),
- (2) 对称性,即若 $C_1 \sim C_2$,则 $C_2 \sim C_1$,这是因 为 如果正交 变换 τ 把 C_1 变成 C_2 ,则正交变换 τ^{-1} 把 C_2 变成 C_1 ;
- (3) 传递性,即若 $C_1 \sim C_2$, $C_2 \sim C_3$,则 $C_1 \sim C_3$, 这是因为 如果正交变换 τ_1 把 C_1 变成 C_2 ,正 交 变 换 τ_2 把 C_2 变成 C_3 ,则 正交变换 $\tau_2 \tau_1$ 把 C_1 变成 C_3 .

对于平面上每个图形C,所有与C正交等价的图形组成的集合记作[C],称[C]是平面上图形的一个**正交等价类**。这样,平面上的所有图形被分成了若干个正交等价类,它们具有以下性质:

- (1) 若 $G \sim D$, 则[C] = [D];
- (2) 平面上每个图形属于且只属于一个正交等价类;
- (3) 同一正交等价类里的任意两个图形必正交等价;
- (4) 不同正交等价类里的两个图形不正交等价。

证明 (1) 任 $C_1 \in [C]$,即, $C_1 \sim C$,又 $C \sim D$,所 以 $C_1 \sim D$,于是 $C_1 \in [D]$,即, $[C] \subset [D]$,同 理, $[D] \subset [C]$,所以 [C] = [D]。

- (2) 平面上任取一个图形 C_1 , 因为 $C_1 \sim C_1$, 所以 $C_1 \in [C_1]$. 假如 $C_1 \in [C_2]$, 则 $C_1 \sim C_2$, 由(1)知, $[C_1] = [C_2]$.
 - (3) 若 $C_1, C_2 \in [C]$, 则 $C_1 \sim C$, $C_2 \sim C$, 从而 $C_1 \sim C_{2\bullet}$
- (4) 设[C] \Rightarrow [D], 设 $C_1 \in$ [C], $D_1 \in$ [D], 假 如 $C_1 \sim D_1$, 则由 $C_1 \sim C$, $D_1 \sim D$, $C_1 \sim D_1$ 可推 出 $C \sim D$, 于 是[C] = [D], 与已知矛盾,所以 $C_1 \sim D_1$.

既然同一个正交等价类里的任意两个图形都是正交等价的,


因此同一个正交等价类里的图形的共同性质就是在任意正交变换下不变的性质,即,度量性质。这样我们在研究图形 C 的度量性质时,就可以在[C]里挑一个最简单的图形来研究,这就是研究图形的正交分类的目的。

同样地, 平面的仿射变换群把平面上所有图形分成了一些仿射等价类(简称仿射类)。同一个仿射类里的任意两个图形是仿射等价的, 不同仿射类里的两个图形是不仿射等价的。因此, 同一个仿射类里图形的共同性质就是仿射性质。我们在研究图形C的仿射性质时, 就可以在C所属的仿射类里挑一个最简单的图形来研究。

例6.8 证明平面上所有平行四边形恰好组成一个仿射类。

证明 取一个平行四边形 ABCD, 任取 一个 平行四边形

EFGH,因为A,B,D不共线,E,F,H也不 共线,所以存在唯一的 仿射变换 τ 把A,B,D分别变成E,F,H,从 而 τ 把仿射标架 $\mathbb{I}[A,A]$ AB,AD]变成 $\mathbb{I}[E,A]$ EF,EH]。因为C点



的 I 坐标是(1,1),所以 $\tau(C)$ 的 II 坐标为(1,1)。由于 G 点的 II 坐标为(1,1),因此 $\tau(C) = G$ 。于是 τ 把平行四边形 ABCD 变成平行四边形 EFGH,即 $\Box EFGH \in [\Box ABCD]$ 。由于 任 一 仿射变换把平行四边形变成平行四边形,因此在[$\Box ABCD$]里只有平行四边形。

习 题 6.4

- 1. 证明:三角形的中线、重心都是仿射概念。
- 2. 证明:三角形的角平分线是度量概念。

- 3. 证明: "一点是三角形内部的点"是仿射性质。
- 4. 证明: 平面绕一个固定点转90°,180°,270°的 三个旋转 $\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3$ 和恒等变换 ε 组成一个变换群。
- 5. 当 *a*,*b* 取任意不全为零的实数时,问所有下列仿射变换组成的集合是否成为一个变换群。

$$\begin{cases} x' = ax - by, \\ y' = bx + ay, \end{cases}$$

- 6. 证明,平面上所有保持面积不变的仿射变换构成一个变换群。
- 7. 证明:两个三角形正交等价 的 充 分 必要条件是它们全等。
- 8. 证明: 两对相交直线正交等价的充分必要条件是它们的 夹角相等。
 - 9. 证明:任意两对相交直线必然仿射等价。
 - 10、证明, 平面上所有三角形恰好组成一个仿射类。
- 11.证明,平面上的梯形有无穷多个仿射类,从而说明平面上的四边形有无穷多个仿射类。

§ 5 二次曲线的正交分类和仿射分类

平面上的二次曲线能分成多少个正交等价类? 多 少 个 仿 射 类?

在第五章 § 1里我们已经知道平面上的二次曲线有九种,它们是:椭圆,跪椭圆,一个点,双曲线,一对相交直线,抛物线,一对平行直线,一对虚平行直线,一对重合直线、

现在取定一个直角坐标系 $[O;e_1,e_2]$ 。

任取一个椭圆,它总可以经过正交变换(平移和旋转的乘积) 变成中心在原点、对称轴为坐标轴的椭圆:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \tag{6.26}$$

再作仿射变换

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{a}x, \\ y' = \frac{1}{b}y \end{cases}$$

可把椭圆(6.26)变成圆心在原点的 单 位 圆: $x^2 + y^2 = 1$. 因此,任一椭圆与圆心在原点的单位圆(记作 C_1) 仿射等价。

类似地,任一虚椭圆与虚单位圆 $x^2 + y^2 = -1$ (记作 C_2)仿 射等价,任一点与原点 $x^2 + y^2 = 0$ (记作 C_3)仿射等价,任一 双曲线与中心在原点的等轴双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ (记作 C_4)仿 射等价,任意一对相交直线与交点在原点的相交直线 $x^2 - y^2 = 0$ (记 作 C_5)仿射等价。

任取一条抛物线可以经过正交变换(平移和旋转的乘积)变成顶点在原点、对称轴为x轴的抛物线 $y^2 = 2px$,再作仿射变换

$$\begin{cases} x' = 2px, \\ y' = y \end{cases}$$

可以变成抛物线 $y^2 = x$, 因此任一抛物 线 与 $y^2 = x$ (记作 C_6) 仿射等价。

任意一对平行直线总可以经过正交变换(平移和施转的乘积)变成平行直线 $y^2 = a^2$,再作仿射变换

$$\begin{cases} x' = x, \\ y' = \frac{1}{a} y \end{cases}$$

可以变成平行直线 $y^2=1$,因此任意一对平行直线 与 $y^2=1$ (记作 C_7)仿射等价。类似地,任意一对虚平行直线与 $y^2=-1$ (记作 C_8) 仿射等价,任意一对重合直线与 x 轴,即, $y^2=0$ (记作 C_8) 符 射等价。

综上述,二次曲线至多有九个仿射类,它们是 $[C_i]$, $i=1,2,\cdots,9$.

 C_3 是一个点,由于仿射变换把一个点变成一个点,因此[C_3] \Rightarrow [C_i], $i \Rightarrow 3$.

 C_0 是一对重合直线,由于仿射变换把直线变成 直 线,因此 $[C_0] \Rightarrow [C_i]$, $i \Rightarrow 9$.

 C_7 是一对平行直线,由于仿射变换把平行 直 线 变成平行直线,因此 $[C_7]$ \Rightarrow $[C_i]$, i \Rightarrow 7 。

由于仿射变换把相交直线变成相交直线,因此 $[C_i]$ \uparrow $[C_i]$, i \uparrow \uparrow 5.

 C_6 是抛物线,它不是中心对称图形,而 C_1,C_4 均 是 中心对称图形,所以[C_6] \div [C_1],[C_4]。又显然[C_6] \div [C_2],[C_8]。

 C_1 是圆, C_4 是双曲线,因为圆沒有渐近 方 向,双曲线有渐近 方 向,所 以 $[C_1] + [C_4]$ 。又 显 然 $[C_1] + [C_2]$, $[C_8]$, $[C_4] + [C_2]$, $[C_8]$ 。

 C_2 是椭圆型曲线,光渐近方向,而 C_8 是抛物型曲线,有渐 近方向,所以 $[C_2] \div [C_8]$.

上述表明, 平面上的二次曲线恰好 分 成 了 九个不同的仿射 类。

从上面的讨论还可看出, 平面上所有二次曲线分成无穷多个 正交等价类, 在每一类里取一个代表, 则所有这些代表是

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1, \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0, \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$$
, $y^2 = 2px$, $y^2 = a^2$, $y^2 = -a^2$, $y^2 = 0$,

其中 a,b,p 可以取任意正实数。

作为二次曲线的仿射分类的应用, 我们来证明

定理6.11 平面的任一仿射变换 τ 可分解成一个正交变换与两个沿互相垂直的方向的压缩(拉伸)的乘积。

证明 考虑國心在点O的单位圆C,设仿射变换 τ 把C变成

中心为O'的椭圆O'、在O'上取长轴 I_1 和短轴 I_2 ,它们是O'的




图 6.6

利用二次曲线的仿射分类,可以解决本章开始时提出的问题。

例6.9 证明: 椭圆的任意一对 共 轭直径把椭圆分成四块面积相等的部分。

证明 任给一个椭圆C,任取它的一对共轭直径 l_1 和 l_2 。因为椭圆和圆心在原点的单位圆 C_1 在同一个仿射类,所以存在一个仿射变换 τ 把C变成 C_1 。由于共轭直径是仿射概念,因此 τ 把 l_1 和 l_2 变成 C_1 的一对共轭直径 l_1 和 l_2 。设C被 l_1 和 l_2 分成的

四块是 $C^{(1)}$, $C^{(2)}$, $C^{(3)}$, $C^{(4)}$, 设 C_1 被 l_1 和 l_2 分成的相应四块是 $C^{(1)}$, $C^{(2)}$, $C^{(3)}$, $C^{(4)}$, 则显然 τ 把 $C^{(1)}$ 变 成 $C_1^{(1)}$, i=1,2,3,4。因为圆 C_1 的共轭直径互相垂直,所以 $C^{(1)}$, $C^{(2)}$, $C^{(3)}$, $C^{(4)}$ 的面积相等。由于 $C^{(4)}$ 与 $C^{(1)}$ 的面积之比等于 τ 的变积系数, i=1,2 , 3,4 ,所以 $C^{(1)}$, $C^{(2)}$, $C^{(3)}$, $C^{(4)}$ 的面积也相等。

习题 6.5

- 1. 证明长半轴为a、短半轴为b的椭圆的面积是 πab .
- 2. 证明,以椭圆的一对共轭华径为边的平行四边形的面积是一个常数。
- 3. 证明: 椭圆的过共轭直径与椭圆的交点的切线构成的平 行四边形的面积是一个常数。
- 4. 证明, 椭圆的任一外切平行四边形的两条对角线所在的 直线是椭圆的一对共轭直径。
 - 5. 证明:以椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

的任意一对共轭直径和椭圆的交点为顶点的平行四边形的面积都等于 2ab.

- 6. 证明, 所有內接于椭圆的四边形中间, 面积最大的是以一对共轭直径和椭圆的交点为顶点的平行四边形。
- 7. 任给一个三角形 ABC, 设 D, E, F 分别是 AB, BC, CA 的中点. 证明: 存在一个椭圆,它与 $\triangle ABC$ 的三边 分 别相切于 D, E, F; 并且求出这个椭圆的面积与 $\triangle ABC$ 的面积的比值.
- 8. 能否在椭圆里作一个内接三角形,使得过它的每个顶点。 的切线都与对边平行?如果椭圆的长、短半轴分别等于 a 和 b , 这个三角形的面积等于什么?
- 9. 证明: 內切于一个平行四边形的二次曲线必是中心型二次曲线,且其中心就是平行四边形的对称中心。

- 10. 证明:双曲线的切线和它的渐近线确定的三角形的面积 是一个常数。
 - 11,证明:双曲线两条渐近线之间的切线线段被切点等分。
 - *12. 证明:相似变换把任意一个圆变成圆。
- *13、证明:如果平面的仿射变换τ将一个圆变成它 自身,则τ是正交变换。

§ 6 空间的正交变换和仿射变换

定义6.14 空间的一个点变换 σ ,如果它在一个直角坐标系中的公式为

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \quad (6.27)$$

其中系数矩阵 $A = (a_{ij})$ 是正交矩阵,则称 σ 是**空间的正交**(点) 变换。

此定义与直角坐标系的选择无关。

例6.10 空间中由向量 $v(a_1,a_2,a_3)$ 确定的平移是空间的正交变换,它在给定的直角坐标系中的公式为

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$$
 (6.28)

例6.11 空间中所有点绕一条定直线 l 的旋转是空间的正交变换,理山如下: 以 l 为 z 轴建立直角坐标系 I [O; e_1 , e_2 , e_3]。 设旋转的角度为 θ ,设 e_i 转 θ 角后变成 e_i' , i=1, 2。 于是 II [O; e_1' , e_2' , e_3'] 也是直角标架,并且易看出 I 到 II 的过 渡矩阵是

$$A = \left(egin{array}{ccc} \cos heta & -\sin heta & 0 \ \sin heta & \cos heta & 0 \ heta & 0 & 1 \end{array}
ight),$$

设室间中任一点 P(x,y,z) 在旋转下的象为 P'(x',y',z'),显然 p'的 Π 坐标等于 P的 Π 坐标(x,y,z),对 P' 点用直角坐标 变换公 式得

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \tag{6.29}$$

(6.29)也表示了P和它的象P'的 I 坐标之间的关系,因此这是所给旋转在 I 中的公式,由于它的系数矩阵是正交矩阵,所以空间绕定直线的旋转是正交变换,这条定直线称为转轴。

例6.12 空间对于一个平面 π 的反射 (称为镜面反射)就 是 把每一点变到它对于这个平面的对称点, 这是正交变 换。 理 由是,我们可以取平面 π 为xOy 面建立一个直角坐标系,则任一点 P(x,y,z) 对于 xOy 面的对称点 P'(x',y',z') 为

$$\begin{cases} x' = x, \\ y' = y, \\ z' = -z, \end{cases} \tag{6.30}$$

(6.30)的系数矩阵是正交矩阵,因此,镜面反射是正交变换。

空间的正交变换有下列性质:

- (1) 保持点之间的距离不变;
- (2) 两个正交变换的乘积仍是正交变换;
- (3) 恒等变换是正交变换;
- (4) 正交变换是可逆的, 并且它的逆变换也是正交变换;
- (5) 把平面变成平面;
- (6) 把平行平面变成平行平面;
- (7) 把相交平面变成相交平面;
- (8) 把直线变成直线;
- (9) 把线段变成线段,且保持线段的分比不变;
- (10) 把平行直线变成平行直线;
- (11) 空间的正交点变换 σ 引起了空间的一个正交 向量变 换

 $\dot{\sigma}$. 设 $\mathbf{m} = \overrightarrow{PQ}$,则 $\mathbf{\sigma}(\mathbf{m}) := \overrightarrow{P'Q'}$,其中 $P' = \sigma(P)$, $Q' = \sigma(Q)$. σ 保持向量的加法,保持向量的数乘,保持向量的内积不变,保持向量的长度不变,保持向量的夹角不变;

- (12) 空间的正交变换把任意一个直角标架 I 变成直角 标 架 II, 且任一点P的 I 坐标等于它的象P'的 II 坐标;

定义6.15 空间的正交变换 σ , 若它在直角坐标系中的公式的系数矩阵A的行列式|A|=+1, 则称 σ 为第一类的,若|A|=-1, 则称 σ 是第二类的。

*命题6.1 若σ是第一类正交变换,且它保持原点 O 不动,则σ必定是绕过原点的某一条定直线的旋转。

**证明 因为σ保持原点不动,所以σ在直角坐标系 I 中的 公式为

$$\left(\begin{array}{c} x'\\ y'\\ z'\end{array}\right) = A\left(\begin{array}{c} x\\ y\\ z\end{array}\right),$$

其中A是正交矩阵,且|A|=+1。由于A是 3 级矩阵,因此 1 是 A 的特征值。由于正交矩阵的特征多项式的根的模等于 1 ,因此可以设A 的特征多项式的另两个根为 $\cos\theta\pm i\sin\theta$ 。于是存在一个正交矩阵T 使得

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0\\ \sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

取另一个直角标架 Π ,使 Π 的原点仍为 Ω ,且 Π 到 Π 的过渡矩阵为 Π ,则 Π 到 Π 的点的坐标变换公式为

$$\left(\begin{array}{c} x \\ y \\ z \end{array}\right) = T \left(\begin{array}{c} \tilde{x} \\ \tilde{y} \\ \tilde{z} \end{array}\right),$$

其中($\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z}$)是点(x, y, z)在 Π 中的坐标。于是 σ 在 Π 中的公式为

$$T\left(\begin{array}{c} \tilde{x}'\\ \tilde{y}'\\ \bar{z}' \end{array}\right) = AT\left(\begin{array}{c} \tilde{x}\\ \tilde{y}\\ \tilde{z} \end{array}\right),$$

即

$$\begin{pmatrix} \tilde{x}' \\ \tilde{y}' \\ \tilde{z}' \end{pmatrix} = T^{-1}AT \begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \\ \tilde{z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \\ \tilde{z} \end{pmatrix}.$$

由此看出, σ 是绕 Π 的 Ξ 轴的旋转,转角为 θ .

*命题6.2 若σ是第二类正交变换,且保持原点〇不动,则 σ必为一个镜面反射, 或者为一个镜面反射与一个绕定直线的旋 转的乘积。

证明与命题 6.1 的证明类似,只需注意: 因为|A| = -1,所以 -1 是 A 的特征值。

由正交变換的性质(2),(3),(4)知, 空间的所有正交变 换 组成一个变换群。

定义6.16 空间的一个点变换 τ , 如果它在一个仿射坐标系中的公式为

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \qquad (6.31)$$

其中系数矩阵A为非奇异的,则称 τ 是**空间的仿射**(点)变换。

此定义与仿射坐标系的选择无关。

空间的仿射变换的性质有:

- (1) 两个仿射变换的乘积仍是仿射变换;
- (2) 恒等变换是仿射变换;
- (3) 仿射变换是可逆的,且它的逆变换是仿射变换;
- (4) 把平面变成平面;
- (5) 把平行平面变成平行平面;

- (6) 把相交平面变成相交平面;
- (7) 把直线变成直线;
- (8) 保持共线三点的简单比值不变;
- (9) 把线段变成线段;
- (10) 把平行直线变成平行直线;
- (11) 空间的仿射点变换下引起了空间一个仿射向量变换下, 并且下保持向量的加法,保持向量的数乘;
- (12) 把任意一个仿射标架 I 变成仿射标架 I ,且任一点 P 的 I 坐标等于它的象 P' 的 I 坐标;
- (13) 若两个仿射变换在同一个仿射标架上的作用相同,则它 们相等。

定理6.72 室间中任给两组不共 面 的 四 点 A_1, A_2, A_3, A_4 和 B_1, B_2, B_3, B_4 , 必然存在唯一的仿射变换 把 A_i 变 成 $B_i, i=1,2$, 3,4。

证明方法与定理6.9类似。

定理6.13 设空间的仿射变换 τ 在仿射坐标系 I 中的公式为 (6.31),对于空间中任意三个不共间的向量 a , b , c , 设它们在 τ 下的象分别是 a' , b' , c' , 则有

$$\frac{a' \times b' \cdot c'}{a \times b \cdot c} = |A|.$$

证明 设τ把仿射标架 I [O; e₁, e₂, e₃]变成 II [O'; e'₁, e'₂, e'₃], 由τ的公式(6.31)得, e'_i 的 I 坐标为(a_{1i}, a_{2i}, a_{3i}), i = 1, 2, 3. 因 此

$$e_1' \times e_2' \cdot e_3' = |A|e_1 \times e_2 \cdot e_3.$$

设a,b,c的 I 坐标分别为 $(x_1,y_1,z_1),(x_2,y_2,z_2),(x_3,y_3,z_3),$ 则a',b',c'的 I 坐标也分别是这些。于是

$$egin{aligned} oldsymbol{a'} imes oldsymbol{b'} ullet oldsymbol{c'} & oldsymbol{z_1} & oldsymbol{x_2} & oldsymbol{x_2} & oldsymbol{x_2} & oldsymbol{x_3} & oldsymbol{e'_1} imes oldsymbol{e'_2} ullet oldsymbol{e'_2} ullet oldsymbol{e'_3} \ oldsymbol{z_1} & oldsymbol{z_2} & oldsymbol{z_3} \ oldsymbol{z_1} & oldsymbol{z_2} & oldsymbol{z_3} \ oldsymbol{z_1} & oldsymbol{z_2} & oldsymbol{z_3} \ oldsymbol{e'_1} & oldsymbol{z_2} oldsymbol{e'_2} oldsymbol{e'_3} \ oldsymbol{e'_1} & oldsymbol{e'_2} oldsymbol{e'_3} \ oldsymbol{e'_1} \ oldsymbol{e'_2} oldsymbol{e'_3} \ oldsymbol{e'_1} \ oldsymbol{e'_2} oldsymbol{e'_3} \ oldsymbol{e'_1} \ oldsymbol{e'_2} \ oldsymbol{e'_2} \ oldsymbol{e'_3} \ oldsymbol{e'_1} \ oldsymbol{e'_2} \ oldsymbol{e'_2} \ oldsymbol{e'_3} \ oldsymbol{e'_2} \ oldsymbol{e'_3} \ oldsymbol{e'_4} \ oldsymbol{e'_4} \ oldsymbol{e'_4} \ oldsymbol{e'_4} \ oldsymbol{e'_4} \ oldsymbol{e'_4} \ oldsymbol{e'_5} \ oldsymbol{e$$

$$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c} = \left| \begin{array}{ccc} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{array} \right| \boldsymbol{e}_1 \times \boldsymbol{e}_2 \cdot \boldsymbol{e}_3.$$

所以

$$\frac{a' \times b' \cdot c'}{a \times b \cdot c} = \frac{e'_1 \times e'_2 \cdot e'_3}{e_1 \times e_2 \cdot e_3} = |A|.$$

易知仿射变换 τ 的公式中的系数矩阵的行列式与坐标系的选择无关,因此可以称|A|是 τ 的行列式,记作 d_{ss}

定理6.13表明,空间的一个仿射变换 τ 按同一比值 d, 改 变任意平行六面体的定向体积,从而它按同一比值 $|d_r|$ 改变 空间中任意区域的体积。

由仿射变换的性质(1),(2),(3)知, 空间中所有仿射变换组成一个变换群。

习 题 6.6

1. 证明下述空间的点变换是第一类正交变换, 并且求转轴。

$$\begin{cases} x' = \frac{2}{3}x - \frac{2}{3}y + \frac{1}{3}z, \\ y' = \frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y, \\ z' = -\frac{1}{3\sqrt{2}}x + \frac{1}{3\sqrt{2}}y + \frac{4}{3\sqrt{2}}z. \end{cases}$$

- 2. 在直角坐标系中,求出把点(0,0,0),(0,1,0),(0,0,1)分 别变成点(0,0,0),(0,0,1),(1,0,0)的正交变换公式。
- - 4. 设σ是空间的第一类正交变换,证明:对于空间的任意 236

两个向量 v1, v2, 有

- (1) $\ddot{\sigma}(\mathbf{v}_1) \cdot \overline{\sigma}(\mathbf{v}_2) = \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2;$
- (2) $\overline{\sigma}(v_1) \times \overline{\sigma}(v_2) = \overline{\sigma}(v_1 \times v_2)_{\bullet}$
- 5. 建立把点(0,0,0),(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)分别 变 为点(x_1,y_1,z_1),(x_2,y_2,z_2),(x_3,y_3,z_3),(x_4,y_4,z_4)的 仿 射 变 换 公式.
 - 6. 求出在仿射变换

$$\begin{cases} x' = 2x + y + z - 1, \\ y' = x + z - 1, \\ z' = -z + 2. \end{cases}$$

下,坐标平面 xOz 所变成的平面。

- 7. 求保持 xOy 面上每一点都不动的一切仿射变换。
- 8. 证明:如果一个仿射变换有三个不共线的不动点,则这三点所确定的平面上的每一点都是不动点;又如果这个仿射变换有四个不共面的不动点,则它是恒等变换。
 - 9. 求空间的仿射变换,已知
- (1) 平面 x + y + z = 1 上 何个 点都是不动点, 而点(1,-1,2) 交成点(2,1,0);
- (2) 直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-1}$ 上每个点都是不动点,而点(0,0,0) 和(1,0,0)互变;
- (3) 保持平面 x+y-1=0, y+z=0, x+z+1=0 都不变,而点(0,0,1)变成点(1,1,1).
 - 10. 求椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$


围成的区域的体积。

*11. 不用命题 6,1,证明第一类正交变换σ至少有 两个不动点。

第七章 射影平面和它的射影变换

迄今为止,我们介绍了解析几何的主要研究方法:坐标法,向量法,坐标变换法以及点变换(正交变换和仿射变换)法, 并且利用这些方法研究了一些图形的度量性质和仿射性质。所有这些都是在普通的欧儿里得空间(或平面)进行的。

在上一章我们看到平面的仿射变换的重要特性是,把共线的三点变成共线的三点。在实际生活中我们还会遇到更一般的从一个平面到另一个平面的保持点的共线关系不变的映射。譬如,就 空摄影时我们要把地面(假定是平的)上的景物摄到底片上,这 可以看成是地面 π。到底片 π1 的一种保持点的共线关系不变的映射。如果 π。和 π1 平行,则上一章讲的平面的仿射变换的理论可以完全照搬到这种映射上。但是,山于飞机在飞行时的颠簸,所以装在飞机上的摄影机的镜头一般地说不是正好铅直 地 对着 大地,从而底片 π1 与地面 π2 不平行,这种情形如图7.1所示,即,



 π_0 和 π_1 是两个相交平面, O 是不在这两个平面上的点。 将平面 π_0 上的点 P 变成平面 π_1 与直线 OP 的交点 P' 的法则称为平面 π_0 到 π_1 上以 O 为投影中心的中心投影。 显然, 在中心投影下,点的 共线关系仍然是保持的。 但是, π_0 上的点 M 如果使得 OM $\#\pi_1$,

则 M在 π_1 上沒有象;同样地, π_1 上的点N如果使得 ON $//(\pi_0)$,则 N在 π_0 上沒有原象。为了弥补这些缺陷,使中心投影成为映射, 幷且为双射,就需要在平面 π_1 上添加一些新的点, 使得 π_0 上M 这样的点(它们形成一条直线)都有象; 而在平面 π_0 上也 添加一些新的点,使得 π_1 上N 这样的点(它们也形成一条直线)都有原象。这样的添补就形成了射影平面的概念。

这一章就是研究射影平面;研究射影平面到自身(或者到另一个射影平面)的具有保持点的共线关系不变的特性的映射,称之为射影变换(或者射影映射);以及研究射影平面上的一次曲线和二次曲线,即,一次和二次曲线的射影理论。

§1 射影平面,齐次坐标

1.1 中心为0的把与扩大的欧几里得平面

本章的开头我们讲到为了使中心投影成为双射就应当在欧几里得平面上添加一些新的点。为了进行这项添补工作,我们再仔细考察一下中心投影的过程。为此我们先引进一些基本定义。

我们知道,基本的几何元素是点、直线和平面,一般的图形都是由这些基本元素按照一定的关系组成的。它们之间最简单的关系是位置关系,譬如,一点在一直线上,一直线经过一点,一平面经过一直线等。为了简单起见,这种关系我们将统一地用"关联"来表示。譬如,点P在直线l上,就说点P与直线l关联,直线l经过点P,就说直线l与点P关联。显然"关联"关系是对称的,即,譬如若点P与直线l关联,则必然有直线l与点P关联。

我们现在不考虑距离、角度、面积以及平行等这些比较复杂的度量性质和仿射性质,而只考虑基本元素之间最简单的位置关系:"关联"。用这样的观点来看一个平面 π, 那就是只考虑与此平面关联的元素,即,我们看到的就是: 所有与平面 π关联的点

P和直线 l . 这样,平面 π 就被看成一些点和直线的集合, 记作 $\pi = [P, l]$. 用同样的观点来看点 O , 那末我们看到的就是,所有与点 O 关联的平面 λ 和直线 p . 今后我们将与一个点 O 关联的所有平面和直线组成的集合称为中心为 O 的把,仍用与点同样的符号 O 来表示这个把,并且记作 O = $[\lambda, p]$.

现在我们从这个观点来考察中心投影的过程,就发现把与平面之间存在着简单而且自然的对应关系。设点 O 不在平面 π上,则平面 π上的每个点 P 决定把 O 的一条直线 O P,平面 π上的每条直线 l 决定把 O 的一个平面,即,点 O 与直线 l 所确定的 平面,记作 O l。这样就得到从平面 π 到把 O 的一个对应关系,称为 π 在把 O 上的射影,并记作

$$O[P,l] = [OP,Ol]_{\bullet}$$

类似地,反过来从把〇到平面 π 也有一个对应关系: 把〇的平面 λ 与平面 π 交于一条直线,这条直线用 $\pi\lambda$ 表示, 把〇的直 线 p 与平面 π 交于一个点,这个点用 πp 表示,我们将这个对应关系称 为把〇在平面 π 上的**截影**,并记作

$$\pi[\lambda,p] = [\pi\lambda,\pi p]_{\bullet}$$


容易看出,经过射影和截影,"关联"关系是不改变的,这 个事实具有基本的重要意义。

现在我们看出,中心投影可以分解成为射影和截影两个步骤:从平面元。到平面元,上以点0为投影中心的中心投影实际上就是元。在把0上的射影与把0在元,上的截影的复合(乘积)。图7.1中,元。上的点M在中心投影下沒有象,这是因为把0的直线OM在截影下沒有象;元上的点N在中心投影下沒有原象,这是因为把0的直线ON在射影下沒有原象。为什么把0中有的直线在截影下沒有象,有的直线在射影下沒有原象,其原因就在于欧几里得平面的结构与把的结构是不同的,弥补这一缺陷的方法应当是以把作为模型来将欧几里得平面加以扩充。

现在我们就以把〇作为模型来扩充欧几里得平面,使得射影

和截影能够成为它们之间的保持关联关系不变的双射。取一个欧几里得平面元。,使点 O 不在元。上。容易看出,在从元。到把 O 的射影下,把 O 中与元。平行的平面元。以及元。上的每条直线都没有原象;而在从把 O 到元。的截影下,把 O 中的平面元。以及元。上的每条直线都没有象。为了使射影和截影都成为双射,就应当在元。上加进一条直线来和把 O 的 平面元。对应,应当在元。上加进一些点来和把 O 的 平面元。上的直线对应,而且这么添加了新的元素(直、线和点)以后,应该使射影和截影仍保持关联关系不变,为此采

取如下的扩充方法:考虑到 π。上的每一条直线 l 在把 O 中的对应 平面 Ol 与 π'。有 唯一的交线 l'(见图 7.2), 因此规定在 π。的每一条直 线 l 上加进唯一的一个点来 与 l'相对应,这个点称为方 变线在把 O 中的对应平面与 而 2000 元。的交线都相同(见图 7.2),



而 π_0 上不平行的直线在把O中的对应平面与 π_0 的交线都不同,因此规定: π_0 上平行的直线有相同的无穷远点, π_0 上不平行的直线则有不同的无穷远点。最后为了与把O中的平面 π_0 对应,我们在 π_0 上还要加进一条直线作为 π_0 与 π_0 的交线,这条直线称为无穷远直线,于是无穷远直线对应于把O的平面 π_0 ,由于无穷远点所对应的把O的直线都在 π_0 上,因此规定无穷远点都在无穷远直线上。

把上面的结果总结一下:对于欧儿里得平面 π_0 ,在它的每一条直线上加进了一个无穷远点 P_{∞} ,平行的直线有相同的 无 穷远点,不平行的直线有不同的无穷远点(这样一来,与每个无穷远点对应的是一个完全确定的方向);所有的无穷远点组成一条无

穷远直线 l_∞ 。补充了这样一些无穷远点和一条无穷远直线的欧几里得平面就称为一个扩大的欧几里得平面,简称为扩大的欧氏平面,记作 σ_0 。

显然,扩大的欧氏平面元。与把〇之间的射影和截影就都成了保持关联关系不变的双射了。换句话说,在扩大的欧氏平面元。与把〇之间存在一个一一对应, 并且这个一一对应保持关联关系不变。说得更详细一点就是:扩大的欧氏平面元。上的全体点组成的集合与把〇的全体直线组成的集合存在一个一一对应, 并且如果元。上的点户与直线1关联,则把〇中跟户对应的直线便与跟1对应的平面关联。因此,从我们只考虑基本几何元素之间的关联关系这一观点来看,扩大的欧氏平面的结构与把的结构在本质上是一样的。由此我们抽象出射影平面的概念。

1.2 射影平面的定义和几何模型

定义7.1 由两类分别称为"点"和"直线"的元素所构成的集合 S,如果在其中的"点"和"直线"之间规定了某种称为"关联"的关系,并且 S中所有的"点"和所有"直线"可以分别与欧氏空间中一个把O的所有直线和所有平面建立一一对应关系,使得这对应关系保持关联性,则称 S为射影平面。

例7.1 欧氏空间中把O本身,如果称其中的直线为"点",称其中的平面为"直线",那么它就是一个射影平面。并且任意一个把W也是一个射影平面,这是因为通过平移可以在把W与把O之间建立——对应关系,并且这种对应保持关联性。

例7.2 扩大的欧氏平面 元。是一个射影平面。

例7.3 取定一个球面,球心为O,将球面的每一对对 径点(位于直径两端的一对点)看成一个"点",将球面的每一个大圆(球面与过球心的平面的交线)看成一条"直线",如果一对对径点在一个大圆上,则认为该"点"在该"直线"上,这样我

们就得到一个射影平面。这是因为,取把〇,把〇里的每一条直线1与球面有两个交点,即为球面的一对对径点,由于将它们看成一个"点",因此1对应于这个"点",把〇里的每个平面和与球面相交于一个大圆,因此和对应于一条"直线",这些分别是一一对应,并且若1在和上,则1对应的"点"在和对应的"直线"上,即这个对应保持关联性。因此,给了一个球面,按照上述解释后就成为一个射影平面(见图7.3)。

任意两个射影平面,由于它们的"点"、"直线"分别有一一对应关系,且这种对应保持关联性,因此它们的有关"点"和

"直线"的关联关系方面的性质是相同的,于是我们在研究这方面的性质时,就只要取一个射影平面作为代表来研究就可以了。今后我们常取把〇或者扩大的欧氏平面元。作为代表,这是因为把〇中"点"和"直线"的关联关系非常直观,并且由于把〇是在欧氏空间中,这样我们可以运




图 7.3

用欧氏空间的有关知识来 研 究 把 0 的 性质;至于扩大的欧氏平面元。由于它是由欧氏平面扩充而得到的,所以可通过元。来解决欧氏平面上的一些问题。

现在我们就利用把〇来研究射影平面上点与直线的 关 联 关 系。从把〇看,两条(不同的)直线唯一地决定一个通过它们的 平面,反过来,两个(不同的)平面相交于唯一的一条直线。所以,在射影平面上就有。

- 1. 两个点必与唯一的一条直线关联;
- 2. 两条直线必与唯一的一个点关联。

现在我们在扩大的欧氏平面 40 上检验一下上述事实。

欧氏平面上的一条直线(简称为欧氏直线)加进一个无穷远点后就成为扩大的欧氏平面上的一条直线,这样的直线称为扩大的欧氏平面上的射影直线。如上所述, π 。上的一条射影直线是由

π。的一条欧氏直线唯一确定的。从而在 π。的全体射影直线与 π。 的全体直线之间存在一个一一对应关系。但是要注意 π。上除了 射影直线外,还有一条无穷远直线。

现在来看元。上两个点必与唯一的一条直线关联的意义: 如果这两个点都是元。上的通常点,则它们决定一条欧氏 直线,从而就决定了一条射影直线。如果这两个点中的一个是通常点,另一个是无穷远点,那么它们也决定一条欧氏直线(就是通过这个通常点而与给定的无穷远点所对应的方向平行的直线), 因而 它们也就决定了一条射影直线。如果这两个点都是无穷远点,则它们决定了唯一的一条无穷远直线。

再看元。上两条直线必与唯一的一个点关联的意义: 两条射影直线交于一个通常点(如果它们对应的两条欧氏直线不平行)或者交于一个无穷远点(如果它们对应的两条欧氏直线平行); 一条射影直线和无穷远直线交手一个无穷远点。

由此可见,平行的概念在射影平面上是沒有意义的,因为射影平面上的任意两条直线都相交。

射影平面与欧氏平面还有一些不同之处。例如,射影平面上的直线是封闭的,好象圆周似的。这从按照把的模型引进无穷远点的规定可以直观地看出这一点:考虑元。上两个通常点在一条直线1上沿着相反的方向跑向无穷远,在把0中与这两个点对应的两条直线将都趋于把0中与1平行的那条唯一的直线,这说明元。上两个点在一条直线上沿着相反的方向远离时将达到同一个无穷远点。又如,在欧氏平面元。上,一条直线将平面分成两部份,但是射影平面元。上的一条直线则不能分割射影平面,譬如在元。上把无穷远线除掉,亦即除掉所有的无穷远点,我们得到的是一个欧氏平面元。,可见无穷远线并沒有把元。分成两块;由于从把的结构上看,射影平面上的无穷远线与其它直线并无本质的不同,因此,元。上的任一条直线都不能把元。分成两块。


1.3 点的齐次坐标

解析几何的基本方法是坐标法,因此自然会想到在射影平面上建立某种坐标系,使得每个点都有坐标。以前所讲的 仿射 坐标(或直角坐标)只能表示射影平面 星。上的通常的点,不能表示无穷远点,因此,这就需要把坐标的概念加以推广,使它既能表示通常的点也能表示无穷远点。

取扩大的欧氏平面元。作为射影平面的代表,为了给元。上的每个点建立坐标,考虑到元。上的全体点与把O中的全体直线在射影和截影下有一一对应关系,而把O中的每条直线又由该直线的方向完全决定,因此,自然想到下述方法:

定义7.2 对于扩大的欧氏平面 年6, 在 年6 上取一 个 仿 射标

架 $[O_1;e_1,e_2]$, 在 π_0 外取一点O, 令 $e_3=OO_1$, 对于 π_0 上任意一点M, 将M在把O中所对应的直线l的任一方向向量 v 在空间仿射标架 $[O_1,e_1,e_2,e_3]$ 下的 坐标 (x_1,x_2,x_3) 称为点M 在 $[O_1;e_1,e_2]$ 下的齐次仿射坐标,简称为齐次坐标。



加上"齐次"两个字的原因是:对于任一非零实数 λ ,(λx_1 , λx_2 , λx_3)与(x_1 , x_2 , x_3)表示把 0 中同一条直线,从而它们表示元。上的同一个点,因此,若(x_1 , x_2 , x_3)是 π 。上点 M的齐次坐标,那么(λx_1 , λx_2 , λx_3)($\lambda \Rightarrow 0$)也是点 M的齐次坐标。这说明: π 。上的每一个点 M的齐次坐标不唯一,但是它们成比例。

如果 (x_1,x_2,x_3) 与 (y_1,y_2,y_3) 不成比例,则它们表示把O中不同的直线,从而它们表示 π_0 上不同的点,因此, π_0 上 不同点的齐次坐标不成比例。

显然,平面 π_0 在[O; e_1 , e_2 , e_3]中的方程是 z=1,于是 向量 $v(x_1, x_2, x_3)$ 与 π_0 平行的充分必要条件是 $x_3=0$ 。由于 π_0 上 通常 点 M 对应于把 O 中与 π_0 相交的直线,因此它的齐次坐标(x_1, x_2, x_3) 中 $x_3 \neq 0$ 。由于无穷远点对应于把 O 中与 π_0 平行的 直 线,因此无穷远点的齐次坐标必形如($x_1, x_2, 0$),其中 x_1, x_2 不全为零。

现在我们来说明齐次坐标与仿射坐标的关系。设点M是平面元。上的通常点,(x,y)是它对于标架 $[O_1:e_1,e_2]$ 的仿射坐标,则 OM 对于标架 $[O_2:e_1,e_2,e_3]$ 的坐标就是(x,y,1),于是点M的齐次坐标 (x_1,x_2,x_3) 与(x,y,1)成比例:

$$(x_1, x_2, x_3) = \lambda(x, y, 1),$$

其中 λ ÷0、从而得

$$x = \frac{x_1}{x_3}, \quad y = \frac{x_2}{x_3},$$

其中 x_0 = 0.因此,通常点的齐次坐标和仿射坐标可以互相确定。现在考虑 π_0 上的无穷远点 P_∞ ,设它的齐次坐标为 $(x_1,x_2,0)$,这时在平面 π_0 上对于标架 $[O_1,e_1,e_2]$ 具有坐标 $(x,y)=(x_1,x_2)$ 的向量显然平行于 P_∞ 所对应的把 O 中的直线 (因为这条直线的方向向量为 $(x_1,x_2,0)$);反过来,平面 π_0 上的每一个方向 (x,y),在它的两个坐标 x,y 之后再添上一个 0 ,我们就可以得到这个方向上的无穷远点 P_∞ 的齐次坐标(x,y,0)。因此,无穷远点 P_∞ 的齐次坐标与它所对应的方向的仿射坐标(对于标架 $[O_1,e_1,e_2]$,可以互相确定。综上所述,我们看到, π_0 上每一个点的齐次坐标由 仿射坐标系 $[O_1,e_1,e_2]$ 完全决定,而与点 O 的选取无关。

有时我们把通常点M的仿射坐标(x,y)称为它的**非齐次坐标**.

1.4 直线在齐次坐标中的方程

元。上每个点都有齐次坐标,从而元。上每一条直 线就可以用关于齐次坐标 x_1, x_2, x_3 的方程来表示。

考虑 π_0 上的一条直线 AB, 设 A, B 在[O_1 , e_1 , e_2] 中的齐次 坐标分别为(a_1 , a_2 , a_3), (b_1 , b_2 , b_3), 设 A, B 分别对应于把 O 中的直线 l_1 , l_2 , 则在[O, e_1 , e_2 , e_3] 中坐标为(a_1 , a_2 , a_3), (b_1 , b_2 , b_3) 的向量 o_1 , o_2 分别为 l_1 , l_2 的方向向量。设 o_3 上任一点 o_4 的 齐 次 坐标为(o_4 , o_4 , o_5 , o_4 , o_5 , o_6 ,

点 $M(x_1,x_2,x_3)$ 在直线 AB 上的充分必要条件是把 O 里的直线 l_0 在 l_1,l_2 决定的平面上,于是 v_0,v_1,v_2 共面,从而

$$\begin{cases} x_1 = \lambda a_1 + \mu b_1, \\ x_2 = \lambda a_2 + \mu b_2, \\ x_3 = \lambda a_3 + \mu b_3, \end{cases}$$
 (7.1)

其中 λ,μ 是不全为零的实数,或者

$$\begin{vmatrix} x_1 & a_1 & b_1 \\ x_2 & a_2 & b_2 \\ x_3 & a_3 & b_3 \end{vmatrix} = 0,$$

肌

$$\eta_1 x_1 + \eta_2 x_2 + \eta_3 x_3 = 0, \tag{7.2}$$

其中

$$\eta_1 = \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{bmatrix}, \quad \eta_2 = - \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_3 & b_3 \end{bmatrix}, \quad \eta_3 = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}.$$

由于 A,B 是不同的两点,因此(a_1,a_2,a_3)与(b_1,b_2,b_3) 不成比例,从而 η_1,η_2,η_3 不全为零,这说明: 直线 AB 在齐次坐标中的方程 (7.2)是三元一次**齐次方程**。反过来,任意一个三元一次 齐 次方程都表示射影平面上的一条直线,这也是容易证明的。

(7.1) 称为直线 AB 在齐次坐标中的参数方程。

由于无穷远直线是由所有无穷远点组成的,而无穷远点的齐次坐标都形如 $(x_1,x_2,0)$,因此,无穷远直线的方程为 $x_3=0$ 。而射影直线的齐次方程中 x_1,x_2 的系数一定不全为零。

从上面的推导过程还看到:

(1) 元 上三点 $A(a_1,a_2,a_3)$, $B(b_1,b_2,b_3)$, $C(c_1,c_2,c_3)$ 共线的 充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0.$$

(2) 齐次方程 $\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 + \mu_3 x_3 = 0$ 与 $\eta_1 x_1 + \eta_2 x_2 + \eta_3 x_3 = 0$ 表 示 π_0 上的同一条直线(对应于把 0 中的同一个平面)的充 分 必要条件是(μ_1, μ_2, μ_3)与(η_1, η_2, η_3)成比例。因此,我们可以把齐次方程的系数(η_1, η_2, η_3)看成直线的坐标,就叫做直线 **的 齐次坐标**。显然,无穷远直线的齐次坐标为(0, 0, 1);射影直线的 齐次 坐标形如(η_1, η_2, η_3),其中 η_1, η_2 不至为零。容易看出,同一条直线的齐次坐标不唯一,但它们成比例;不同直线的齐次坐标不成比例。

既然直线也有齐次坐标,因此从齐次坐标来看,射影平面上的点和直线的地位是对等的,点和直线对于关联关系而言也是对等的,点 (x_1,x_2,x_3) 与直线 (η_1,η_2,η_3) 关联的充分必要条件是

$$\eta_1 x_1 + \eta_2 x_2 + \eta_3 x_3 = 0,$$

因此,对于固定的直线 (η_1,η_2,η_3) ,方程(7,2)是此直线上的全体的点所适合的方程,称为**直线的点方程**。

出于直线(η_1, η_2, η_3)与点(x_1, x_2, x_3)关联的充分必要条件也是(7.2),因此,对于固定的点(x_1, x_2, x_3),方程(7.2)是与点(x_1, x_2, x_3)关联的全体直线所适合的方程,称为点的线方程。

从上面的讨论可以看到,在射影平面上,基本的几何元素是 点和直线,基本的关系是关联关系,点和直线在射影平面上的地 位是对称的。

下面我们要讨论射影平面的另外一个模型,解析模型,了解这个模型对于读者今后想进一步学习射影几何是有帮助的。

1.5 射影平面的解析模型

从上述看出,邓·上的点(或直线)的齐次坐标不唯一,但它 248 们成比例,为了使点*M*对应于唯一的对象,就需要把所有有序三 元实数组所组成的集合按照成比例的关系进行分类。

定义7.5 称有序三元实数组 (x_1,x_2,x_3) 与 (y_1,y_2,y_3) 等价,如果存在实数 $\lambda \Rightarrow 0$,使得 $(y_1,y_2,y_3) = (\lambda x_1,\lambda x_2,\lambda x_3)$,此时记作 $(x_1,x_2,x_3) \sim (y_1,y_2,y_3)$ 。

所定义的关系~显然具有下列性质:

- (1) 反身性,即,任一有序三元实数组与自身等价;
- (2) 对称性,即,若 (x_1,x_2,x_3) $\sim (y_1,y_2,y_3)$,则 $(y_1,y_2,y_3) \sim (x_1,x_2,x_3)$;
- (3) 传递 性, 即,若 (x_1, x_2, x_3) (y_1, y_2, y_3) , (y_1, y_2, y_3) ~ (z_1, z_2, z_3) ,则

$$(x_1, x_2, x_3) \sim (z_1, z_2, z_3)$$
.

对于每一个有序三元实数组(x₁,x₂,x₃), 把所有与它等价的三元实数组组成的集合称为一个**类**, 记作(x₁:x₂:x₃), 则 所 有有序三元实数组的集合被划分成了一些类, 使得每个有序三元实数组属于且只属于一个类; 同一类型的任意两个三元实数组是等价的(即成比例), 不同类里的两个三元实数组是不等价的(即不成比例).

(0:0:0)称为零类,其他类称为非零类。

定理7.1 把每一个有序三元实数组的非零类看成"点",把 满足方程 $\eta_1 x_1 + \eta_2 x_2 + \eta_3 x_3 = 0$ (共中 η_1, η_2, η_3 不全为零)的"点" $(x_1:x_2:x_3)$ 组成的集合看成"直线",并且规定方程

$$\eta_1 x_1 + \eta_2 x_2 + \eta_3 x_3 = 0$$
 if $\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 + \mu_3 x_3 = 0$

表示同一条"直线"的充分必要条件是 (η_1,η_2,η_3) 与 (μ_1,μ_2,μ_3) 成比例,于是"直线"也可由有序三元实数组的非零类 $[\eta_1:\eta:\eta_3]$ ① 所完全决定,而且点 $(x_1:x_2:x_3)$ 与直线 $[\eta_1:\eta_2:\eta_3]$ 相关 联 的 充分必要条件是

① 为了从书写形式上区别"点"与"直线",我们把"直线"的非 零 类 记 作 [171 * 172 * 73]。

$$\eta_1 x_1 + \eta_2 x_2 + \eta_3 x_3 = 0$$

则山所有这些"点"和"直线"组成的集合就是一个射影平面,记作 $PG(2, \mathbf{R})$ 。

点 $M(x_1,x_2,x_3)$ 1- --- ~点" $(x_1:x_2:x_3)$,

直线 L_1 $\eta_1 x_1 + \eta_2 x_2 + \eta_3 x_3 = 0 \mapsto "直线" [\eta_1 : \eta_2 : \eta_3].$

显然上述对应分别是一一对应,拜且若点M与直线五关联,则有 $\eta_1x_1+\eta_2x_2+\eta_3x_3=0$,从而"点"($x_1:x_2:x_3$)与"直线"[$\eta_1:\eta_2:\eta_3$] 关联。所以PG(2,R)是一个射影平面。

由定理7.1,我们得到射影平面的又一个具体模型,即,PG(2,R),称它是解析模型.解析模型的好处之一是便于将射影平面进行推广。迄今为止,我们讨论的射影平面都是**实射影平面**,但是,如果我们类似地考虑有序三元复数组,则可以得到**复射影平面**,记作 PG(2,C);如果我们考虑有序四元实数组,则可以得到**三维实射影空间** PG(3,R),如果考虑有序n+1 元实数组,则可以得到n 维实射影空间 PG(n,R)。

*如果我们考虑有序三元组,其中的元素取0或1,规定: 0+0=0,0+1=1,1+1=0,0×1=0,0×0=0,1×1=1, 并且规定加法和乘法都适合交换律、结合律以及分配律,则从这种有序三元组出发可以得到2阶有限射影平面,记作PG(2,2),它 只有7个"点",7条"直线"。每条"直线"上行3个"点",




图 7.5

每个"点"位于三条"直线"上,可以用图 7.5 形象地表现 出 PG(2,2)上的"点"、"直线"以及它们之间的关联关系。共中编号 为1,2,3,4,5,6,7的"点"分别是。(1:0:0),(1:1:0),(1:0:1),(0:1:0),(0:1:1),(1:1:1),(0:0:1)。编号为1,2,4的"点"所 在的"直线"的方程为 $x_3 = 0$,"直线" 137

的方程为 $x_2=0$; "直线" 457 的方程为 $x_1=0$; "直线" 165的方程为 $x_2+x_3=0$; "直线" 463 的方程为 $x_1+x_3=0$; "直线" 762 的方程为 $x_1+x_2=0$; "直线" 235的方程为

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

以后我们只讨论实射影平面, 仍简称为射影平面,

习 题 7.1

- 1. 设扩大的欧氏平面 π_0 上两点 A,B 的齐次 坐 标 分 别是 (3,-1,2),(2,0,1), 求:
 - (1) 直线 AB 在齐次坐标中的普通方程和参数方程;
- (2) 直线 AB 上的无穷远点的齐次坐标和它所对 应 的 参 数 值。
- 2. 证明扩大的欧氏平面写。上的下列三条直线共点。 拜 且 求该点的齐次坐标。

$$x_1 + x_2 = 0$$
, $2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0$, $5x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$.

- 3. 在扩大的欧氏平面 3。上,给出了 元。的欧氏直线在仿射 坐标中的方程,求由它确定的射影直线在齐次坐标中的方程,并 且求出它上面的无穷远点。
 - (1) x + 2y 1 = 0; (2) x = 0;
 - (3) y = 1; (4) 3x 2y = 0.
- 4. 在 PG(2, **R**)上,设直线 L_1 , L_2 , L_3 , L_4 的方程 依 次是: $x_1-x_3=0$, $x_2+x_3=0$, $2x_1+x_2-x_3=0$, $x_1+x_2+2x_3=0$, 设 L_1 与 L_2 的交点为 A, L_3 与 L_4 的交点为 B, 求直线 AB 的力程。
- 5. 取一个球面,用过球心的一个平面五截它,取其中一个 半球面,把这个半球面上的每个点垂直投影到截面五上,得到一个圆盘, 若投影点在圆盘内部,则这个投影点就看成一个"点", 若投影点在圆盘的边界圆上,则把圆的直径的两个端点看成一个"点", 半球面上的大半圆的投影点组成的半椭圆或直径看成"直

§ 2 射影平面上的对偶原理

从上一节我们已初步看到,射影平面上点和直线的地位是对称的,本节我们来进一步讨论这个问题。

设 $\varphi(点, 3)$ 是关于射影平面上一些点和一些直线的关联关系的一个命题,那么,把此命题中的点都改写成线,把线都改写成点,并且保持关联关系不变以及其它一切表述不变,则得到的命题 $\varphi(3, 点)$ 称为原命题 $\varphi(点, 3)$ 的对偶命题。下面我们列举一些命题和它的对偶命题。

原命题

- (1) 射影平面上三点共线的充分必要条件是它们的齐次 坐标组成的三阶行列 式等于
- (2) 射影平面上者三点P₁
 P₂,P₃不共线,则三线P₁P₂,
 P₂P₃,P₃P₁不共点。
- (3) 德沙格(Desargues) 定理:射影平面上,如果两个 三角形的对应顶点的 连线 共 点,那么它们的对应边的交点 共线。
- (4) 直线(看成点列)的点 方程是三元一次齐次方程。

对偶命题

- (1)¹ 射影平面上三线共 点的充分必要条件是它们的齐 次坐标组成的三阶行列式等于 零。
- (2) 射影平面上若三线 p₁,p₂,p₃不共点,则三点p₁p₂工, p₂p₃,p₃p₁ 不共线。
- (3) 德沙格定理的逆定 理,射影平面上,如果两个三角 形的对应边的交点共线,那么 它们的对应顶点的连线共点。
- (4)'点(看成线束)的线 方程是三元一次齐次方程。

① 用 p_1p_2 表示直线 p_1 与 p_2 的交点,其余同理。

射影平面上的每一个命题 φ (点,线)与它的对偶 命 题 φ (线,点)有下述重要的性质,即

射影平面上的对偶原理 射影平面上,如果一个命题φ(点,线)可以证明是一条定理,则它的对偶命题φ(线,点)也可以证明是一条定理。

证明 在平面上取一坐标系,把命题ø(点,线)的证明用齐次 坐标写出来。在这个证明中,把点的齐次坐标都看作线的齐次坐 标,把线的齐次坐标都看作点的齐次坐标,所有的表示关联关系 的方程沒有任何改变,仍然成立,但最后的结论变成ø(线,点), 于是,就得到了命题ø(线,点)的证明。

根据射影平面上的对偶原理,我们只要证明了一个命题@(点,线)成立, 那末它的对偶命题@(线,点)就必然成立。譬如,我们已经证明过上述表中的命题(1)成立,于是我们肯定它的对偶命题(1)'也成立。下面我们来证明德沙格定理成立,从而它的逆定理(对偶命题)也必然成立。

德沙格(Desargues) 定理 射影平面上, 如果两个三角形的 对应顶点的连线共点, 那末它们的对应边的交点共线。

证明 设三角形ABC与三角形A'B'C'的 对应顶 点的连 线 AA',BB',CC'相交于一点D.

情形!. 如果A与A' 重合,则AB与AB' 变干A(A'),AC与AC' 变干A(A')。设BC与B' C' 变干R,则显然A,A,R 共线。

同理,如果B与B'重合,或者C与C'重合,则结论显然成立。




图 7.6

情形2. 任一组对应顶点不重合。在射影平面上取定一个坐标系,设各点的齐次坐标分别为: $A(a_1,a_2,a_3)$, $B(b_1,b_2,b_3)$,

 $C(c_1,c_2,c_3)$, $A'(a'_1,a'_2,a'_3)$, $B'(b'_1,b'_2,b'_3)$, $C'(c'_1,c'_2,c'_3)$, $D(d_1,d_2,d_3)$.

根据直线的参数方程可知,因为D点在直线 AA' 上,所以有不全为零的实数 λ, λ' 使得

$$\begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} + \lambda' \begin{pmatrix} a'_1 \\ a'_2 \\ a'_3 \end{pmatrix}.$$

同理,有不至为零的实数 μ,μ' 和 ν,ν' ,使得

$$d_i = \mu b_i + \mu' b'_i, \quad i = 1, 2, 3;$$

 $d_i = \nu c_i + \nu' c'_i, \quad i = 1, 2, 3.$

于是得

 $\lambda a_i + \lambda' a_i' = \mu b_i + \mu' b_i' = \nu c_i + \nu' c_i', \qquad i = 1,2,3. \tag{7.3}$ 从而有

$$\lambda a_i - \mu b_i = -\lambda' a'_i + \mu' b'_i = : p_i, i = 1, 2, 3,$$
 (7.4)

由(7.4)看出,齐次坐标为 (p_1,p_2,p_3) 的点P既在直线 AB上, 又 在直线 A'B' 上,因此P是 AB 和 A'B' 的交点。

类似地,由(7.3)可得

$$-\lambda a_i + \nu e_i = \lambda' a_i' - \nu' e_i' = :q_i, \qquad i = 1, 2, 3; \qquad (7.5)$$

$$\mu b_i - \nu c_i = -\mu' b'_i + \nu' c'_i = : r_i, \quad i = 1, 2, 3, \quad (7.6)$$

从(7.5),(7.6)分别看出,齐次坐标为 (q_1,q_2,q_3) 的点 Q 是 AC 与 A'C' 的变点;齐次坐标为 (r_1,r_2,r_3) 的点 R 是 BC 与 B'C' 的 交点。从(7.4),(7.5),(7.6)可得

$$p_i + q_i + r_i = 0, \quad i = 1, 2, 3.$$

ĮΊ

$$\begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix},$$

所以P,Q,R三点其线。

习 题 7.2

- 1. 证明:射影平面上若三点 P_1, P_2, P_3 不共线,则三线 P_1P_2, P_2P_3, P_3P_1 不共点.
- 2. 设命题 $\varphi(\underline{A}, \underline{4})$ 为: 在射影不面上, A, B, C和 A', B' , C' 分别是直线 I_1 和 I_2 上的三个点,并且均与 I_1 和 I_2 的交点 D不重合: 设 AB' 与 A'B 变于点 P , BC' 与 B'C 变 于 点 Q , CA' 与 C'A 变于点 R , 则 P , Q , R 三点共线 。试写出这 个 命 题 的对偶命题 $\varphi(\underline{4},\underline{A})$ 。
- 3. 设射影平面上直线 l_1 的齐次坐标为 $(\eta_{i1},\eta_{i2},\eta_{i3})$, i=1, 2,3,拜且 $l_1 \Rightarrow l_2$, 证明: l_1,l_2,l_3 共点的充分必要条件 为 存 在不 全为零的实数 λ 和 μ 使得

 $\eta_{3j} = \lambda \eta_{1j} + \mu \eta_{2j}, \quad j = 1, 2, 3.$

*4. 设M是欧氏平面元。上一点,与和与是元。上两条直线,它们相交于一个不可到达的点N(非常远或者被物体阻隔),试用直尺作经过点M和N的直线。




图 7.7

§ 3 交 比

我们知道,在中心投影下线段的分比(即共线三点的简单比值)是会改变的,本节讨论射影平面上共线四点的**交比**,它经过中心投影后保持不变。

3.1 交比的定义和性质

设A,B,C是射影平面 π_0 上共线的三点,A,B为通常点,C \Rightarrow B . 首先我们将第六章 § 3 定义的共线三点的简单比值(A,B,C) 推广到C 可以为无穷远点的情形,即

$$(A,B,C) = \frac{AC}{CB}, \qquad (7.7)$$

当C为无穷远点时,规定(A,B,C) = -1。然后我们来定义 π_0 上 共线四点的交比。

定义7.6 设 A,B,C,D 为射影平面 π 。上典线的四点, A, B 为通常点, $A \neq B$, $C \neq B$, $D \neq A,B$ 。 我们将(A,B,C)与(A, B,D)的比值称为 A,B,C,D 的**交比**,记作(A,B,C,D)。即


$$(A,B,C,D):=\frac{(A,B,C)}{(A,B,D)}=\frac{AC}{CB}:\frac{AD}{DB}=\frac{AC}{CB}\cdot\frac{DB}{AD}.$$

(7.8)

若 A,B,C 各不相同,则规定。当 D=B 时, (A,B,C,D)=0。 有时也把交比称为二重比。

我们也可以给射影平面上共点的四线规定它们的交比。设 l_1 , l_2 , l_3 , l_4 是通过点 0 的四条直线, l_1 中 l_2 。任取一条不过 0 的 直 线 l_4 ,设 l_4 与 l_4 相交于 A_i (i=1,2, 3,4),如果(A_1 , A_2 , A_3 , A_4)有定义,我们就规定共点四线 l_1 , l_2 , l_3 , l_4 的交比为:

$$(l_1, l_2, l_3, l_4) := (A_1, A_2, A_3, A_4).$$
 (7.9)



但是要证明这个定义是有意义的,即,这样定义的交比与截线 l 的选取无关,为此在 π_0 上取定一个仿射标架 $[O_1e_1,e_2]$,设直线 l_1 的齐次坐标为 $(\eta_{i1},\eta_{i2},\eta_{i3})$,点 A_i 的齐次坐标为 (a_{i1},a_{i2},a_{i3}) , i=1,2,3,4 。因为 $l_1
eq l_2$,根据三线共点的条件(见习题 7.2 第 3 题),得

$$\begin{split} &\eta_{3j} = \lambda_1 \eta_{1j} + \mu_1 \eta_{2j}, \\ &\eta_{4j} = \lambda_2 \eta_{1j} + \mu_2 \eta_{2j}, \qquad j = 1, 2, 3. \end{split}$$

又根据在仿射坐标系中,若点 $M_1(x_1,y_1)$ 与 $M_2(x_2,y_2)$ 的 连 线与 直线 Ax + By + C = 0 的交点为M,则

$$\frac{M_1M}{MM_2} = -\frac{Ax_1 + By_1 + C}{Ax_2 + By_2 + C},$$

因此,我们得到

$$\begin{split} \frac{A_1 A_3}{A_3 A_2} &= -\frac{\eta_{31} \cdot \frac{a_{11}}{a_{13}} + \eta_{32} \frac{a_{12}}{a_{13}} + \eta_{33}}{\eta_{31} \frac{a_{21}}{a_{23}} + \eta_{32} \frac{a_{22}}{a_{23}} + \eta_{33}} \\ &= -\frac{\mu_1 \left(\eta_{21} \frac{a_{11}}{a_{13}} + \eta_{22} \frac{a_{12}}{a_{13}} + \eta_{23} \right)}{\lambda_1 \left(\eta_{11} \frac{a_{21}}{a_{23}} + \eta_{12} \frac{a_{22}}{a_{23}} + \eta_{13} \right)}, \\ &\frac{A_1 A_4}{A_4 A_2} &= -\frac{\mu_2 \left(\eta_{21} \frac{a_{11}}{a_{13}} + \eta_{22} \frac{a_{12}}{a_{23}} + \eta_{13} \right)}{\lambda_2 \left(\eta_{11} \frac{a_{21}}{a_{23}} + \eta_{12} \frac{a_{22}}{a_{23}} + \eta_{13} \right)}, \end{split}$$

于是有


$$(l_1, l_2, l_3, l_4) = (A_1, A_2, A_3, A_4) = \frac{A_1 A_3}{A_3 A_2} : \frac{A_1 A_4}{A_4 A_2}$$

$$= \frac{\mu_1 \lambda_2}{\lambda_1 \mu_2} = \frac{\lambda_2}{\mu_2} / \frac{\lambda_1}{\mu_1}.$$
(7.10)

山此可见,这样定义的共点四线的交比只与这四条直线的相互位置有关,而与截线 l 的选取无关。

设[P]为一点列,O为[P]外一点,则 $P \longleftrightarrow OP$ 是点列[P]和线束[OP]之间的一一对应,并且把线束[OP]称为点列 [P]在 O上的射影(或[P]以O为中心的射影),把点列[P]称为O在[P]上的截影。

根据上面共点四线的交比的定义不难看出: 交比在上述射影和截影下保持不变。由此可以推广前面所述的交比的定义,免除前面定义交比时所加上的某些元素不能是无穷远元素的限制。共线四点 A,B,C,D,若 A,B,C 各 不相同,并且 D
ot= A,则可以把它们的交比(A,B,C,D)规定为它们在某个点 O 上的射影 O A,O B , O C , O D 的交比; 共点四线 I_1,I_2,I_3,I_4 ,若 I_1,I_2,I_3 各不相同,并且 $I_4
ot= I_4$,则可以把它们的交比(I_1,I_2,I_3,I_4)规定为它们在某条直线 I 上的截影 P_1,P_2,P_3,P_4 的交比。这样规定的交 比 仍 然包含前面的定义作为特例,并且具有性质:交比在上述射影和截影下保持不变。这样一来,我们在讨论交比的性质时,总可以假设它们是共线的四个通常点的交比,这是因为共线的四个点如果它们中间有无穷远点,我们总可以经过射影和截影把它们变成共线的四个通常点(见图7.9)。



由于交比在射影和截影下保持不变,因此交比在中心投影下保持不变。

我们已经会用直线的齐次坐标计算共点四线的交比(见公式 (7.10)),现在我们来讨论如何用点的齐次坐标计算共线四点的交比。

定理7.2 设射影平面元。上的共线四点 A,B,C,D,其中 A,B,C 各不相同,并且 $D \Rightarrow A$ 。设 A,B,C,D 的齐次坐标分别为 $(a_1,a_2,a_3),(b_1,b_2,b_3),(c_1,c_2,c_3),(d_1,d_2,d_3),$

幷且

$$c_i = \lambda_1 a_i + \mu_1 b_i$$
, $d_i = \lambda_2 a_i + \mu_2 b_i$, $i = 1, 2, 3$,

则

$$(A,B,C,D) = \frac{\lambda_2}{\mu_2} / \frac{\lambda_1}{\mu_1}.$$
 (7.11)

证明 在直线 AB 外任 取一 点P,设 它 的 齐 次 坐 标 为 (p_1,p_2,p_3) 。则连线 PA,PB,PC,PD 的齐次坐标依次为:

$$\left(\begin{vmatrix} p_2 & a_2 \\ p_3 & a_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & a_1 \\ p_3 & a_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} p_1 & a_1 \\ p_2 & a_2 \end{vmatrix} \right),$$

$$\left(\begin{vmatrix} p_2 & b_2 \\ p_3 & b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & b_1 \\ p_3 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} p_1 & b_1 \\ p_2 & b_2 \end{vmatrix} \right),$$

$$\left(\begin{vmatrix} p_2 & \lambda_1 a_2 + \mu_1 b_2 \\ p_3 & \lambda_1 a_3 + \mu_1 b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_1 a_1 + \mu_1 b_1 \\ p_3 & \lambda_1 a_3 + \mu_3 b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_1 a_1 + \mu_1 b_1 \\ p_3 & \lambda_1 a_3 + \mu_3 b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_1 a_2 + \mu_1 b_2 \\ p_2 & \lambda_1 a_2 + \mu_1 b_2 \end{vmatrix} \right),$$

$$\left(\begin{vmatrix} p_2 & \lambda_2 a_2 + \mu_2 b_2 \\ p_3 & \lambda_2 a_3 + \mu_2 b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1 + \mu_2 b_1 \\ p_3 & \lambda_2 a_3 + \mu_2 b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1 + \mu_2 b_1 \\ p_3 & \lambda_2 a_3 + \mu_2 b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1 + \mu_2 b_1 \\ p_3 & \lambda_2 a_3 + \mu_2 b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1 + \mu_2 b_1 \\ p_3 & \lambda_2 a_3 + \mu_2 b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1 + \mu_2 b_1 \\ p_3 & \lambda_2 a_3 + \mu_2 b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1 + \mu_2 b_1 \\ p_3 & \lambda_2 a_3 + \mu_2 b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1 + \mu_2 b_1 \\ p_3 & \lambda_2 a_3 + \mu_2 b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1 + \mu_2 b_1 \\ p_3 & \lambda_2 a_3 + \mu_2 b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1 + \mu_2 b_1 \\ p_3 & \lambda_2 a_3 + \mu_2 b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1 + \mu_2 b_1 \\ p_3 & \lambda_2 a_3 + \mu_2 b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1 + \mu_2 b_1 \\ p_3 & \lambda_2 a_3 + \mu_2 b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1 + \mu_2 b_1 \\ p_3 & \lambda_2 a_3 + \mu_2 b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1 + \mu_2 b_1 \\ p_3 & \lambda_2 a_3 + \mu_2 b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1 + \mu_2 b_1 \\ p_3 & \lambda_2 a_3 + \mu_2 b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1 + \mu_2 b_1 \\ p_3 & \lambda_2 a_3 + \mu_2 b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1 + \mu_2 b_1 \\ p_3 & \lambda_2 a_3 + \mu_2 b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1 + \mu_2 b_1 \\ p_3 & \lambda_2 a_3 + \mu_2 b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1 + \mu_2 b_1 \\ p_3 & \lambda_2 a_3 + \mu_2 b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1 + \mu_2 b_1 \\ p_3 & \lambda_2 a_3 + \mu_2 b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1 + \mu_2 b_1 \\ p_3 & \lambda_2 a_3 + \mu_2 b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1 + \mu_2 b_1 \\ p_3 & \lambda_2 a_3 + \mu_2 b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1 + \mu_2 b_1 \\ p_3 & \lambda_2 a_3 + \mu_2 b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1 + \mu_2 b_1 \\ p_3 & \lambda_2 a_3 + \mu_2 b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1 + \mu_2 b_1 \\ p_3 & \lambda_2 a_3 + \mu_2 b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1 + \mu_2 b_1 \\ p_3 & \lambda_2 a_3 + \mu_2 b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1 + \mu_2 b_1 \\ p_3 & \lambda_2 a_3 + \mu_2 b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1 + \mu_2 b_1 \\ p_3 & \lambda_2 a_3 + \mu_2 b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1 + \mu_2 b_1 \\$$

显然有

$$\begin{vmatrix} p_2 & \lambda_1 a_2 + \mu_1 b_2 \\ p_3 & \lambda_1 a_3 + \mu_1 b_3 \end{vmatrix} = \lambda_1 \begin{vmatrix} p_2 & a_2 \\ p_3 & a_3 \end{vmatrix} + \mu_1 \begin{vmatrix} p_2 & b_2 \\ p_3 & b_3 \end{vmatrix},$$

等等,于是由(7.10)得

$$(A,B,C,D) = (PA,PB,PC,PD) = \frac{\lambda_2}{\mu_2} / \frac{\lambda_1}{\mu_1}.$$

共线四点的交比还可以通过另一种形式来计算。

定理7.3 设 A,B,C,D 是射影不而 π_0 上的共线图 点,其中 A,B,C 各不相同,并且 $D \Rightarrow A$ 。在此直线上取两 点 P,Q,它 们的 下次坐标分别为

$$(p_1, p_2, p_3), (q_1, q_2, q_3);$$

A,B,C,D 的齐次坐标分别为

$$(a_1, a_2, a_3), (b_1, b_2, b_3), (c_1, c_2, c_3), (d_1, d_2, d_3),$$

并且设

$$\begin{split} a_i &= \lambda_1 p_i + \mu_1 q_i, & b_i &= \lambda_2 p_i + \mu_2 q_i, \\ c_i &= \lambda_3 p_i + \mu_3 q_i, & d_i &= \lambda_4 p_i + \mu_4 q_i, \end{split} \qquad i = 1, 2, 3; \end{split}$$

则

$$(A,B,C,D) = \begin{vmatrix} \lambda_{1} & \lambda_{3} \\ \mu_{1} & \mu_{3} \\ \lambda_{1} & \lambda_{4} \\ \mu_{1} & \mu_{4} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \lambda_{2} & \lambda_{4} \\ \mu_{2} & \mu_{4} \\ \mu_{2} & \lambda_{3} \\ \mu_{2} & \mu_{3} \end{vmatrix} .$$
 (7.12)

证明 因为点A与B不同,所以(λ_1,μ_1)与(λ_2,μ_2)不成比例, 从而

$$d = \begin{vmatrix} \lambda_1 & \mu_1 \\ \lambda_2 & \mu_2 \end{vmatrix} \pm 0.$$

由已知, $a_i = \lambda_1 p_i + \mu_1 q_i$, $b_i = \lambda_2 p_i + \mu_2 q_i$,所以

$$p_{i} = \frac{1}{d} \begin{vmatrix} a_{i} & \mu_{1} \\ b_{i} & \mu_{2} \end{vmatrix}, \quad q_{i} = \frac{1}{d} \begin{vmatrix} \lambda_{1} & a_{i} \\ \lambda_{2} & b_{i} \end{vmatrix}, \quad i = 1, 2, 3.$$

从而

$$c_i = \lambda_3 p_i + \mu_3 q_i = \frac{\lambda_3}{d} \begin{vmatrix} a_i & \mu_1 \\ b_i & \mu_2 \end{vmatrix} + \frac{\mu_3}{d} \begin{vmatrix} \lambda_1 & a_i \\ \lambda_2 & b_i \end{vmatrix}$$

$$= d^{-1} [(\lambda_3 \mu_2 - \lambda_2 \mu_3) a_i + (\lambda_1 \mu_3 - \lambda_3 \mu_1) b_i], \quad i = 1, 2, 3, \dots$$

类似地有

$$d_i = d^{-1} \lceil (\lambda_4 \mu_2 - \lambda_2 \mu_4) a_i + (\lambda_1 \mu_4 - \lambda_4 \mu_1) b_i \rceil, \quad i = 1, 2, 3.$$

所以

$$(A,B,C,D) = \frac{d^{-1}(\lambda_4\mu_2 - \lambda_2\mu_4)}{d^{-1}(\lambda_1\mu_4 - \lambda_4\mu_1)} / \frac{d^{-1}(\lambda_3\mu_2 - \lambda_2\mu_3)}{d^{-1}(\lambda_1\mu_3 - \lambda_3\mu_1)}$$

$$= \frac{\begin{vmatrix} \lambda_{1} & \lambda_{3} \\ \mu_{1} & \mu_{3} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \lambda_{2} & \lambda_{4} \\ \mu_{2} & \mu_{4} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \lambda_{1} & \lambda_{4} \\ \mu_{1} & \mu_{4} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \lambda_{2} & \lambda_{3} \\ \mu_{2} & \mu_{3} \end{vmatrix}} \cdot \frac{\lambda_{3}}{\lambda_{2}} = \frac{\lambda_{4}}{\lambda_{3}}$$

从定理7.3不难得出交比的下列性质:

(1)
$$(C,D,A,B) = (A,B,C,D) = (B,A,D,C);$$

(2) 若D与B也不同,则有

$$(B,A,C,D)=\frac{1}{(\overline{A},\overline{B},C,\overline{D})}=(A,B,D,C),$$

(3)
$$(A,C,B,D) = 1 - (A,B,C,D)$$
.

不难看出,对于共点四线的交比也有类似于定理 7.3 的计算公式和上述三条性质。

共点四线的变比还有一条重要性质。设O是元。上的通常点, l_1, l_2, l_3, l_4 是共点于O的四条不同的直线,用 $\langle l_i, l_j \rangle$ 表示直线 l_i 绕 O转到 l_i 的角度,则有

$$(l_1, l_2, l_3, l_4) = \frac{\sin(l_1, l_3)}{\sin(l_3, l_2)} / \frac{\sin(l_1, l_4)}{\sin(l_4, l_2)}.$$
 (7.13)

这个公式的证明留给读者(见习题7.3第8题)。

3.2 调和点列与调和线束

交比为~1的情形是一种重要的情形。

定理7.7 射影平面上共线四点A,B,C,D,如果满足(A,B,C,D) = -1,则称它们是调和点列,其中点D 称为 A,B,C 的 第四调和点,并且称点D 是点C 关于点偶 A,B 的调和共轭点。

由于

$$(A,B,D,C) = \frac{1}{(A,B,C,D)},$$

所以若点D是点C关于点偶。,B的调和共轭点,则点C也 是点D关于点偶A,B的调和共轭点,这时称C,D关于A,B调和共轭。

由于(C,D,A,B) = (A,B,C,D),因此如果C,D 关于A,B 调和共轭,则A,B 关于C,D 调和共轭。此时称点 偶C,D 与点

偶 A, B 彼此调和分割。

由交比的定义以及交比在射影和截影下的不变性可以看出,任给共线的三个不同点 A,B,C,它们的第四调和点一定 存 在并且是唯一的。

设 A,B,C 是 π_0 上共线的三个通常点,如果 C 是线段 AB 的中点,则从 (A,B,C,D) = -1 可以推出 D 为直线 AB 上的无穷远点。这说明线段 AB 的中点 C 关于 A,B 调和共轭的点是直线 AB 上的无穷远点,从而直线 AB 上的无穷远点,关于 A,B 的 调 和共轭点是线段 AB 的中点(注:所谓线段 AB 指的是 直 线 AB 上 AB 与 BB 之间的不含无穷远点的那一部分)。

类似地, 共点四线 l_1, l_2, l_3, l_4 , 如果满足 $(l_1, l_2, l_3, l_4) = -1$,

则称 l_1, l_2, l_3, l_4 是调和线束, 其中 l_4 称为 l_1, l_2, l_3 的第四调和线。

同样,任给共点的三条不同的直线,它们的第四调和线存在并且唯一。





图 7.10

设O是元 $_1$ 上的 通常点, l_1 , l_2 , l_3 , l_4 是通过点O的直线,如条 不同直线,如果 l_3 是 l_1 与 l_2 所 平 的 一个角的 $(l_1,l_2;l_3,l_4)$ =-1,则由公式 (7,13) 可以得出

4是 l₁与 l₂所夹的另一个角的角平分线(见图7.10)。这说明 l₂与 l₂ 所夹的两个角的角平分线关于 l₁, l₂调和共轭。

任给共线的三个通常点 A,B,C, 它们的第四调和 点 可以按下述步骤作出:

在直线 AB 外任取一点S, 连接 SA, SB, SC。在直线 SC上



取一点 G(AC,S), 连接 AG, 它与 SB 委于 E, 连接 BG, 它与 SA 委于 F。则 FE 与 AB 的 SE 办 就是 A, B, C 的 第四调和点。

证明 设FE 与 SC 的交点为 H。先后考虑以S 为中心的线束和以G 为中心的线束可以得出。

$$(A,B,C,D) = (SA,SB,SC,SD) = (F,E,H,D),$$

$$(F, E, H, D) = (GF, GE, GH, GD) = (B, A, C, D),$$

从而 (A,B,C,D) = (B,A,C,D),再用交比的性质 (2),可得到 $(A,B,C,D)^2 = 1$,假如 (A,B,C,D) = 1,则 得 (A,C,B,D) = 0,从而 (A,C,B) = 0,于是 A = B,这与 已 知 矛 盾。所 以 必 有 (A,B,C,D) = -1,从而 $D \in A,B,C$ 的第四调和点。

习 题 7.3

- 1. 在射影平面 π_0 上,设共线三点 A,B,C 的齐次坚标分别为(1,2,5),(1,0,3),(-1,2,-1),在直线 AB 上求 一点 D 使得交比(A,B,C,D) = 5.
- 2. 在射影平面元。上,三点 A,B,C 的 齐 次 坐 标 分 别 为 (1,4,1),(0,1,1),(2,3,-3),证明 A,B,C 三点共线,并 且求此 直线上的一点 D 使 (A,B,C,D) = -4.
- 3. 在射影平面 B_0 上,给 了 共 线的四个通常点的仿射坐标 A(2,-4),B(-4,5),C(4,-7),D(0,-1),求它 们 的 交比 (A,B,C,D)。
 - 4 在射影平面 和上, 设共点于O的三条直线 l₁, l₂, l₃的 齐

次坐标分别为(-1,0,2),(3,1,-2),(1,1,2), 求通过O的一条 直线 l_4 , 使得交比(l_1,l_2,l_3,l_4) = -3.

- 5. 在射影平面元。上,五个点 P, A, B, C, D 的 齐 次坐标分别 为(3, -2,4),(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1),(1,1,1), 求 直 线 PA, PB, PC, PD 的交比。
 - 6. 设 A,B,C,D,E 是共线的五点,并且两两不同,证明 $(A,B,C,D) \cdot (A,B,D,E) = (A,B,C,E)$.
- 7. 用交比(A,B,C,D)表达这些点按任何共它 順 序所取的 交比。
- 8. 设 0 是 π_0 上的通常点, l_1, l_2, l_3, l_4 是共点于 0 的 四 条不同的直线,用 $\langle l_i, l_j \rangle$ 表示直线 l_i 绕 0 逆时针 转 到 l_j 的 角 度。证明:

$$(l_1, l_2, l_3, l_4) = \frac{\sin \langle l_1, l_3 \rangle}{\sin \langle l_3, l_2 \rangle} / \frac{\sin \langle l_1, l_4 \rangle}{\sin \langle l_4, l_2 \rangle}.$$

- 9. 岩 l₁, l₂, l₃, l₄是 元 上的调和线束, 并且 l₃与 l₄互相垂直, 证明: l₃是 l₄与 l₂的夹角的角平分线。
- 10. 证明, 在欧氏平面 π_0 上, 已给一个圆上任意 四个 不同的固定点 A_1,A_2,A_3,A_4 , 则它们到圆上任意第五点P的联线的交比(PA_1,PA_2,PA_3,PA_4)是常数, 与P在圆上的位置无关。

§ 4 射影坐标和射影坐标变换

4.1 点的射影坐标

在 § 1里我们在扩大的欧氏平面 π_0 上定义点的齐 次坐标时,用了欧氏平面 π_0 上的仿射标架 $[O_1,e_1,e_2]$ 。 我们自然希望能够直接用射影平面 π_0 上的元素 ("点")作为标架,也 就 是 说,要在射影平面 π_0 上建立射影坐标系。

为了回答上述问题,我们先从把O这个模型来看,上述问题就变成,能不能用把O里的直线(这就是"点")作为标架建立射

影坐标系?我们已经知道,把〇里的直线 / 完全被它的方向向量 所决定,但是方向向量可以相差一个非零倍数。基于这一事实, 我们分两步来回答上述问题。

首先,我们仍然先在把〇中取一个彷射标架[〇; e1, e2, e8],这 时把〇中的每一条直线(的方向向量。在这个仿射标架下就有仿 射坐标(x,,x2,x3),我们自然会想到就可以将(x1,x2,x3)称为直线U 的坐标,这种坐标可以相差一个非零倍数。这说明只要在把 0 中 取定一个仿射标架,那末把〇中的每条直线就都有了坐标。但是 我们的目的是要以把〇中的直线作为标架,因此我们要进一步分。 析,在把〇中取定一个仿射标架[O;e,,e2,e3]后可以确定 把〇中 的几条直线? 显然 e_1,e_2,e_3 分别确定了把O中的正条直线 l_1,l_2,l_3 , 共中 ei就是 4的方向向量, 于是 4的坐标是(1,0,0), la的坐标是 (0,1,0), 13的坐标是(0,0,1), 这三条直线 4,12,13称为把〇中的 基本直线(即坐标分别为(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)的 直 线)。此 外, 若令 $e = e_1 + e_2 + e_3$, 则 e 也确定了把 O 中的一条直线 A, 它 的坐标是(1,1,1),这条直线互称为把口中的单位 直线(即坐标为 (1,1,1)的直线)。由于 e_1,e_2,e_3,e 中任意三个向量都不共面,因 此 4, 12, 14, 14中任意三条直线都不共面,这样的四条直线 称为把 〇中一般位置的四条直线。上述说明,把〇中取定一个仿射标架 $[O,e_1,e_2,e_3]$ 后,就确定了把O中的一般位置的四条直线 I_1,I_2,I_3 , 前三冬是基本直线,第四条是单位直线。

 此对于这个仿射标架, l_1,l_2,l_3 仍是基本直线, l_4 仍是单位 直线。既然对于三条基本直线和一条单位直线可以得到不同的仿射标架 $[O;e_1,e_2,e_3]$ 和 $[O;e_1',e_2',e_3']$,那末我们必须说明把O中每一条直线l的方向向量。分别在这两个仿射标架下的 坐 标 (x_1,x_2,x_3) 和 (x_1',x_2',x_3') 是成比例的,这样才能把上述三条基本直线和一条单位直线合在一起作为把O中的射影标架。现在就来说 明 (x_1,x_2,x_3) 和 (x_1',x_2',x_3') 为什么是成比例的。因为 e'和 e 都是 l_4 的方向向量,所以可设 $e'=\lambda e$ 。同理可设 $e'_1=\lambda_1 e_1$,i=1,2,3。于是

$$\boldsymbol{e}^{\,\prime} = \boldsymbol{e}_{\,1}^{\,\prime} + \boldsymbol{e}_{\,2}^{\,\prime} + \boldsymbol{e}_{\,3}^{\,\prime} = \hat{\lambda}_{1}^{\,\prime}\boldsymbol{e}_{1}^{\,\prime} + \lambda_{2}^{\,\prime}\boldsymbol{e}_{2}^{\,\prime} + \lambda_{3}^{\,\prime}\boldsymbol{e}_{3}^{\,\prime},$$

又有 $e' = \lambda e = \lambda(e_1 + e_2 + e_3)$, 因此,

$$\lambda_1 \mathbf{e}_1 + \lambda_2 \mathbf{e}_2 + \lambda_3 \mathbf{e}_3 = \lambda \mathbf{e}_1 + \lambda \mathbf{e}_2 + \lambda \mathbf{e}_3$$

从而得 $\lambda_i = \lambda$, i = 1, 2, 3。所以,

$$\boldsymbol{v} = \sum_{i=1}^{3} x_i' \, \boldsymbol{e}_i' = \sum_{i=1}^{3} x_i' \, \lambda \boldsymbol{e}_i,$$

由此得出, $x_i = \lambda x_i$,i = 1,2,3。

综上述,我们可以给出下述定义。

定义7.8 设 l_1, l_2, l_3, l_4 是把 O 中一般位置的 四条 直 线,在 l_4 上取一个方向向量 e_1 然后在 l_4 上取方向向 量 e_4 (i = 1, 2, 3) 使得 $e = e_1 + e_2 + e_3$ (见图7.12)。称 l_1, l_2, l_3 是基本 直 线,称 l_4 是单位直线,称 $[l_1, l_2, l_3, l_4]$ 是把 O 的一组基底(或一个射影标架);




图 7.12

把〇中每一条直线 l 的方向向量 v 在仿射标 架 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 下 的 坐标 (x_1, x_2, x_3) 称为 l 在基底 $[l_1, l_2, l_3, l_4]$ 中的齐次射影坐标,简称为射影坐标。

显然把O中的直线l 在基底 $[l_1, l_2, l_3, l_4]$ 中的齐次射影坐标

不唯一,但它们成比例。不同直线在同一基底中的齐次射影坐标不成比例。基本直线 l_1, l_2, l_3 的齐次射 影坐标分别 为(1,0,0),

(0,1,0),(0,0,1); 单位直线与的齐次射影坐标为(1,1,1),

现在来看扩大的欧氏平面 至。上如何引进射影坐标系。

在欧氏平面元。外取一点〇,于是扩大的欧氏不面元。上的点和直线分别与把〇的直线和平面有一个一一对应。显然,把〇中一般位置的四条直线对应于元。上一般位置的四个点(即,其中任意三点不共线)。于是容易想到下述定义。

定义7.9 在扩大的欧氏平面 π_0 上 取定 一般位置的四个点 A_1, A_2, A_3, E ,在 π_0 外取一点 O 。对于 π_0 上的每一个点 M,我们将 直线 OM 在把 O 的基底 $[OA_1, OA_2, OA_3, OE]$ 中的齐次 射 影坐标 (x_1, x_2, x_3) 称为点 M 在 π_0 的基底 $[A_1, A_2, A_3, E]$ 中的 齐次 射影坐标,简称为射影坐标。基底 $[A_1, A_2, A_3, E]$ 中的 前 三个点称为基本点,第四个点称为单位点。




图 7.13

显然,基本点 A_1,A_2,A_3 的射影坐标分别为(1,0,0),(0,1,0)和(0,0,1),单位点 E的射影坐标为(1,1,1)。直线 A_1A_2,A_2A_3 , A_3A_1 构成的三角形称为**坐标三角形**。

现在来说明上述定义与 π_0 外一点O的取法无关。在 OE上取一个方向向量 e, 在 OA, 上取方向 向量 e, (i=1,2,3)使得 e=e₁+e₂+e₃. 设OM在仿射标架 [O, e₁, e₂, e₃]中的坐标为(x_1, x_2, x_3),由 定义 7.8 和 定义 7.9 知,(x_1, x_2, x_3) 就是点M在基底 [A_1, A_2, A_3, E]中的射影坐标。设直线 A_3E 与 A_1A_2 变于点 A_{12} ,设直

线 A_3M 与 A_1A_2 交于点 M_{12} (见 图 7.13)。由于 $\overrightarrow{OA_{12}}$, $\overrightarrow{OA_1}$, $\overrightarrow{OA_2}$ 共面以及 $\overrightarrow{OA_{12}}$, $\overrightarrow{OA_3}$, \overrightarrow{OE} 共面,于是可以得到 $\overrightarrow{OA_{12}} = \lambda(1,1,0)$ 。 类似地,由 $\overrightarrow{OM_{12}}$, $\overrightarrow{OA_1}$, $\overrightarrow{OA_2}$ 共面以及 $\overrightarrow{OM_{12}}$, $\overrightarrow{OA_3}$, \overrightarrow{OM} 共面,可得 $\overrightarrow{OM_{12}} = \mu(x_1,x_2,0)$ 。于是 OA_1 , OA_2 , OA_{12} , OM_{12} 的方向向量分别为 e_1 , e_2 , e_1 + e_2 , x_1e_1 + x_2e_2 。在平面 OA_1A_2 上取仿射标架 $[O;e_1,e_2]$,则 O,A_1,A_2,A_{12} , M_{12} 的齐次绝标分别为(0,0,1),(1,0, t_1),(0,1, t_2),(1,1, t_3),(x_1 , x_2 , t_4)。易求出直线 OA_1 , OA_2 , OA_{12} . OM_{12} 在齐次坐标中的方程,从而可得它们的齐次坐标依次为(0,1,0),(-1,0,0),(-1,1,0),(- x_2 , x_1 ,0)。显然有

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_3 \\ 0 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

于是由公式(7,10)得

$$(OA_1,OA_2,OA_{12},OM_{12}) = \frac{x_1}{x_2} / \frac{1}{1} = \frac{x_1}{x_2}$$

所以 $(A_1,A_2,A_{12},M_{12})=x_1:x_2$ (这里设M不在 A_1A_3 线上)。 类似地,对于不在 A_1A_2 线上。的 点M,有 $(A_2,A_3,A_{23},M_{23})=x_2:x_3$,对于不在 A_2A_3 线上的点M,有 $(A_3,A_1,A_{31},M_{31})=x_3:x_1$ 。由此可见,对于不在直线 A_1A_2,A_2A_3,A_3A_1 上的点M,它的射影坐标 (x_1,x_2,x_3) 中 $x_1:x_2,x_2:x_3,x_3:x_1$ 分别等于上述三个 交比;而 A_1A_3 线上的点 $M(x_1,0,x_3)$,有 $x_3:x_1$ 等于交比; A_1A_2 或 A_2A_3 线上的点类似。因此 π_0 上每个点在基底 $[A_1,A_2,A_3,E]$ 中的射影坐标与0点取法无关 $(O \in \pi_0)$ 。 并且点M的射影坐标的几何意义为:

$$x_1: x_2 = (A_1, A_2, A_{12}, M_{12}),$$

 $x_2: x_3 = (A_2, A_3, A_{23}, M_{23}),$
 $x_3: x_1 = (A_3, A_1, A_{31}, M_{31}),$

其中点 A_{12} 是直线 $A_{3}E$ 与 $A_{1}A_{2}$ 的交点,点 M_{12} 是直线 $A_{3}M$ 与 $A_{1}A_{2}$ 的交点,等等。

不难看出,§1中点M的 齐 次 仿 射坐 标 是在 特 殊 基 底 $[A_1,A_2,A_3,E]$ 中的齐次射影坐标,其中 A_1,A_2 是无穷远点, A_3,E 是通常点、

注意在一般的基底下,不能用点M的射影型标中 x_3 是 否 为零来判定M是否为无穷远点。

设点M在基底[A_1,A_2,A_3,E]下的射影 坐 标 为(x_1,x_2,x_3),则显然有

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

即任一点M的射影坐标等于三个基本点的射影坐标的线性组合, 并且组合的系数恰好就是M的射影坐标 x_1, x_2, x_3 。

4.2 射影坐标变换公式

设元0上有两个基底, $I[A_1,A_2,A_3,E]$, $II[A'_1,A'_2,A'_3,E']$ 。 设元0上点M在基底 I 中的射影坐标为 (x_1,x_2,x_3) ,M在基底 I 中的射影坐标为 (x'_1,x'_2,x'_3) 。 我们来讨论 (x_1,x_2,x_3) 与 (x'_1,x'_2,x'_3) 之间的关系。

在 π_0 外取一点O,把O中相应 地 行两个基底[OA_1,OA_2 , OA_3,OE'],对于这两个基底分 别 取它 OA_3,OE']和[OA'_1,OA'_2,OA'_3,OE'],对于这两个基底分 别 取它 们所对应的一个仿射标架 I [$O;e_1,e_2,e_3$]和 II [$O;e'_1,e'_2,e'_3$],于是 \overrightarrow{OM} 在仿射标架 I 中的坐标为($\lambda x_1,\lambda x_2,\lambda x_3$), \overrightarrow{OM} 在 II 中的坐标为($\lambda'x'_1,\lambda'x'_2,\lambda'x'_3$)。根据欧氏空间中的仿射坐标变 換 公式知道,存在非奇异矩阵 $A=(a_{ij})$,使得

$$\begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \\ \lambda x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda' x_1' \\ \lambda' x_2' \\ \lambda' x_3' \end{pmatrix},$$

也就是

$$\rho \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix}, \tag{7.14}$$

其中 ρ 是非零实数,对于不同的点, ρ 的值不同。公式(7.14)就是点的射影坐标变换公式,它表明点M的 I 坐标可以用它的 II 坐标的一次齐次多项式表示,即,点的 射 影 坐 标变换公式是线性的。公式(7.14)中的系数矩阵 $A = (a_{ij})$ 可以用待定系数 法求得。

例7.4 设射影平面 π_0 上取了两个 基底 $\Gamma[A_1,A_2,A_3,E]$ 和 $\Pi[A'_1,A'_2,A'_3,E']$,已知点 A'_1,A'_2,A'_3,E' 在基底 Γ 中 的 射 影 坐标分别为: (1,-1,2),(2,0,1),(-1,2,4)和(1,-1,0)。求基 底 Γ 到基底 Γ 的 点的射影坐标变换公式。

解 所求的射影坐标变换公式形如(7,14), 其中的系数矩阵 $A = (a_{ij})$ 可以用待定系数法求得。

因为 A_1 的 I 坐标是(1,-1,2), Π 坐标是(1,0,0), 所 以 Π (7.14)得

$$\rho_{1}\begin{pmatrix} 1\\ -1\\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1\\ 0\\ 0 \end{pmatrix},$$

于是得到 $a_{11} = \rho_1$, $a_{21} = -\rho_1$, $a_{31} = 2\rho_{10}$

类似地,分别将 A_2' , A_3' 的 I , II 坐标代入(7.14)可 以求得;

$$a_{12}=2\,\rho_{2}\,,a_{22}=0\;,a_{32}=\rho_{2}\,,a_{13}=\,-\,\rho_{3}\,,\;,a_{23}=2\,\rho_{3}\,,a_{33}=4\,\rho_{34}$$

将 E′的 I,Ⅱ坐标代入(7.14)得到

$$\begin{cases} a_{11} + a_{12} + a_{13} = \rho_4, \\ a_{21} + a_{22} + a_{23} = -\rho_4, \\ a_{31} + a_{32} + a_{33} = 0. \end{cases}$$

然后把aij的值代入到上述方程组中得到

$$\begin{cases} \rho_1 + 2\rho_2 - \rho_3 - \rho_4 = 0, \\ -\rho_1 + 2\rho_3 + \rho_4 = 0, \\ 2\rho_1 + \rho_2 + 4\rho_3 = 0. \end{cases}$$
 (7.15)

解方程组(7.15)得:

$$\rho_1 = \frac{7}{15}\rho_4, \quad \rho_2 = \frac{2}{15}\rho_4, \quad \rho_3 = -\frac{4}{15}\rho_4,$$

其中 ρ_4 可取任意非常实数。取 $\rho_4=15$,得 $\rho_1=7$, $\rho_2=2$, $\rho_8=-4$ 。从而得到

$$a_{11}=7\;, a_{21}=-7\;, a_{31}=14\;; a_{12}=4\;, a_{22}=0\;, a_{32}=2\;; a_{13}=4\;,$$

$$a_{23}=-8\;, a_{33}=-16\;,$$

所以从基底 I 到基底其的点的射影 密原变换公式为:

$$\rho \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 4 & 4 \\ -7 & 0 & -8 \\ 14 & 2 & -16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix},$$

其中ρ为非零实数。

4.3 直线在射影坐标中的方程

设相异两点 P,Q 在基底[A_1,A_2,A_3,E]中的射影坐标分别为 $(p_1,p_2,p_3),(q_1,q_2,q_3)$ 。点 $M(x_1,x_2,x_3)$ 在直线 PQ 上的 充 分必要条件为:把 O 中相应的直线 OM,OP,OQ 共面,从而有不全为零的实数 λ , μ 使得它们的方向向量 v_M,v_P,v_Q 适合: $v_M=\lambda v_P+\mu v_Q$,即

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix},$$
 (7.16)

或者有

$$\left| \begin{array}{ccc} x_1 & p_1 & q_1 \\ x_2 & p_2 & q_2 \\ x_3 & p_3 & q_3 \end{array} \right| = 0,$$

展开得

$$\eta_1 x_1 + \eta_2 x_2 + \eta_3 x_3 = 0, \tag{7.17}$$

其中

$$\eta_1 = \begin{vmatrix} p_2 & q_2 \\ p_3 & q_3 \end{vmatrix}, \quad \eta_2 = -\begin{vmatrix} p_1 & q_1 \\ p_3 & q_3 \end{vmatrix}, \quad \eta_3 = \begin{vmatrix} p_1 & q_1 \\ p_2 & q_2 \end{vmatrix}$$

不全为零(因为 P,Q 是相异两点,所以 v, X v_Q),这说 明. 直线 PQ 在射影坐标中的方程(7.17)是三元一次齐次方程。反 之,易 看出,任意一个三元一次齐次方程(在射影坐标系中)都表示射影 平面上的一条直线。

(7.16)称为直线 PQ 在给定射影坐标系中的参数方程。

容易看出, $\eta_1 x_1 + \eta_2 x_2 + \eta_3 x_3 = 0$ 与 $\omega_1 x_1 + \omega_2 x_2 + \omega_3 x_3 = 0$ 表示 同一条直线的充分必要条件是(η_1, η_2, η_3)与($\omega_1, \omega_2, \omega_3$) 成 比 例,因此可以将(η_1, η_2, η_3)称为直线 $\eta_1 x_1 + \eta_2 x_2 + \eta_3 x_3 = 0$ 的 齐 次射影 坐标,简称为射影坐标。

由上述讨论还可看出:

(1) 射影 平面上,设 三 点 P,Q,R 的 射 影 坐 标 分 别 为 (p_1,p_2,p_3) , (q_1,q_2,q_3) , (r_1,r_2,r_3) ,则 P,Q,R 三点共线的充 分必 要条件为

$$\begin{vmatrix} p_1 & q_1 & r_1 \\ p_2 & q_2 & r_2 \\ p_3 & q_3 & r_3 \end{vmatrix} = 0.$$

(2) 射影平面上,设相异两点P,Q的射影坐标分别是 $(p_1,p_2,p_3),(q_1,q_2,q_3)$,点R的射影坐标是 (r_1,r_2,r_3) ,则点R与P,Q 共线的充分必要条件是存在不全为零的实数 λ,μ 使得

$$\begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix}.$$

请读者利用射影平面的对偶原理写出关于射影坐标的三线共 点的条件。

4.4 用射影坐标计算交比

在§3中我们曾经给出了用齐次坐标计算交比的 公式(7,11) 272 和(7.10)。现在我们来说明这两个公式在射影坐标下仍然成立。

定理7.4 设 A,B,C,D 是射影平面元。上共 线的四点,共中 A,B,C 各不相同,并且 $D \hookrightarrow A$ 。设 A,B,C,D 在 任 一 基 底 I [A_1,A_2,A_3,E] 中的射 影 坐 标 分 别 为(a_1,a_2,a_3),(b_1,b_2,b_3),(c_1,c_2,c_3),(d_1,d_2,d_3),并且

$$c_i = \lambda_1 a_i + \mu_1 b_i$$
, $d_i = \lambda_2 a_i + \mu_2 b_i$, $i = 1, 2, 3$.

厠

$$(A,B,C,D) = \frac{\lambda_2}{\mu_2} / \frac{\lambda_1}{\mu_1} \qquad (7.18)$$

证明 在元₀上取基底 $\Pi[B_1,B_2,B_3,F]$,使得 B_1,B_2 都 为无 穷 远点,则 A,B,C,D 在 基 底 Π 中 的 射 影 坐 标 (a'_1,a'_2,a'_3) , (b'_1,b'_2,b'_3) , (c'_1,c'_2,c'_3) , (d'_1,d'_2,d'_3) 也就是它们的齐次坐标。设

$$c'_{i} = \lambda'_{1}a'_{i} + \mu'_{1}b'_{i}$$
, $d'_{i} = \lambda'_{2}a'_{i} + \mu'_{2}b'_{i}$, $i = 1, 2, 3$

则由公式(7,11)得

$$(A,B,C,D) = \frac{\lambda_2'}{\mu_2'} / \frac{\lambda_1'}{\mu_1'}.$$

设基底Ⅰ到Ⅱ的射影坐标变换公式为

$$\rho \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = H \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix},$$

共中H是非奇异矩阵。于是由 $c_i = \lambda_i a_i + \mu_i b_i$ 得

$$\rho_3^{-1}H\begin{pmatrix} a_1'\\ a_2'\\ a_3'\end{pmatrix}=\lambda_1\rho_1^{-1}H\begin{pmatrix} a_1'\\ a_2'\\ a_3'\end{pmatrix}+\mu_1\rho_2^{-1}H\begin{pmatrix} b_1'\\ b_2'\\ b_3'\end{pmatrix},$$

所以

$$\lambda_1' = \lambda_1 \rho_3 \rho_3^{-1}, \quad \mu_1' = \mu_1 \rho_3 \rho_2^{-1}$$

同理可得 $\lambda'_2 = \lambda_2 \rho_4 \rho_1^{-1}$, $\mu'_2 = \mu_2 \rho_4 \rho_2^{-1}$. 于是可以算出

$$\frac{\lambda_2'}{\mu_2'} / \frac{\lambda_1'}{\mu_1'} = \frac{\lambda_2}{\mu_2} / \frac{\lambda_1}{\mu_1},$$

从而(7.18)成立。

类似地,关于用齐次坐标计算共点四线的交比的公式(7.10) 在射影坐标中仍然成立。

此外,由公式(7.12)的推导过程可以看出,既然公式(7.11) 在射影坐标中也成立,因此公式(7.12)在射影坐标中同样成立, 并且对于共点四线的交比类似于(7.12)的公式在射影坐标中也成立。

4.5 点的非齐次射影坐标




图 7.14

定义7,10 在射影平面上取一个基底 $[A_1,A_2,A_3,E]$,对于不在直线 A_1A_2 上的点 $M(x_1,x_2,x_3)$,令

$$x = \frac{x_1}{x_3}, \quad y = \frac{x_2}{x_3},$$

则称(x,y)是 点M的非齐次射影 坐标。

由前面谈到的点M的齐次射影坐标的几何意义知道 $x_1: x_3 = (A_1, A_3, A_{13}, M_{13}), x_2: x_3 = (A_2, A_3, A_{23}, M_{23}).$ 因此,点M的非齐次射影坐标实际上就是交比。

取另一基底 $\Pi[A'_1,A'_2,A'_3,E']$,对于既不在直线 A_1A_2 上,又不在直线 $A'_1A'_2$ 上的任意一点 M,设它在 I, Π 中的齐次射影坐标分别是 (x_1,x_2,x_3) , (x'_1,x'_2,x'_3) , 非齐次射影坐标分别是 (x,y), (x'_1,y'_2) , 则

$$x = \frac{x_1}{x_3}, \quad y = \frac{x_2}{x_3}, \quad x' = \frac{x_1'}{x_3'}, \quad y' = \frac{x_2'}{x_3'}.$$

由齐次射影坐标变换公式(7.14)得


$$\rho x_i = \sum_{j=1}^{3} a_{ij} x'_j, \quad i = 1, 2, 3.$$

$$\begin{cases} x = \frac{a_{11}x' + a_{12}y' + a_{13}}{a_{31}x' + a_{32}y' + a_{33}}, \\ y = \frac{a_{21}x' + a_{22}y' + a_{23}}{a_{31}x' + a_{32}y' + a_{33}}. \end{cases}$$
 (7.19)

这是点的**非齐次射影坐标变换公式**,它表明点M在基底 I 中的非齐次射影坐标x,y可以用它在 II 中的非齐次射影坐标x',y'的分式线性函数表达。

习 题 7.4

- 1. 设在射影平面的一个基底 I 里给了点 $B_1(4,-2,3)$, $B_2(5,2,0)$, $B_3(1,3,-2)$,F(1,1,0),M(1,1,-1),证明点 B_1 , B_2 , B_3 ,F 是一般位置的四个点,并且求基底 I 到 II [B_1 , B_2 , B_3 ,F]的 射影坐标变换公式,求M在基底 II 中的射影坐标。
- 2. 在射影平面 上,求 从 基 底 $\mathbb{I}[A_1,A_2,A_3,E]$ 到 基 底 $\mathbb{I}[A_3,A_1,E,A_2]$ 的射影坐标变换公式。
- 3. 在射影平面上,设点F在 基底 I [A_1 , A_2 , A_3 , E]中的射影坐标为(ε_1 , ε_2 , ε_3),并且 A_1 , A_2 , A_3 , F 是一般位置的四个点,求基底 I 到 II [A_1 , A_2 , A_3 , F]的射影坐标变换公式。
- 4. 在射影平面上取四点 $B_1(1,2,1)$, $B_2(1,1,0)$, $B_3(2,1,1)$, F(0,1,7), 求点 M(1,1,1)在基底[B_1,B_2,B_3,F]中的坐标。
- 5. 证明帕普斯(Pappus)定理:设A,B,C,A',B',C'分别是直线与和 l_2 上的三个点,并且均与与和 l_2 的交点D不重合,设AB'与A'B交子点P,BC'与B'C交子点Q,CA'与C'A 交子点R,则P,Q,R三点共线。
- 6. 在射影平面上取一个 悲 底[A_1,A_2,A_3,E], A_{23} 是直线 A_1E 与 A_2A_3 的 交 点,求 直 线 A_2A_3 上的一个点 P 使 得 交比 $(A_2,A_3;A_{23},P)=a$.
- 7. 在射影平面上给了一个三角形 $A_1A_2A_3$, 设 P_1,P_2,P_3 分别在直线 A_2A_3,A_3A_1,A_1A_2 上,但是都不 和 A_1,A_2,A_3 重合,而



 Q_1,Q_2,Q_3 依次为 P_1,P_2,P_3 对 于 $A_2,A_3;$ A_3,A_1,A_1,A_2 的调和 共 轭 点。证 明: A_1Q_1,A_2Q_2,A_3Q_3 共点 的 充 分 必 要条件 是 P_1,P_2,P_3 共

线.

8. 在射影平面上, A_1, A_2, A_3 和 P_1, P_2, P_3 的意义同第7题,但是

- 9. 在射影平面上,设 A_1 , A_2 , A_3 , P_1 , P_2 , P_3 , Q_1 , Q_2 , Q_3 的意义同第 8 题。证明:若 P_1 , P_2 , P_3 共线,则 A_1Q_1 , A_2Q_2 , A_3Q_3 共点的充分必要条件是 $\theta_1\theta_2\theta_3 = -1$ 。义如果 P_1 , P_2 , P_3 在扩大欧氏平面的无穷远直线上,那末上述命题的几何意义是什么?
- *10. 射影平面配上,由一般位置的四个点 A,B,C,D(称它们为顶点)和由它们两两相连的六条直线(称它们为边)构 成 的图形称为完备四点形。不在同一顶点上的两条边称为对边,对边的交点称为对角点,如图7,16中,E,F,G均是对角点。
- (1)证明完备四点形的三个对角点不 共 线。由这三个对角 点确定的三角形称为完备四点形的**对角三角形**。
- (2)证明完备四点形的任意两个对角点 调 和分割它们的连 线和另外两条边的交点。
- *11. 在射影平面上,完备四点形的对偶称为**完备四边形。叙** 述第 10 题的第(2)小题的对偶 命题, 幷且说明调和线束的作图 方法。




图 7.16

§ 5 射影映射和射影变换

本章一开头曾介绍过中心投影,这一节我们要来讨论作为中心投影的推广的射影映射。

5.1 射影映射的定义和性质

首先我们来讨论中心投影的坐标表示。设定是从射影平面元。到元的投影中心为O的中心投影。在元。上取定一个基底[A_1 , A_2 , A_3 , E],在元。上取定一个基底[B_1 , B_2 , B_3 , F]。设 A_i , E在下的象分别为 A_i' , E',则[A_1' , A_2' , A_3' , E']也是元。的一个基底。从射影坐标的定义容易看出,点 M 在中心投影工下的象点 M' 在基底 [A_1' , A_2' , A_3' , E'] 中的坐标与点M在基底 [A_1 , A_2 , A_3 , E] 中的坐标与点M在基底 [A_1 , A_2 , A_3 , E] 中的坐标(x_1 , x_2 , x_3)相同。设元的基底 [B_i , B_2 , B_3 , F] 到基底 [A_1' , A_2' , A_3' , E'] 的坐标变换公式中系数矩阵为 $A = (a_{ij})$,则点M'在基底[B_1 , B_2 , B_3 , F] 中的坐标(x_1' , x_2' , x_3')与 M'在基底[A_1' , A_2' , A_3' , E'] 中的坐标(x_1 , x_2 , x_3) 之间的关系为

$$\rho \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \tag{7.20}$$




图 7.17

由于 (x_1,x_2,x_3) 也是点M在基底 $[A_1,A_2,A_3,E]$ 中的坐标,因此,(7.20)也表明象点M'在基底 $[B_1,B_2,B_3,F]$ 中的坐标 (x_1',x_2',x_3') 与原象M在基底 $[A_1,A_2,A_3,E]$ 中的坐标 (x_1,x_2,x_3) 之间的关系,从而(7.20)是中心投影 τ 关于 π_0 的基底 $[A_1,A_2,A_3,E]$ 和 π_1 的基底 $[B_1,B_2,B_3,F]$ 的坐标表达式,简称为中心投影 τ 的公式。

现在我们将中心投影加以推广, 引进射影映射的概念。

定义7.11 射影平面元。到射影平面元的一个映射 σ ,如果它关于元的基底 $[A_1,A_2,A_3,E]$ 和元的基底 $[B_1,B_2,B_3,F]$ 的坐标表达式为

$$\rho \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \tag{7.21}$$

其中 (x_1,x_2,x_3) 是 π_0 上的点 M 在基底 $[A_1,A_2,A_3,E]$ 中的射影坐标, (x_1',x_2',x_3') 是 π_1 上象点 M'在基底 $[B_1,B_2,B_3,F]$ 中的射影坐

标, ρ 是非零实数,系数矩阵 $A=(a_{ij})$ 是非奇异的,那末称 σ 是元。到 π_i 的一个射影映射。

不难证明,上述定义与射影坐标系的 选 择 无 关,即由公式 (7.21)定义的映射 σ 关于 π_0 的一个新基底 $[A'_1,A'_2,A'_3,E']$ 和 π_1 的 新基底 $[B'_1,B'_2,B'_3,F']$ 的坐标表达式仍然形 如(7.21)的样子,并且其系数矩阵 B 仍是非奇异的,因此用 σ 在新基底中的坐标表达式判断, σ 仍是射影映射。

显然,中心投影是射影映射。

定理7.5 设σ是射影平面元。到元1的射影映射,则σ把直线变成直线。

证明 在 π_0 上取直线 l: $\eta_1 x_1 + \eta_2 x_2 + \eta_3 x_3 = 0$, 即

$$(\eta_1, \eta_2, \eta_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0.$$
 (7.22)

用σ的公式(7.21)代到(7.22)中得

$$(\eta_1, \eta_2, \eta_3) \rho A^{-1} \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix} = 0,$$
 (7.23)

易知 $(\eta_1,\eta_2,\eta_3)\rho A^{-1}$ \Rightarrow 0,因此,(7.23) 是 x'_1,x'_2,x'_3 的一次齐次方程,从而它表示 π_1 上的一条直线l' 。这说明直线 l 上任一点在 σ 下的象都在直线 l' 上。

反之,由于把(7.21)代到(7.23)中就得到(7.22),因此直线U上任一点在 σ 下的原象一定在U上。综上述, σ 把直线U变成直线U。

定理7.5说明,射影平面元。到元的射影映射 σ 引起了元的射有直线组成的集合到元的所有直线组成的集合的一个双射,并且 σ 保持点和直线的关联性。

由于射影映射 σ的公式(7.21)与射影坐标变换公式(7.14)在 形式上一样,因此完全类似于定理 7.4 的证明我们可以证得下述 **定理7.6** 射影映射保持共线四点的变比不变,即如果 σ 是射影平面 π_0 到 π_1 的射影映射,并且 σ 把 π_0 上的共线四点 A, B, C, D 分别变成 π_1 上的共线四点 A', B', C', D', 那宋

$$(A,B,C,D)=(A^\prime,B^\prime,C^\prime,D^\prime)_\bullet$$

由于共点四线的交比等于它们在某条直线上的截影的交比, 因此由定理 7.6 可以得到:射影映射也保 持 共 点 四线的交比不 变。

5.2 射影映射的基本定理

由定理 7.5 易知,射影映射把不共线三点变成不共线三点,从而把一般位置的四个点变成一般位置的四个点。反过来,我们有

定理7.7(射影映射基本定理) 设 A_1,A_2,A_3,E 是 π_0 上一般位置的四个点, A'_1,A'_2,A'_3,E' 是 π_1 上一般位置的四个点,则存在 π_0 到 π_1 的唯一的射影映射 σ 把 A_1,A_2,A_3,E 分别映成 A'_1,A'_2,A'_3,E' ,并且在 σ 下,任意一点 $M \in \pi_0$ 在基底[A_1,A_2,A_3,E]中的射影坐标。

证明 在 π_0 上取 基底 $[A_1,A_2,A_3,E]$,在 π_1 上 取 基 底 $[A_1',A_2',A_3',E']$ 。 设射影映射 σ 关于这两个基底的坐标表达式为

$$\rho \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}. \tag{7.24}$$

假如 $\sigma(A_i) = A'_i$, $\sigma(E) = E'$, 则

$$\rho_1\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \quad \rho_2\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},$$

$$\rho_{3}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}, \quad \rho_{4}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

于是 得 $a_{ij}=0$, 当 $i \Rightarrow j$, $a_{11}=a_{22}=a_{33}=\lambda \Rightarrow 0$ 。 选取 $\lambda=1$, 从而 (7.24) 成为

$$\rho \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} .$$
(7.24)

根据射影映射的定义,(7.24)'确定了一个射影 映 射,而且从上 遮知,把 A_1,A_2,A_3,E 分别映成 A_1',A_2',A_3',E' 的射影映射一定就 是它。这样我们就证明了存在 π_0 到 π_1 的唯一的射影映射 σ 把 A_1 , A_2,A_3,E 分别映成 A_1',A_2',A_3',E' 。从 σ 的坐标表达式(7.24)'可以得到

$$\rho\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix},$$

这说明 π_0 上任一点M在 基 底 $[A_1,A_2,A_3,E]$ 中 的 射 影 坐标 (x_1,x_2,x_3) 等于它的象点 M' 在基底 $[A'_1,A'_2,A'_3,E']$ 中的射影坐 标 (x'_1,x'_2,x'_3) (注 意: $\rho(x'_1,x'_2,x'_3)$ 与 (x'_1,x'_2,x'_3) 都是 点 M' 的射影坐标)。

下面我们指出射影映射基本定理在航空摄影中的应用。本章一升头我们曾指出,航空摄影时在底片上所得到的象是一块大地(假定地面是平的)经过中心投影以后的象,并且由于飞机飞行时的颠簸,使得底片与地面不平行,因此,底片上的象通常不是地面的相似图,而是变了形的图象。利用射影映射基本定理就可以给出矫正摄影图象的适当的方法。矫正的目的是要从底片得到地面的一个相似图,而地面的一张相似图就是地面元。在一个水平平面和一上的中心投影,可以设想中心就是镜头。因此,相似图和一也是底片元,在相应的中心投影下的象,而中心投影是一个射影映

射,根据射影映射基本定理,要想从底片和,得到地面的一张相似图 π' ,只须确定和,上一组一般位置的四个点所对应的 π' 上的四个点就够了,这是因为这两组一般位置的四个点就唯一确定了这个中心投影。具体做法如下:取一张准确的地形图和 δ (不必很详细),在 π' 6上任意选取一组一般位置的四个点 A'7,B'7,C'7,D'9, 在底片和上找出它们的对应点A7,B7,D8 然后把 π 1和 π' 6装到灯光照射器上,调整它们的位置,使得A7,B7,D7 正好分别照射到 A'7,B'7,C'7,D'1上。最后,把地图 π' 6 换 成照相正片,注意不要变动调整好的位置,那么正片上即出的就是一张地面的相似图,它是由底片和1经过矫正得到的。

5.3 射影变换

射影平面元。到自身的射影映射 σ 称为元。的射影变换,此时 σ 的公式(7.21)中(x'_1 , x'_2 , x'_3)和(x_1 , x_2 , x_3)分别是象点 和原象对于同一个基底的射影坐标。

由于射影变換公式中的系数矩阵是可逆矩阵,因此由可逆矩阵的性质立即得到:射影变换的乘积还是射影变换,恒等变换是射影变换;射影变换是可逆的,其逆变换仍是射影变换。从而射影平面上的所有射影变换形成一个群,称它为射影变换群。

关于射影映射的定理 7.5,7.6 以及 射 影映射基本定 理 对于射影变换同样成立。

同样有,射影平面的一个射影变换 σ(点变换)引起了这个射影平面上的所有直线组成的集合到自身的一个双射,并且 σ保持点与直线的关联性。

例7.5 在射影平面上,求把点A(1,0,1),B(2,1,1),C(3,-1,0),D(3,5,2)分别变成点A'(-1,0,3),B'(1,1,3),C'(2,3,8),D'(2,1,-2)的射影变换 σ 的公式,

解 设 σ的公式为

$$\lambda \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

由已知条件得

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -\lambda_1 & \lambda_2 & 2\lambda_3 & 2\lambda_4 \\ 0 & \lambda_2 & 3\lambda_3 & \lambda_4 \\ 3\lambda_1 & 3\lambda_2 & 8\lambda_3 & -2\lambda_4 \end{pmatrix},$$

比较两边矩阵的第一行得

$$\begin{cases} a_{11} + a_{13} = -\lambda_1, \\ 2a_{11} + a_{12} + a_{13} = \lambda_2, \\ 3a_{11} - a_{12} = 2\lambda_3, \\ 3a_{11} + 5a_{12} + 2a_{13} = 2\lambda_4, \end{cases}$$

由此方程组可以得到

$$\lambda_1 + 2\lambda_2 - \lambda_3 - \lambda_4 = 0. \tag{7.25}$$

比较上面等式两边矩阵的第二行可得到

$$4\lambda_2 - 3\lambda_3 - \lambda_4 = 0. \tag{7.26}$$

比较上面等式两边矩阵的第三行可得到

$$3\lambda_1 - 6\lambda_2 + 4\lambda_3 - \lambda_4 = 0. \tag{7.27}$$

联立(7.25),(7.26),(7.27)解得

$$\begin{cases} \lambda_1 = \frac{3}{4}\lambda_4, \\ \lambda_2 = -\frac{1}{8}\lambda_4, \\ \lambda_3 = -\frac{1}{2}\lambda_4. \end{cases}$$

再代回到上述三个方程组,即可求出aij的值(与Ai有关),适当选

取礼的值,可以得到6的公式为

$$\lambda \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 23 & -21 \\ -13 & 9 & 13 \\ -53 & -31 & 125 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

5.4 分式线性变换

现在在射影平面上取定一个 基底[A_1,A_2,A_8,E]。设射影变换 σ 的公式为(7.21)。对于不在直线 A_1A_2 上,并且不在直线 $a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=0$ 上的点 $M(x_1,x_2,x_3)$,设它的非齐次射影坐标为 (x,y),设M在 σ 下的象 M'(x',y',z') 的非 齐 次 射 影坐标为 (x',y')。由于

$$x' = \frac{x_1'}{x_3'}, \quad y' = \frac{x_2'}{x_3'}, \quad x_1 = xx_3, \quad x_2 = yx_3,$$

因此由(7,21)得

$$\begin{cases} x' = \frac{a_{11}x + a_{12}y + a_{13}}{a_{31}x + a_{32}y + a_{33}}, \\ y' = \frac{a_{21}x + a_{22}y + a_{23}}{a_{31}x + a_{32}y + a_{33}}. \end{cases}$$
(7.28)

公式(7.28)是射影变换 σ在非齐次射影坐标中的表达式, 它是分式线性函数, 并且.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \div 0. \tag{7.29}$$

由此可见,射影平面的射影变换用非齐次射影坐标表达时,是平 面的分式线性变换。

5.5 仿射——射影变换

考虑扩大欧氏平面元。上的把无穷远直线变成无穷远直线的射影变换,这样的射影变换称为**仿射——射影变换**。

取一个仿 射——射 影 变 換 σ , 在 π_0 上 取 一 个 基 底 I · $[A_1, A_2, A_3, E]$, 使得 A_1, A_2 为 假点,这 时点的齐次射影坐标也就是点的齐次仿射坐标,非齐次射影坐标也就是点的仿射坐标。设 σ 在 I 中的公式仍为(7.21),由于无穷远直线 $x_3 = 0$ 上的点均变成无穷远点,因此由(7.21)得

$$\lambda \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 0 \end{pmatrix}, \tag{7.30}$$

取 $x_1 = 1$, $x_2 = 0$, 则得 $a_{31} = 0$; 取 $x_1 = 0$, $x_2 = 1$, 得 $a_{32} = 0$ 。于是 σ 在 I 中的公式成为

$$\lambda \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \tag{7.31}$$

由于 σ的公式中的系数矩阵应为非奇异的,因此有

$$a_{33} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \rightleftharpoons 0,$$

从而 $a_{aa} + 0$ 。 合

$$c_{ij} = \frac{a_{ij}}{a_{88}}, \quad i = 1, 2, 3; \quad j = 1, 2, 3.$$

则σ 在 I 中的公式又可写成

$$\lambda' \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \tag{7.32}$$

其中 $\lambda' = \frac{\lambda}{a_{23}}$, 幷且

$$\begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{vmatrix} \neq 0. \tag{7.33}$$

现在考虑 π_0 上的任一通常点 $M(x_1,x_2,x_3)$, 设它的仿射坐标为(x,y), 则 $x=\frac{x_1}{x_3}$, $y=\frac{x_2}{x_3}$. 设M在 σ 下的象M'(M'必为通常点)


的仿射坐标为(x',y')。由 σ 用非齐次射影坐标表达的公式(7.28)得

$$\begin{cases} x' = c_{11}x + c_{12}y + c_{13}, \\ y' = c_{21}x + c_{22}y + c_{23}, \end{cases}$$
 (7.34)

由(7.33)知,此公式(7.34)的系数矩阵是非奇异的。这说明, π_0 上的仿射——射影变换 σ 限制到 π_0 上时,它是仿射变换(7.34)。 在这个意义上我们可以说:仿射变换是特殊的射影变换。

习 题 7.5

1. 在射影平面上,取一个基底 $[A_1,A_2,A_3,E]$,求把点 $B_1(1,0,1)$, $B_2(2,0,1)$, $B_3(0,1,1)$,F(0,2,1) 分别变到基点 A_1,A_2,A_3,E 的射影变换 σ 的公式。



2 7.18

- 2. 在射影平面上,取一基底 $[A_1,A_2,A_3,E]$,设 B_i 为 坐 标 三 角形的顶 点 A_i 与单位点 E 的连线 A_iE 跟对边的交点,求把 A_1,A_2 , A_3 分别变成 B_1,B_2,B_3 的射影变换的 公式的一般形式。
- 3. 在扩大的欧氏平面上,求出把直线 $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, $x_3 = 0$ 分别变为直线 $a_i x_1 + b_i x_2 + c_i x_3 = 0$ (i = 1, 2, 3)的射影变换的公式的一般形式。
- 4. 证明:在射影平面上,以坐标三角形的三个顶点为不动 点的射影变换的公式的一般形式是

$$\lambda \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix},$$

其中a,b,c均可取任意非零实数。

5. 在射影平面上,射影变换 σ的公式为

$$\lambda \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix},$$

*6. 设射影平面上的一个点变换 σ 有 不动点 A 和不动直线 $l_0(l_0)$ 上每点均不动), A 不在 l_0 上, 并且对于每个其它点 P, σ 把 P 变到 AP 上一点 P', 使得 $(A,P_0,P,P')=e$, 其中 P_0 是 AP 和 l_0 的交点, e 是常数 $(\Rightarrow 0,1)$ 。证明 σ 是射影变换。此时称 σ 是透射, A 为透射中心, l_0 为透射轴。

§ 6 配极, 二次曲线的射影分类

6.7 射影平面上的二次曲线

射影平面上,射影坐标满足二次齐次方程 $a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_8 = 0$ (7.35)

的点的集合称为二次曲线。

服然若点 $M(x_1,x_2,x_3)$ 在二次曲线(7.35)上,则它的任一射影坐标($\lambda x_1,\lambda x_2,\lambda x_3$)满足方程(7.35),并且二次曲线(7.35)在任意基底下的方程仍是二次齐次方程。

把二次曲线方程(7.35)的左端筒记作 $F(x_1,x_2,x_3)$, 它可以写成

$$F(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix},$$

其中系数矩阵 $A = (a_{ij})$ 是对称矩阵。如果A是非奇异的,则称二次曲线(7.35)是非退化的,否则称为退化的。

方程(7,35)可写成

$$X^{\dagger}AX = 0,$$
 (7.35)

其中 $X^i = (x_1, x_2, x_3)$, 方程(7.35)也可以写成

$$\sum_{i,j=1}^{3} a_{ij} x_i x_j = 0, \quad \text{Hith } a_{ij} = a_{ji}; \qquad (7.35)''$$

现在考虑扩大欧氏平面元。,在元。上取一个直角标架[O_1 ; e_1 , e_2],相应的元。的基底记作 I.则点 M 在 I 中的射影坐标(x_1 , x_2 , x_3)就是M的齐次坐标,于是M 任[O_1 ; e_1 , e_2]中的仿射坐标为

$$x=\frac{x_1}{x_3}, \quad y=\frac{x_2}{x_3}.$$

设给了二次曲线 ♂, 它在Ⅰ中的方程为(7.35)。

情形1. a_{11}, a_{22}, a_{33} 不全为零。

通常点 $M(x_1,x_2,x_3)$ 在 S 上的充分必要条件为M的仿射坐标 (x,y)适合

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0,$$
 (7.36)

无穷远点 $N(x_1,x_2,0)$ 在 \overline{S} 上的充分必要条件为 N 相应的 π_0 上的方向 $v(x_1,x_2)$ 适合

$$a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + 2a_{12}x_1x_2 = 0, (7.37)$$

这表明 $v(x_1,x_2)$ 是 π_0 上的二次曲线 (7.36) 的渐近方向。

所以当 a_{11} , a_{22} , a_{33} 不全为零时, π_0 上的二次曲线 \mathbb{Z} 是 由 欧氏平面 π_0 上的二次曲线(7.36)以及它的渐近方向所对应 的 无穷远点所组成。

情形2. $a_{11}=a_{22}=a_{33}=0$. 则通常点 $M(x_1,x_2,x_3)$ 在 $\mathbb S$ 上的充分必要条件为它的仿射坐标(x,y)满足方程

$$2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0, (7.38)$$

在情形 2 下,任一无穷远点的坐标都满足(7.35),从而整条无穷远直线在 图 上。因此,若 $a_{11} = a_{22} = a_{33} = 0$,则 图 或 者由一条射影直线(7.38)和一条无穷远直线组成,或者由一对重合的无穷远直线组成。

总之,射影平面元。上的二次曲线 8 有11种,其中 9 种分别

是欧氏平面 沉。上 的 二次曲线并且补充了它的渐近方向所对应的 无穷远点; 另外两种是, 一条 射 影 直 线(7.38)和一条无穷远直 线;一对重合的无穷远直线。

6.2 二次曲线的切线

现在研究直线与二次曲线相交的情况、设直线 PQ 的参数方 程为

 $x_i = \lambda p_i + \mu q_i$, λ, μ 不全为零, i = 1, 2, 3. (7.39)代入二次曲线 B 的方程(7.34)中,得

$$\left[\lambda(p_1,p_2,p_3) + \mu(q_1,q_2,q_3)\right] A \left[\lambda \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix}\right] = 0,$$

吅

 $\lambda^2 F(p_1, p_2, p_3) + \mu^2 F(q_1, q_2, q_3) + 2\lambda \mu \overline{F}(p_1, p_2, p_3; q_1, q_2, q_3) = 0,$ (7.40)

共中 $\overline{F}(p_1, p_2, p_3; q_1, q_2, q_3) = (p_1, p_2, p_3) A \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix}.$

$$A \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix}$$

如果 $F(p_1,p_2,p_3) = F(q_1,q_2,q_3) = \overline{F}(p_1,p_2,p_3, q_1,q_2,q_3) = 0$, 则λ,μ 可取任意不全为零的实数,从而直线 PQ 的所有点都在二 次曲线 🖇 上。

如果 $F(p_1,p_2,p_3)$, $F(q_1,q_2,q_3)$, $\overline{F}(p_1,p_2,p_3,q_1,q_2,q_3)$ 不全 为零,则(7.40)可确定 $\lambda:\mu$ 的两个值(不同的,或相同的,或虚的),从而得到直线PQ与二次曲线S有两个交点(不同的,或重合 的,或虚的)。

定义7.12 若直线 4 与二次曲线 8 有重合的两个交点,或者 L整个在 B 上,则称 L 是 B 的切线,它们的交点称为切点。

设直线 L B 的切线, 切点为 P 。在 L 上任取一点 $Q(\Rightarrow P)$, 设 P,Q 的射影坐标分别是 $(p_1,p_2,p_3),(q_1,q_2,q_3), L$ 的参数方程 为(7.39)。因为L = S有二重交点P,所以(7.40)确定 $\lambda : \mu$ 的两 个相同的值, 从而得

[$F(p_1,p_2,p_3; q_1,q_2,q_8)$]² - $F(p_1,p_2,p_3) \cdot F(q_1,q_2,q_8)$ = 0, 由于P在 \overline{S} 上,所以 $F(p_1,p_2,p_3)$ = 0, 从而由上式得

$$\overline{F}(p_1, p_2, p_3; q_1, q_2, q_3) = 0.$$
 (7.41)

切线 L 上任一点 $Q(q_1,q_2,q_3)$ 均适合(7,41), 即适合方程

$$(p_1, p_2, p_3) A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0.$$
 (7.42)

者 $(p_1,p_2,p_3)A$ = 0,则 (7.42) 是一次齐次方程,它就是切线 L 的方程。若 $(p_1,p_2,p_3)A$ = 0,则 x_1,x_2,x_3 可取任意不全为零的实数值,这意味着扩大欧氏平面上任一点与点 P 的连线都是 B 的切线。

二次曲线 δ 上的点 $P(p_1,p_2,p_3)$, 如果便得

$$(p_1, p_2, p_3)A = 0,$$

则称点 P 是 B 的奇点。

显然, 非退化的二次曲线沒有奇点(因为 4 非奇异).

设直线 L 整个在 S 上,则仍可得到(7.41)式,因此仍有上述结论。

6.3 极点和极线

取点 $P(p_1,p_2,p_3)$ 不在二次曲线S上。过点P引任意一条直




图 7.19

线L,使得L与B有两个不同的变点G,H,作点P关于G,H的调和共轭点Q,即,使得(G,H;P,Q)=-1. 用这样的方法所作的点Q的几何轨迹称为点P关于二次曲线B的配极,而点P对于配极而言称为极点。

现在来求点 $P(p_1,p_2,p_3)$

关于二次曲线B的配极的方程。设 $Q(q_1,q_2,q_3)$ 是配极上任一点,则直线 PQ 的参数方程为(7.39),它与B的交点 G、H 对 应的参数值 λ_i , μ_i 满足(7.40)。设 λ_1 , μ_1 和 λ_2 , μ_2 是满足 (7.40) 的两组值,则G 点坐标为

$$(\lambda_1 p_1 + \mu_1 q_1, \lambda_1 p_2 + \mu_1 q_2, \lambda_1 p_3 + \mu_1 q_3)$$
,

H点的坐标为

从而

î

$$\begin{split} (\lambda_2 p_1 + \mu_2 q_1, \lambda_2 p_2 + \mu_2 q_2, \lambda_2 p_3 + \mu_2 q_3), \\ (P, Q, G, H) &= \frac{\lambda_2}{\mu_2} \bigg/ \frac{\lambda_1}{\mu_1} \; . \end{split}$$

因为(P,Q,G,H) = (G,H,P,Q) = -1,所以 λ_1, λ_2

$$\frac{\lambda_1}{\mu_1} + \frac{\lambda_2}{\mu_2} = 0.$$

于是由 (7.40) 得

$$\overline{F}(p_1, p_2, p_3, q_1, q_2, q_3) = 0,$$

这说明,点 P 关于 ♂的配极上的任一点 Q(q1,q2,q3)满足

$$(p_1, p_2, p_3) A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0,$$
 (7.43)

由于P不在S 上,所以 (p_1,p_2,p_3) A \Rightarrow 0,从而(7.43) 是 x_1,x_2,x_3 的一次方程,于是点P($\in S$) 关于S 的配极上的任意一点Q 都在 直线(7.43) 上,为简便起见,于脆把整条直线(7.43) 称为点P ($\in S$) 关于二次曲线S的配极,因此配极也称为**极线**,它的方程 是(7.43),或者写成

$$\sum_{i,j=1}^{8} a_{ij} p_i x_j = 0. (7.44)$$

若点 $P(p_1,p_2,p_3)$ 在二次曲线 8 上,且P 不是 8 的奇点,则以P 为切点的切线方程(7.42)与(7.43)形式一样,因此,这时我们把以P 为切点的切线就称为点 $P(\in 8)$ 关于 8 的极线。

者点 $P(p_1,p_2,p_3)$ 是 B 的奇点,则 $(p_1,p_2,p_3)A=0$,从而 π_0

上任一点都满足方程(7,43),因此,这时我们把任一条直线都看作是奇点P的极线。

极线有两条重要性质:

(1) 点P的极线上的任何一点Q的极线通过点P。

证明 在点 $P(p_1,p_2,p_3)$ 的极线上任取一点 $Q(q_1,q_2,q_3)$,则有

$$(p_1, p_2, p_3) A \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix} = 0,$$

两边取转置得

$$(q_1, q_2, q_3) A \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix} = 0,$$

这表明点P在点Q的极线上。

(2) 点P的极线通过点P的充分必要条件为P在二次曲线 S上。

证明 点 $P(p_1,p_2,p_3)$ 在自己的极线上的充分必要条件是

$$(p_1, p_2, p_3) A \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix} = 0,$$

. 即P在 B上。

若 B 是非退化二次曲线,则 B 沒有奇点。因此 A_0 上每一点 P 都有关于 B 的唯一的极线。 反之, A_0 上 的 每一条直线 $b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3=0$ 必定是某一个确定的点关于 B 的极线,这 是 因 为 $(p_1,p_2,p_3)A=(b_1,b_2,b_3)$ 有唯一的解:

$$(p_1, p_2, p_3) = (b_1, b_2, b_3)A^{-1}$$

定义7.13 设 B 是 非 退化二次曲线, π_0 上的点的集合与直线的集合之间有一个一一对应 τ_1 点 P 对应于它关于B 的极线 L_P ,直线 L 对应于它关于B 的极点 Q_L 。称 τ 是扩大欧氏平面 π_0 关于

₿的配极映射.


配极映射保持关联性,这是因为如果点P在直线 L_L ,设L是点 Q_L 的极线,则P点的极线 L_R 通过点 Q_L 。

6.4 自配极三角形

任给一条二次曲线 S, 任取一条直线 L, 它不是 S 的切线,

在L上任取一点 $A(\overline{C}S)$, 作点 A 关于 S 的极线 L_A , 它与 L 交 于点 B,则 B 必异于 A (假如 B = A,则 L_A 通过 A,从而 $A \in S$,矛盾)。

情形1、 若B不在S上。则作点B关于B的极线 L_B ,它与



 L_A 交于C,点C必异于B,也异于A。由于B在A的极线 L_A 上,所以B的极 线 L_B 通 过A。由于C在A的极线上,所以C的极线通过A,同理C的极线通过B,因此,C的极线就是 L。于是我们得到一个三角形ABC,它的每一条边是对顶点的极线,这样的三角形称为关于二次曲线 B 的自配极三角形。

情形2、 若B在B上,且B是B的奇点。则过A作一条直线 L_B ,使 L_B 与 L_A 的交点C异于B,这样也得到一个三角形ABC,它的每一条边是对顶点的极线,因此这也是关于B的自配极三角形。

情形3. 若B在 B上,且B不是B的奇点,则B的唯一的极线 L_B 通过 B,又 L_B 通过 A,于是 L_B 与L 重合。由于 B在 B上,所以 B的极线 L_B 是B 的切线,这与已知 L 不是B 的切线矛盾,这说明情形 3 不可能发生。

6.5 二次曲线的射影分类

任给一条二次曲线 S, 它在基底 I 中的方程为(7.35), 现在取

关于 \mathbb{Z} 的一个自配极它角形 ABC 作 为坐标三角形建立一个基底 $\Pi[A,B,C,F]$ 。设 \mathbb{Z} 在 Π 中的方程为

$$\sum_{i,j=1}^{3} a_{ij}^* x_i^* x_j^* = 0. (7.45)$$

 $\triangle ABC$ 的三条边 BC,AC,AB 在 Π 中的方程分别为

$$x_1^* = 0$$
, $x_2^* = 0$, $x_3^* = 0$.

因为 BC是点 A 的极线, 所以BC在 Ⅱ 中的方程又应为

$$(1,0,0)\begin{pmatrix} a_{11}^* & a_{12}^* & a_{13}^* \\ a_{12}^* & a_{22}^* & a_{23}^* \\ a_{13}^* & a_{23}^* & a_{33}^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1^* \\ x_2^* \\ x_3^* \end{pmatrix} = 0,$$

胍

$$a_{1\,1}^*x_1^* + a_{1\,2}^*x_2^* + a_{1\,3}^*x_3^* = 0_{\bullet}$$

于是得

$$a_{12}^* = 0$$
, $a_{13}^* = 0$.

同理,因为 AC 是点 B 的极线,所以可得 $a_{12}^*=0$, $a_{23}^*=0$ 。于是 B 在 \coprod 中的方程成为

$$a_{11}^* x_1^{*2} + a_{22}^* x_2^{*2} + a_{33}^* x_3^{*2} = 0. (7.46)$$

适当选取自配极三角形的顶点的次序,(7.46)可分为以下几种情况;

情形1. $\lambda_1 x_1^{*2} + \lambda_2 x_2^{*2} + \lambda_3 x_3^{*2} = 0$, $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \Rightarrow 0$;

情形2. $\lambda_1 x_1^{*2} + \lambda_2 x_2^{*2} = 0$, $\lambda_1 \lambda_2 = 0$;

· 情形3. $\lambda_1 x_1^{*2} = 0$, $\lambda_1 \rightleftharpoons 0$.

再取基底Ⅲ, 使Ⅱ到Ⅲ的坐标变换公式为

$$\rho x^*_i = \frac{1}{\sqrt{|\lambda_i|}} \tilde{x}_i, \qquad i = 1, 2, 3.$$

则从情形工可得

1.1)
$$\tilde{x}_{2}^{1} + \tilde{x}_{2}^{2} + \tilde{x}_{3}^{2} = 0$$
;

1.2)
$$\tilde{x}_1^2 + \tilde{x}_2^2 - \tilde{x}_3^2 = 0;$$

从情形 2 可得

2.3)
$$\tilde{x}_{1}^{2} + \tilde{x}_{2}^{2} = 0$$
;

2.4)
$$\bar{x}_1^2 - \tilde{x}_2^2 = 0$$

294

从情形 3 可得

3.5) $\bar{x}_1^2 = 0$.

因此,任给一条二次曲线 B, 我 们 总 可 以适当选取一个基 底,使得 B 的方程为上述这五个方程中的某一个。由于射影坐标 变换公式与射影变换的公式在形式上类似,因此由上述结论知, 对于任给的一条二次曲线 B, 我们总可以作一个适当 的 射 影 变 换,使得 B 变成一条新的二次曲线 B',而 B'在原来基底中的方程 为下述之一。

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 0$$
, $x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 0$, $x_1^2 + x_2^2 = 0$, $x_1^2 - x_2^2 = 0$, $x_1^2 = 0$. (7.47)

前两条二次曲线是非退化的,后三条是退化的.不难看出,这五条二次曲线彼此不射影等价(所谓两条曲线是射影等价的,意思是存在一个射影变换把其中一条变成另一条).这样我们就得到

定理7.8 射影平面上所有二次曲线分成五个射影类,它们的代表是(7.47)中五个方程所分别表示的曲线。前两类里都是非退化的二次曲线,后三类里都是退化的二次曲线。

容易看出,第一类都是沒有轨迹的二次曲线,第二类里的二次曲线是原欧氏平面上的椭圆、双曲线和抛物线并且补充了它们的渐近方向(如果有的话)所对应的无穷远点,第三类里的二次曲线都是一个点,第四类里都是一对相交直线,第五类里都是一对重合直线。

射影平面上的椭圆,双曲线和抛物线在同一个射影类里,这是不奇怪的。 譬如,在中心投影下,椭圆、抛物线和 双曲线可以互变,如图7.21; 椭圆是平 面 π₀ 与圆锥面的交线,抛物线是 π₁ 与 圆锥面的交线,于是以圆锥顶点为中心 的从 π₀ 到 π₁ 的中心投影把椭圆变成抛 物线。其余类似。





图 7.21

*6.6 斯坦纳定理,巴斯卡定理,布里昂香定理

本小节讨论非退化二次曲线的三个定理。本小节所指的非退 化二次曲线都把无轨迹除外。

斯坦纳(Steiner)定理 如果一条非退化二次曲线 B上给定四个不同的点 A_1 , A_2 , A_3 , A_4 , 则 B 上任意一点 P 与它们的连线的交比(PA_1 , PA_2 , PA_3 , PA_4)是一个常数(与点 P 在 B上的位置无关)。如果 P 点与给定的四个点中某一个点(譬如 A_4)重合,则 A_4A_1 , A_4A_2 , A_4A_3 与点 A_4 处的切线 A_4 T的交比(A_4A_1 , A_4A_2 , A_4A_3 , A_4A_3 , A_4A_4)。



仍等于上述常数.

证明 易看出 A_1, A_2, A_3, A_4 是一般位置的四个点,因此可取基底为[A_1, A_2, A_3, A_4],于是 \mathcal{S} 的方程为:

$$a_{12}x_1x_2 + a_{23}x_2x_3 + a_{13}x_1x_3 = 0 ,$$
(7.48)

其中, $a_{12}a_{23}a_{13}$ = 0, 科且 $a_{12} + a_{23} + a_{13} = 0$. 不失一般性,可设 $a_{23} = 1$, $a_{13} = -k$, $a_{12} = k - 1$, $k \Rightarrow 0, 1$.

于是(7.48)成为

$$x_2 x_3 - k x_1 x_3 + (k-1) x_1 x_2 = 0. (7.49)$$

设P点坐标为 (x_1,x_2,x_3) ,则它们满足方程(7.49)。直线 PA_1 , PA_2 , PA_3 , PA_4 的方程分别为:

$$x_3X_2 - x_2X_3 = 0$$
, $x_3X_1 - x_1X_3 = 0$, $-x_2X_1 + x_1X_2 = 0$,
 $(x_2 - x_3)X_1 - (x_1 - x_3)X_2 + (x_1 - x_2)X_3 = 0$.

从而 PA_1 , PA_2 , PA_3 , PA_4 的射影坐标分别为:

$$(0, x_3, -x_2), (x_3, 0, -x_1),$$

$$x_1(0, x_3, -x_2) - x_2(x_3, 0, -x_1),$$

$$(x_3 - x_1)(0, x_3, -x_2) + (x_2 - x_3)(x_3, 0, -x_1),$$

因此

$$(PA_1, PA_2, PA_3, PA_4) = \frac{x_3 - x_1}{x_2 - x_3} / \frac{x_1}{-x_2} = \frac{x_2(x_1 - x_3)}{x_1(x_2 - x_3)}.$$
 (7.50)

由 (7.49) 可得

$$k = \frac{x_2(x_1 - x_3)}{x_1(x_2 - x_3)}.$$

因此

$$(PA_1, PA_2, PA_3, PA_4) = k_4$$

当点P趋近于 A_* 时, (PA_1,PA_2,PA_3,PA_4) 总是等于k,而割线 PA_4 趋近于切线 A_*T ,于是经过取极限就得到

$$(A_4A_1, A_4A_2, A_4A_3, A_4T) = k_*$$

利用斯坦纳定理可以证明下述的巴斯卡定理。

巴斯卡(Pascal)定理 一条非退化二次曲线的内接六角形 的三对对边的交点一定共线。

即如 果 A,B,C,A',B',C' 在一条非退化 二次 曲 线 B 上,设AB'与A'B交于P, AC'与 A'C交于Q,BC'与 B'C 交 T R,则 P,Q,R 共 线。




图 7,23

证明 设BC'与直线

PQ 交子 R_1 , 若能证得 $R_1 = R$, 则 R 在 PQ 上。

设 BC' 与 A'C 交于 H,设 AC'与 A'B 交干 G 。从束 Q与 割线 BC'来看,有

$$(QB,QH,QC',QR_1) = (B,H,C',R_1)$$

从東Q与割线BA'来看,有

 $(QB,QH,QC',QR_1)\approx (QB,QA',QG,QP)=(B,A',G,P).$ 由上两式得

$$(B,H,C',R_1) = (B,A',G,P)$$
 (7.51)

再从束A与割线BA'来看,有

$$(B, A'; G, P) = (AB, AA'; AG, AP)$$
 (7.52)

对于束A和束C,用斯坦纳定理,得


$$(AB, AA', AG, AP) = (CB, CA', CC', CB')$$
 (7.53)

再从束C和割线BC'来看,有

$$(CB, CA', CC', CB') = (B, H, C', R),$$
 (7.54)

由(7.49)~(7.54)得

$$(B,H,C',R_1) = (B,H,C',R)$$



从而 $R_1 = R$, 即 R 在直线 PQ 上。

巴斯卡定理的对偶命题是下 述布里昂香定理。

布望昂香 (Brianchon) 定理 连接非退化二次曲线的外切六边 形的对顶点所成的三条直线相交 于一点。

习 題 7.6

- 1. 在射影平面上给了五个点,求由它们所确定的二次曲线。A(1,-1,0),B(2,0,-1),C(0,2,-1),D(1,4,-2),E(2,3,-2).
- 2. 求通过点A(1,0,1),B(0,1,1),C(0,-1,1), 并且以直线 l_1 ; $x_1-x_3=0$ 和直线 l_2 ; $x_3-x_2=0$ 为切线的二次曲线。
 - 3. 求点P(1,2,1)关于二次曲线 S: $x_1^2 - x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 - 4x_1x_3 = 0$

的极线。

- 4. 证明:不在二次曲线 &上的每个无旁远点的极线是共轭于此无旁远点所对应的方向的直径。
- 5. 证明: 非退化二次曲线 Z的中心(若有的话)的极线是无穷远直线。

298


- 6. 证明, 双曲线上的无穷远点的极线是它的渐近线, 从而 双曲线上无穷远点处的切线是渐近线。
- 7. 证明: 抛物线上的无穷远点的极线是无穷远直线, 从而无穷远直线是抛物线的切线。
- 8. 证明:圆锥曲线(即椭圆,双曲线和抛物线,以下同)焦点的极线是准线。

١

1

ś

9. 从圆锥曲线外一点 P作圆锥曲线的切线的方法为: 从 P作任意两条直线 L_1 , L_2 , 使得 L_i 与圆锥曲线交于 G_i , H_i , 连 H_2G_1 , H_2H_1 , 连 G_1G_2 , 它与 H_2H_1 变于 A, 连 H_1G_2 , 它与 H_2G_1 交于 B, 连 AB, 它与 L_1 , L_2 分别 交于 Q_1 , Q_2 , 它与圆锥曲线 交于 G_1 , G_2 , 连 PC_1 , PC_2 , 它们就是从 P 所引的圆锥曲线的两条切线。说出这种作法的理由。



*10. 怎样用直尺作过圆锥曲线上给定点的切线?

*11. 对于非退化二次曲线 \mathcal{S} ,给了一个配极映 射 τ ,它把 点 $P(x_1,x_2,x_3)$ 对应于点 P的极线 $L_p(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$,设 τ 的公式为

$$\rho \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \xi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix},$$

- (1) 求直线 $L: x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 的极点;
- (2) 求自共轭点的轨迹(一个点P的极线若通过P,则称P是关于B的自共轭点。易知,非退化二次曲线B的自共轭点的轨

0101004

迹就是二次曲线 8本身)。

- *12. 如果一个完备四点形内接于一条二次曲线 8, 那末它的三对对边的变点形成一个自配极三角形。
- *13. 证明:射影平面上任给一般位置的五个点《即其中任意三点不共线》,有且只有一条工次曲线通过它们。