

吕林根, 许子道 《解析几何》 习题 4.7.9

叶卢庆*

2014 年 11 月 19 日

题目. 试证明双曲抛物面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z (a \neq b)$ 上的两直母线直交时, 其交点必在一双曲线上.

解. 双曲抛物面的 u 族直母线为

$$\begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = uz, \\ u(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}) = 2 \end{cases}$$

v 族直母线为

$$\begin{cases} v(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}) = 2, \\ \frac{x}{a} - \frac{y}{b} = vz. \end{cases}$$

其中 u, v 为参数. 由于双曲抛物面的同族直母线必异面, 异族直母线必相交, 因此只可能是异族直母线直交. 于是, 存在 u_0 和 v_0 , 使得

$$\left[\left(\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, -u_0 \right) \times \left(\frac{u_0}{a}, -\frac{u_0}{b}, 0 \right) \right] \cdot \left[\left(\frac{v_0}{a}, \frac{v_0}{b}, 0 \right) \times \left(\frac{1}{a}, -\frac{1}{b}, -v_0 \right) \right] = 0.$$

根据 Lagrange 恒等式, 即

$$\left| \begin{array}{cc} \frac{v_0}{a^2} + \frac{v_0}{b^2} & \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} + u_0 v_0 \\ \frac{u_0 v_0}{a^2} - \frac{u_0 v_0}{b^2} & \frac{u_0}{a^2} + \frac{u_0}{b^2} \end{array} \right| = 0,$$

可得

$$\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right)^2 - \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right)^2 = \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right) u_0 v_0.$$

异族直线的交点 (x_0, y_0, z_0) 满足

$$\begin{cases} \frac{x_0}{a} + \frac{y_0}{b} = u_0 z_0, \\ u_0 \left(\frac{x_0}{a} - \frac{y_0}{b} \right) = 2, \\ v_0 \left(\frac{x_0}{a} + \frac{y_0}{b} \right) = 2, \\ \frac{x_0}{a} - \frac{y_0}{b} = v_0 z_0. \end{cases}$$

可得 $z_0 = \frac{2}{u_0 v_0}$ 是一个非零常数, 且

$$\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 2z_0$$

可见, 交点在双曲线上. □

*叶卢庆 (1992—), 男, 杭州师范大学理学院数学与应用数学专业本科在读, E-mail: yeludingmathematics@gmail.com