

My Note of Learning Non-commutative Geometry

Ye Ning

January, 28, 2026

目录

0.1 Chapter 2	2
-------------------------	---

0.1 Chapter 2

Definition 2.4 A *representation* of a finite-dimensional $*$ -algebra A is a pair (H, π) where H is a (finite-dimensional, complex) inner product space and π is a $*$ -algebra map

$$\pi : A \rightarrow L(H).$$

A representation (H, π) is called *irreducible* if $H \neq 0$ and the only subspaces in H that are left invariant under the action of A are $\{0\}$ or H .

对这个定义的理解:这里所谓的 representation 其实就是把抽象代数 A 中的元素变成 Hilbert 空间 H 上的具体算子。也就是说, A 本来是一个抽象的“算子代数”, 而 $L(H)$ 是“真正的算子代数(矩阵)”; 而 π 则是把抽象算子变成具体算子的“解释器”。

为什么这里的映射必须是 $*$ -algebra map 呢? 原因是 $*$ -algebra A 有加法、乘法、单位元, 同时 A 有 $*$ 运算(类似共轭转置)。相应的, 为保持住这些结构, π 就必须满足:

$$\pi(a + b) = \pi(a) + \pi(b) \quad \text{加法}$$

$$\pi(ab) = \pi(a)\pi(b) \quad \text{乘法}$$

及

$$\pi(a^*) = \pi(a)^* \quad \text{共轭}$$

尤其是这最后一条意味着抽象的“自伴算子”(厄米算子)会被表示成真正的“自伴矩阵”。

此外, 这里选择 Hilbert 空间也是有原因的。因为 Hilbert 空间有内积, 有范数, 有完备性, 可以在上面讨论算子的连续性、自伴性及谱。它是量子力学的自然舞台也是 C^* 的唯一合理载体。而关于 Hilbert 空间的 $L(H)$ 的这种写法也有其特定的含义: $L(H)$ 代表了 H 上所有有界线性算子的集合, 换句话说就是所有 $n \times n$ 复矩阵的集合。即

$$L(H) \cong M_n(C).$$

之所以这里不采用 $M_n(C)$ 是因为只有在有限维的情况下 $L(H)$ 才能和矩阵划等号, 而在无限维的情况下矩阵不再是合适的语言。但“线性算子”仍然是核心对象。所以数学家统一将其写成:

$$L(H) = \{T : H \rightarrow H | T \text{ 是有界线性算子}\}$$

另外, 这里强调“有界”的原因是在无限维的 Hilbert 空间里有些线性算子是“无界”的, 如微分算子。这种无界算子是不能被放进 C^* 代数里的, 也因此不能直接用于表示论。

Definition 2.6 Two representations (H_1, π_1) and (H_2, π_2) of a $*$ -algebra A are *unitarily equivalent* if there exists a unitary map $U : H_1 \rightarrow H_2$ such that

$$\pi_1(a) = U^* \pi_2(a) U$$

Definition 2.7 The *structure space* $\hat{A}$ of A is the set of all unitary equivalence classes of irreducible representations of A .

Definition 2.8: An algebra (bi)module:

Let A, B be algebras (not necessarily matrix algebras). A left A -module is a vector space E that carries a left representation of A , i.e., there is a bilinear map $A \times E \ni (a, e) \mapsto a \cdot e \in E$ such that

$$(a_1 a_2) \cdot e = a_1 \cdot (a_2 \cdot e); \quad (a_1, a_2 \in A, e \in E).$$

Similarly, a right B -module is a vector space F that carries a right representation of B , i.e., there is a bilinear map $F \times B \ni (f, b) \mapsto f \cdot b \in F$ such that

$$f \cdot (b_1 b_2) = (f \cdot b_1) \cdot b_2; \quad (b_1, b_2 \in B, f \in F).$$

Finally, an $A - B$ -bimodule E is both a left A -module and a right B -module, with mutually commuting actions:

$$a \cdot (e \cdot b) = (a \cdot e) \cdot b; \quad (a \in A, b \in B, e \in E).$$

关于 (bi)module 定义 (Definition 2.8) 的一些看法: 要正确理解这个定义中的内容我们需要了解什么是“模”。拿这里提到的 B -module 来说, 可以将其看成一个集合, 而该集合的成员不一定是普通的数, 而是更抽象意义上的算子, 数当作是一种特殊的算子。因此这里提到的 Hilbert Module 可以被看成是 Hilbert Space 的一种推广。相应的这里提到的 vector space E 和 F 也不是我们从线性代数那里学到的向量, 在那里组成向量的是一个一个的数。而这里的向量元素全部来自 B -module, 即一个个的算子。因此这个向量是之前线性代数中的向量的一个推广。具体来说在 Hilbert module B^m 里, 向量是一个 m 维列向量, 其中每个分量是 B 的元素。假如我们有 $B = M_2(C)$, 那么:

$$e = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{pmatrix}, A_i \in M_2(C).$$

也就是说该向量 e 的每一个分量都是一个 2×2 的矩阵! 当然了, 必须注意的是这个例子也是个特殊情况, 而在一般情况下模 B 的元素有可能根本不是矩阵, 它可能是一个函数, 一个阿贝尔群或是一个算子, 等等。

Definition 2.9 Let A, B be matrix algebras, A *Hilbert bimodule* for the pair (A, B) is given by an $A - B$ -bimodule E together with a B -valued inner product $\langle \cdot, \cdot \rangle_E : E \times E \rightarrow B$ satisfying

$$\langle e_1, a \cdot e_2 \rangle_E = \langle a^* \cdot e_1, e_2 \rangle_E; \quad (e_1, e_2 \in E, a \in A), \quad [I]$$

$$\langle e_1, e_2 \cdot b \rangle_E = \langle e_1, e_2 \rangle_E b; \quad [II.1] \quad \langle e_1, e_2 \rangle_E^* = \langle e_2, e_1 \rangle_E; \quad (e_1, e_2 \in E, b \in B), \quad [II.2]$$

$$\langle e, e \rangle_E \geq 0 \text{ with equality if and only if } e = 0; \quad (e \in E). \quad [III]$$

The set of Hilbert bimodules for (A, B) will be denoted by $\mathbf{KK}_f(A, B)$.

理解与例子：上述定义条件中 $[I]$ 体现了左作用与内积的兼容性； $[II.1]$ 体现了右作用与内积的兼容性； $[II.2]$ 体现了自伴性； $[III]$ 则体现了正性，从而保证内积是“非退化”的。上面条件的重要性在于它们保证了 E 是一个真正的“Hilbert 空间的非交换版本”。

比如，现在我们有

$$A = M_2(C), \quad B = M_3(C).$$

此时可取 $E = M_{2 \times 3}(C)$ 形成一个 $A - B$ 双模的典型例子。我们不难看出此时的左作用和右作用分别对应了普通的矩阵乘法。也不难看出所谓的 B 值内积

$$\langle e_1, e_2 \rangle_E := e_1^* e_2 \in M_3(C)$$

确如所料的产生的结果落在 B 里。要验证左作用的兼容性

$$\langle e_1, a \cdot e_2 \rangle_E = \langle a^* \cdot e_1, e_2 \rangle_E$$

我们可以看到左边：

$$\langle e_1, a e_2 \rangle = e_1^* (a e_2)$$

而右边：

$$\langle a^* e_1, e_2 \rangle = (a^* e_1)^* e_2 = e_1^* a e_2$$

因此左右相等。用类似的思路不难证明右作用兼容性，自伴性和正性都能满足。

Exercise 2.7 Show that $A - A$ -bimodule given by A itself is an element in $\mathbf{KK}_f(A, A)$ by establishing that the following formula defines an A -valued inner product $\langle \cdot, \cdot \rangle_A : A \times A \rightarrow A$: $\langle a, a' \rangle_A = a^* a' : (a, a' \in A)$

Idea of Solution: 为了解这个问题，最主要的是正确理解 $\langle a, a' \rangle_A = a^* a' : (a, a' \in A)$ 中的 a 。我们需要意识到这是属于 A 的一个元素，因此是一个矩阵，另外这是一个方阵。究其原因是 A 是自身的 bimodule，也就是不论从左还是从右皆能作用其自身，因此长度必须等于宽度。此外，我们还需要正确理解方阵的内积： $\langle a, a' \rangle$ 。这里其实让 a 做了一个转置共轭然后与 a' 进行普通意义下的矩阵乘法。在些理解的基础上就不难验证定义 2.9 中诸条件如 $\langle e_1, a \cdot e_2 \rangle_E = \langle a^* \cdot e_1, e_2 \rangle$ 。其实就是利用乘法的结合律。

How to understand the Definition of the balanced tensor product (BTP)? If E is a right A -module, and F is a left A -module, we can form the *balanced tensor product*:

$$E \otimes_A F := E \otimes F / \left\{ \sum_i (e_i a_i \otimes f_i - e_i \otimes a_i f_i) : a_i \in A, e_i \in E, f_i \in F \right\}. \quad (1)$$

In other words, the quotient imposes A -linearity of the tensor product, i.e., in $E \otimes_A F$ we have

$$ea \otimes_A f = e \otimes_A af; \quad (a \in A, e \in E, f \in F).$$

总结和 AI 讨论之后的一些看法：首先，关于这个 BTP 的直观理解是我们在使用 quotient 粘合这里的 E 和 F 。如果直接做代数张量积 $E \otimes F$ ，我们会得到一个巨大的空间，其中 $e \cdot a \otimes f$ 与 $e \otimes a \cdot f$ 是两个完全不同的元素。但在组合态射时，我们强制令其代表同一个“路径”。其次，从代数的角度来看在代数张量积 $E \otimes F$ 中，元素的形式是：

$$\sum_i e_i \otimes f_i.$$

如果我们允许 E 的右 A 作用与 F 的左 A 作用独立存在，我们就会得到**过多的自由度**。这会导致无法定义 $A-C$ 双模结构；无法定义内积；无法定义组合态射。为此我们进行了 balanced quotient：

$$E \otimes_A F := (E \otimes F)/N,$$

其中 N 是由所有

$$ea \otimes f - e \otimes af$$

生成的子空间。换句话说 N 是所有“不兼容 A ”的误差项，而 quotient 的作用是将所有误差项都杀掉。其结果就是 A 的左右作用被强制一致； A 不再出现在结果中，最终得到一个真正的 $A-C$ 模块了。最后让我们从 Hilbert 模块版的角度来拆解一下这个定义的意义和来源。如果我们想定义一个 C 值内积：

$$\langle e_1 \otimes f_1, e_2 \otimes f_2 \rangle \in C.$$

但是 E 的内积给的是 A ：

$$\langle e_1, e_2 \rangle_E \in A.$$

与此同时 F 的内积却是：

$$\langle f_1, f_2 \rangle_F \in C.$$

唯一能把它们接起来的方式是：

$$\langle e_1 \otimes f_1, e_2 \otimes f_2 \rangle = \langle f_1, \langle e_1, e_2 \rangle_E f_2 \rangle_F.$$

此外还需要注意的是在 $e \otimes af$ 的计算中优先级永远是先算 af ，再做张量积。

Definition 2.11 The *Kasparov product* $F \circ E$ between Hilbert bimodules $E \in \mathbf{KK}_f(A, B)$ and $F \in \mathbf{KK}_f(B, C)$ is given by the balanced tensor product $F \circ E := E \otimes_B F$ ($E \in \mathbf{KK}_f(A, B), F \in \mathbf{KK}_f(B, C)$), so that $F \circ E \in \mathbf{KK}_f(A, C)$, with C -valued inner product given on elementary tensors by

$$\langle e_1 \otimes f_1, e_2 \otimes f_2 \rangle_{E \otimes_B F} = \langle f_1, \langle e_1, e_2 \rangle_E f_2 \rangle_F, \quad (2)$$

and extended linearly to all of $E \otimes F$

关于 Kasparov Product 的一些理解：

从代数直觉上来说 Kaparov Product 是将中间的 B 也消掉了。其结果就是 $F \circ E := E \otimes_B F$.

从 Hilbert 模块结构来解读,这应该看成是内积的传递。这一点体现在 $\langle e_1 \otimes f_1, e_2 \otimes f_2 \rangle_{E \otimes_B F} = \langle f_1, \langle e_1, e_2 \rangle_E f_2 \rangle_F$ 中。这个表达式的右边其实完成了三个步骤：先在 E 中算出一个 B 元素 $b := \langle e_1, e_2 \rangle_E \in B$ ；然后现用这个 B 元素作用于 F 上形成 $bf_2 \in F$ ；最后再在 F 里算 C 值内积 $\langle f_1, bf_2 \rangle_F \in C$ 。

Example 2.10 More generally, let $\phi : A \rightarrow B$ be a $*$ -algebra homomorphism between matrix algebras A and B . From it, we can construct a Hilbert bimodule E_ϕ in $\mathbf{KK}_f(A, B)$ as follows. Let E_ϕ be B as a vector space with the natural right B -module structure and inner product, but with A acting on the left via the homomorphism ϕ :

$$a \cdot b = \phi(a)b; \quad (a \in A, b \in E_\phi). \quad (3)$$

关于例 2.10 的一些理解：简单说来这个例子是想告诉我们任何代数同态 $\phi : A \rightarrow B$ 都自动给出一个从 A 到 B 的 Hilbert 双模。换句话说：代数同态是 $\mathbf{KK}$ 理论中的“平凡态射”。更具体地说是我们利用代数同态 ϕ 很自然地便构造了一个 Hilbert $A - B$ 双模向量空间 E_ϕ ：

$$E_\phi = B,$$

即 E_ϕ 就是 B 本身。在些基础上 E_ϕ 的右模结构及内积分别就是 B 自然的右乘和 B 自己的标准 B 值内积。而其左模则是通过 ϕ 来实现：

$$a \cdot b = \phi(a)b.$$

由此我们不难验证 Definition 2.9 中的诸条件从而说明其是一个合法的双模。

Exercise 2.8 Show that the association $\phi \rightsquigarrow E_\phi$ from Example 2.10 is *natural* in the sense that

1. $E_{\text{id}_A} \simeq A \in \mathbf{KK}_f(A, A)$,
2. for $*$ -algebra homomorphisms $\phi : A \rightarrow B$ and $\psi : B \rightarrow C$ we have an isomorphism

$$E_\psi \circ E_\phi \equiv E_\phi \otimes_B E_\psi \simeq E_{\psi \circ \phi} \in \mathbf{KK}_f(A, C), \quad (4)$$

that is, as $A - C$ -bimodules.

Ideas to Solution: 对于这里的第一点，我们取 $\phi = \text{id}_A : A \rightarrow A$. 按照 Example 2.10 的精神 E_{id_A} 作为向量空间就是 A 本身。因此其右 A -模用右乘；左 A -模用 id_A 左乘，也就是普

通的左乘；而内积则是 $\langle a_1, a_2 \rangle = a_1^* a_2 \in A$. 因此，作为 $A - A$ 双模 E_{id_A} 与 A 是完全一样的；同时，作为 Hilbert 模块，内积也是同一个。因此结论就是：

$$E_{\text{id}_A} \simeq A \in \mathbf{KK}_f(A, A).$$

关于第二点，我们应该意识到两个同态映射 $\phi : A \rightarrow B$ 和 $\psi : B \rightarrow C$ ，按照 Example 2.10 的意思对应了两个向量空间 $E_\phi \in \mathbf{KK}_f(A, B)$ 与 $E_\psi \in \mathbf{KK}_f(B, C)$ 。然后结合我们对 Kasparov product 的定义，不难看出结论。

Exercise 2.9 In the above definition:

1. Check that $E \otimes_B F$ is an $A - C$ -bimodule.
2. Check that $\langle \cdot, \cdot \rangle_{E \otimes_B F}$ defines a C -valued inner product.
3. Check that $\langle a^*(e_1 \otimes f_1), e_2 \otimes f_2 \rangle_{E \otimes_B F} = \langle e_1 \otimes f_1, a(e_2 \otimes f_2) \rangle_{E \otimes_B F}$

对 Exercise 2.9 的理解：从前面的 2.8 已经看出由给定的两个同态映射 ϕ 及 ψ 我们可以构造相应的向量空间 E_ϕ 及 E_ψ 成为 $A - B$ 双模及 $B - C$ 双模。现在我们要构造一个 $A - C$ 双模，不妨建立同构映射：

$$\Phi : E_\phi \otimes_B E_\psi \rightarrow E_{\psi \circ \phi}.$$

按照 Example 2.10 的意思， $E_{\psi \circ \phi}$ 就是 C 本身。其左 A -模为 $a \cdot c = \psi(\phi(a))c$ ；右 C -模即右乘；内积为 $\langle c_1, c_2 \rangle = c_1^* c_2$ 。

现在， $E_\phi \otimes_B E_\psi$ 的“简单张量”元素是 $b \otimes c$ ，其中 $b \in B, c \in C$ 。那么这里最自然的候选映射是：

$$\Phi(b \otimes c) := \psi(b)c \in C.$$

这相当于是先用 ψ 将 b 推到 C 里，然后再右乘 c 。首先，我们需要检查这个映射是否兼容平衡关系。我们知道在平衡张量积有关系

$$(bb') \otimes c \sim b \otimes (b' \cdot c) = b \otimes \psi(b')c.$$

现在我们用 Φ 分别作用于上式的两边：

$$\text{LHS} = \Phi((bb') \otimes c) = \psi(b)\psi(b')c.$$

与此同时

$$\text{RHS} = \Phi(b \otimes \psi(b')c) = \psi(b)\psi(b')c.$$

因此，左右相等，所以 Φ 对平衡关系是兼容的，因而在商空间上 well-defined.

现在我们检查双模结构，即这一题的第一点。在 $E_\phi \otimes_B E_\psi$ 上，我们有：

$$a \cdot (b \otimes c) = (\phi(a)b) \otimes c.$$

然后在 Φ 的作用下，我们得到：

$$\Phi(a \cdot (b \otimes c)) = \Phi(\phi(a)b \otimes c) = \psi(\phi(a)b)c = \psi(\phi(a))\psi(b)c = (\psi \circ \phi)(a) \cdot \Phi(b \otimes c),$$

上式的最右端体现了 $E_{\psi \circ \phi}$ 的左 A -作用。同时，在张量积上：

$$(b \otimes c) \cdot c' = b \otimes (cc').$$

映射 Φ 作用其上得：

$$\Phi(b \otimes cc') = \psi(b)cc' = (\psi(b)c)c' = \Phi(b \otimes c) \cdot c',$$

上式体现了右 C -模结构。综合以上两点可以看到 Φ 是 $A - C$ 双模同态。

本题的第二点是要求检验内积的兼容性。在 Hilbert 双模的 BTP 里，内积的标准定义是（这里是 $B - C$ 情形）：

$$\langle b_1 \otimes c_1, b_2 \otimes c_2 \rangle_C := \langle c_1, \langle b_1, b_2 \rangle_B \cdot c_2 \rangle_C.$$

代入我们这里的具体内积 $\langle b_1, b_2 \rangle_B = b_1^* b_2 \in B$ 以及 B 左作用在 $E_\psi = C$ 上是 $b \cdot c = \psi(b)c$ ，可得：

$$\langle b_1 \otimes c_1, b_2 \otimes c_2 \rangle_C = \langle c_1, \psi(b_1^* b_2) c_2 \rangle_C = c_1^* \psi(b_1^* b_2) c_2 \in C.$$

另一方面，在 $E_{\psi \circ \phi} \simeq C$ 里，内积是：

$$\langle \Phi(b_1 \otimes c_1), \Phi(b_2 \otimes c_2) \rangle = \langle \psi(b_1) c_1, \psi(b_2) c_2 \rangle = c_1^* \psi(b_1)^* \psi(b_2) c_2.$$

因为 ψ 是 $*$ -同态，有 $\psi(b_1)^* = \psi(b_1^*)$ 。所以上面的等式正好是前面 BTP 定义出来的内积。这正是该题的第三点。