Framingham 10-year CVD Risk (lipid-based) — SA STG

adults 30–79 y without known CVD · PHC / OPD

10-y CVD risk

POINTS — MEN | WOMEN ✚

Age	M	W	Total chol mmol/L	M	W	HDL mmol/L	M/W
30–34	0	0	<4.1	0	0	>1.5	−2
35–39	2	2	4.1–5.19	1	1	1.3–1.49	−1
40–44	5	4	5.2–6.19	2	3	1.2–1.29	0
45–49	6	5	6.2–7.2	3	4	0.9–1.19 ‡	+1
50–54	8	7	>7.2	4	5	<0.9	+2
55–59	10	8					
60–64	11	9	Smoker	4	3		
65–69	12	10	Diabetic	3	4		
70–74	14	11					
75–79	15	12					

SYSTOLIC BP — UNTREATED | ON TREATMENT ✚

SBP	<120	120–129	130–139	140–149	150–159	≥160
Men	−2 | 0	0 | 2	1 | 3	2 | 4	2 | 4	3 | 5
Women	−3 | −1	0 | 2	1 | 3	2 | 5	4 | 6	5 | 7

STATIN REGARDLESS OF SCORE

- Type 2 diabetes >40 years; diabetes >10 years; diabetes with CKD (eGFR <60) ✚
- Established CVD (IHD, stroke/TIA, PAD) = secondary prevention — do not calculate ✚

NOTES

- SA STG uses the general CVD Framingham (D'Agostino 2008) — not the ATP III 'hard CHD' version in some apps
- No lipids: use the BMI-based (non-lab) chart in PHC Appendix III / HOSP Appendix VII
- Hospital STG prints HDL '0.9–1.119' (PHC AIII.4 prints 0.9–1.19) ‡

MANAGEMENT (SA STG)

- **<10%** Low — lifestyle advice; reassess every 5 years ✚
- **10–20%** Moderate — lifestyle; reassess annually ✚
- **≥20%** High — lifestyle + statin ✚

10-YEAR CVD RISK (%) BY TOTAL POINTS ✚

Pts	Men	Women	Pts	Men	Women
≤−3	<1	<1	9	7.9	5.3
−2	1.1	<1	10	9.4	6.3
−1	1.4	1.0	11	**11.2**	7.3
0	1.6	1.2	12	**13.2**	8.6
1	1.9	1.5	13	**15.6**	**10.0**
2	2.3	1.7	14	**18.4**	**11.7**
3	2.8	2.0	15	**21.6**	**13.7**
4	3.3	2.4	16	**25.3**	**15.9**
5	3.9	2.8	17	**29.4**	**18.5**
6	4.7	3.3	18	**>30**	**21.5**
7	5.6	3.9	19	**>30**	**24.8**
8	6.7	4.5			