

目录

第一章 线性方程组的解法 ..... 2

第二章 行列式..... 2

第三章 矩阵 ..... 2

第四章 向量组的线性相关性 ..... 3

第五章 矩阵的相似对角化..... 3

第六章 实二次型 ..... 3

## 第一章 线性方程组的解法

1. 初等行变换：①交换两行；②某一行乘  $k$ ；③某一行乘  $k$  后加到另一行；

## 第二章 行列式

1. 某一行的展开式： $|A| = \sum_{k=1}^n a_{ik} A_{ik}, (i = 1, 2, \dots, n)$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij} \quad \text{列同理}$$

2. 行列式变号：交换某两行

不变：①转置；②某一行/列乘  $k$  后加到另一行/列；

③某行所有元素为两个数之和，可以写成两个行列式之和

数乘：①某行的公因数  $k$  可以提到外面；② $|kA| = k^n |A|$

3. 若  $A$  中无 0 且  $R(A) = 1, A^2 = (\text{列向量} * \text{行向量})^2 = lA = \sum_{i=1}^n a_{ii} A, A^n = l^{n-1} A$

4. 范德蒙德型行列式：

$$V_n = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 1 & x_1 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \dots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^{n-1} \end{bmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

$$5. \text{莫拉克法则：} D = \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}, x_j = \frac{D_j}{D}, j = 1, 2, \dots, n$$

## 第三章 矩阵

1.  $n$  维上/下三角方阵， $A^k = O, k \geq n$

2.  $B, C$  分别为  $m, n$  阶，则  $\begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & O \\ O & C^{-1} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} O & B \\ C & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix}$

$$3. \text{伴随矩阵：} A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix} \quad \text{逆矩阵：} A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$$

$$AA^* = A^*A = |A|E \quad |A^{-1}| = \frac{1}{|A|} \quad (A^*)^{-1} = \frac{A}{|A|} \quad |A^*| = |A|^{n-1}$$

$$(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1} \quad (A^n)^{-1} = (A^{-1})^n \quad (A^*)^* = |A|^{n-2} A \quad (kA)^* = k^{n-1} A^*$$

4.  $A, B$  等价：存在可逆矩阵  $P$  和  $Q$ ，使得  $B = PAQ$

几何意义：两个有限维向量空间的同一个线性映射

一个矩阵经过初等行/列变换后得到的任意一个矩阵与原矩阵等价

5.  $n$  维方阵  $A$  可逆  $\Leftrightarrow A$  与  $E$  等价

$\Leftrightarrow |A| \neq 0$

$\Leftrightarrow A$  为非奇异矩阵

$\Leftrightarrow R(A) = n$

$\Leftrightarrow A$  的各列/行线性无关

$\Leftrightarrow A^T$  可逆

$\Leftrightarrow A$  的列向量构成  $\mathbb{R}^n$  的

$\Leftrightarrow 0$  不是  $A$  的特征值

$\Leftrightarrow Ax=0$  只有零解

$\Leftrightarrow Ax=b$  只有唯一解

6. 初等矩阵： $E$  经过一次初等变换

左乘  $\Leftrightarrow$  行变换，右乘  $\Leftrightarrow$  列变换

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ nk & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k^n & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{2n} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{2n-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

7. 求逆： $(A \quad E) \xrightarrow{r} (E \quad A^{-1}) \quad (E+B)^{-1} = (BB^{-1} + B)^{-1}$

求解： $(A \quad B) \xrightarrow{r} (E \quad X)$

8. ①  $\max\{R(A), R(B)\} \leq R(A|B) \leq R(A) + R(B)$

②  $R(A+B) \leq R(A) + R(B)$

③  $R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\}$

④  $A$  为  $m \times s$  的矩阵， $B$  为  $s \times n$  的矩阵， $AB = O, R(A) + R(B) \leq s$

⑤  $A$  可逆，则  $R(AB) = R(BA) = R(B)$

$$\textcircled{6} R \begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix} = R(A) + R(B)$$

$$\textcircled{7} R(A^*) = \begin{cases} n, & R(A) = n \\ 1, & R(A) = n-1 \\ 0, & R(A) < n-1 \end{cases}$$

$$9. (a+b)^n = a^n + C_n^1 a^{n-1}b + C_n^2 a^{n-2}b^2 + \dots + C_n^{n-1} ab^{n-1} + b^n$$

10. 非齐次线性方程组： $A_{m \times n} X_{n \times 1} = \beta_{m \times 1} \neq 0$  齐次线性方程组： $\beta_{m \times 1} = 0$

结论：①  $Ax = 0$  的解的线性组合仍为其解

②  $a, b$  为  $Ax = b$  的解，则  $a - b$  为导出组  $Ax = 0$  的解

11.

#### 第四章 向量组的线性相关性

1.  $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n = 0$   
 线性相关:  $|A|=0 \Leftrightarrow k_1 \sim k_n$  不全为 0  $\Leftrightarrow$  不满秩  $\Leftrightarrow AX=0$  有解  
 线性无关:  $|A| \neq 0 \Leftrightarrow k_1 \sim k_n$  全为 0  $\Leftrightarrow$  满秩  $\Leftrightarrow AX=0$  无解  
 结论: ①  $n+1$  个  $n$  维度向量必线性相关  
 ② 任何部分相关  $\Rightarrow$  整体相关; 整体无关  $\Rightarrow$  任何部分无关  
 ③ 线性无关  $\Rightarrow$  延伸无关; 线性相关  $\Rightarrow$  缩短相关  
 ④ 向量组 A 两两正交且非零, 则其线性无关
2. 线性组合/表出/表示:  $\beta = AX = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n$  有解

$$\Leftrightarrow R(A) = R(A|\beta) \begin{cases} = n, \text{唯一解} \\ < n, \text{无穷多解} \end{cases}$$

结论: ① 向量组(I)线性无关, (I| $\beta$ )线性相关, 则 $\beta$ 可由向量组(I)线性表示, 且表示方法唯一

3. 极大无关组:  $r$  组线性无关,  $r+1$  组线性相关 计算: 初等行变换化为行最简形  
 4. 向量组等价: 两个向量组可以相互线性表示  $\Leftrightarrow R(I) = R(I|II) = R(II)$  (缺一不可)  
 结论: ① 多数向量能用少数向量线性表示, 多数向量一定线性相关  
 ② 向量组(I)可由向量组(II)线性表示, 则  $R(I) \leq R(II)$
5. 过渡矩阵:  $B = AC$  坐标变换公式:  $X = CY$
6.  $Ax = 0$  的基础解系: 本质: 一个极大无关组, 构成:  $n - R(A)$  个解

计算方法: 对 A 初等行变换得到最简形

- 结论: ① 有非零解  $\Leftrightarrow r(A) < n \Leftrightarrow A$  的列向量线性相关  
 ②  $\eta_1, \eta_2$  为  $Ax = 0$  的两个解, 其线性组合也是  $Ax = 0$  的解
7.  $Ax = \beta$  的通解: 对  $(A|\beta)$  初等行变换得到最简形, 通解 = 特解 + 基础解系  
 结论: ① 有多个不等的解, 则  $R(A) = R(A|\beta) < n$   
 ②  $\alpha, \beta$  为  $Ax = \beta$  的两个解,  $\alpha - \beta$  为  $Ax = 0$  的解  
 ③  $\alpha$  为  $Ax = \beta$  的解,  $\eta$  为  $Ax = 0$  的解,  $\alpha + \eta$  为  $Ax = \beta$  的解, 即通解 = 特解 + 基础解系  
 ④  $Ax = \beta$  无解  $\Leftrightarrow R(A) \neq R(A|\beta)$
8. 同解方程组结论: A 经过初等行变换后与 A 同解
- 9.

#### 第五章 矩阵的相似对角化

1. 特征值:  $|A - \lambda E| = 0$  几何意义: 伸缩比例  
 特征方程:  $(A - \lambda E)X = 0$   $\sum_{i=1}^n \lambda_i = \sum_{i=1}^n a_{ii}$  (迹)  $\prod_{i=1}^n \lambda_i = |A|$   
 特征向量: 对应 $\lambda$ 的X 几何意义: 矩阵对向量只发生伸缩变换
2.  $A, A^{-1}, A^*, A^m$  有相同的特征向量  $\lambda, \frac{1}{\lambda}, \frac{|A|}{\lambda}, \lambda^m$  是它们的特征值
3. A、B 相似:  $P^{-1}AP = B$  A、B 的行列式、秩、迹、特征值相等  
 几何意义: 一个有限维向量空间的同一个线性变换  
 $P^{-1}A^nP = B^n$   $P^{-1}EP = E$
4. 可相似对角化的充分必要条件:  $R(A - \lambda_i E) = n - n_i$ ,  $\lambda_i$  是  $n_i$  重特征值  
 P 的求法: 先解  $|A - \lambda E| = 0$ , P 由基础解系构成
5. 向量正交  $\Leftrightarrow \|\alpha + \beta\|^2 = \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2 \Leftrightarrow \alpha, \beta$  内积为 0
6. 施密特正交化方法:  $\beta_m = \alpha_m - \frac{[\alpha_m, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]}\beta_1 - \frac{[\alpha_m, \beta_2]}{[\beta_2, \beta_2]}\beta_2 - \dots - \frac{[\alpha_m, \beta_{m-1}]}{[\beta_{m-1}, \beta_{m-1}]}\beta_{m-1}$
7. 正交矩阵:  $AA^T = E \Leftrightarrow$  行/列向量组是单位正交向量组  $\Leftrightarrow |A|^2 = 1 \Leftrightarrow A^T = A^{-1}$
8. 实对称矩阵化为对角阵:  $Q^{-1}AQ = Q^T AQ = \Lambda$   
 ① 求出特征值 $\lambda$ ; ② 求出特征向量, 然后正交化, 再单位化, 构成正交矩阵 Q
- 9.

#### 第六章 实二次型

1. 二次型:  $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T AX$  A 为实对称矩阵  
 $= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n$   
 标准型: 只含有完全平方项 规范型: 完全平方项前的系数为  $\pm 1$
2. (可逆)线性变换:  $X = CY$ , C 为可逆矩阵
3. 化实二次型为标准型方法  
 a) 配方法:  
 i. 二次型含有完全平方项: 配成全为完全平方项,  
 例如  $f = (x_1 - x_2 + x_3)^2 - 4(x_2 + \frac{1}{2}x_3)^2 + 4x_3^2$ , 令  $\begin{cases} y_1 = x_1 - x_2 + x_3 \\ y_2 = x_2 + \frac{1}{2}x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}$   
 ii. 二次型不含完全平方项: 例  $f = x_1x_2 + x_1x_3 + 2x_2x_3$ , 令  $\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$

b) 正交变换法步骤：必存在 Q

①求出特征值 $\lambda$ ; ②求出特征向量, 正交化, 单位化, 构成正交矩阵 Q

4. 正惯性指数 $p$ : 标准型中正平方项的个数; 负惯性指数 $q$ : 负平方项的个数

5. A、B 合同:  $C^T A C = B$

几何意义: 一个有限维向量空间的同一个双线性函数 or 内积

性质: ①如果 A 为对称矩阵, B 也是对称矩阵; ② $R(A) = R(B)$ ; ③传递性

6. 正定二次型:  $\forall X \neq 0$ , 都有  $f > 0$  负定二次型:  $\forall X \neq 0$ , 都有  $f < 0$

7. A 为正定矩阵  $\Leftrightarrow$  ①A 特征值全为正; ②各阶顺序主子式都为正值

③正惯性指数  $p = n$ ; ④A、E 合同

A 为负定矩阵  $\Leftrightarrow$  奇数阶顺序主子式为负值, 偶数得为正值

8.