

目录

第一章 概率论的基本概念	1
第二章 随机变量及其分布	1
第三章 多元随机变量及其分布	3
第四章 随机变量的数字特征	3
第五章 大数定律和中心极限定理	4
第六章 样本及抽样分布	5

第一章 概率论的基本概念

1. 互斥(互不相容): $AB = \emptyset$ 对立(互逆): $\bar{A} = B$

完备(完全)事件组: A_1, A_2, \dots, A_n , 满足 $A_i A_j = \emptyset, i \neq j$, 且 $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$

2. 德摩根律: $\overline{A \cup B} = A \cap B$ $\overline{A \cap B} = A \cup B$ $\overline{A - B} = \bar{A} \bar{B} = \bar{A} \cup B$

3. $A \subset B, AB = A$

4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ $P(A - B) = P(A) - P(AB) = P(A\bar{B})$
 $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC)$
 $P(AB) = P(A) - P(A\bar{B})$

5. 古典型概率计算公式: $P(A) = \frac{k}{n} = \frac{\text{事件 A 中的基本事件数}}{\text{样本空间 S 中的基本事件总数}}$

6. 不放回抽取, 连续取 n 次每次取 1 个 \Leftrightarrow 一次取 n 个

7. 条件概率: $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ 乘法定理: $P(AB) = P(B|A)P(A)$

缩减样本空间解法

$$P(ABC) = P(C|AB)P(B|A)P(A)$$

8. 全概率公式: 离散: $P(A) = \sum_{i=1}^n P(AB_i) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$

连续: $p_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x|y)p_Y(y) dy$ $p_Y(y)$ 同理

第七章 参数估计	5
第八章 假设检验	6
三大抽样分布	7
常用随机变量分布	8
正态总体均值、方差的置信区间	9
正态总体参数的假设检验	10

9. 贝叶斯公式: 离散: $P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{P(A)} = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}$

连续: $p(y|x) = \frac{p(x|y)p_Y(y)}{p_X(x)} = \frac{p(x|y)p_Y(y)}{\int_{-\infty}^{+\infty} p(x|y)p_Y(y) dy}$ $p(x|y)$ 同理

10. A、B 独立: $P(AB) = P(A)P(B)$

定理: ① 一系列独立事件中任一部分改为对立事件, 所得事件列仍为相互独立

② 事件 A、B、C, 任取两个事件都独立, 则

两两独立: $P(ABC) \neq P(A)P(B)P(C)$

相互独立: $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$

11.

第二章 随机变量及其分布

1. 离散型随机变量 (概率质量函数 PMF)

a) **0-1 分布**: 抛硬币, 二选一

$$P\{X = k\} = p^k(1-p)^{1-k}, k = 0, 1 \quad E(X) = p \quad D(X) = p(1-p)$$

b) **二项分布**: $X \sim B(n, p)$ n 重伯努利, 出现 k 次“是”

$$P\{X = k\} = \binom{n}{k} p^k(1-p)^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n$$

$$E(X) = np \quad D(X) = np(1-p)$$

c) **几何分布**: $X \sim Ge(p)$ n 重伯努利, 第 k 次首次出现“是”

$$P\{X = k\} = p(1-p)^{k-1}, k = 0, 1, \dots, n \quad E(X) = \frac{1}{p} \quad D(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

无记忆性 为负二项分布的特例 $r=1$

d) **负二项分布(帕斯卡分布)**: $X \sim Nb(r, p)$ 几何分布的和

$$P\{X = k\} = C_{k-1}^{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, k = r, r+1, \dots \quad E(X) = \frac{r}{p} \quad D(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

X =第 k 次实验, 正好发生 r 次"是"

e) **超几何分布**: $X \sim h(n, N, M)$ 不放回抽样的二项分布

$$P\{X = k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} \quad E(X) = n \frac{M}{N} \quad D(X) = n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \left(1 - \frac{n-1}{N-1}\right)$$

N 件物品, 有 M 件次品, 抽 n 件 (不放回) 有 k 件次品概率

分子: k 件从不合格品中抽取, 剩下的在合格品中抽取

分母: 从 N 件中随便抽取 n 件

若 N 巨大, 放不放回区别不大, 近似为二项分布

f) **松柏分布**: $X \sim P(\lambda)$ 二项分布的极限, $p = \lambda/n$

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad E(X) = \lambda \quad D(X) = \lambda$$

条件: 平稳性、独立性、普通性

意义: 单位时间内随机事件发生的次数; 例: 汽车站的候客人数

结论: $X_1 + X_2 \sim P(2\lambda)$

2. 概率密度函数充要条件 ① $f(x) > 0$; ② $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$

3. 连续型随机变量 (概率密度函数 PDF)

a) **均匀分布**: $X \sim U(a, b)$ 古典派的几何概型

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{a+b}{2} \quad D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

b) **正态分布**: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 二项分布的另一种极限

$$p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

$$E(X) = \mu \quad D(X) = \sigma^2$$

重要结论: ① $aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$ ② **标准化**: 令 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$, 则 $Z \sim N(0, 1)$

③ $Z \sim N(0, 1)$, $P(Z > z_\alpha) = \alpha, 0 < \alpha < 1$, z_α 称为上 α 分位点

④ $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \approx 68.26\%$, $P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) \approx 99.72\%$

c) **标准正态分布**: $X \sim N(0, 1)$ 用 Z 表示

$$p(x) = \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad F(x) = \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

性质: $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$, $\Phi(0) = 0.5$, $\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) dt = 1$

d) **指数分布**: $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ 泊松分布的间隔, 连续的几何分布

$$p(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} \quad D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

泊松分布的三个条件+无记忆性 指数函数取对数→对数正态分布

无记忆性: ① $P\{X > t\} = \int_t^{+\infty} \lambda e^{-\lambda t} dt = e^{-\lambda t}, t > 0$

② $P\{X > t + s | X > s\} = P\{X > t\}$

4. 伯努利分布 $\xrightarrow{+ \text{伯努利分布}}$ 二项分布 $\xrightarrow{+ \text{二项分布}}$ 二项分布 $\xrightarrow{n \text{ 很大}}$ 正态分布 $\xrightarrow{+ \text{正态分布}}$ 正态分布

5. (累积)分布函数 CDF: $F(x) = P(X \leq x)$

离散: $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{a \leq x} p(a)$

连续: $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x p(t) dt \quad \frac{d}{dx} F(x) = p(x)$

$F(x)$ 为分布函数的充分必要条件: ① $F(x)$ 单调非减; ② $F(x)$ 右连续;

③ $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$;

$P\{a < X \leq b\} = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a)$

$P(X < a) = 1 - P(X \geq a) = F(a-0) \leftarrow "a-0"$ 为 a 左极限, 离散时有意义

$P(X = a) = P(X \leq a) - P(X < a) = F(a) - F(a-0)$

6. 中心极限定理: 正态分布是所有分布的最终归宿

7. 泊松过程: $P(X = k, t) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$ 时间可变的泊松分布 ($t=1$)

8. 唯二无记忆性的分布：几何分布、指数分布
9. 随机变量的函数分布：PDF 为 $p_X(x)$ 的 X ，PDF 为 $p_Y(y)$ 的 $Y = g(X)$
 $h(y)$ 是单调函数 $y = g(x)$ 的反函数

a) 公式法： $p_Y(y) = \begin{cases} p_X[h(y)] \cdot |h'(y)|, & a < y < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

其中 a, b 为函数 $g(X)$ 在 X 可能取值区间上的值域

- b) 定义法：① 写出 $p_X(x)$;
 ② $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = P\{X \leq h(y)\} = F_X(h(y))$;
 ③ $p_Y(y) = F'_Y(y)$

10. 常用公式： $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$ $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = e$

第三章 多为随机变量及其分布

1. 离散：联合概率质量函数 JPMF

边缘概率质量函数 MPMF (边缘分布)：

$$p_{i\cdot} = P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} P\{X = x_i, Y = y_j\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}, i \in N \quad Y \text{ 同理}$$

条件概率质量函数： $P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(Y=y_j)}$ Y 同理

2. 连续：联合概率密度函数 JPDF

边缘概率密度函数 MPDF (边缘密度)： $p_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy$ Y 同理

条件概率密度函数： $p_{X|Y}(x|y) = \frac{p(x, y)}{p_Y(y)}$ X 为条件同理

3. 条件概率 $\xrightarrow{\text{组成}}$ 条件分布

4. 联合累积分布函数 JCDF： $F(x, y) = P(\{X \leq x\} \text{ 且 } \{Y \leq y\}) = P(X \leq x, Y \leq y)$

边缘累积分布函数 MCDF： $= F(x, +\infty) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = P(X \leq x)$

$F_Y(y) = F(+\infty, y)$ $F_X(x)F_Y(y)$ 也是分布函数

条件累积分布函数：连续： $F_{X|Y}(x|y) = \int_{-\infty}^x \frac{p(u, y)}{p_Y(y)} du$ X 为条件同理

5. 相互独立：CDF： $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n F_i(x_i)$

PMF： $P(X = x_1, X = x_2, \dots, X = x_n) = \prod_{i=1}^n P(X = x_i)$

PDF： $p(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n p_i(x_i)$

离散： $p_{ij} = p_i \cdot p_j$ 连续： $p(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$

6. 二维均匀分布： $p(x, y) = \begin{cases} 1/S \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

二维正态分布： $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho) \Rightarrow X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \& Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$

性质：① X, Y 相互独立 $\Leftrightarrow \rho = 0$ ；② $aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a\sigma_1^2 + 2ab\rho\sigma_1\sigma_2 + b\sigma_2^2)$

7. $Z = (X, Y)$ 的分布：

a) X, Y 离散： $P(X + Y = k) = \sum_{i=0}^k P(X = i)P(Y = k - i)$ 卷积公式

b) X, Y 连续： $Z = Y + X$ $p_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, z - x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} p(z - y, y) dy$

X, Y 相互独立 $\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} p_X(x)p_Y(z - x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} p_X(z - y)p_Y(y) dy$

$Z = \frac{Y}{X}$ $p_{Y/X}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| P(x, xz) dx$ $|x|$ 意义： $|\frac{dy}{dz}|$

$Z = YX$ $p_{YX}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} P\left(x, \frac{z}{x}\right) dx$

c) X 离散， Y 连续： $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = \sum_i P\{X = x_i\}P\{g(x_i, Y) \leq z | X = x_i\}$

8. $X_i \sim F_i(x)$ $Y = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ $F_Y(y) = \prod_{i=1}^n F_i(y)$

$Z = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ $F_Z(z) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - F_i(z))$

9.

第四章 随机变量的数字特征

1. 数学期望 (随机变量的一阶矩)

意义：① 对不确定性的计量；② 加权平均 (重心)

a) 离散： $\mu = \mu_X = E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p(x_i)$ 前提： $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| p(x_i) < \infty$

b) 连续： $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x) dx$

性质：① $E[g(X)] = \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i)p(x_i) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)p(x) dx$;

$$E[g(X,Y)] = \sum_j \sum_i g(x_i, y_j) p(x_i, y_j) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) p(x, y) dx dy$$

$$\textcircled{2} E(c) = c \rightarrow E(E(X)) = E(X) \quad \textcircled{3} \text{齐次性: } E(aX + b) = aE(X) + b$$

$$\textcircled{4} \text{可加性: } E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y) \quad \textcircled{6} X, Y \text{独立: } E(XY) = E(X)E(Y)$$

$$\textcircled{5} \text{施瓦茨不等式: } [E(XY)]^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$$

$$2. \text{示性函数: } X = \begin{cases} 1, \text{事件} A \text{发生} \\ -1, \text{事件} A \text{没发生} \end{cases}, Y = \begin{cases} 1, \text{事件} B \text{发生} \\ -1, \text{事件} B \text{没发生} \end{cases}, XY = \begin{cases} 1, AB \cup \bar{A}\bar{B} \\ -1, A\bar{B} \cup \bar{A}B \end{cases}$$

3. 方差 (二阶矩): 衡量集中程度

$$Var(X) = \sigma^2 = \sigma_X^2 = D(X) = E[(X - E(X))^2] = \sum_{i=1}^{\infty} (x_i - \mu)^2 p(x_i)$$

$$\text{性质: } \textcircled{1} D(X) = E(X^2) - E(X)^2;$$

$$\textcircled{2} D(aX + b) = a^2 D(X); \quad b \text{ 的几何意义为平移量}$$

$$\textcircled{3} D(c) = 0 \rightarrow D(D(x)) = D(x)$$

$$\textcircled{4} D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2Cov(X, Y)$$

$$\textcircled{5} D(X) = 0 \Leftrightarrow \text{存在常数 } c \text{ 使得 } P(X = c) = 1 \quad X = c \text{ 与 } P(X = c) = 1 \text{ 不同}$$

$$4. \text{标准差: 解决方差单位不一致} \quad \sigma = \sigma_X = \sqrt{Var(X)}$$

$$5. \text{协方差: } Cov(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = E(XY) - E(X)E(Y) = Cov(Y, X)$$

$$Cov(X, Y) > 0, \text{ 正相关}; < 0, \text{ 负相关}; = 0, \text{ 不相关} \quad \text{不相关} \Leftrightarrow \text{独立}$$

$$\text{性质: } \textcircled{1} Cov(aX, bY) = abCov(X, Y) \quad \textcircled{3} Cov(X, X) = D(X)$$

$$\textcircled{2} Cov(X_1 + X_2, Y) = Cov(X_1, Y) + Cov(X_2, Y)$$

对称性求解协方差: 例如 X、Y、Z 独立, 且 X+Y+Z=2,

$$\text{则 } cov(X, Y) = cov(X, 2 - X - Z) = cov(X, 2) - cov(X, X) - cov(X, Z)$$

$$\text{因为 } cov(X, Y) = cov(X, Z), \text{ 所以 } cov(X, Y) = 1/2D(X)$$

$$6. \text{相关系数: } \rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \quad \text{因为标准差有单位} \quad \rho_{XY} \in [-1, 1]$$

$$\rho > 0, \text{ 正相关}; \quad \rho < 0, \text{ 负相关};$$

$$\rho = 1, \text{ 完全正相关}; \rho = -1, \text{ 完全负相关}; \rho = 0, \text{ (线性) 不相关};$$

$$|\rho_{XY}| = 1 \Leftrightarrow \text{存在常数 } a(a \neq 0), b \text{ 使得 } P(Y = aX + b) = 1$$

$$7. \text{满足二维正态分布的 } X, Y \text{ 独立} \Leftrightarrow \rho = 0, \text{ 即不相关}$$

8.

第五章 大数定律和中心极限定理

$$1. \text{马尔可夫不等式: } P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a} \quad \text{切比雪夫不等式: } P(|X - \mu| \geq k) \leq \frac{\sigma^2}{k^2}$$

$$2. \text{概率收敛: 记为 } Y_n \xrightarrow{P} a \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|Y_n - a| < \varepsilon\} = 1$$

3. 弱大数定律 统计存在的基础

$$a) \text{伯努利大数定律: 记为 } \frac{X_n}{n} \xrightarrow{P} p, n \rightarrow \infty$$

$$\text{条件: } X_n \sim B(n, p) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{X_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

$$b) \text{辛钦大数定律: 记为 } \bar{X} \xrightarrow{P} \mu, n \rightarrow \infty$$

$$\text{条件: } X_1, X_2, \dots, X_n \text{ 独立同分布, 期望存在}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - E(\bar{X})\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

$$c) \text{切比雪夫大数定律: 记为 } \bar{X} \xrightarrow{P} \mu, n \rightarrow \infty$$

$$\text{条件: } X_1, X_2, \dots, X_n \text{ 两两不相关, } E(X_i) \text{ 与 } D(X_i) \text{ 存在, } D(X_i) \leq c \text{ (常数)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

结论: 切比雪夫 or 辛钦能推出伯努利

$$4. \text{强大数定律: } P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} |\bar{X} - \mu| < \varepsilon\right) = 1 \quad \text{约束条件比弱大数更强} \quad \text{—— 考研不考}$$

5. 中心极限定理 解释了为什么生活中正态分布处处可见

a) 棣莫弗-拉普拉斯定理 理解: 伯努利分布的和的极限是正态分布

$$\text{条件: } X_n \sim B(n, p)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right) = \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad X_n \sim N(np, np(1-p))$$

b) 列维-林德伯格定理: 条件: X_1, X_2, \dots, X_n 独立同分布, $E(X_i)$ 与 $D(X_i)$ 存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right) = \Phi(x) \quad \sum_{i=1}^n X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2)$$

$$c) \text{计算方法: 例如 } P\{X > k\} = P\left\{\frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{k - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right\} = 1 - \Phi\left(\frac{k - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

第六章 样本及抽样分布

1. 样本 X_1, X_2, \dots, X_n

a) 若 X 的分布为 $F(x)$, 则样本的分布为 $F_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n F(x_i)$

b) 若 X 的密度为 $f(x)$, 则样本的密度为 $f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i)$

c) $X_1, X_2, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其线性组合也服从正态分布

2. 统计量(样本数字特征): 不含未知参数

a) 样本均值: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

b) 样本方差: $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} (\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2)$

样本标准差: $S = \sqrt{S^2}$

c) k (原点)阶矩: $E(X^k)$ k 阶中心矩: $E\{[X - E(X)]^k\}$

$k+1$ 阶混合矩: $E(X^k Y^l)$ $k+1$ 阶混合中心矩 $E\{[X - E(X)]^k [Y - E(Y)]^l\}$

性质: ① $E(\bar{X}) = E(X) = \mu$; ② $D(\bar{X}) = \frac{1}{n} D(X)$; ③ $E(S^2) = D(X)$

3. 抽样分布: 统计量的分布

a) **卡方分布**: 记作 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$ $X_i \sim N(0,1), \chi^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2$

$$E(X) = n \quad D(X) = 2n \quad \text{若 } n \text{ 为正整数, } F(n) = (n-1)!$$

性质: ①可加性: $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$;

②上 α 分位点: $P\{\chi^2 > \chi_{\alpha}^2(n)\} = \int_{\chi_{\alpha}^2(n)}^{\infty} f(y) dy = \alpha$

b) **t 分布**: 记作 $T \sim t(n)$ $T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}, \begin{cases} X \sim N(0,1) \\ Y \sim \chi^2(n) \end{cases}, X, Y \text{ 独立}$

$$E(X) = 0 (n > 1) \quad D(X) = \frac{n}{n-2} (n > 2)$$

性质: ①上 α 分位点: $P\{T > t_{\alpha}(n)\} = \int_{t_{\alpha}(n)}^{\infty} h(t) dt = \alpha$

② $h(t)$ 为偶函数; ③ n 充分大时, $t(n)$ 分布近似于 $N(0,1)$

④ $P\{|T| > t_{\alpha/2}(n)\} = \alpha$

c) **F 分布**: 记作 $F \sim F(n_1, n_2)$

$$F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}, \begin{cases} X \sim \chi^2(n_1) \\ Y \sim \chi^2(n_2) \end{cases}, X, Y \text{ 独立}$$

$$E(X) = \frac{n_2}{n_2-2} (n_2 > 2) \quad D(X) = \frac{2n_2^2(n_1+n_2-2)}{n_1(n_2-2)^2(n_2-4)} (n_2 > 4)$$

性质: ①上 α 分位点: $P\{F > F_{\alpha}(n_1, n_2)\} = \int_{F_{\alpha}(n_1, n_2)}^{\infty} \psi(y) dy = \alpha$

② $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$, $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_1, n_2)}$

d) **一个正态总体的抽样分布**: 总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

i. 样本均值的分布: $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 或 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \quad \text{量化 } \bar{X} \text{ 逼近 } \mu \text{ 的靠谱程度}$$

ii. 样本方差的分布: 量化 S^2 逼近 σ^2 的靠谱程度

$$\bar{X} \text{ 与 } S^2 \text{ 相互独立, 且 } \chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$\chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$$

e) **两个正态总体的抽样分布**: 总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且相互独立

i. 样本均值的差:

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right) \text{ 或 } U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

$$\text{若 } \sigma_1^2 = \sigma_2^2, T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{\omega} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2) \quad S_{\omega}^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

ii. 样本方差的比例: $F = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} = \frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$

4.

第七章 参数估计

1. 参数估计意义: 分布函数已知, 部分参数未知

2. 点估计: 部分参数 θ , 估计量 $\hat{\theta}$

种类: ①一致估计量: $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon) = 1$ $\bar{\theta} \xrightarrow{P} \theta$ 大样本容量

②无偏估计量: $E(\hat{\theta}) = \theta$

小样本容量

③更有效估计量: $D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$, $\hat{\theta}_1$ 更有效

计算方法:

a) 矩估计法:

理论基础: 样本 k 阶矩 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$, 随机变量 k 阶矩 $E(X^k) = \mu_k$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|A_k - \mu_k| < \varepsilon) = 1, \text{ 即 } A_k \xrightarrow{P} \mu_k, n \rightarrow \infty$$

步骤: 列出一阶矩到 k 阶矩的方程。(考研最多两个方程)

b) 最大似然估计法: 可能性最大的就是事实

i. 似然函数: 离散: $L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta), \theta \in \theta$

连续: $L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta), \theta \in \theta$

ii. 最大似然函数: $L(x_1, x_2, \dots, x_n; \hat{\theta}) = \max_{\theta \in \theta} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$

最大似然估计值: $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$; 最大似然估计量: $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$

iii. 对数似然方程: $\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = 0$ 解法之一

3. 区间估计: 置信水平 $1 - \alpha$

a) 单个总体 $N(\mu, \sigma^2)$

i. μ 的置信区间

① σ^2 已知: $(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2})$

② σ^2 未知: $(\bar{X} \pm \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1))$

ii. σ^2 的置信区间 σ 的置信区间同理

① μ 已知: $(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)})$

② μ 未知: $(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)})$

b) 两个总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$

i. $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

① σ_1^2, σ_2^2 已知: $(\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}})$

② $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 =$ 未知: $(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) S_{\omega} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}})$

$$S_{\omega}^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

ii. σ_1^2 / σ_2^2 的置信区间 μ_1, μ_2 未知

$$(\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)})$$

4.

第八章 假设检验

1. 第一类错误: H_0 是对的, 但我们拒绝了它 (弃真)

第二类错误: H_0 错, 接受 (纳伪)

2. 显著性检测: 只控制第一类错误

步骤: ① 提出 H_0 ;

② 给出显著性水平 α ;

③ 确定检验统计量及拒绝域形式;

④ 求出拒绝域 W

3.

三大抽样分布

	统计量		$E(X)$	$D(X)$	性质
卡方分布	$\chi^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2, X \sim N(0,1)$	$\chi^2 \sim \chi^2(n)$	n	$2n$	①可加性: $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$; ②上 α 分位点: $P\{\chi^2 > \chi_{\alpha}^2(n)\} = \int_{\chi_{\alpha}^2(n)}^{\infty} f(y) dy = \alpha$
t 分布	$T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}, \begin{cases} X \sim N(0,1) \\ Y \sim \chi^2(n) \end{cases}$ X, Y 独立	$T \sim t(n)$	$0(n > 1)$	$\frac{n}{n-2}(n > 2)$	①上 α 分位点: $P\{T > t_{\alpha}(n)\} = \int_{t_{\alpha}(n)}^{\infty} h(t) dt = \alpha$ ② $h(t)$ 为偶函数; ④ $P\{ T > t_{\alpha/2}(n)\} = \alpha$ ③n 充分大时, $t(n)$ 分布近似于 $N(0,1)$
F 分布	$F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}, \begin{cases} X \sim \chi^2(n_1) \\ Y \sim \chi^2(n_2) \end{cases}$ X, Y 独立	$F \sim F(n_1, n_2)$	$\frac{n_2}{n_2-2}(n_2 > 2)$	$\frac{2n_2^2(n_1+n_2-2)}{n_1(n_2-2)^2(n_2-4)}(n_2 > 4)$	①上 α 分位点: $P\{F > F_{\alpha}(n_1, n_2)\} = \int_{F_{\alpha}(n_1, n_2)}^{\infty} \psi(y) dy = \alpha$ ② $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$, $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_1, n_2)}$

常用随机变量分布

		$P\{X = k\}/p(x)$	$F(x)$	$E(X)$	$D(X)$	
0-1 分布		$p^k(1-p)^{1-k}$		p	$p(1-p)$	抛硬币，二选一
二项分布	$X \sim B(n, p)$	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$		np	$np(1-p)$	n 重伯努利，出现 k 次“是”
松柏分布	$X \sim P(\lambda)$	$\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$		λ	λ	二项分布的极限， $p = \frac{\lambda}{n}$
几何分布	$X \sim Ge(p)$	$p(1-p)^{k-1}$		$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	n 重伯努利，第 k 次首次出现“是”
负二项分布	$X \sim Nb(r, p)$	$C_{k-1}^{r-1} p^r (1-p)^{k-r}$		$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$	几何分布的和 X=第 k 次实验，正好发生 r 次“是”
超几何分布	$X \sim h(n, N, M)$	$\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$		$n \frac{M}{N}$	$n \frac{M}{N} (1 - \frac{M}{N}) (1 - \frac{n-1}{N-1})$	不放回抽样的二项分布
均匀分布	$X \sim U(a, b)$	$\begin{cases} \frac{1}{b-a}, a < x < b \\ 0, \text{其他} \end{cases}$	$\begin{cases} 0, x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, a \leq x \leq b \\ 1, x > b \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	古典派的几何概型
正态分布	$X \sim N(\mu, \sigma^2)$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$ $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$	μ	σ^2	二项分布的另一种极限
标准正态分布	$X \sim N(0, 1)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$	0	1	
指数分布	$X \sim Exp(\lambda)$	$\begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0 \\ 0, x < 0 \end{cases}$	$\begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, x \geq 0 \\ 0, x < 0 \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	泊松分布的间隔，连续的几何分布
二维均匀分布		$p(x, y) = \begin{cases} 1/S \\ 0, \text{其他} \end{cases}$				
二维正态分布	$(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$	$p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right]}$				

正态总体均值、方差的置信区间

	待估参数	其他参数	枢轴量的分布	置信区间
一个正态总体	μ	σ^2 已知	$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$	$\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right)$
		σ^2 未知	$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$
	σ^2	3	$\chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)} \right)$
		μ 未知	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$	$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$
两个正态总体	$\mu_1 - \mu_2$	σ_1^2, σ_2^2 已知	$U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$	$(\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}})$
		$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 =$ 未知	$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_\omega \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$ $S_\omega^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) S_\omega \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}})$
	σ_1^2/σ_2^2	μ_1, μ_2 未知	$F = \frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$	$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)} \right)$

正态总体参数的假设检验

检验参数	其他参数	H_0	H_1	检验统计量的分布	拒绝域
μ	σ^2 已知	$\mu = \mu_0$ $\mu \leq \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$ $\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$	$ U \geq u_{\alpha/2}$ $U \geq u_{\alpha}$ $U \leq u_{\alpha}$
	σ^2 未知			$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$ T \geq t_{\alpha/2}(n-1)$ $T \geq t_{\alpha}(n-1)$ $T \leq t_{\alpha}(n-1)$
σ^2	μ 已知	$\sigma^2 = \sigma_0^2$ $\sigma^2 \leq \sigma_0^2$ $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$ $\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 < \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$	$\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n)$ or $\chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n)$ $\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(n)$ $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n)$
	μ 未知			$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$	$\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$ or $\chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ $\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(n-1)$ $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$
$\mu_1 - \mu_2$	σ_1^2, σ_2^2 已知	$\mu_1 - \mu_2 = \mu_0$ $\mu_1 - \mu_2 \leq \mu_0$ $\mu_1 - \mu_2 \geq \mu_0$	$\mu_1 - \mu_2 \neq \mu_0$ $\mu_1 - \mu_2 > \mu_0$ $\mu_1 - \mu_2 < \mu_0$	$Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \mu_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$	$ U \geq u_{\alpha/2}$ $U \geq u_{\alpha}$ $U \leq u_{\alpha}$
	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 =$ 未知			$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \mu_0}{S_{\omega} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$	$ T \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$ $T \geq t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2)$ $T \leq t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2)$
σ_1^2/σ_2^2	μ_1, μ_2 已知	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$	$F = \frac{X/n_1}{Y/n_2} \sim F(n_1, n_2), \begin{cases} X \sim \chi^2(n_1) \\ Y \sim \chi^2(n_2) \end{cases}$	$F \leq F_{1-\alpha/2}(n_1, n_2)$ or $F \geq F_{\alpha/2}(n_1, n_2)$ $F \leq F_{\alpha}(n_1, n_2)$ $F \geq F_{1-\alpha}(n_1, n_2)$
	μ_1, μ_2 未知			$F = S_1^2/S_2^2 \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$	$F \leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1)$ or $F \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1)$ $F \leq F_{\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)$ $F \geq F_{1-\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)$