

Errata à “Sur les représentations non ramifiées des groupes réductifs p -adiques ; l'exemple de $\mathrm{GSp}(4)$ ”

François Rodier
Institut de Mathématiques de Luminy – C.N.R.S.
Marseille – France

Résumé

On corrige deux erreurs dans le papier [3] : l'une dans l'étude d'une involution sur les représentations irréductibles non ramifiées d'un groupe semi-simple, l'autre dans la description de représentations du groupe $\mathrm{GSp}(4)$.

Abstract

We correct two errors in the paper [3] : the first in the study of an involution on the irreducible unramified representations of a semi-simple group, the second in the description of representations of the group $\mathrm{GSp}(4)$.

Deux erreurs m'ont été signalées dans cet article, la première par Amritanshu Prasad, qui avait utilisé l'énoncé de la proposition 13 dans son papier [1] et qui a dû écrire par la suite un erratum, et la seconde par Laurent Clozel. Je les remercie tous deux de m'avoir signalé ces erreurs.

1 L'erreur dans la Proposition 13

La première erreur concerne la proposition 13. Elle a des conséquences sur la description des composants irréductibles des représentations de $\mathrm{GSp}(4)$ dans le chapitre 6 et dans la remarque finale du chapitre 7, mais ni sur le nombre de ces représentations, ni sur leur multiplicité.

Elle est due à une confusion entre deux notations. La notation sgn définie dans la section 2.1 comme dénotant un caractère de k^\times , donc une application du groupe multiplicatif du corps local non archimédien k dans \mathbb{C} , est à ne pas confondre avec la notation $\text{sgn } q_x$ définie en 5.3, où q_x représente un volume, donc un nombre réel.

Dans la démonstration de la proposition 13, l'assertion $q_t = \rho_P(t)^{-2}$ était utilisée pour prouver que $\text{sgn } q_t = 1$, alors que $\rho(t)$ n'est pas forcément entier puissance de q .

L'assertion de la ligne suivante, obtenue à l'aide du lemme 4, doit s'écrire par conséquent :

$$((\hat{\pi})_U(t) \circ A)x_U = \text{sgn } q_t A(\pi((T_{w_0(t^{-1})})^{-1})x)_U.$$

Elle implique

$$(\hat{\pi})_U(t) \circ A = \text{sgn } q_t \rho_P(t)^2 A \circ \pi_U(w_0(t))$$

Ou encore, en remarquant que $\text{sgn } q_t = \text{sgn } \rho_P^2(t) = \text{sgn } \nu(t)$:

$$(\hat{\pi})_U(t) \circ A = \text{sgn } \nu(t) \rho_P(t)^2 A \circ \pi_U(w_0(t))$$

D'où l'énoncé corrigé de la proposition 13 :

Proposition 13 . — *La représentation $R(\hat{\pi})$ est équivalente à $(\text{sgn } \circ \nu)R(\pi) \circ \text{Int } w_0$ où $\text{Int } w_0$ est l'automorphisme de T défini par w_0 .*

Par la suite cette erreur affecte dans les sections postérieures la description des composants irréductibles du groupe $\text{GSp}(4)$.

Dans la section 6.2, il faut lire que la représentation $(\text{sgn } \circ \nu)R(\hat{\pi}_\chi)$ est composée de χ , avec la multiplicité 2, et de $w_\alpha \chi$ avec la multiplicité 1. Et par conséquent $I(\chi)$ est composée de 4 représentations irréductibles : π_χ , π'_χ , $(\text{sgn } \circ \nu)\hat{\pi}_\chi$, $(\text{sgn } \circ \nu)\hat{\pi}'_\chi$.

Dans la section 6.3 : $I(\chi)$ est composée de 2 représentations irréductibles : π_χ , $(\text{sgn } \circ \nu)\hat{\pi}_\chi$.

C'est aussi le même cas dans les sections 6.4 et 6.5.

A la fin du paragraphe 7.2, il faut modifier la remarque finale :

Remarque. — Si χ est le caractère $t \mapsto |t^{2\alpha+\beta}|^{1/2}$ ou le caractère $t \mapsto \text{sgn } \nu(t)|t^{2\alpha+\beta}|^{1/2}$, alors $I(\chi)$ admet $\text{sgn } \circ \nu \hat{\pi}_\chi$ et π'_χ comme composants tempérés.

2 Erreurs dans l'énoncé du théorème 2

Les conditions sur le représentant x dans $X(T) \otimes \mathbb{R}$ du caractère unitaire χ_U imposées dans la section 7.2 sont traduites maladroitement dans le théorème 2. Voici les corrections.

Théorème 2 . — *Les représentations irréductibles non ramifiées de G sont les suivantes.*

- a) *sans changement* ;
- b) $I(\chi)$ pour $\chi(t) = \exp(-2\pi i \mu \operatorname{val} t^{\alpha+\beta}) |t^\alpha|^\lambda$ avec $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $0 < \mu < 1/2$ et $0 < \lambda < 1/2$;
- c) *sans changement* ;
- d) $I(\chi)$ pour $\chi(t) = \exp(-2\pi i \mu \operatorname{val} t^{2\alpha+\beta}) |t^\beta|^\lambda$ avec $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $0 < \mu < 1/2$ et $0 < \lambda < 1/2$;
- e) *sans changement* ;
- f) $I(\chi)$ pour $\chi(t) = \operatorname{sgn} t^{\alpha+\beta} \exp(-2\pi i \mu \operatorname{val} t^\alpha) |t^{\alpha+\beta}|^\lambda$ avec $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $0 < \mu < 1/2$ et $0 < \lambda < 1/2$;
- g) *sans changement* ;
- h à n) *sans changement* ;
- o) Les composants de $I(\chi)$ pour $\chi = |t^\alpha|^\lambda |t^\beta|^{1/2}$ avec $1/2 \leq \lambda \leq 1$;
- p) Les composants de $I(\chi)$ pour $\chi = \operatorname{sgn} \circ \nu |t^\alpha|^\lambda |t^\beta|^{1/2}$ avec $1/2 \leq \lambda \leq 1$.

Références

- [1] Amritanshu Prasad, *Almost unramified automorphic representations for split groups over $\mathbb{F}_q(t)$* . J. Algebra, 262(1) : 253-261, 2003.
- [2] Amritanshu Prasad, *Erratum to “Almost unramified automorphic representations for split groups over $\mathbb{F}_q(t)$ ”*, preprint, disponible sur [http ://www.imsc.res.in/~amri/erratum.pdf](http://www.imsc.res.in/~amri/erratum.pdf) .
- [3] F. Rodier, *Sur les représentations non ramifiées des groupes réductifs p -adiques ; l'exemple de $\operatorname{GSp}(4)$* , Bull. Soc. Math. Fr. 116 (1988), 15–42.