

Modules simples en caractéristique p des algèbres de Hecke affines de type A_2

Rachel Ollivier

Soit F un corps local non archimédien de caractéristique résiduelle p et de corps résiduel à q éléments. On ne connaît pas les représentations irréductibles modulo p de $Gl_n(F)$. Mais il est tentant de conjecturer que le foncteur des invariants par le pro- p -Iwahori $I(1)$ les identifie avec les modules à droite de l'algèbre de Hecke $\mathcal{H}_{\overline{\mathbf{F}}_p}(Gl_n(F), I(1))$.

Pour $n = 2$, l'étude des $\mathcal{H}_{\overline{\mathbf{F}}_p}(Gl_n(F), I)$ -modules simples est le point crucial pour la détermination des $\mathcal{H}_{\overline{\mathbf{F}}_p}(Gl_n(F), I(1))$ -modules simples. Parmi ceux-là, on distingue les modules que l'on appelle "supersinguliers" : ils ne correspondent pas, via le foncteur des invariants par le pro- p -Iwahori, à des sous-quotients d'induites paraboliques de $Gl_2(F)$.

Nous considérons le cas $n = 3$. Pour déterminer les $\mathcal{H}_{\overline{\mathbf{F}}_p}(Gl_3(F), I)$ -modules simples, on va réduire les modules standards de la $\overline{\mathbf{Q}}_p$ -algèbre de Hecke-Iwahori de $Gl_3(F)$ qui admettent une structure entière. On obtient des modules pour la $\overline{\mathbf{F}}_p$ -algèbre de Hecke-Iwahori, dont on détermine les suites de Jordan-Hölder. On classe ainsi les modules simples de la $\overline{\mathbf{F}}_p$ -algèbre de Hecke-Iwahori $\mathcal{H}_{\overline{\mathbf{F}}_p}(Gl_3(F), I)$, et l'on décrit conjecturalement ses modules supersinguliers au sens de [Vig2].

Soit R un anneau commutatif unitaire qui est un $\mathbf{Z}[q]$ -module. On peut considérer q comme une indéterminée ou bien l'identifier avec son image q_R dans R .

Définition 1 Soit q une indéterminée. On désigne par H la $\mathbf{Z}[q]$ -algèbre engendrée par $T^{\pm 1}$, S_1 vérifiant les relations

$$(S_1 + 1)(S_1 - q) = 0, T^3 S_1 = S_1 T^3, S_1 S_2 S_1 = S_2 S_1 S_2, T S_2 = S_1 T.$$

On désigne par H_R la R -algèbre $H \otimes_{\mathbf{Z}[q]} R$. Dans H_R , on identifie q et son image dans R .

La R -algèbre de Hecke $\mathcal{H}_R(Gl_3(F), I)$ est isomorphe à H_R ([BK] p177).

Présentation de Bernstein : ([Rog1])

Soit A l'algèbre commutative de la décomposition de Bernstein de $H \otimes \mathbf{Z}[q^{\pm 1}]$, isomorphe à l'algèbre des polynômes de Laurent $\mathbf{Z}[q^{\pm 1}][Y_i^{\pm 1} (1 \leq i \leq 3)]$ où

$$Y_1 = q S_1^{-1} S_2^{-1} T, Y_2 = S_2^{-1} T S_1, Y_3 = q^{-1} T S_1 S_2.$$

L'algèbre commutative A est aussi égale à l'algèbre des polynômes de Laurent

$$\mathbf{Z}[q^{\pm 1}][T^{\pm 3}, T_i^{\pm 1} (1 \leq i \leq 2)] \text{ où } T_1 = T^2 S_2 S_1, T_2 = T S_1 S_2,$$

T_1, T_2 sont les fonctions caractéristiques de $I y_1 I$ et de $I y_2 I$ où $y_1 = t^2 s_2 s_1$ est la diagonale $(1, p, p)$ et $y_2 = t s_1 s_2$ est la diagonale $(1, 1, p)$.

En effet on a les relations, $Y_1 = q T^3 T_1^{-1}$, $Y_2 = T_1 T_2^{-1}$, $Y_3 = q^{-1} T_2$.

D'après le théorème de Bernstein, A et l'algèbre de Hecke finie H_0 de générateurs S_1 et S_2 engendrent $H \otimes \mathbf{Z}[q^{\pm 1}]$.

Le résultat suivant, relatif à la structure de l'algèbre H , est fondamental pour la suite. C'est un cas particulier de [Vig2] Théorème 2.

Théorème 1 *L'intersection $A \cap H$ est la $\mathbf{Z}[q]$ -algèbre de type fini*

$$\mathbf{Z}[q][(Y_1 Y_2 Y_3)^{\pm 1}, q(Y_i Y_j)^{\pm 1}, qY_i^{\pm 1}, 1 \leq i \neq j \leq 3].$$

Le centre de H est la $\mathbf{Z}[q]$ -algèbre de type fini

$$\mathbf{Z}[q][\sigma_3^{\pm 1}, q\sigma_1, q\sigma_2],$$

où $\sigma_1 = Y_1 + Y_2 + Y_3$, $\sigma_2 = Y_1 Y_2 + Y_2 Y_3 + Y_1 Y_3$, $\sigma_3 = Y_1 Y_2 Y_3$.

H est un module de type fini sur son centre.

Un R -caractère de A est un morphisme d'anneaux $\chi : A \rightarrow R$ tel que $\chi(q) = q_R$. Un tel morphisme est entièrement déterminé par la donnée du triplet (y_1, y_2, y_3) de ses valeurs en Y_1, Y_2, Y_3 . Ainsi, on a une action naturelle de \mathcal{S}_3 sur les R -caractères de A .

Rappels sur les modules standards : ([Rog1])

Soit R un corps de caractéristique nulle. Tout R -caractère $\chi : A \rightarrow R$ induit un H_R -module à gauche que l'on appelle H_R -module standard associé à χ :

$$I_A(\chi) = H_R \otimes_{A, \chi} R.$$

D'après Bernstein, c'est un R -espace vectoriel de dimension 6, engendré sur H_R par le générateur canonique $1 \otimes 1$, vecteur propre pour A de valeur propre χ .

Par adjonction, ces modules standards possèdent une propriété universelle fondamentale pour la détermination des H_R -modules simples : tout H_R -module engendré par un vecteur propre pour A de valeur propre χ est quotient du module standard $I_A(\chi)$.

De plus, deux modules standards $I_A(\chi)$ et $I_A(\chi')$ ont la même suite de Jordan-Hölder si et seulement si χ et χ' sont conjugués sous l'action de \mathcal{S}_3 .

Modules standards entiers :

Désormais, R est un anneau commutatif unitaire.

Définition 2 *Soit $\chi : A \cap H \rightarrow R$ un R -caractère de $A \cap H$, c'est à dire un morphisme d'anneaux tel que $\chi(q) = q_R$. Le H_R -module standard entier relatif à χ est le H_R -module à gauche induit de χ*

$$I(\chi) = H \otimes_{A \cap H, \chi} R.$$

Propriétés des modules standards entiers :

- (1) Le module standard entier $I(\chi)$ est de type fini sur R car H est de type fini sur $A \cap H$.
- (2) Il est engendré par le générateur canonique $\Phi = 1 \otimes 1$, vecteur propre pour $A \cap H$ de valeur propre χ .
- (3) Par adjonction, tout H_R -module engendré par un vecteur propre pour $A \cap H$ de valeur propre χ est quotient de $I(\chi)$.
- (4) Si $\chi : A \cap H \rightarrow R$ est la restriction de $\chi_A : A \rightarrow R$, alors $I(\chi)$ est égal à $H_R \otimes_{A, \chi_A} R$, le H_R -module induit par χ_A .

Structures entières des modules standards :

Définition 3 Soit E une extension finie de \mathbf{Q}_p d'anneau d'entiers O_E et $\chi : A \rightarrow E$ un E -caractère de A .

On dit que χ est O_E -entier si $\chi(A \cap H) \subset O_E$.

Soit M un H_E -module de dimension finie. On dit que M a une O_E -structure entière s'il existe un sous- O_E -module de M libre, stable par H et qui contient une E -base de M . On dit alors du H_E -module M qu'il est entier.

On note $r_p : O_E \rightarrow \overline{\mathbf{F}}_p$ la réduction modulo p . Soit V un H_{O_E} -module. On appelle réduction de V le $H_{\overline{\mathbf{F}}_p}$ -module $V \otimes_{O_E, r_p} \overline{\mathbf{F}}_p$.

Proposition 1 Soit E une extension finie de \mathbf{Q}_p d'anneau d'entiers O_E et $\chi_A : A \rightarrow E$ un caractère de A .

Le H_E -module standard $I_A(\chi_A)$ admet une O_E -structure entière si et seulement si χ_A est O_E -entier,

c'est à dire

$$(y_1 y_2 y_3)^{\pm 1}, q(y_i y_j)^{\pm 1}, q y_i^{\pm 1}, 1 \leq i \neq j \leq 3$$

sont des éléments de O_E .

Cette relation est invariante sous l'action de \mathcal{S}_3 .

Preuve : C'est [Vig2] (2.5.4). Soit Φ le générateur canonique de $I_A(\chi_A)$ qui est un vecteur A -propre pour la valeur propre χ_A . Soit $H_{O_E}\Phi$ le sous H_{O_E} -module de $I_A(\chi_A)$ engendré par Φ . Plus précisément, on montre que lorsque χ_A est O_E -entier sur $A \cap H$, le H_{O_E} -module $H_{O_E}\Phi$ est une structure entière de $I_A(\chi_A)$ appelée la O_E -structure entière canonique.

Remarque 2 : Soit $\chi : A \cap H \rightarrow O_E$ la birestriction de χ_A à $A \cap H$ et O_E . Le $\overline{\mathbf{F}}_p$ -caractère $r_p \chi : A \cap H \rightarrow \overline{\mathbf{F}}_p$ induit un $H_{\overline{\mathbf{F}}_p}$ -module standard entier $I(r_p \chi)$ qui est isomorphe à la réduction de la structure entière canonique de $I_A(\chi_A)$ ([Vig2] Théorème 5).

Proposition 2 Soit $\chi_A : A \rightarrow \overline{\mathbf{Q}}_p$ un caractère. Il existe une extension finie E de \mathbf{Q}_p telle que $\chi_A(A) \subset E$.

Si le H_E -module standard $I_A(\chi_A)$ admet une O_E -structure entière $L(\chi_A)$, la semi-simplification du $H_{\overline{\mathbf{F}}_p}$ -module $L(\chi_A) \otimes \overline{\mathbf{F}}_p$ ne dépend que de χ_A . On appelle cette semi-simplification la réduction de $I_A(\chi_A)$.

De plus, pour tout $w \in \mathcal{S}_3$, $I_A(w.\chi_A)$ admet aussi une structure entière et les réductions de $I_A(\chi_A)$ et $I_A(w.\chi_A)$ sont les mêmes.

Preuve : La proposition se déduit des propriétés des modules standards ([Oll] 4.3.1).

Réduction des modules standards $I_A(\chi_A)$ pour χ_A ordinaire :

Soit $\chi_{y,A} : A \rightarrow E$ un E -caractère donné par le triplet $y = (y_1, y_2, y_3)$ de ses valeurs en Y_1, Y_2, Y_3 . On le suppose entier sur $A \cap H$. Puisque $y_1 y_2 y_3$ est une unité, $\chi_{y,A}$ est dans l'orbite sous \mathcal{S}_3 d'un caractère tel que y_1 et y_3^{-1} sont des entiers. Pour de tels caractères appelés *ordinaires*, on définit explicitement une structure entière $L(\chi_{y,A})$.

Soit $\chi_{y,A} : A \rightarrow E$ ordinaire. On définit des nombres $q(w, y)$, pour tout $w \in \mathcal{S}_3$:

$$\begin{aligned} q(1, y) &= 1 \\ q(s_1, y) &= \begin{matrix} 1 & \text{si } y_2^{-1} \in O_E \\ y_2^{-1} & \text{si } y_2 \in O_E \end{matrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q(s_2, y) &= y_2 \quad \text{si} \quad y_2^{-1} \in O_E \\ &= 1 \quad \text{si} \quad y_2 \in O_E \end{aligned}$$

$$q(s_1 s_2, y) = q^{-1} y_1 y_2$$

$$q(s_2 s_1, y) = q^{-1} y_1$$

$$\begin{aligned} q(s_1 s_2 s_1, y) &= q^{-1} y_1 y_2 \quad \text{si} \quad y_2^{-1} \in O_E \\ &= q^{-1} y_1 \quad \text{si} \quad y_2 \in O_E. \end{aligned}$$

Ils sont non-nuls et leurs inverses sont des entiers.

Soit le système de Coxeter $(\mathcal{S}_3, \{s_1, s_2\})$, $\ell : \mathcal{S}_3 \rightarrow \mathbf{N}$ la longueur associée. On note $T_{s_i} = S_i$, $i = 1, 2$, et $T_{ww'} = T_w T_{w'}$ pour w, w' tels que $\ell(ww') = \ell(w) + \ell(w')$.

Proposition 3 *Soit $\chi_{y,A} : A \rightarrow E$ ordinaire.*

Soit $L(\chi_{y,A})$ le sous O_E -module libre de rang 6 de $I_A(\chi_{y,A})$ de base $\{q(w, y)T_w \Phi\}_{w \in \mathcal{S}_3}$.

Alors $L(\chi_{y,A})$ est la O_E -structure entière canonique de $I_A(\chi_{y,A})$.

Preuve :

Montrons que $L(\chi_{y,A})$ est un H_{O_E} -module. On va noter $\Phi_w = q(w, y)T_w \Phi$. En particulier, $\Phi_1 = \Phi$. Alors, on a

$$\begin{aligned} T\Phi &= \Phi_{s_2 s_1}, \quad T^2\Phi = \Phi_{s_1 s_2}, \quad T^3\Phi = y_1 y_2 y_3 \Phi \\ T\Phi_{s_1} &= \Phi_{s_2}, \quad T^2\Phi_{s_1} = \Phi_{s_1 s_2 s_1}, \quad T^3\Phi_{s_1} = y_1 y_2 y_3 \Phi_{s_1} \end{aligned}$$

Donc T stabilise $L(\chi_{y,A})$ et l'on peut prendre $\mathcal{B} = (\Phi, T\Phi, T^2\Phi, \Phi_{s_1}, T\Phi_{s_1}, T^2\Phi_{s_1})$ comme O_E -base de ce module puisque $y_1 y_2 y_3$ est une unité.

Posons pour simplifier :

$$z = y_1 y_2 y_3,$$

$$a = q(s_1, y)^{-1}, \quad b = \frac{q(s_2 s_1, y)}{q(s_1 s_2 s_1, y)}, \quad c = \frac{q(s_2, y)}{q(s_1 s_2, y)},$$

$$a' = qa^{-1}, \quad b' = qb^{-1}, \quad c' = qc^{-1}.$$

On vérifie que ces nombres sont tous des entiers de E car $\chi_{y,A}$ est ordinaire.

Les matrices de S_1 et T dans la base \mathcal{B} sont données par :

$$S_1 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & a' & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b' \\ 0 & 0 & q-1 & 0 & c & 0 \\ a & 0 & 0 & q-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c' & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 & 0 & q-1 \end{pmatrix} T \begin{pmatrix} 0 & 0 & z & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & z \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc S_1 et T stabilisent le O_E -module $L(\chi_{y,A})$ qui est bien stable par H_{O_E} . Par conséquent, $L(\chi_{y,A})$ contient $H_{O_E} \Phi$.

Réciproquement, il est clair que $\Phi, T\Phi, T^2\Phi$ sont des éléments de $H_{O_E} \Phi$. Dans le cas où $q(s_1, y) = 1$, l'élément $\Phi_{s_1} = S_1 \Phi$ est dans $H_{O_E} \Phi$. Dans le cas où $q(s_1, y) = y_2^{-1}$, $\Phi_{s_1} = T^{-1} S_2 \Phi$ est un élément de $H_{O_E} \Phi$. D'où, $L(\chi_{y,A}) = H_{O_E} \Phi$.

Proposition 4 Soit $\bar{\chi} : A \cap H \rightarrow \bar{\mathbf{F}}_p$ un caractère. Il existe un caractère ordinaire $\chi_A : A \rightarrow \bar{\mathbf{Q}}_p$ tel que la réduction du $H_{\bar{\mathbf{Q}}_p}$ -module standard $I_A(\chi_A)$ et le $H_{\bar{\mathbf{F}}_p}$ -module standard entier $I(\bar{\chi})$ ont la même semi-simplification.

Preuve : Soit $\bar{\chi} : A \cap H \rightarrow \bar{\mathbf{F}}_p$. On peut montrer à la main que $\bar{\chi}$ se relève en un O_E -caractère χ de $A \cap H$, où E est une extension finie de \mathbf{Q}_p . Pour une démonstration générale, [Vig 2] (3.3). Soit $i_p : O_E \rightarrow E$ l'inclusion canonique. Le E -caractère $i_p \chi : A \cap H \rightarrow E$ est dans l'orbite sous \mathcal{S}_3 d'un E -caractère ordinaire χ_y . On conclut grâce à la proposition 2 et la remarque 2.

Tout caractère $\chi_A : A \rightarrow E$ entier sur $A \cap H$ est dans l'orbite sous \mathcal{S}_3 d'un caractère ordinaire de la liste suivante. D'après la proposition 4, cette liste donne accès à la semi-simplification des $H_{\bar{\mathbf{F}}_p}$ -modules standards entiers.

La valuation de l'anneau de valuation discrète O_E est désignée par val .

$L(\chi_{y,A}) \otimes \bar{\mathbf{F}}_p$ est irréductible quand :

- (1) $0 < val(y_2) < val(q)$ et $val(y_3) = -val(q)$
- (2) $-val(q) < val(y_2) < 0$ et $val(y_1) = val(q)$
- (3) $(val(y_1), val(y_2), val(y_3)) = (val(q), 0, -val(q))$ et $qy_3 \not\equiv y_2, qy_2 \not\equiv y_1$

$L(\chi_{y,A}) \otimes \bar{\mathbf{F}}_p$ est indécomposable et admet deux sous-quotients irréductibles de dimension 3 quand :

- (4) $(val(y_1), val(y_2), val(y_3)) = (val(q), 0, -val(q))$ et $qy_3 \not\equiv y_2, qy_2 \equiv y_1$
- (5) $(val(y_1), val(y_2), val(y_3)) = (val(q), 0, -val(q))$ et $qy_3 \equiv y_2, qy_2 \not\equiv y_1$
- (6) $(val(y_1), val(y_2), val(y_3)) = (0, 0, 0)$

$L(\chi_{y,A}) \otimes \bar{\mathbf{F}}_p$ est décomposé en somme directe de deux sous-quotients irréductibles de dimension 3 quand :

- (7) $0 < val(y_2) \leq -val(y_3) < val(q)$
- (8) $-val(q) < -val(y_1) \leq val(y_2) < 0$

$L(\chi_{y,A}) \otimes \bar{\mathbf{F}}_p$ est indécomposable de longueur quatre quand :

- (9) $(val(y_1), val(y_2), val(y_3)) = (val(q), 0, -val(q))$ et $qy_3 \equiv y_2, qy_2 \equiv y_1$

La liste des sous-quotients irréductibles des $L(\chi_{y,A}) \otimes \bar{\mathbf{F}}_p$ peut-être décrite à l'aide des $H_{\bar{\mathbf{F}}_p}$ -modules ci-dessous.

Soient z, y, y' des éléments non nuls de $\bar{\mathbf{F}}_p$ que l'on note ici R pour alléger les notations. On définit les modules suivants :

- $L_6(z, y) = Rv \oplus RTv \oplus RT^2v \oplus Rw \oplus RTw \oplus RT^2w$
 $S_1(v) = 0, S_1(Tv) = T^2w, S_1(T^2v) = -T^2v, S_1(w) = -w, S_1(Tw) = \frac{y}{z}T^2v, S_1(T^2w) = -T^2w$, et T^3 agit par le scalaire z . Ce module est irréductible.

- $\tilde{L}_6(z, y) = Rv \oplus RTv \oplus RT^2v \oplus Rw \oplus RTw \oplus RT^2w$
 $S_1(v) = w, S_1(Tv) = 0, S_1(T^2v) = -T^2v, S_1(w) = -w, S_1(Tw) = \frac{y}{z}T^2v, S_1(T^2w) = -T^2w$ et T^3 agit par le scalaire z . Ce module est irréductible.
- $K_6(z, y, y') = Rv \oplus RTv \oplus RT^2v \oplus Rw \oplus RTw \oplus RT^2w$
 $S_1(v) = w, S_1(Tv) = \frac{y}{y'}T^2w, S_1(T^2v) = -T^2v, S_1(w) = -w, S_1(Tw) = \frac{y'}{z}T^2v, S_1(T^2w) = -T^2w$ et T^3 agit par le scalaire z .
Ce module est irréductible si et seulement si $y^2 \neq y'$ et $y'^2 \neq zy$.
- $M_3(z, y) = Rv \oplus RTv \oplus RT^2v, S_1v = 0, S_1Tv = y^{-1}T^2v, S_1T^2v = -T^2v, T^3v = zv$.
Alors ce module est irréductible si et seulement si $y^3 \neq z$.
Si $y^3 = z$, alors $M_3(z, y)$ a pour seul sous-module le caractère

$$M_1(0, y) : T \rightarrow y, S_1 \rightarrow 0,$$

et pour seul quotient le module dimension 2

$$M_2(y) = Rw \oplus RTw, S_1w = -w, S_1Tw = 0, T^2w = -y^2w - yTw.$$

- $\tilde{M}_3(z, y) = Rv \oplus RTv \oplus RT^2v, S_1v = -v, S_1Tv = -y^{-1}T^2v, S_1T^2v = -T^2v, T^3v = zv$.
Alors ce module est irréductible si et seulement si $y^3 \neq z$.
Si $y^3 = z$, alors $\tilde{M}_3(z, y)$ a pour seul sous-module le module de dimension 2

$$\tilde{M}_2(y) = Rw \oplus RTw, S_1w = 0, S_1Tw = -Tw, T^2w = -y^2w - yTw,$$

et pour seul quotient le module de dimension 1

$$M_1(-1, y) : T \rightarrow y, S_1 \rightarrow -1$$

- $N_3(z, y) = Rv \oplus RTv \oplus RT^2v, S_1v = -v, S_1Tv = 0, S_1T^2v = -yTv - T^2v, T^3v = zv$.
Alors ce module est irréductible si et seulement si $y^3 \neq z$.
Si $y^3 = z$, alors $N_3(z, y)$ a pour seul sous-module le caractère $M_1(-1, y)$ et pour seul quotient le module de dimension 2 $M_2(y)$.
- $\tilde{N}_3(z, y) = Rv \oplus RTv \oplus RT^2v, S_1v = 0, S_1Tv = 0, S_1T^2v = yTv - T^2v, T^3v = zv$.
Alors ce module est irréductible si et seulement si $y^3 \neq z$.
Si $y^3 = z$, alors $\tilde{N}_3(z, y)$ a pour seul sous-module le module de dimension 2 $\tilde{M}_2(y)$ et pour seul quotient le caractère $M_1(0, y)$.
- $P_3(z) = Rv \oplus RTv \oplus RT^2v, S_1v = 0, S_1Tv = 0, S_1T^2v = -T^2v, T^3v = zv$.
Il est irréductible.
- $\tilde{P}_3(z) = Rv \oplus RTv \oplus RT^2v, S_1v = -v, S_1Tv = 0, S_1T^2v = -T^2v, T^3v = zv$.
Il est irréductible.

Action du centre :

Soit $z \in \overline{\mathbf{F}}_p^*, y, y' \in \overline{\mathbf{F}}_p$. On désigne par $\omega(z, y, y')$ le caractère central défini par :

$$\begin{aligned}
\sigma_3 &\mapsto z \\
q\sigma_1 &\mapsto y \\
q\sigma_2 &\mapsto y'
\end{aligned}$$

On reprend la numérotation précédente pour décrire la semi-simplification des $L(\chi_{y,A}) \otimes \overline{\mathbf{F}}_p$.

On pose $z = r_p(y_1 y_2 y_3)$, $y = r_p(q y_3)$, $y' = r_p(q y_2 y_3)$. Alors, les $H_{\overline{\mathbf{F}}_p}$ -modules $L(\chi_{y,A}) \otimes \overline{\mathbf{F}}_p$ de la liste suivante ont pour caractère central $\omega(z, y, y')$.

Caractères centraux réguliers : $yy' \neq 0$.

- (3) $L(\chi_{y,A}) \otimes \overline{\mathbf{F}}_p$ est isomorphe au module irréductible $K_6(z, y, y')$. On a $y^2 \neq y'$ et $y'^2 \neq zy$.
- (4) $L(\chi_{y,A}) \otimes \overline{\mathbf{F}}_p$ a pour seul sous-module $M_3(z, y'y^{-1})$. Le quotient obtenu est $\tilde{M}_3(z, y'y^{-1})$. On a $y'^2 = zy$, $y^2 \neq y'$.
- (5) $L(\chi_{y,A}) \otimes \overline{\mathbf{F}}_p$ a pour seul sous-module $\tilde{N}_3(z, y'y^{-1})$. Le quotient obtenu est $N_3(z, y'y^{-1})$. On a $y' = y^2$, $y'^2 \neq zy$.
- (9) $L(\chi_{y,A}) \otimes \overline{\mathbf{F}}_p$ a pour sous-quotients irréductibles $M_1(0, y)$, $M_1(-1, y)$, $M_2(y)$, $\tilde{M}_2(y)$. On a $y^2 = y'$, $y'^2 = zy$. La décomposition de $L(\chi_{y,A}) \otimes \overline{\mathbf{F}}_p$ est représentée par le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccccccc}
& & & M_2(y) & & \tilde{M}_2(y) & \\
& & & \swarrow & & \searrow & \\
L(\chi_{y,A}) \otimes \overline{\mathbf{F}}_p & \xrightarrow{M_1(-1, y)} & & & & & \\
& & & \nwarrow & & \nearrow & \\
& & & \tilde{M}_2(y) & & M_2(y) & \\
& & & & & & \\
& & & & & M_1(0, y) & \rightarrow 0
\end{array}$$

Caractères centraux singuliers : $yy' = 0$ mais $(y, y') \neq (0, 0)$.

- (1) $L(\chi_{y,A}) \otimes \overline{\mathbf{F}}_p$ est isomorphe au module irréductible $L_6(z, y)$. Ici, $y' = 0$.
- (2) $L(\chi_{y,A}) \otimes \overline{\mathbf{F}}_p$ est isomorphe au module irréductible $\tilde{L}_6(z, y')$. Ici $y = 0$.

Caractères centraux supersinguliers : $y = y' = 0$.

- (6) $L(\chi_{y,A}) \otimes \overline{\mathbf{F}}_p$ a pour sous-module $\tilde{P}_3(z)$ et pour quotient $P_3(z)$.
- (7)(8) $L(\chi_{y,A}) \otimes \overline{\mathbf{F}}_p$ est somme directe de $\tilde{P}_3(z)$ et $P_3(z)$.

On a établi une liste de $H_{\overline{\mathbf{F}}_p}$ -modules simples : $M_1(0, y)$, $M(-1, y)$, $M_2(y)$, $\tilde{M}_2(y)$, $M_3(z, y)$, $\tilde{M}_3(z, y)$, $N_3(z, y)$, $\tilde{N}_3(z, y)$, $P_3(z)$, $\tilde{P}_3(z)$, $L_6(z, y)$, $\tilde{L}_6(z, y)$, $K_6(z, y, y')$ avec $y^2 \neq y'$, $y'^2 \neq zy$ et $y^3 \neq z$. On note que l'action du centre sur ces modules simples détermine les valeurs des paramètres z, y, y' . Grâce à cet argument et à l'observation de la trace de S_1 on montre qu'il n'y a pas d'isomorphisme entre deux modules simples de dimension 6 (resp. 3) de la liste précédente. On montre à la main que $M_2(y)$ et $\tilde{M}_2(y)$ ne sont pas isomorphes.

On connaît la semi-simplification des $H_{\overline{\mathbf{Q}}_p}$ -modules standards ([Rog2]). En la comparant, pour les $\chi_{y,A}$ de la liste, avec la semi-simplification de $L(\chi_{y,A}) \otimes \overline{\mathbf{F}}_p$ on remarque que tous les modules simples contenus dans $L(\chi_{y,A}) \otimes \overline{\mathbf{F}}_p$ se relèvent : ils sont la réduction modulo p d'une structure entière d'un $H_{\overline{\mathbf{Q}}_p}$ -module simple.

On a donc obtenu :

Théorème 2 *Tout $H_{\overline{\mathbf{F}}_p}$ -module simple ayant un caractère central est de la forme*

$$\begin{aligned} M_1(0, y), M(-1, y), M_2(y), \tilde{M}_2(y), K_6(z, y, y') \text{ avec } y^2 \neq y' \text{ et } y'^2 \neq zy \\ M_3(z, y), \tilde{M}_3(z, y), N_3(z, y), \tilde{N}_3(z, y), \text{ avec } y^3 \neq z \\ L_6(z, y), \tilde{L}_6(z, y), \\ P_3(z), \tilde{P}_3(z) \end{aligned}$$

avec $z, y, y' \in \overline{\mathbf{F}}_p^*$.

Un $H_{\overline{\mathbf{F}}_p}$ -module simple est la réduction d'un $H_{\overline{\mathbf{Q}}_p}$ -module simple entier.

Bibliographie :

- [BK] Bushnell, C.J. Kutzko, P. The admissible dual of $GL(N)$ via compact open subgroups. Annals of Mathematics Studies. 129. Princeton University Press, 1993.
- [Oll] Ollivier, R. Modules simples en caractéristique p des algèbres de Hecke affines de type A_1, A_2 . DEA Institut de Mathématiques de Jussieu, Juin 2002.
- [Rog1] Rogawski, J.D. On modules over the Hecke algebra of a p -adic group. Invent. Math 79, 443-465, 1985.
- [Rog2] Rogawski, J.D. Representations of $GL(n)$ over a p -adic field with an Iwahori-fixed vector Isr. J. Math 54, 242-256 ,1986.
- [Vig1] Vignéras, M.-F Representations modulo p of the p -adic group $GL(2, F)$. Institut de Mathématiques de Jussieu. Prépublication 301, Septembre 2001.
- [Vig2] Vignéras, M.-F. Algèbres de Hecke affines génériques. Institut de Mathématiques de Jussieu. Prépublication, Novembre 2002.