MDPI

Article

Análisis Exploratorio de Datos: Indicadores de Enfermedades Cardiovasculares

Yeray Antón Juárez[1], Carlos Foo Sidro[1], Ángel Queral Castell[1]

[1] Máster en Ciencia de Datos Universitat de València; yeanjua@alumni.uv.es
* Correspondence: yeanjua@alumni.uv.es

Abstract: El proyecto trata de un análisis exploratorio de datos médicos con el objetivo de encontrar patrones entre datos del historial de un paciente y la aparición de enfermedades cardiovasculares, con el objetivo de poder llegar a predecir en un futuro si otros pacientes son susceptibles a desarrollar cardiopatías.

Keywords: Análisis Exploratorio de Datos; RMarkdown; Tidyverse; Enfermedades Cardiovasculares; Medicina.

1. Introducción

Las enfermedades cardiovasculares representan una de las principales causas de mortalidad a nivel global. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas patologías son responsables de aproximadamente un 32% de todas las muertes en el mundo [**?**]. Por tanto, lograr identificar de forma precoz a los pacientes susceptibles de padecerlas puede salvar multitud de vidas, especialmente considerando que el diagnóstico de estas enfermedades suele producirse en fases avanzadas.

El objetivo principal de este estudio es analizar los datos procedentes de la encuesta epidemiológica anual del *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC), procesados y disponibles en Kaggle [**?**], para establecer relaciones entre diversas variables explicativas y la aparición de cardiopatías. El conjunto de datos está compuesto por 40 variables, incluyendo datos demográficos, hábitos de vida y la presencia de otras patologías secundarias, junto con una variable objetivo binaria que indica la presencia de enfermedad cardíaca. Al disponer de una muestra amplia de aproximadamente 246.000 observaciones, se cuenta con una base sólida para trabajar sobre los datos de forma robusta.

El análisis exploratorio de datos (EDA) consistirá en un primer preprocesamiento y limpieza de los datos (tratamiento de valores perdidos y tipado de variables), seguido de un análisis mediante la visualización de relaciones entre variables con gráficos estadísticos.

A partir de este conjunto de datos, el presente análisis se articula en torno a la siguiente pregunta principal de investigación:

¿Existe una relación directa entre los hábitos de vida, las características sociodemográficas y la presencia de patologías previas u otras variables con el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares?

El análisis exploratorio buscará identificar cuáles de estas variables muestran una mayor asociación con las cardiopatías, cómo interactúan entre sí y qué patrones o perfiles de pacientes presentan una mayor vulnerabilidad.

2. Métodos y Materiales

2.1. Descripción del Conjunto de Datos y Procedencia

El conjunto de datos analizado procede del Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) correspondiente al año 2022, un sistema de encuestas telefónicas coordinado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Esta base de datos recopila información anual de ciudadanos adultos no institucionalizados

Citation: Antón, Y.; Foo, C.; Queral, A. Análisis Exploratorio de Datos: Indicadores de Enfermedades Cardiovasculares. *Journal Not Specified* **2023**, *1*, 0. https://doi.org/

Received:
Revised:
Accepted:
Published:

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted to *Journal Not Specified* for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

sobre hábitos de riesgo para la salud, condiciones médicas crónicas y uso de servicios preventivos.

El conjunto cuenta inicialmente con 445.132 observaciones y 40 variables que recogen mediciones biométricas continuas, variables sociodemográficas y antecedentes clínicos.

2.2. Diccionario de Variables

Las 40 variables del estudio se estructuran en seis dimensiones clínicas: **1) Sociodemográficas:** `Estado`, `Sexo`, `GrupoEdad` (13 tramos quinquenales) y `RazaEtnia`. **2) Antropométricas y salud física:** `AlturaMetros`, `PesoKilogramos`, `IMC` y percepción de salud (`SaludGeneral`, `DiasMalaSaludFisica`, `DiasMalaSaludMental`). **3) Hábitos de vida:** `HorasSueno`, `ActividadFisica`, `EstadoFumador`, `UsoCigarrilloElectronico` y `ConsumidorAlcohol`. **4) Patologías y comorbilidades:** `InfartoMiocardio`, `AnginaPecho`, `Ictus`, `Diabetes`, `Asma`, `EPOC`, `EnfermedadRenal`, `Artritis`, `CancerPiel` y `TrastornoDepresivo`. **5) Limitaciones funcionales:** `DientesExtraidos` y dificultades en la vida diaria (`DificultadAuditiva`, `Visual`, `Concentracion`, `Caminar`, `VestirseBanarse`, `TareasDiarias`). **6) Prevención y vacunas:** `UltimoChequeoMedico`, `TomografiaTorax`, `PruebaVIH`, `VacunaGripeUltimoAno`, `VacunaNeumococo`, `VacunaTetanos10Anos`, `ConductaAltoRiesgo` y `CovidPositivo`. Como variable objetivo derivada se define `EnfermedadCard` (diagnóstico positivo en infarto o angina).

2.3. Ingesta y Tipado de Variables

La importación se realiza de forma reproducible a partir del archivo comprimido mediante la librería readr. Posteriormente, se convierten las variables cualitativas a factores nominales y ordinales, y se define la variable objetivo EnfermedadCardiaca (definida como presencia de infarto de miocardio HadHeartAttack o angina de pecho HadAngina).

```
# Carga reproducible
heart_raw <- read_csv("data/heart_2022_with_nans.csv.gz")

# Renombrado de variables a español
heart_data <- heart_raw %>%
  rename(
    Estado = State, Sexo = Sex, SaludGeneral = GeneralHealth,
    DiasMalaSaludFisica = PhysicalHealthDays, DiasMalaSaludMental = MentalHealthDays,
    UltimoChequeoMedico = LastCheckupTime, ActividadFisica = PhysicalActivities,
    HorasSueno = SleepHours, DientesExtraidos = RemovedTeeth,
    InfartoMiocardio = HadHeartAttack, AnginaPecho = HadAngina, Ictus = HadStroke,
    Asma = HadAsthma, CancerPiel = HadSkinCancer, EPOC = HadCOPD,
    TrastornoDepresivo = HadDepressiveDisorder, EnfermedadRenal = HadKidneyDisease,
    Artritis = HadArthritis, Diabetes = HadDiabetes, DificultadAuditiva = DeafOrHardOfHearing,
    DificultadVisual = BlindOrVisionDifficulty, DificultadConcentracion = DifficultyConcentrating,
    DificultadCaminar = DifficultyWalking, DificultadVestirseBanarse = DifficultyDressingBathing,
    DificultadTareasDiarias = DifficultyErrands, EstadoFumador = SmokerStatus,
    UsoCigarrilloElectronico = ECigaretteUsage, TomografiaTorax = ChestScan,
    RazaEtnia = RaceEthnicityCategory, GrupoEdad = AgeCategory, AlturaMetros = HeightInMeters,
    PesoKilogramos = WeightInKilograms, IMC = BMI, ConsumidorAlcohol = AlcoholDrinkers,
    PruebaVIH = HIVTesting, VacunaGripeUltimoAno = FluVaxLast12, VacunaNeumococo = PneumoVaxEver,
    VacunaTetanos10Anos = TetanusLast10Tdap, ConductaAltoRiesgo = HighRiskLastYear, CovidPositivo = CovidPos
  )

# Tipado de variables y creación de HeartDisease
heart_data <- heart_data %>%
  mutate(
    EnfermedadCardiaca = factor(if_else(InfartoMiocardio == "Yes" | AnginaPecho == "Yes", "Yes", "No"), levels = c("
    Diabetes = factor(case_when(
      Diabetes %in% c("Yes", "No, pre-diabetes or borderline diabetes") ~ "Yes",
      Diabetes %in% c("No", "Yes, but only during pregnancy (female)") ~ "No",
      TRUE ~ NA_character_
    ), levels = c("No", "Yes")),
    SaludGeneral = factor(SaludGeneral, levels = c("Poor", "Fair", "Good", "Very good", "Excellent"), ordered = TRUE
    GrupoEdad = factor(GrupoEdad, levels = c(
      "Age 18 to 24", "Age 25 to 29", "Age 30 to 34", "Age 35 to 39", "Age 40 to 44", "Age 45 to 49",
      "Age 50 to 54", "Age 55 to 59", "Age 60 to 64", "Age 65 to 69", "Age 70 to 74", "Age 75 to 79", "Age 80 or old
    ), ordered = TRUE),
    DientesExtraidos = factor(DientesExtraidos, levels = c("None of them", "1 to 5", "6 or more, but not all", "All"
    EstadoFumador = factor(EstadoFumador, levels = c(
      "Never smoked", "Former smoker", "Current smoker - now smokes some days", "Current smoker - now smokes every d
    ), ordered = TRUE),
    UsoCigarrilloElectronico = factor(UsoCigarrilloElectronico, levels = c(
      "Never used e-cigarettes in my entire life", "Not at all (right now)", "Use them some days", "Use them every d
```

```
    ), ordered = TRUE),
    UltimoChequeoMedico = factor(UltimoChequeoMedico, levels = c(
      "Within past year (anytime less than 12 months ago)", "Within past 2 years (1 year but less than 2 years ago)"
      "Within past 5 years (2 years but less than 5 years ago)", "5 or more years ago"
    ), ordered = TRUE),
    CovidPositivo = factor(case_when(CovidPositivo == "No" ~ "No", str_detect(CovidPositivo, "positive|Yes") ~ "Yes"
    VacunaTetanos10Anos = factor(case_when(str_detect(VacunaTetanos10Anos, "^No") ~ "No", str_detect(VacunaTetanos10
    TotalEnfermedades = rowSums(across(c(Ictus, Diabetes, Asma, EPOC, EnfermedadRenal, Artritis, CancerPiel, Trastor
    across(where(is.character), as.factor)
  )

# Resumen del dataset
tabla_resumen <- tibble(
  Métrica = c("Total Observaciones", "Variables Totales", "Casos Cardiopatía (Yes)", "Casos Sin Cardiopatía (No)", "
  Valor = c(as.character(nrow(heart_data)), as.character(ncol(heart_data)), sum(heart_data$EnfermedadCardiaca == "Ye
            sum(heart_data$EnfermedadCardiaca == "No", na.rm = TRUE), paste(round(mean(heart_data$EnfermedadCardiaca
)

kable(tabla_resumen, caption = "Dimensiones iniciales y prevalencia de cardiopatías.")
```

Table 1. Dimensiones iniciales y prevalencia de cardiopatías.

Métrica	Valor
Total Observaciones	445132
Variables Totales	42
Casos Cardiopatía (Yes)	39751
Casos Sin Cardiopatía (No)	400360
Prevalencia Cardiopatía (%)	9.03 %

2.4. Detección y Corrección de Inconsistencias

Siguiendo con el análisis exploratorio se analiza la presencia de valores especiales, valores numéricos imposibles para las variables y la consistencia entre el índice de masa corporal, el peso y la altura.

```
# Comprobación de especiales, valores no positivos y consistencia de IMC
infinitos <- sapply(heart_data %>% select(where(is.numeric)), function(x) sum(is.infinite(x)))
menores_cero <- sapply(heart_data %>% select(where(is.numeric)), function(x) sum(x < 0, na.rm = TRUE))
inconsistencias_bmi <- sum(abs(heart_data$IMC - (heart_data$PesoKilogramos / heart_data$AlturaMetros^2)) > 1.5, na.r

# Corrección de inconsistencias biológicas imposibles a NA
heart_data <- heart_data %>%
  mutate(
    HorasSueno = if_else(HorasSueno <= 2 | HorasSueno >= 20, NA_real_, HorasSueno),
    AlturaMetros = if_else(AlturaMetros < 1.0, NA_real_, AlturaMetros)
  )
```

Tras la verificación, se comprobó la ausencia de valores infinitos y de valores negativos imposibles en las variables numéricas (constatando que únicamente `DiasMalaSaludFisica` y `DiasMalaSaludMental` presentan valores 0 válidos). Asimismo, no se detectaron discrepancias entre el IMC y el cociente peso/altura fuera del margen de tolerancia de 1.5 kg/m^2 atribuible al redondeo de unidades imperiales. Se sustituyeron por `NA` los valores biológicamente anómalos: horas de sueño ≤ 2 o ≥ 20 y estaturas de adultos inferiores a 1 metro.

2.5. Valores Perdidos y Observaciones Completas

A continuación se cuantifica el volumen de valores perdidos presentes en las variables y se evalúa la proporción de casos completos.

```
# Cálculo de NAs por columna
nas_columna <- colSums(is.na(heart_data))
pct_nas <- round((nas_columna / nrow(heart_data)) * 100, 2)

# Tabla maquetada con las 5 variables de mayor volumen de NAs
tabla_nas <- tibble(
  Variable = names(nas_columna),
  Num_NAs = nas_columna,
```

```
  Porcentaje = paste(pct_nas, " %")
) %>%
  filter(Num_NAs > 0) %>%
  arrange(desc(Num_NAs))

kable(head(tabla_nas, 5), caption = "Variables con mayor proporción de valores perdidos.")
```

Table 2. Variables con mayor proporción de valores perdidos.

Variable	Num_NAs	Porcentaje
VacunaTetanos10Anos	82516	18.54 %
VacunaNeumococo	77040	17.31 %
PruebaVIH	66127	14.86 %
TomografiaTorax	56046	12.59 %
CovidPositivo	50764	11.4 %

El análisis de casos completos revela que 277.447 observaciones (el 62.33% del total) carecen de valores perdidos en la totalidad de sus campos. Descartar las filas incompletas mediante un filtrado global supondría desechar casi un 38% de la muestra (asociado a preguntas optativas de inmunización o chequeos). Por tanto, se conservan las observaciones para el análisis general y se aplican procedimientos de imputación en las variables clave.

2.6. Detección Univariante de Outliers y Comparativa de Métodos

A continuación se aplican y comparan cuatro métodos de detección de outliers sobre el IMC (Índice de Masa Corporal): regla 3 sigma, identificador Hampel, regla del boxplot y percentiles (5% y 95%).

Para cada método se evalúa tanto el número de anomalías detectadas como los umbrales que definen los valores típicos para decidir como tratar a los valores extremos.

```
# Definición de reglas univariantes
reglasigma     <- function(x) abs(x - mean(x, na.rm = TRUE)) > 3 * sd(x, na.rm = TRUE)
reglahampel    <- function(x) abs(x - median(x, na.rm = TRUE)) > 3 * (1.4826 * median(abs(x - median(x, na.rm = TRUE
reglaboxplot   <- function(x) { q <- quantile(x, c(0.25, 0.75), na.rm = TRUE); x < q[1] - 1.5 * diff(q) | x > q[2] +
reglapercentil <- function(x) { p <- quantile(x, c(0.05, 0.95), na.rm = TRUE); x < p[1] | x > p[2] }

# Clasificación de outliers sobre IMC
heart_outliers <- heart_data %>%
  mutate(IMC_Sigma = reglasigma(IMC), IMC_Hampel = reglahampel(IMC),
         IMC_Boxplot = reglaboxplot(IMC), IMC_Percentil = reglapercentil(IMC))

# Umbrales y comparativa de métodos
m_imc <- mean(heart_data$IMC, na.rm = TRUE); s_imc <- sd(heart_data$IMC, na.rm = TRUE)
med_imc <- median(heart_data$IMC, na.rm = TRUE); mad_imc <- 1.4826 * median(abs(heart_data$IMC - med_imc), na.rm = T
q_imc <- quantile(heart_data$IMC, c(0.25, 0.75), na.rm = TRUE); p_imc <- quantile(heart_data$IMC, c(0.05, 0.95), na.

tabla_outliers <- tibble(
  Método = c("Regla 3 Sigma", "Identificador Hampel", "Regla Boxplot", "Percentiles (5% - 95%)"),
  Outliers_Detectados = c(sum(heart_outliers$IMC_Sigma, na.rm = TRUE), sum(heart_outliers$IMC_Hampel, na.rm = TRUE),
                          sum(heart_outliers$IMC_Boxplot, na.rm = TRUE), sum(heart_outliers$IMC_Percentil, na.rm = TR
  Porcentaje = paste(round(c(mean(heart_outliers$IMC_Sigma, na.rm = TRUE), mean(heart_outliers$IMC_Hampel, na.rm = T
                             mean(heart_outliers$IMC_Boxplot, na.rm = TRUE), mean(heart_outliers$IMC_Percentil, na.r
  Umbral_Inferior = round(c(m_imc - 3 * s_imc, med_imc - 3 * mad_imc, q_imc[1] - 1.5 * diff(q_imc), p_imc[1]), 2),
  Umbral_Superior = round(c(m_imc + 3 * s_imc, med_imc + 3 * mad_imc, q_imc[2] + 1.5 * diff(q_imc), p_imc[2]), 2)
)
kable(tabla_outliers, caption = "Comparativa de métodos de detección de outliers y umbrales en IMC.")
```

Table 3. Comparativa de métodos de detección de outliers y umbrales en IMC.

Método	Outliers_Detectados	Porcentaje	Umbral_Inferior	Umbral_Superior
Regla 3 Sigma	5071	1.28 %	8.87	48.19
Identificador Hampel	10657	2.69 %	10.85	44.03




Figure 1. Detección de outliers en IMC según cada método implementado

Método	Outliers_Detectados	Porcentaje	Umbral_Inferior	Umbral_Superior
Regla Boxplot	12339	3.11 %	12.70	43.18
Percentiles (5% - 95%)	38840	9.8 %	20.12	40.69

La regla 3 Sigma es poco agresiva: fija el umbral superior en 48.21, detectando solo un 1.28% de outliers debido a que la propia desviación típica se expande por la presencia de casos extremos. **El identificador Hampel es más agresivo:** al basarse en el MADM, sitúa el umbral superior en 44.03, identificando un 2.69% de anomalías. **La regla del Boxplot:** con un umbral superior de 43.33 y detectando un 3.11% de valores fuera de los bigotes. Esto pasa porque justo la variable IMC no es simétrica si no con una cola a la derecha. **Percentiles:** corta de forma fija el 10% de la muestra, con independencia de la distribución.

Tratamiento de los outliers identificados: Estos valores de IMC no representan errores de medición o transcripción (ya fueron filtrados antes), sino observaciones biológicamente reales correspondientes a pacientes con obesidad mórbida (grado III). Por tanto, no se eliminan del conjunto de datos, sino que se conservan para ser analizados mediante procedimientos y estadísticos en los siguientes bloques.

2.7. Representación Gráfica de Outliers por Método

Se representan gráficamente los valores de IMC frente a los métodos de detección empleados, mostrando los datos catalogados como típicos y los catalogados como outliers en distinto color.

Para evitar problemas de saturación visual en el gráfico debido al volumen de más de 400.000 observaciones, se utiliza una muestra aleatoria representativa de 5.000 observaciones con set.seed(123) y se aplica dispersión aleatoria con transparencia.

```r
# Preparación de datos
set.seed(123)

df_plot_outliers <- heart_outliers %>%
  select(IMC, starts_with("IMC_")) %>%
  filter(!is.na(IMC)) %>%
  slice_sample(n = 5000) %>%
  pivot_longer(
    cols = starts_with("IMC_"),
    names_to = "Metodo",
    values_to = "Es_Outlier"
  )

# Gráfico de puntos con jitter
ggplot(df_plot_outliers, aes(x = Metodo, y = IMC, color = !Es_Outlier)) +
  geom_point(position = "jitter", alpha = 0.4, size = 0.8) +
  labs(
    title = "Detección de Outliers en IMC por Método",
    x = "Método de Detección",
    y = "Índice de Masa Corporal (IMC)",
    color = "No es Outlier"
  )
```

El gráfico refleja de manera visual la sensibilidad de cada método.

Continuidad de los datos: Se observa que los valores superiores no son puntos aislados ni errores tipográficos, sino una nube continua que se extiende hasta valores extremos, confirmando que se trata de individuos con obesidad severa real que deben conservarse en la muestra.

- **Comparativa de cortes:** La regla 3 Sigma deja una franja alta de puntos clasificados como normales (debido a la varianza inflada), mientras que la regla del Boxplot y el identificador Hampel capturan de forma equilibrada la masa de valores atípicos.

2.8. Imputación de Variables Numéricas

Para garantizar la integridad de los análisis cuantitativos posteriores sin introducir sesgos artificiales, se aplica una imputación según la naturaleza de cada variable:

Variables AlturaMetros, PesoKilogramos, IMC: Hombres y mujeres siguen distribuciones distintas. Imputamos los valores perdidos directamente por la media según el Sexo del paciente.

Variables de descanso y salud percibida (`HorasSueno`**,** `DiasMalaSaludFisica`**,** `DiasMalaSalud`
Al concentrarse en valores típicos (7 horas de sueño y 0 días de enfermedad), se imputan mediante su mediana.

```r
# Imputación por Sexo (antropometría) y por Mediana (descanso y salud percibida)
heart_data <- heart_data %>%
  group_by(Sexo) %>%
  mutate(
    AlturaMetros   = coalesce(AlturaMetros, mean(AlturaMetros, na.rm = TRUE)),
    PesoKilogramos = coalesce(PesoKilogramos, mean(PesoKilogramos, na.rm = TRUE)),
    IMC            = coalesce(IMC, mean(IMC, na.rm = TRUE))
  ) %>%
  ungroup() %>%
  mutate(across(c(HorasSueno, DiasMalaSaludFisica, DiasMalaSaludMental), ~ coalesce(.x, median(.x, na.rm = TRUE))))
```

Tras el proceso de imputación, todas las variables numéricas continuas y discretas del estudio quedan con cero valores perdidos, listas para el análisis bivariante y multivariante.

2.9. 2.10. Estrategia de Análisis Estadístico

Para dar respuesta a las preguntas planteadas, estudiaremos el conjunto de datos en dos etapas:

- **Análisis Univariante:** Se examinará de forma individual la distribución y el comportamiento de cada variable del conjunto de datos. En el caso de las variables cuantitativas, se calculará estadísticos de tendencia central (media y mediana) y de dispersión clásicos y robustos (desviación típica, rango intercuartílico y MADM). Su representación visual se realizará mediante histogramas y gráficos de densidad, evaluando la normalidad de las distribuciones a través de QQ-plots. Las variables cualitativas y factores se caracterizarán mediante distribuciones de frecuencias absolutas y relativas, apoyadas en diagramas de barras.
- **Análisis Bivariante: :**Se estudiarán las relaciones entre variables adaptando la técnica a su naturaleza. Para variables categóricas se utilizarán tablas de contingencia, la prueba de χ^2 y la V de Cramér. En el caso de variables ordinales y cuantitativas no normales, se emplearán la correlación de Spearman y contrastes no paramétricos como Kruskal-Wallis y Wilcoxon, complementados con *boxplots cuando se requieran*. Dado el elevado tamaño muestral ($N > 10^5$), la interpretación se centrará en el tamaño del efecto más que en la significación de los p-valores, pero los test se efectuaran igualmente.

3. Resultados

En este apartado vamos a estudiar los datos como hemos mencionado en la sección anterior, dividiéndolo en dos subsecciones dependiendo de la naturaleza del análisis.




Figure 2. Distribución de las variables cuantitativas principales.

3.1. Análisis Univariante

A su vez, el análisis univariante lo vamos a estructurar dependiendo del tipo de dato de cada columna.

3.1.1. Variables Cuantitativas

El análisis univariante de las variables cuantitativas (`AlturaMetros`, `PesoKilogramos`, `IMC`, `HorasSueno`, `TotalEnfermedades`, `DiasMalaSaludFisica` y `DiasMalaSaludMental`) permite evaluar sus propiedades distribucionales, contrastando los estadísticos clásicos con estimadores robustos para mitigar el efecto de la asimetría y la presencia de colas pesadas.

Primero vamos a comenzar con unos plots de las distribuciones de cada variable, obviando `AlturaMetros` y `PesoKilogramos` porque son algo redundantes con `IMC`.

```
library(tidyverse)

heart_data %>%
  select(IMC, HorasSueno, DiasMalaSaludFisica, DiasMalaSaludMental) %>%
  pivot_longer(cols = everything(), names_to = "Variable", values_to = "Valor") %>%
  ggplot(aes(x = Valor)) +
  geom_histogram(bins = 30, fill = "steelblue", color = "white") +
  facet_wrap(~ Variable, scales = "free") +
  theme_minimal() +
  labs(x = NULL, y = "Frecuencia")
```

Con estos histogramas podemos sacar varias conclusiones. De las dos primeras gráficas es resaltable la tendencia a valores pequeños de ambas variables, pero también el sesgo presente hacia los valores extremos 30 y 0 por la naturaleza de las variables (al ser una respuesta subjetiva en una encuesta). Por otra parte, el histograma de horas de sueño también es peculiar en su medida, ya que se nota un cierto sesgo en ciertos números, pero la distribución es mucho más parecida a una normal. Por último, con el BMI pasa algo similar a esto último, ya que la distribución es bastante centrada.

Todo esto podemos verlo de mejor manera en la tabla `estadisticos_num` hecha previamente. Sin embargo, antes de comentar lo que vemos en esta tabla podemos ampliarla con algunos estadísticos que habíamos obviado previamente.

```r
skewness <- function(x) {
  x <- x[!is.na(x)]
  n <- length(x)
  m <- mean(x)
  s <- sd(x)
  sum((x - m)^3 / s^3) / n
}

kurtosis <- function(x) {
  x <- x[!is.na(x)]
  n <- length(x)
  m <- mean(x)
  s <- sd(x)
  sum((x - m)^4 / s^4) / n - 3
}

madm <- function(x) {
  1.4826 * median(abs(x - median(x, na.rm = TRUE)), na.rm = TRUE)
}

# Hago de nuevo la tabla por todas las imputaciones y demas cambios que hemos hecho
estadisticos_num <- heart_data %>%
  select(where(is.numeric)) %>%
  pivot_longer(cols = everything(), names_to = "Variable", values_to = "Valor") %>%
  group_by(Variable) %>%
  summarise(
    Media    = round(mean(Valor, na.rm = TRUE), 2),
    SD       = round(sd(Valor, na.rm = TRUE), 2),
    Mediana  = round(median(Valor, na.rm = TRUE), 2),
    MADM     = round(madm(Valor), 2),
    IQR      = round(IQR(Valor, na.rm = TRUE), 2),
    Sesgo    = round(skewness(Valor), 2),
    Curtosis = round(kurtosis(Valor), 2)
  )

kable(estadisticos_num, caption = "Estadísticos descriptivos y de forma para variables cuantitativas.")
```

Table 4. Estadísticos descriptivos y de forma para variables cuantitativas.

Variable	Media	SD	Mediana	MADM	IQR	Sesgo	Curtosis
AlturaMetros	1.70	0.11	1.70	0.12	0.15	0.07	0.02
DiasMalaSaludFisica	4.24	8.61	0.00	0.00	3.00	2.22	3.62
DiasMalaSaludMental	4.29	8.32	0.00	0.00	4.00	2.16	3.51
HorasSueno	7.05	1.39	7.00	1.48	2.00	0.67	4.81
IMC	28.53	6.19	28.29	4.94	6.60	1.47	5.35
PesoKilogramos	82.84	20.53	79.38	16.81	23.14	1.14	3.24
TotalEnfermedades	1.10	1.20	1.00	1.48	2.00	1.19	1.37

Al observar la tabla nos damos cuenta de varias cosas:

- En `DiasMalaSaludFisica` y `DiasMalaSaludMental`, la mediana y el MADM son 0 (la mayoría de los individuos dicen no tener días de enfermedad, como habíamos visto), mientras que la media se sitúa en torno a 4 días con una desviación típica de más de 8 días, claramente inflada por los individuos con patologías crónicas graves (30 días).
- En el `IMC` y el `PesoKilogramos`, la media es superior a la mediana debido a la presencia de casos con obesidad severa en la cola superior de la distribución.
- La variable `NumeroEnfermedades` es numérica pero es basicamente un factor, ya que hay poco rango de enfermedades que se pueden padecer. El valor medio y mediano ronda 1 enfermedad por persona pero su distribución no merece la pena representarse gráficamente por ahora.




Figure 3. Comparativa de gráficos QQ de normalidad para Altura, IMC y Horas de Sueño.

- En cuanto al sesgo, como cabría esperar, las variables más asimétricas son las que más sesgo tienen. Además, vemos que `IMC` tiene un sesgo no despreciable, lo que sugiere que la distribución quizás no es normal.
- La curtosis nos revela también que las colas de `IMC` y de `HorasSueno` son demasiado anchas, así que probablemente no nos encontramos ante distribuciones normales.
- `AlturaMetros` sí parece seguir algo parecido a una normal debido a su curtosis y sesgo.

Como último paso para este tipo de variables vamos a comprobar la normalidad con Q-Q plots, ya que los test de normalidad se ven muy penalizados por la cantidad tan grande de instancias que tenemos.

```
par(mfrow = c(1, 3))

qqPlot(heart_data$AlturaMetros,
       main = "A) Altura (Metros)",
       xlab = "Cuantiles teóricos",
       ylab = "Cuantiles muestrales",
       id = FALSE)

qqPlot(heart_data$IMC,
       main = "B) Índice de Masa Corporal",
       xlab = "Cuantiles teóricos",
       ylab = "Cuantiles muestrales",
       id = FALSE)

qqPlot(heart_data$HorasSueno,
       main = "C) Horas de Sueño",
       xlab = "Cuantiles teóricos",
       ylab = "Cuantiles muestrales",
       id = FALSE)
```

```
par(mfrow = c(1, 1))
```

Comparando los cuantiles de nuestra distribución con los de una gaussiana teórica vemos como el desplazamiento de las distribuciones de `IMC` y `HorasSueno` son lo suficientemente importantes como para descartar su normalidad, pero con altura vemos como su comportamiento puede ser lo suficientemente parecido como para asumir que sigue una distribución gaussiana.

3.1.2. Variables Binarias

Comenzando el análisis de las variables binarias, lo primero que vamos a hacer es el cálculo de la proporción de 'Sí' en cada una de las variables.

```r
variables_binarias <- heart_data %>%
  select(where(~ is.factor(.x) && nlevels(.x) == 2)) %>%
  names()

tabla_binarias <- heart_data %>%
  select(any_of(variables_binarias)) %>%
  pivot_longer(cols = everything(), names_to = "Variable", values_to = "Respuesta") %>%
  filter(!is.na(Respuesta)) %>%
  count(Variable, Respuesta, name = "Conteo") %>%
  group_by(Variable) %>%
  mutate(Porcentaje = round((Conteo / sum(Conteo)) * 100, 2)) %>%
  ungroup() %>%
  filter(Respuesta == "Yes") %>%
  arrange(desc(Porcentaje)) %>%
  select(Variable, N = Conteo, Porcentaje = Porcentaje)

kable(tabla_binarias, caption = "Frecuencia de factores de riesgo y patologías binarias.")
```

Table 5. Frecuencia de factores de riesgo y patologías binarias.

Variable	N	Porcentaje
ActividadFisica	337559	76.02
VacunaTetanos10Anos	241123	66.50
ConsumidorAlcohol	210891	52.91
VacunaGripeUltimoAno	209256	52.58
TomografiaTorax	165865	42.63
VacunaNeumococo	152488	41.43
Artritis	151148	34.16
PruebaVIH	129086	34.06
CovidPositivo	124313	31.52
TrastornoDepresivo	91410	20.67
DificultadCaminar	68081	16.17
Diabetes	71487	16.10
Asma	66694	15.04
DificultadConcentracion	50100	11.90
DificultadAuditiva	38946	9.17
EnfermedadCardiaca	39751	9.03
EPOC	35656	8.05
CancerPiel	35485	8.03
DificultadTareasDiarias	32447	7.74
AnginaPecho	26551	6.02
InfartoMiocardio	25108	5.68
DificultadVisual	23658	5.59
EnfermedadRenal	20315	4.58
ConductaAltoRiesgo	17185	4.36
Ictus	19239	4.34
DificultadVestirseBanarse	16813	3.99

Viendo esta tabla podemos destacar la presencia de distintos tipos de variables, con frecuencias más o menos grandes. Destaca el desbalance de nuestra variable objetivo, con un 9% de casos positivos, lo cual puede ser importante en un futuro al trabajar con modelos predictivos. Para tener una mejor idea de lo que estamos viendo en el resto de variables podemos fragmentar las variables en distintos grupos, siendo estos grupos hábitos, otras patologías y distintas medidas de prevención.

```r
#es necesario dividir en grupos primero

habitos_binarios <- c("ActividadFisica", "ConsumidorAlcohol")
patologias_binarias <- c("Ictus", "Diabetes",
                         "Asma", "EPOC", "EnfermedadRenal", "Artritis",
```

```
                        "CancerPiel", "TrastornoDepresivo")
prevencion_binarias <- c("TomografiaTorax", "PruebaVIH", "VacunaGripeUltimoAno",
                         "VacunaNeumococo", "VacunaTetanos10Anos", "ConductaAltoRiesgo", "CovidPositivo")
limitaciones_binarias <- c("DificultadAuditiva", "DificultadVisual", "DificultadConcentracion",
                           "DificultadCaminar", "DificultadVestirseBanarse", "DificultadTareasDiarias")

todas_binarias <- c(habitos_binarios, patologias_binarias, prevencion_binarias,limitaciones_binarias)


tabla_binarias_tematica <- heart_data %>%
  select(any_of(todas_binarias)) %>%
  pivot_longer(cols = everything(), names_to = "Variable", values_to = "Respuesta") %>%
  filter(!is.na(Respuesta)) %>%
  count(Variable, Respuesta, name = "Conteo") %>%
  group_by(Variable) %>%
  mutate(Porcentaje = round((Conteo / sum(Conteo)) * 100, 2)) %>%
  ungroup() %>%
  filter(Respuesta == "Yes") %>%
  mutate(
    BloqueTematico = case_when(
      Variable %in% habitos_binarios     ~ "1. Hábitos de Vida",
      Variable %in% patologias_binarias  ~ "2. Patologías y Antecedentes",
      Variable %in% prevencion_binarias  ~ "3. Prevención y Atención Médica",
      Variable %in% limitaciones_binarias  ~ "4. Limitaciones",
      TRUE                               ~ "Otros"
    )
  ) %>%
  select(BloqueTematico, Variable, Casos_Yes = Conteo, Prevalencia_Pct = Porcentaje) %>%
  arrange(BloqueTematico, desc(Prevalencia_Pct))


heart_data %>%
  select(any_of(todas_binarias)) %>%
  pivot_longer(cols = everything(), names_to = "Variable", values_to = "Respuesta") %>%
  filter(!is.na(Respuesta)) %>%
  count(Variable, Respuesta) %>%
  group_by(Variable) %>%
  mutate(Proporcion = n / sum(n)) %>%
  ungroup() %>%
  filter(Respuesta == "Yes") %>%
  mutate(
    BloqueTematico = case_when(
      Variable %in% habitos_binarios     ~ "1. Hábitos de Vida",
      Variable %in% patologias_binarias  ~ "2. Patologías y Antecedentes",
      Variable %in% prevencion_binarias  ~ "3. Prevención y Atención Médica",
      Variable %in% limitaciones_binarias  ~ "4. Limitaciones",
      TRUE                               ~ "Otros"
    )
  ) %>%
  ggplot(aes(x = reorder(Variable, Proporcion), y = Proporcion * 100, fill = BloqueTematico)) +
  geom_col(width = 0.7, show.legend = FALSE) +
  coord_flip() +
  facet_wrap(~ BloqueTematico, scales = "free", ncol = 1) +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Prevalencia de Indicadores Binarios por Dominio Clínico",
       x = NULL, y = "Prevalencia (%)")
```

De esta manera, el análisis de cada grupo se vuelve más fácil.

- Los hábitos de vida son solo 2, así que solo podemos comentar que son variables muy balanceadas.
- Las patologías tienden a ser más raras y por tanto conviene llevar cuidado con el desbalanceo de clases.
- El tercer gráfico correspondiente a la atención médica y prevenciones detaca que volvemos a tener variables más o menos balanceadas exceptuando `ConductaAltoRiesgo`.
- Por último exploramos las variables que expresan las dificultades en distintos ámbitos de la vida, que por supuesto son variables bastante desbalanceadas a favor del no.

Por último, conviene destacar que al igual que con diabetes alguna variable podría perder algo de información para volverse binaria y analizarla aquí pero a priori no parece que merezca la pena. Otra variable que puede ser interpretada como binaria es la de `Sexo` , pero su balance hace que no aporte nada analizarla aquí.




Figure 4. Prevalencia de factores binarios agrupados por dominios clínicos de la introducción.

```
heart_data %>% count(Sexo) %>% mutate(Porcentaje = round(n / sum(n) * 100, 2))
```

```
## # A tibble: 2 x 3
##   Sexo        n Porcentaje
##   <fct>   <int>      <dbl>
## 1 Female 235893       53.0
## 2 Male   209239       47.0
```

3.1.3. Variables Categóricas

Por último, estudiaremos las variables categóricas. Estas variables son mucho más difíciles de interpretar de manera univariante ya que no podemos calcular medias ni otros estadísticos,y como mucho podemos aprovechar que estas categorías estén algo ordenadas para extraer algo más de información.

Por tanto, vamos a comenzar graficando las variables que tienen cierto orden.

```
#por como funcionan los factores tenemos que usar patchwork para construir los subplots. Creamos una funcion para no

plot_ordinal <- function(var_name, title_text, bar_color = "#2b5c8f") {
  heart_data %>%
    filter(!is.na(.data[[var_name]])) %>%
    count(.data[[var_name]]) %>%
    mutate(Prop = (n / sum(n)) * 100) %>%
    ggplot(aes(x = .data[[var_name]], y = Prop)) +
    # Color fijo para todas las barras, eliminando el mapeo multicolor
    geom_col(fill = bar_color, width = 0.7, color = "#1a365d", linewidth = 0.2) +
    theme_minimal() +
    labs(title = title_text, x = NULL, y = "Porcentaje (%)") +
    theme(
      axis.text.x = element_text(angle = 25, hjust = 1, size = 8),
      plot.title = element_text(size = 10, face = "bold")
    )
}


g1 <- plot_ordinal("SaludGeneral", "Salud General", bar_color = "#2b5c8f")
g2 <- plot_ordinal("GrupoEdad", "Grupo de Edad", bar_color = "#2e8b57")
g3 <- plot_ordinal("DientesExtraidos", "Dientes Extraídos", bar_color = "#d97706")
g4 <- plot_ordinal("EstadoFumador", "Estado Fumador", bar_color = "#7c3aed")
g5 <- plot_ordinal("UsoCigarrilloElectronico", "Uso de Cigarrillo Electrónico", bar_color = "#0891b2")
```




Figure 5. Distribución porcentual conjunta de los factores ordinales respetando su jerarquía lógica.

```
g6 <- plot_ordinal("UltimoChequeoMedico", "Último Chequeo Médico", bar_color = "#be123c")


(g1 + g2) / (g3 + g4) / (g5 + g6)
```

En estos gráficos de barras podemos ver claramente la moda y la distribución general de la variables, pudiendo detectar sesgos. En estos casos hay variables claramente sesgadas (por ejemplo es muy claro que lo más común es que no hayan dientes extraidos) pero nada que resulte raro.

Por último vamos a graficar las dos últimas variables que no hemos tratado, aunque es más bien para tener una idea de qué son ya que además de ser dos variables que a priori no parecen muy importantes para la pregunta que queremos responder, son muy difíciles de interpretar.

```
#misma estructura que antes pero ahora ordenado de mayor a menor frecuencia. en el caso de estados seleccionamos sol

plot_nominal <- function(var_name, title_text, bar_color) {
  heart_data %>%
    filter(!is.na(.data[[var_name]])) %>%
    count(.data[[var_name]]) %>%
    mutate(
      Prop = (n / sum(n)) * 100,
      Categoria = fct_reorder(.data[[var_name]], Prop, .desc = TRUE)
    ) %>%
    ggplot(aes(x = Categoria, y = Prop)) +
    geom_col(fill = bar_color, width = 0.7, color = "#1a365d", linewidth = 0.2) +
    theme_minimal() +
    labs(title = title_text, x = NULL, y = "Porcentaje (%)") +
    theme(
      axis.text.x = element_text(angle = 25, hjust = 1, size = 8),
      plot.title = element_text(size = 10, face = "bold")
    )
}


g_raza <- plot_nominal("RazaEtnia", "Distribución por Raza / Etnia", bar_color = "#3b82f6")
g_region <- heart_data %>%
```




Figure 6. Distribución porcentual de las variables nominales (Raza y Región) ordenadas por frecuencia descendente.

```
  filter(!is.na(Estado)) %>%
  mutate(Estado = fct_lump_n(Estado, n = 15, other_level = "Otros")) %>%
  count(Estado) %>%
  mutate(
    Prop = (n / sum(n)) * 100,
    Estado = fct_reorder(Estado, Prop, .desc = TRUE)
  ) %>%
  ggplot(aes(x = Estado, y = Prop)) +
  geom_col(fill = "#10b981", width = 0.7, color = "#1a365d", linewidth = 0.2) +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Distribución Geográfica (Top 15 Estados)", x = NULL, y = "Porcentaje (%)") +
  theme(
    axis.text.x = element_text(angle = 25, hjust = 1, size = 9),
    plot.title = element_text(size = 11, face = "bold")
  )


g_raza + g_region
```

Para que el gráfico sea legible se ha tenido que optar por visualizar solo los 15 estados más representados, pero se entiende que no hay mucha variabilidad entre estados.

3.2. Análisis Bivariante

Tras ver una a una las variables y sus distribuciones, ahora podemos comenzar a ver las relaciones dos a dos entre variables para poder establecer conexiones. Dividiremos este apartado en dos, el primero intentando ver las relaciones que hay entre nuestras variables explicativas, para poder encontrar variables redundantes susceptibles a eliminación para futuros modelos, y el segundo, estableciendo relaciones entre la variable objetivo y las demás variables para poder ver que variables afectan más a la aparición de enfermedades cardiovasculares.

3.2.1. Redundancia y Multicolinealidad entre Variables Explicativas

La cantidaad de pares entre las variables explicativas es muy grande, así que vamos a hacer selecciones lógicas de variables que a priori son susceptibles a estar correlacionadas y comprobarlo con las herramientas estadísticas adecuadas.

El primer grupo de variables que vamos a estudiar es del subgrupo de variables que representan dificultades, podemos pensar que las mismas dificultades motoras pueden llegar a traducirse a dificultad al andar, a vestirse o bañarse, y a hacer tareas en general. Por tanto, vamos a calcular el coeficiente V de Cramer para tener una medida de que tan redundantes son las variables.

```
assocstats(table(heart_data$DificultadCaminar, heart_data$DificultadVestirseBanarse, useNA = "no"))
```

```
##                     X^2 df P(> X^2)
## Likelihood Ratio 43690  1        0
## Pearson          64745  1        0
##
## Phi-Coefficient   : 0.393
## Contingency Coeff.: 0.366
## Cramer's V        : 0.393
```

```
cat('_____________________________\n')
```

```
## _____________________________
```

```
assocstats(table(heart_data$DificultadCaminar, heart_data$DificultadTareasDiarias, useNA = "no"))
```

```
##                     X^2 df P(> X^2)
## Likelihood Ratio 45554  1        0
## Pearson          64328  1        0
##
## Phi-Coefficient   : 0.392
## Contingency Coeff.: 0.365
## Cramer's V        : 0.392
```

```
cat('_____________________________\n')
```

```
## _____________________________
```

```
assocstats(table(heart_data$DificultadVestirseBanarse, heart_data$DificultadTareasDiarias, useNA = "no"))
```

```
##                     X^2 df P(> X^2)
## Likelihood Ratio 36334  1        0
## Pearson          75154  1        0
##
## Phi-Coefficient   : 0.424
## Contingency Coeff.: 0.39
## Cramer's V        : 0.424
```

Los valores del estadístico no son despreciables, pero tampoco son altos, puesto que no superan siquiera el 0.5. Por tanto, dos a dos, podemos decir que las variables tengan una correlación suficiente como para eliminar alguna.

El siguiente grupo de variables a estudiar es uno formado por la salud general autopercibida y las variables de dias de malestar, tanto físico como mental. Para este caso, altener una variable categórica y otra numérica una opción sería hacer un ANOVA, pero en este caso es más práctico aprovechar que el factor está ordenado y utilizar el test de Kruskal-Wallis. Para complementar esta información también utilizaremos el test de Spearman.

```r
kruskal.test(DiasMalaSaludFisica ~ SaludGeneral, data = heart_data)
```

```
##
##  Kruskal-Wallis rank sum test
##
## data:  DiasMalaSaludFisica by SaludGeneral
## Kruskal-Wallis chi-squared = 96843, df = 4, p-value < 2.2e-16
```

```r
cor.test(as.numeric(heart_data$SaludGeneral), heart_data$DiasMalaSaludFisica, method = "spearman")
```

```
##
##  Spearman's rank correlation rho
##
## data:  as.numeric(heart_data$SaludGeneral) and heart_data$DiasMalaSaludFisica
## S = 2.0516e+16, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
## sample estimates:
##       rho
## -0.4069589
```

```r
kruskal.test(DiasMalaSaludMental ~ SaludGeneral, data = heart_data)
```

```
##
##  Kruskal-Wallis rank sum test
##
## data:  DiasMalaSaludMental by SaludGeneral
## Kruskal-Wallis chi-squared = 23473, df = 4, p-value < 2.2e-16
```

```r
cor.test(as.numeric(heart_data$SaludGeneral), heart_data$DiasMalaSaludMental, method = "spearman")
```

```
##
##  Spearman's rank correlation rho
##
## data:  as.numeric(heart_data$SaludGeneral) and heart_data$DiasMalaSaludMental
## S = 1.7663e+16, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
## sample estimates:
##       rho
## -0.2113354
```

El test de Kruskal con p valor bajo nos dice que hay cierta relación entre las variables, pero es Spearman el que cuantifica como de fuerte es esta relación. Valores negativos entre -0.2 y -0.5 nos permiten concluir que la relación es moderada, pero no hay redundancia, además de que la relación de estas variables es inversa (mayor salud general se traduce en menos dias malos). Además, podemos concluir que la salud física es más influyente en la percepción de la salud general.

Relacionado con esto tambien podemos comparar las variables `DiasMalaSaludMental` con `TrastornoDepresivo`. Esto lo haremos de manera similar a la anterior, utilizando el test de Wilcoxon para comparar una variable numérica con una binaria, y apoyándonos en Spearman para identificar la intensidad de la relación.

```r
wilcox.test(DiasMalaSaludMental ~ TrastornoDepresivo, data = heart_data)
```

```
##
##  Wilcoxon rank sum test with continuity correction
##
```

```
## data:  DiasMalaSaludMental by TrastornoDepresivo
## W = 7463342912, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

```
cor.test(as.numeric(heart_data$TrastornoDepresivo), heart_data$DiasMalaSaludMental, method = "spearman")
```

```
##
##  Spearman's rank correlation rho
##
## data:  as.numeric(heart_data$TrastornoDepresivo) and heart_data$DiasMalaSaludMe
## S = 8.2362e+15, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
## sample estimates:
##       rho
## 0.4289543
```

De nuevo, la relación parece ser existente, pero Spearman nos dice que la magnitud no es lo suficientemente grande como para ser redundante. Destacar que como cabría esperar una relación directa entre las dos variables, en contraposición a la de salud general que era inversa.

El último bloque que vamos a tratar es el de fumadores y fumadores electrónicos o vaper. Claramente son variables que pueden estar muy relacionadas así que vamos a utilizar la V de Cramer para comparar ambas variables.

```
assocstats(table(heart_data$EstadoFumador, heart_data$UsoCigarrilloElectronico, useNA = "no"))
```

```
##                     X^2 df P(> X^2)
## Likelihood Ratio 34667  9        0
## Pearson          38922  9        0
##
## Phi-Coefficient   : NA
## Contingency Coeff.: 0.296
## Cramer's V        : 0.179
```

El valor del estadístico es bastante bajo, lo cual nos dice que a priori la relación entre estas dos variables no es nada importante.

Por último, destacar que otras variables que van a tener cierta correlación por construcción son las que literalmente hemos construido a partir de otras variables, como `IMC` o `TotalEnfermedades`. Estas variables no las hemos estudiado aquí porque su cometido es el contrario, intentar resumir el contenido de varias variables para enriquecer el dataset. Dependiendo del modelo con el que se quiera trabajar resulta más útil quitar variables redundantes o generar nuevas variables que pueden resumir mejor la información.

3.2.2. Relación con la variable objetivo

3.3. Análisis Multivariante

4. Conclusión

This section is not mandatory, but can be added to the manuscript if the discussion is unusually long or complex.

Funding: Este trabajo no ha recibido financiación externa.

Institutional Review Board Statement: Not applicable

Informed Consent Statement: Not applicable

Data Availability Statement: Los datos utilizados están disponibles en el repositorio de GitHub del proyecto.

Conflicts of Interest: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.