

线性代数(2024春)(Linear Algebra)

作业6

1. 给定正定矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ 。证明

(1) 函数

$$q(u) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & x_1 \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & x_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & x_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & x_n \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n & 0 \end{vmatrix}, \quad \forall u = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

是一个负定的二次型；(提示：利用 $TA^tT = I_n$ 和分块矩阵证明 $q(u) < 0$ 如果 $u \neq \vec{0}$)

(2) $|A| \leq \Delta_{n-1}a_{nn}$ ；(提示：利用(1)和行列式是列向量的多线性函数)

(3) $|A| \leq a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$ 。

2. 给定斜称双线性型

$$f(u, v) = 2x_1y_3 - 2y_3x_1 - 3x_2y_3 + 3x_3y_2 + 4x_2y_4 - 4x_4y_2 - 5x_3y_4 + 5x_4y_3,$$

其中 $u = (x_1, x_2, x_3, x_4), v = (y_1, y_2, y_3, y_4) \in \mathbb{R}^4$ 。求 f 的规范基和它的标准型，并用矩阵的语言来解释。

3. 设 U, V, W 为 \mathbb{F} 上的有限维向量空间。如果 $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{F}}(V, W)$ 和 $g \in \mathcal{L}_{\mathbb{F}}(U, V)$ ，证明 $\dim \operatorname{Im} f \circ g \leq \dim \operatorname{Im} f$ 和 $\dim \operatorname{Im} f \circ g \leq \dim \operatorname{Im} g$ 。

4. 定义 $\theta : \mathcal{P}_n[x] \rightarrow \mathcal{P}_n[x]$ 为

$$\theta(f) = x \frac{d}{dx}(f) - f, \quad \forall f \in \mathcal{P}_n[x].$$

证明 θ 是一个线性映射并求 $\ker \theta$, $\operatorname{Im} \theta$ 和 $\operatorname{rank} \theta$ 。

5. 设 a_1, a_2, \dots, a_n 是 \mathbb{F} 中的 n 个不同的元素。定义线性映射 $\vartheta : \mathcal{P}_n[x] \rightarrow \mathbb{F}^n$ 为

$$\vartheta(f) = (f(a_1), f(a_2), \dots, f(a_n)), \quad \forall f \in \mathcal{P}_n[x].$$

写出 ϑ 在 $\mathcal{P}_n[x]$ 的基 $\{1, x, \dots, x^{n-1}\}$ 和 \mathbb{F}^n 的标准基 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ 下的矩阵。证明 ϑ 是一个向量空间的同构并写出 ϑ^{-1} 。