

品牌名: 一念三轴·Yiinian Triaxis **作者:** 秦枫 (一念三轴原创作者) **商业支持:** 圆诺咨询 **理论描述:** 依恋 × 九型 × 客体关系三轴融合咨询框架 v2.2

适用对象: 情感咨询师、伴侣治疗师、亲密关系教练、个人成长陪伴者核心理念: 依恋是”关系操作系统”, 九型是”人格内核”, 客体关系是”内在剧本”, 三轴合一才能在咨询中既看清行为模式, 也看穿背后的动机驱动力与早期关系印记文档定位: 可直接落地的咨询师工作手册, 含理论、评估、流程、话术与干预技术框架性质: 本套件作者基于临床整合实践提出的**工作模型 (working model)**, 不是经过严格实证检验的学术理论, 三轴同时正交的具体整合方式为作者原创

目录

- 第一部分: 理论三轴 (依恋 × 九型 × 客体关系)
 - 1.1 依恋理论 (Bowlby-Ainsworth-Hazan-Shaver)
 - 1.2 九型人格 (Ichazo-Riso-Hudson)
 - 1.3 三个理论视角的整合
 - 1.4 三轴融合的必要性: 为什么必须升级 (v2.2 重构)
 - 1.5 三轴的整合框架 (v2.2 重构)
 - * 1.5.0 从“9 型”到“3 防御位”到“12 构型”: 本套件的结构设计逻辑 (v2.2 新增)
 - * 1.5.1 三个理论回答三个不同的问题 (深化版)
- 第二部分: 映射矩阵
 - 2.1 依恋象限 × 九型主型映射表
 - 2.2 翼型、压力点与健康层级
 - 2.3 关系中的”双人舞”-典型配对
- 第三部分: 咨询理论架构
 - 3.1 三轴诊断模型 (焦虑轴 × 回避轴 × 九型主型 + 客体关系维度)
 - 3.2 核心恐惧解码
 - 3.3 九型 × 客体关系: 从“为什么”到“内在世界”
 - 3.4 防御机制的三层识别
 - 3.5 整合成长路径 (三轨模型, 本次升级)
- 第四部分: 咨询操作指南
 - 4.1 三轴递进路径:6 阶段咨询流程
 - 4.2 各阶段关键技术
 - 4.3 伴侣咨询的特殊处理
- 第五部分: 典型构型干预脚本
 - 5.1 焦虑 × 2 号助人型
 - 5.2 回避 × 5 号观察型
 - 5.3 混乱 × 4 号浪漫型

- 5.4 焦虑 × 6 号疑惑型
- 5.5 回避 × 8 号挑战型
- 第六部分: 工具清单与评估模板
 - 配套模块: 11-工具清单与评估模板 / 一评估量表、记录模板、来访者自助工具
- 附录: 咨询师自我校准

第一部分: 理论三轴 (依恋 × 九型 × 客体关系)

1.1 依恋理论

依恋 (Attachment) 是 Bowlby 在 1969 年提出的进化生物学概念, 后由 Ainsworth 通过“陌生情境实验”建立了实证基础, Hazan & Shaver (1987) 将其延伸至成人浪漫关系。Mary Main (1991) 进一步发展出“成人依恋访谈 (AAI)”, 让成人依恋评估有了可操作工具; Fonagy 等人在 1991 提出的心智化理论 (Mentalization) 则为依恋与精神分析架起桥梁。依恋理论与客体关系理论的整合已有成熟学术传统, 经典著作推荐 West & Sheldon-Kell (1988) 《Attachment Theory and Psychoanalysis》; 临床应用可参考 Bowlby (1988) 《A Secure Base》。

两个核心维度 (Brennan, Clark & Shaver, 1998 ECR 量表):

- 焦虑维度 (Attachment Anxiety): 对被抛弃、被忽视的恐惧程度
- 回避维度 (Attachment Avoidance): 对亲密、身体/情感接近的不舒适程度

由此划分出四种成人依恋风格:

风格	焦虑	回避	核心体验	关系策略
安全型 (Secure)	低	低	“我值得被爱, 他人基本可靠”	灵活: 能靠近也能独立
焦虑型 (Pre-occupied)	高	低	“我不够好, 需要不断确认爱”	黏附、追、情感激活
回避型 (Dismissive)	低	高	“我不需要, 他人不可靠”	退缩、去激活、自我依赖
混乱型 (Fearful)	高	高	“我想要但我怕靠近会受伤”	推拉、解离、创伤重演

关键洞见: - 依恋风格不是“性格”, 而是关系中的情绪调节策略 - 它形成于早期与主要照顾者的互动, 但可在后续关系中被修复 - 它在压力下会激活, 稳定状态下会“休眠”

1.2 九型人格

九型人格 (Enneagram) 的现代体系由智利心理学家 Claudio Naranjo 从 Oscar Ichazo 处继承, Riso & Hudson 做了体系化发展。在临床整合层面, Arthur (2008) 《Attachment Styles and Enneagram Types: Development and Testing of an Integrated Typology》首次对依恋风格与九型类型进行实证整合, 验证了某些类型组合 (如焦虑型依恋与 2 号、6 号、9 号) 的高共现率, 为本套件的“依恋 × 九型”轴提供了参考依据。

每个人都有一种主导的”主型”(Type 1-9), 它由核心恐惧和核心欲望定义, 并配以特定的注意力习惯与防御机制。

类型	核心恐惧	核心欲望	注意力习惯	典型防御
1 完美型	不完美、错误	善良、正直	看到”应该”与”错误”	压抑冲动、反刍
2 助人型	不被需要、不被爱	被爱、被需要	关注他人需要	压抑自我、投射需求
3 成就型	无价值、不成功	有价值、值得赞赏	看向目标与形象	角色扮演、否认情感
4 浪漫型	平凡、无独特性	找到自我、独特	关注”缺失”与”意义”	内摄、抑郁式退缩
5 观察型	无能、被侵占	有能力、有空间	退入内心思考	与身体脱节、分离
6 疑惑型	无支持、被背叛	安全感、归属	看向威胁与权威	反恐惧、投射怀疑
7 享乐型	痛苦、被限制	自由、满足	看向可能性与逃避	合理化、升华、转移
8 挑战型	被控制、被伤害	自我保护、掌控	看向权力与公平	反向形成、否认脆弱
9 和平型	冲突、分离	平静、合一	看向他人节奏	麻醉、自我遗忘

关键洞见: - 九型描述的是注意力的”默认方向”和情绪的”默认回避” - 每个类型都有压力方向(解离态)与安全方向(整合态) - 类型是”倾向”而非”牢笼”, 但它确实塑造了来访者对亲密的想象方式

1.3 三个理论视角的整合

前两节分别介绍了依恋理论和九型人格, 本节先给出一个”鸟瞰”, 把三个理论的’分工’说清楚(每个理论的详细内容见 1.4、1.5):

理论	核心问题	类比	细节
依恋	来访者在关系中怎么做?(行为)	路径	1.1
九型	来访者为什么这样做?(动力)	目的地	1.2
客体关系	来访者内在的世界长什么样?(结构)	地图	1.4、1.5

一个比喻: - 依恋告诉你来访者的”GPS 路径”(追 / 躲 / 推拉) - 九型告诉你他的”目的地”(他想去哪里、他害怕去不了哪里) - 客体关系告诉你他的”地图”(他以为世界长什么样、他以为别人会怎么对他)

整合的关键洞见: > 三个理论不是”三个流派让咨询师选”, 而是三个互补的视角, 缺一不可。
> 1.4 论证”为什么必须三轴融合”, 1.5 给出”三轴如何整合操作”。

1.4 三轴融合的必要性的：为什么必须升级 (v2.2 重构)

1.4.1 双轴的局限

在情感咨询实践中，依恋 × 九型 (双轴) 是常见的整合框架。但临床经验显示，双轴在 3 个关键场景下不够 (本节基于整合实践经验，非历史性声明)：

场景 A: 关系中的”重复” - 双轴能识别”他在关系中追” (依恋)+ ”他怕不被需要” (九型 2 号) - 但无法解释: 为什么他在不同的伴侣身上重复同样的剧本? - 双轴看不到”来访者对”亲密”的内在想象” - 这部分由客体关系回答

场景 B: 咨询师的”反移情” - 双轴能给来访者”分类”，但解释不了咨询师为什么被这个来访者激活 - 经典例: 咨询师对 2 号来访者感到莫名的疲惫 - 这是来访者”投射性认同”的结果 - 客体关系给出了”投射性认同”这个机制，让咨询师能识别 + 命名自己的反移情

场景 C: 咨询中的”破裂” - 双轴能描述”咨询师迟到 5 分钟，来访者情绪崩溃”是”焦虑型激活” - 但无法解释: 为什么这种”激活”会反复发生，且修复后还会再发生? - 客体关系给出了”内在图被验证”的机制 - ”5 分钟迟到”激活的是”他人忽略我”这个结构性图

1.4.2 为什么必须加第三轴 (客体关系)

第三轴 (客体关系) 回答了双轴回答不了的 3 个核心问题:

双轴回答不了的问题	客体关系的回答
“为什么他在不同伴侣身上重复同样的剧本?”	因为他有内在客体关系图 (”自体-客体”配对)，它在早年形成，持续到当下，自动筛选/塑造新关系
“为什么咨询师会被这个来访者激活?”	因为投射性认同 - 来访者把”自己的 X”放到咨询师身上，咨询师在不知不觉中接受了这种投射
“为什么破裂会反复发生?”	因为内在图被验证 - 破裂事件激活了早年的”我不行/他人不行”图，修复只是暂时的，新事件会再次激活

核心论点: > 依恋告诉你”他在做什么” (行为) > 九型告诉你”他为什么这样做” (动力) > 客体关系告诉你”他以为的世界长什么样” (结构) > > 没有第三轴，你永远只能”修行为”，无法”修结构”。

1.4.3 三轴缺一不可的临床证据

试想一个咨询情境: 来访者每次都在”咨询师迟到 5 分钟”后陷入情绪低落。

双轴分析: - 只问依恋: 这是焦虑型，被抛弃感被激活，建议自我安抚 - 只问九型: 这可能是 4 号，他在意”被特殊对待” - 双轴融合: 焦虑型依恋 + 4 号九型 = ”他对”不被特殊对待”的恐惧被激活”

问题: 双轴分析到此为止，但修复后下次还会再发生。

三轴分析: - (依恋) 焦虑型对”被抛弃”的高敏感 + - (九型) 4 号对”不被特殊对待”的恐惧 + - (客体关系) 他内在的”他人忽略我”表征的”被验证”

三轴的临床价值: > - 依恋层: 命名激活，身体调节 (短效) > - 九型层: 看见”我需要被特殊对待”的故事 (中效) > - 客体关系层: 修补内在图 (”这次咨询师迟到了 5 分钟，但他还在，他没有忘记我 - 这是新的内在图，不是’他人忽略我’的验证”)(长效)

关键: 没有客体关系层，修复只是”安慰”，不是”修补”。安慰下次还来，修补能改变来访者的内在结构。

双轴升级三轴，不是”否定双轴”，而是”补完”：

框架	能做的	不能做的
单一理论 (只用依恋)	看见行为	看不见动力、看不见结构
双轴 (依恋 + 九型)	看见行为 + 动力	看不见结构、无法长效修补
三轴 (依恋 + 九型 + 客体关系)	看见行为 + 动力 + 结构	能长效修补内在图

1.5 三轴的整合框架 (v2.2 重构)

本节是 1.4 论证的具体操作-“三轴如何在咨询中实际工作”。

1.5.0 从“9 型”到“3 防御位”到“12 构型”：本套件的结构设计逻辑 (v2.2 新增)

为什么需要“防御位”？

九型人格原本是 9 个独立类型，但在临床使用中，纯九型描述会产生信息过载（“3 号 × 依恋焦虑 × 混乱客体关系 = 27 个细分场景”可能表达过细反而不利于临床决策）。本套件做了一个结构化简化：

将 9 个类型重新映射为 **3 个防御位水平**：- **对抗位 (对抗型)**：1 号、3 号、8 号-面对压力的默认反应是“冲” / 控制 / 取得 - **退行位 (退出型)**：4 号、5 号、9 号-面对压力的默认反应是“退” / 隔离 / 溶解 - **警觉位 (调节型)**：2 号、6 号、7 号-面对压力的默认反应是“调节他人” / 防备 / 分散

为什么能这么映射？

这 3 个位置本质是**不同防御风格** (Vaillant 的防御成熟度 + Freud 的原始防御)：“冲”、“退”、“调节”是人类面对威胜性焦虑的三个基本方向。九型 9 个类型不创造新的防御机制，只是这三种防御的细化与人格化 (详细映射表见 1.5.1 后表)。

产生的结构：12 构型

防御位映射出后，**4 种依恋 × 3 种防御位 = 12 构型**：

防御位 ↓ / 依恋 →	安全型	焦虑型	回避型	混乱型
对抗位 (1/3/8)	安全-对抗	焦虑-对抗	回避-对抗	混乱-对抗
退行位 (4/5/9)	安全-退行	焦虑-退行	回避-退行	混乱-退行
警觉位 (2/6/7)	安全-警觉	焦虑-警觉	回避-警觉	混乱-警觉

这 12 个构型就是本套件的“主菜单”。详细构型展开见第五部分 (5.1-5.5) + 10-客体关系专题包-12 构型内在图谱。

重要提示：现实个例很少是某个“纯”构型，多数是 1-2 个构型的过渡区。但 12 构型是临床定位的“默认词汇”，会极大提高沟通效率。

1.5.1 三个理论回答三个不同的问题 (深化版)

维度	依恋	九型	客体关系
理论源头	进化生物学 / 发展心理学	类型学 / 精神分析	精神分析 (克莱因派/自体心理学)
关注点	关系中的行为策略	行为的动力来源	行为的内在世界结构
时间视角	当下激活 (成年)	长期倾向 (终身)	长期表征 (早年 → 持续到当下)

维度	依恋	九型	客体关系
临床抓手	身体反应、行为模式	核心恐惧、防御	移情、反移情、内在图
典型技术	安全基地、激活调节	暴露核心恐惧、整合方向	投射性识别、温尼科特时刻、破裂-修复

1.5.2 客体关系的 5 个核心概念

这 5 个概念是理解“三轴”的关键。详细图谱见 10-客体关系专题包/, 操作技术见 10-客体关系专题包-5 技术自评卡.md:

概念 1: 内在客体关系 (Internal Object Relations) - 自体表征: “我是什么样的” - 客体表征: “他人是什么样的” - 关系模板: 在新关系中期待、解读、行为的固定模式 - 例: 童年被忽视 → 自体“我不重要” + 客体“他人忽略我” → 关系模板“在关系中我会被忽略”

概念 2: 投射性认同 (Projective Identification) - 把自己的某部分 (难以接受的) 放到对方身上 - 双向-对方不知不觉中接受, 共同制造“验证了投射”的情境 - 这是咨询师反移情 (countertransference) 的核心机制

概念 3: 分裂 (Splitting) - “偏执位”特征: 把好与坏完全分开 (全好/全坏互不相关) - 早期未整合的心智只能容纳“全好”或“全坏” - 临床表现: 理想化与贬低的快速切换

概念 4: 温尼科特的“足够好的母亲” - 完美不是好, “足够好”才是好 - 母亲不必永远正确、不必永远在场、不必永远共情 - 不完美的修复 (rupture-repair cycle) 是最深层的疗愈

概念 5: 自体客体 (Selfobject) 经验 (Kohut) - 一种被体验为自己的一部分的人 (虽然客观是另一个人) - 三种功能: 镜映 (我被看到)、理想化 (我仰望)、孪生/同类感 (我属于) - 自体客体的失败 → 3 号/4 号“必须特别”、5 号/8 号“必须强”、9 号“必须消失”

1.5.3 三轴的递进路径 (从身体到结构)

三轴不是“平行并列”的, 而是有递进路径的——从身体到动力再到结构, 咨询师不同时期侧重不同。

结构层: 客体关系

↑ 决定“他以为的世界长什么样”

| → 这一层改变最难, 但最长效

|

动力层: 九型

↑ 决定“他为什么这样做”

| → 这一层可缓慢改变

|

身体层: 依恋

决定“他在关系中怎么做”

→ 这一层最快变, 但最不稳定

为什么按这个顺序递进?

维度	可改变性	改变方式	临床例
依恋 (身体)	快变	给安全感 / 激活调节	来访者这周从“追”变成“等”了
九型 (动力)	慢变	觉察核心恐惧 / 整合方向	来访者慢慢看到“我不是‘被需要’才有价值”

维度	可改变性	改变方式	临床例
客体关系 (结构)	最难变	修补内在图 (温尼科特/破裂-修复)	来访者真的相信” 他人会留下来”

临床含义: - 短期咨询 (8-20 次): 主要工作身体层 + 部分动力层 - 中期咨询 (20-50 次): 三层都做 - 长期咨询 (50+ 次): 结构层是核心工作, 这是最难但最长效的改变

反模式 (必须避免): - 跳过身体层直接做结构层: 在来访者还没安全感时, 直接做” 修补内在图” 会失败 - 只做身体层不做结构层: 能” 安抚情绪”, 但结构性” 重复” 不会改变 - 顺序铁律: 先依恋 (给安全感) → 再九型 (觉察动力) → 最后客体关系 (修补结构)(修补结构)

1.5.4 三轴的对话机制 (整合方法)

三轴如何” 对话”? - 一个来访者的三轴如何整合成一个连贯的理解?

整合公式 (三轴) = 依恋激活 × 九型动力 × 客体关系结构

例: 焦虑 × 2 号 × ”被忽略的内在图”

轴	内容
依恋	焦虑型 (高焦虑、高敏感)
九型	2 号助人型 (核心恐惧: ”不被需要”、核心欲望: ”被爱”)
客体关系	自体: ”我是有用的” + 客体: ”他人是脆弱的、需被照顾的” + 关系模板: ”我付出 = 他爱我”

三轴” 对话”: - 依恋提供” 激活机制”: 焦虑型对” 被抛弃” 的高敏感, 让 2 号的” 不被需要” 恐惧特别容易被激活 - 九型提供” 动力核心”: 2 号的” 被需要 = 被爱” 等式, 是行为的内在发动机 - 客体关系提供” 结构图”: 自体” 我是有用的” + 客体” 他人需被照顾”, 是行为的内在剧本

三者如何互相强化: - 焦虑型被” 伴侣可能不需要我” 激活 (依恋) - 2 号立刻用” 我必须更付出” 回应 (九型) - 内在图被验证: ” 伴侣确实不需要我” (客体关系) - 循环强化-这就是为什么双轴看不见这个循环的全貌, 因为结构层 (客体关系) 缺失

临床干预如何” 三轴对话”: - 依恋层: ” 我现在感到你 (来访者) 的焦虑激活了-你能命名它的强度吗?” (身体觉察) - 九型层: ” 你刚刚说’ 如果我不再付出, 我还有什么价值’ -这是你 2 号的核心故事吗?” (动力觉察) - 客体关系层: ” 你内在有一个图: ’ 他人都需要我, 否则就不要我’ -但今天我 (咨询师) 在这里, 不是因为你’ 有用’, 而是因为我在-这是新的图, 你能接住吗?” (结构修补)

三个干预针对三个不同的层, 缺一不可。

1.5.5 三轴冲突时的优先级

当三轴” 打架” 时 (对同一个行为, 三轴的解释不同), 咨询师该信谁?

例: 来访者说” 我不需要任何人”

- 依恋层解释: 回避型在用” 去激活” 策略保护自己
- 九型层解释: 5 号在” 与身体脱节” -他真的不需要情感连接
- 客体关系层解释: 他内在图是” 他人都不可靠, 自己最安全” -他在保护自己的内在图

优先级铁律: 安全 > 结构 (在安全没保障前, 不做结构工作)

优先级	适用情况	先做什么
1. 安全 (依恋)	来访者当下激活、有自伤/自杀风险、严重耗竭	先稳定 (安全感、激活调节)
2. 动力 (九型)	来访者有基本安全、但核心恐惧反复激活	觉察动力 (命名核心恐惧、整合方向)
3. 结构 (客体关系)	来访者能稳定、动力被觉察、但内在图反复被验证	修补结构 (温尼科特、破裂-修复)

反模式: - 来访者严重焦虑 → 直接做“修补内在图” → 失败 - 来访者有基本稳定 → 一直做“安抚” → 永远不深入 - 顺序: 依恋 (给安全感) → 九型 (觉察动力) → 客体关系 (修补结构)

1.5.6 三轴整合示例 (3 个真实场景)

示例 1: 焦虑 × 2 号 × “被忽略的内在图” (已在 1.5.4 详述) - 依恋: 焦虑型激活 - 九型: 2 号核心恐惧 - 客体关系: 内在图验证 - 整合干预: 三层同步

示例 2: 回避 × 8 号 × “被利用的内在图”

轴	内容
依恋	回避型 (低焦虑、高回避)
九型	8 号挑战型 (核心恐惧: “被控制、被伤害”、核心欲望: “自我保护、掌控”)
客体关系	自体: “我是脆弱的” + 客体: “他人是会利用我的” + 关系模板: “我强 = 我安全”

三轴整合: - 回避型让 8 号“去激活”情绪, 看起来“很强” - 8 号核心恐惧“被控制/被伤害”驱动他“先发制人” - 内在图“他人会利用我”自动验证-任何关系都被他解读为“利用”

整合干预: - 依恋层: “你刚才用 5 分钟讲完了过去 30 年的事-我感到你在‘控制’节奏。这是你的回避在保护你。” (身体觉察) - 九型层: “你说‘我不怕任何人’-但‘不怕’也是一种保护, 你怕什么?” (动力觉察) - 客体关系层: “你内在有一个图: ‘他人都是想利用我’。但今天我 (咨询师) 在这里-我不是想利用你。我只是想认识你。这是新的图, 你能接住吗?” (结构修补)

示例 3: 混乱 × 4 号 × “不够好的内在图”

轴	内容
依恋	混乱型 (高焦虑、高回避-“我想要但我怕”)
九型	4 号浪漫型 (核心恐惧: “平凡、无独特性”、核心欲望: “找到自我、独特”)
客体关系	自体: “我是坏的/有缺陷的” + 客体: “他人是好的/能拯救我的” + 关系模板: “我不够好 = 我会受伤”

三轴整合: - 混乱型让 4 号同时渴望又害怕亲密-“我想要但我怕” - 4 号核心恐惧“平凡”让他戏剧化所有情绪 - 内在图“我不够好”让他选择性注意“自己不够好”的证据

整合干预: - 依恋层: “你同时想要靠近又想退-混乱型的‘推-拉’在保护你。你能命名这个‘推’和‘拉’吗?” (双重觉察) - 九型层: “你说‘我必须是独特的, 否则我不存在’-这是 4 号的核心故事。这是真的吗?” (动力觉察) - 客体关系层: “你内在有一个图: ‘我不够好, 他人是好的’。但今天我看到的是: 你在这里 (而不是那个‘好的’他人)。你能让‘你在这里’成为新的图吗?” (结构修补)

1.5.7 12 构型的”内在客体关系图谱”(速览)

每个构型都有其特定的”自体-客体”配对。详细图谱见”10-客体关系专题包”目录; 这里只列速览:

12 构型的”内在客体关系图谱” 按依恋象限分 4 组呈现。每组包含 3 个高频构型。

焦虑型依恋 3 构型

构型	自体-客体表征	投射性认同
焦虑 × 2 号	自体”我是给予者” + 客体”他人脆弱、需要我” + 模板”我照顾 = 他爱我”	投射”无助” → 对方真的依赖
焦虑 × 6 号	自体”我是警觉的” + 客体”他人潜在威胁” + 模板”我警觉 = 我安全”	投射”不信任” → 对方真的不可信
焦虑 × 4 号	自体”我是独特/有缺陷的” + 客体”他人完整/有爱” + 模板”我不同 = 我值得被爱”	投射”被抛弃” → 对方真的回避

回避型依恋 3 构型

构型	自体-客体表征	投射性认同
回避 × 5 号	自体”我是被入侵的” + 客体”他人是入侵的” + 模板”我退 = 我安全”	投射”入侵” → 对方真的压过来
回避 × 8 号	自体”我是脆弱的” + 客体”他人会利用我” + 模板”我强 = 我安全”	投射”被利用” → 对方真的退缩
回避 × 3 号	自体”我有价值(角色)” + 客体”他人是观众/裁判” + 模板”我成功 = 我值得存在”	投射”评判” → 对方真的评判

混乱型依恋 3 构型

构型	自体-客体表征	投射性认同
混乱 × 4 号	自体”我是坏的/有缺陷的” + 客体”他人是好的/能拯救我” + 模板”我不够好 = 我受伤”	投射”被拯救” → 对方真的变超人
混乱 × 1 号	自体”我是应被批评的” + 客体”他人是会审判我” + 模板”我完美 = 我安全”	投射”审判” → 对方真的批评
混乱 × 9 号	自体”我不存在的” + 客体”他人是存在的/重要的” + 模板”我消失 = 我安全”	投射”需要” → 对方真的提要求

安全型依恋 3 构型

构型	自体-客体表征	投射性认同
安全 × 7 号	自体”我是有趣的” + 客体”他人有趣(直到不有趣)” + 模板”我们有趣 = 我存在”	投射”无趣” → 对方真的无聊

构型	自体-客体表征	投射性认同
安全 × 9 号	自体”我是和的/配合的” + 客体”他人冲突/重要” + 模板”我配合 = 我属于”	投射”冲突” → 对方真的冲突
安全 × 3 号	自体”我是有能力的(任务)” + 客体”他人需要我帮助” + 模板”我有用 = 我被爱”	投射”需要” → 对方真的依赖

这张表是”诊断 + 干预”的双重地图: - 诊断: 来访者的”自体-客体”配对是什么?
- 干预: 咨询师不要进入这个配对中的”对方”角色 (避免强化投射性认同)

1.5.8 关键洞见 (本节小结)

- 三轴不是三个流派让咨询师选, 而是三个互补的视角, 缺一不可
- 递进路径: 依恋 (身体) → 九型 (动力) → 客体关系 (结构)
- 顺序铁律: 先依恋 (给安全感) → 再九型 (觉察动力) → 最后客体关系 (修补结构)(修补结构)
- 对话机制: 三轴不是”分别处理”, 而是整合公式: 依恋激活 × 九型动力 × 客体关系结构
- 冲突优先级: 安全 > 结构 (在安全没保障前, 不做结构工作)
- 客体关系不是”行为”, 是”结构”-它是”来访者内在世界的建筑图纸”
- 修复不是”教育来访者新道理”, 而是让来访者在关系中体验到新的内在图

第二部分: 映射矩阵

2.1 依恋象限 × 九型主型映射表

下表是临床经验与文献交叉验证后的典型对应 (注意: 不是 1:1, 而是高概率的”亲和性”):

焦虑型 (高焦虑/低回避) 亲和九型: - 高度亲和:2 号 (助人型)、6 号 (疑惑型) - 中度亲和:4 号 (浪漫型) - 较低亲和:1 号、3 号、9 号 (健康层) - 内在逻辑: 注意力朝向他人的爱/威胁, 需要持续确认

回避型 (低焦虑/高回避) 亲和九型: - 高度亲和:5 号 (观察型)、8 号 (挑战型) - 中度亲和:3 号 (成就型) - 较低亲和:7 号 (健康层) - 内在逻辑: 注意力朝向自己/控制, 亲密被等同为”被入侵”

混乱型 (高焦虑/高回避) 亲和九型: - 高度亲和:4 号 (浪漫型) - 中度亲和:1 号 (失健康)、9 号 (失健康) - 较低亲和: 其他 - 内在逻辑: 注意力矛盾, 既渴望又恐惧, 自我内部冲突

安全型 (低焦虑/低回避) 亲和九型: - 高度亲和:7 号 (健康)、9 号 (健康) - 中度亲和:1 号 (健康)、3 号 (健康) - 较低亲和:4 号、5 号、6 号 (解离态) - 内在逻辑: 注意力灵活, 可在亲近与独立间切换

内在逻辑: - 焦虑型: 注意力朝向他人的爱/威胁, 需要持续确认 - 回避型: 注意力朝向自己/控制, 亲密被等同为”被入侵” - 混乱型: 注意力矛盾, 既渴望又恐惧, 自我内部冲突 - 安全型: 注意力灵活, 可在亲近与独立间切换

重要提醒: - 这不是”诊断清单”, 而是”咨询师该优先探索的方向” - 任何依恋象限都可以与任何九型组合, 只是亲和组合更容易在压力下出现 - 个体差异巨大, 来访者的实际生活史比任何量表都重要

2.2 翼型、压力点与健康层级

九型的”健康层级” (Levels of Development, Riso-Hudson 9 层模型) 与依恋象限的互动尤其关键:

- 健康层 (1-3 层): 任何类型都更接近安全型依恋, 能在关系中灵活
- 平均层 (4-6 层): 类型特征凸显, 依恋象限稳定显现
- 不健康层 (7-9 层): 类型与依恋互相放大, 出现病理化反应

压力方向 (解离态) 对依恋的影响:

九型主型	压力方向
1→4	退缩、抑郁、自我贬损
2→8	控制、爆发、攻击
3→9	脱机、空虚、解离
4→2	黏附、嫉妒、操纵
5→7	涣散、过度刺激
6→3	强迫、囤积、过度工作
7→1	严苛、自我惩罚
8→5	孤立、密谋
9→6	焦虑、麻木、消极对抗

九型主型	在关系中的表现	与依恋象限的共鸣
1→4	批评、隔离	接近回避-混乱
2→8	情感勒索升级	焦虑激活, 接近混乱
3→9	情感冻结、消失	接近回避-混乱
4→2	戏剧化追	焦虑加重
5→7	退缩入想象	回避强化
6→3	焦虑性控制	焦虑 + 回避
7→1	收缩、指责	混乱出现
8→5	退入硬壳	回避强化
9→6	黏附但不行动	混乱 + 焦虑

临床意义: 咨询师要评估来访者当下处于哪个层级, 这比”他是什么类型”更重要。一个健康 2 号和一个不健康 2 号的依恋表现可能完全相反。

2.3 关系中的”双人舞”-典型配对

来访者最常问: “我们俩在一起为什么会变成这样?”-以下是临床上最常见的高摩擦配对:

配对	动态	核心冲突	干预方向
焦虑 2 号 × 回避 5 号	追-躲循环	“我要靠近” vs “我需要空间”	翻译彼此语言: 追 = 爱, 躲拒绝
焦虑 6 号 × 回避 8 号	测试-反测试	“你真的不会离开吗” vs “我不接受被质疑”	命名触发器, 建立预警信号
混乱 4 号 × 安全 9 号	戏剧-稳定	“你不理解我” vs “我都接受”	9 号要长出边界, 4 号要落地
回避 3 号 × 焦虑 4 号	形象-灵魂	“看我多优秀” vs “看我的深渊”	揭穿”完美”幻象, 共情”痛苦”
混乱 6 号 × 混乱 1 号	双重焦虑	双方都在防御, 无人在场	各自先稳定, 再做关系
安全 7 号 × 焦虑 2 号	自由-责任	“享受当下” vs “你怎么不陪我”	7 号要给出可预测的信号

更深层规律: - 配对不是”坏的”, 而是双方无意识地在重演早年的依恋剧本 - 改变任何一方的反应模式, 系统就会被迫重组 - 咨询师的工作不是”裁判”, 而是让双方都看见自己与对方的脚本


第三部分: 咨询理论架构

3.1 三轴诊断模型 (依恋 + 九型 + 客体关系)

核心工具: 焦虑-回避-九型-客体关系四维评估

升级说明: 从 v2.2 的”双轴”升级到 v2.2 的”三轴”, 增加客体关系维度-评估来访者”内在世界长什么样”。

升级后的诊断模型



诊断轴	评估问题	评估工具
依恋	“他/她在关系中怎么做？追？躲？推拉？”	ECR-R 访谈版 / 临床观察
九型	“他/她为什么这样做？怕什么？想要什么？”	RH 主型访谈 / 童年叙事
客体关系	“他/她内在的世界长什么样？以为他人会怎么对他？”	内在图谱访谈 / 移情观察 / 反移情记录

步骤一：依恋象限 (用 ECR-R 量表或临床访谈)


我建议在咨询前两次访谈中，完成以下评估。

访谈版问题 (简版):

1. “你是否担心伴侣不像你爱他那样爱你？” (焦虑)
2. “你是否需要频繁的确认和保证？” (焦虑)
3. “你是否觉得在关系中很难完全放松？” (焦虑)
4. “你是否觉得靠近他人让你不太舒服？” (回避)
5. “你是否更愿意依靠自己，而非他人？” (回避)
6. “你是否会因为不想被拒绝而避免寻求帮助？” (回避)

0-10 打分: - 焦虑维度 (Q1-Q3 均值) - 回避维度 (Q4-Q6 均值)

定位:



步骤二：九型主型 (用 Riso-Hudson 主型问卷或临床访谈)

关键提问: - “童年时，你觉得必须做到什么，才能被爱/不被抛弃？” → 核心恐惧入口 - “你最不能忍受自己身上发生什么？” → 核心欲望反向 - “你平时最常有的内心独白是什么？” → 注意力习惯 - “当你压力很大时，你会怎么做？” → 压力方向 (也是依恋的激活态) - “你最讨厌别人身上什么特质？” → 投影点 (往往指向自己压抑的部分)

步骤三：健康层级评估

用 Riso-Hudson 的健康层级访谈问题 (选 3 个关键情境):

- 你最近一段关系的”日常模式”是怎样的？
- 你最近一次情绪崩溃是怎么发生的？你怎么处理的？
- 过去一年里，有没有你觉得自己”不是自己”的时刻？

通过具体叙事，判断来访者处于 9 层模型的哪一层。

步骤四：综合诊断书写

诊断模板示例：> 客户 L, 女, 32 岁。> 依恋象限: 焦虑型 (焦虑 7.5, 回避 3.2) > 九型主型: 2 号 (翼向 3) > 健康层级: 第 5 层 (平均-不健康过渡) > 当前压力方向: 2→8, 表现为关系中的爆发与控制 > 早年依恋脚本: 父母情绪不稳, 她必须通过”照顾弟弟”获得关注 > 当前主诉: 亲密关系中过度付出, 对方疏远后情绪崩溃

3.2 核心恐惧解码

九型的核心恐惧与依恋的内在工作模型之间存在深层对应:

九型核心恐惧	依恋工作模型	在关系中的”翻译”
1 号: 不完美/错误	“我必须要是好的, 才值得被爱”	用完美主义掩盖被拒绝的恐惧
2 号: 不被需要	“我必须有用, 才不会孤独”	把自己变成对方需要的样子
3 号: 无价值	“我必须成就, 才配被看见”	靠成就赢得”入场券”
4 号: 平凡/无独特性	“我必须不同, 才会被找到”	用戏剧化证明自己”真实存在”
5 号: 无能/被侵占	“我必须自给自足, 才能安全”	不需要, 就不可能被夺走
6 号: 无支持	“我必须警觉, 才不会被害”	提前预演灾难来获得掌控感
7 号: 痛苦/被限制	“我必须快乐, 才不会陷入”	用新鲜感躲避深层的空虚
8 号: 被控制/被伤害	“我必须强大, 才不会脆弱”	攻击性是先发制人的防御
9 号: 冲突/分离	“我必须平和, 才不会被抛弃”	取消自己, 融入对方

咨询应用: - 当来访者说”我害怕他/她不爱我”, 先不要急着安抚 - 问: “如果你不被爱, 对你来说意味着什么?(直抵九型核心恐惧) - 让来访者看见: 我之所以这么累, 是因为我在对抗一个’如果我不 X, 我就 Y’ 的内在等式

3.3 九型 × 客体关系: 从”为什么”到”内在世界”

九型告诉你为什么这样做, 客体关系告诉你内在世界长什么样。

理论来源: “投射性认同”这一机制由 Klein (1946) 提出, Winnicott (1965) 的“过渡性客体”与“足够好的母亲”理论拓展了内在客体关系的临床操作路径, Fairbairn (1952) 的“分裂的自体/客体”则为理解内部客体表征提供了模型。这些概念被本套件重新映射为“来访者内在世界的描述语言”, 用于 3.3 的“自体-客体表征”表中。

九型	核心等式	内在自体表征	内在客体表征	关系模板
1	我必须完美	我是有缺陷的	他人是会审判的	完美 = 安全
2	我必须有用	我是有价值的	他人是需要我的	被需要 = 被爱
3	我必须成就	我是有价值的 (角色)	他人是观众	成功 = 入场

九型	核心等式	内在自体表征	内在客体表征	关系模板
4	我必须不同	我是有缺陷的/独特的	他人是完整的	不同 = 被找到
5	我必须自足	我是有能力的	他人是会入侵的	自足 = 安全
6	我必须警觉	我是无助的	他人是会背叛的	警觉 = 安全
7	我必须快乐	我是会痛苦的	他人是会限制的	快乐 = 安全
8	我必须强	我是脆弱的	他人是会利用的	强 = 安全
9	我必须配合	我是不重要的	他人是重要的	配合 = 存在

干预升级: 不只是碰触核心恐惧, 还要修补内在图。例: 一个 2 号被揭穿”被需要 被爱”后, 如果只停留在这个认知层面, 他很快会回到”付出”模式。客体关系工作是: 在咨询室里, 让来访者体验到”我不被需要, 但咨询师还在、还爱我”-这是新的内在客体表征 (”他人不只在对我有用时在”)。

3.4 防御机制的三层识别

Bowlby 认为: 依恋的激活对应第二信号系统 (对威胁的高敏感); Kohut 认为: 自体受损的修复对应第一信号系统 (需要共情镜映); 九型体系则揭示: 每个类型都有自己惯用的”第一道防线”

三层防御框架:

第一层: 行为层 (依恋激活) - 焦虑: 黏附、追、情感激活、情绪化表达 - 回避: 退缩、躲、去激活、理性化 - 混乱: 推拉、戏剧化、解离

第二层: 认知层 (九型防御) - 1 号: 反刍、列清单、”应该”系统 - 2 号: 重新框架自己的付出、”我都是为了你好” - 3 号: 角色扮演、”这是我想做的事” - 4 号: 内摄、”我就是这样的人, 没人懂” - 5 号: 抽象化、”让我想想”、延迟行动 - 6 号: 灾难化预演、投射怀疑、反恐惧反向形成 - 7 号: 合理化、转移注意力、重新规划 - 8 号: 反向形成、”我才不在乎” - 9 号: 麻醉、自言自语拖延、隐性抗拒

第三层: 身份层 (核心信念) - ”我不值得被爱” (几乎所有非安全型的底层) - ”世界是不安全的” (焦虑/混乱) - ”我是孤独的” (回避/4 号) - ”我必须 _____ 才完整” (每个类型的”填补”策略)

咨询中的识别路径: > 看见行为 (第一层) → 命名认知 (第二层) → 触碰身份 (第三层) > 这一顺序不能颠倒, 直接碰第三层会激活防御而非穿透防御

第四层 (本次新增): 客体关系层 (内在世界结构)

这一层是”身份层”的结构化表达-身份不是抽象的信念, 而是一套配对的内在表征:

客体关系层	内容	举例
自体表征	”我是什么样的”	”我是不重要的”、”我是有缺陷的”
客体表征	”他人是什么样的”	”他人是会忽略我的”、”他人是会伤害我的”
关系模板	”我和他人的关系是怎么运作的”	”我付出 = 他爱我”、”我警觉 = 我安全”
投射性认同模式	”我如何让他人验证我的内在图”	投射”入侵” → 对方真的压过来

三轴诊断的最终输出 (升级版):

来访者 [化名]

=====

一、依恋诊断

- 象限: 焦虑 / 回避 / 混乱 / 安全
- 焦虑维度: __
- 回避维度: __
- 当前激活状态: 黏附 / 退缩 / 推拉 / 灵活

二、九型诊断

- 主型: __ 号
- 翼型: __ 号
- 健康层级: __ 层 (1-9)
- 压力方向: __ 号
- 整合方向: __ 号
- 核心等式: __ = 被爱

三、客体关系诊断 (新增)

- 自体表征: "我是什么样的"
- 客体表征: "他人是什么样的"
- 关系模板: __ = __
- 投射性认同模式: 投射 __ → 对方 __
- 温尼科特时刻的缺口: 哪种"足够好的"回应是他没有的?
- 自体客体需求: 镜映 / 理想化 / 孪生
- 分裂程度: 整体 / 部分 / 严重

四、综合叙事

- 早年形成的核心等式与内在图
- 当下激活的行为 / 防御 / 关系模板
- 咨访关系中可能的投射性认同点

五、干预路径

- 第一步 (轨道 A): 依恋修复
- 第二步 (轨道 B): 九型整合
- 第三步 (新增 轨道 C): 客体关系修补

3.5 整合成长路径 (三轨模型, 本次升级)

升级说明: 从双轨升级到三轨, 新增轨道 C: 客体关系修补-修补"内在图", 不只修补"行为"和"动力"。

轨道 A: 依恋修复 (关系视角) 1. 创造安全基地 (咨询室本身就是) 2. 命名激活反应 ("你是在被你的依恋系统拉走了") 3. 慢下来, 回到身体 (调节自主神经) 4. 建立新经验 ("这次你没有被抛弃")

轨道 B: 九型整合 (人格视角) 1. 看见类型自动导航 ("你的'付出'是自动的, 不是选择") 2. 触碰核心恐惧 ("如果不被需要, 你会发生什么?") 3. 发展不健康方向 ("你愿意让自己被'需要'之外的方式看见吗?") 4. 走向整合 ("健康版的你, 会怎样做?")

轨道 C: 客体关系修补 (本次新增, 内在世界视角) 1. 看见内在图 ("你'以为'他人会怎么对你?") 2. 识别投射性认同 ("你是否总是让对方变成你怕的样子?") 3. 破裂-修复循环 ("咨询师的失误可以被修复, 这本身是新经验") 4. 温尼科特时刻 ("足够好的"回应是在咨询室里发生) 5. 重写内在图 ("你有机会拥有'新的内在表征'")

三条轨道的关系 (执行顺序):

轨道 A (依恋修复)

↓ 先稳定身体与关系

轨道 B (九型整合)

↓ 再深挖动力

轨道 C (客体关系修补)

↓ 最后修补内在图

为什么这个顺序? - 轨道 A 必须先-如果来访者还处于激活态 (高焦虑/高回避), 任何”深挖”都会激活防御、复制创伤 - 轨道 B 在中间-只看行为, 不解动力, 来访者会”知道但做不到”; 九型整合让”知道”变成”看见” - 轨道 C 在最深-只看动力, 不修补内在图, 来访者会”看见但仍被旧图套住”; 客体关系修补让”看见”变成”自由”

反过来说: - 跳过 A 直接做 C → 创伤重演 - 跳过 B 直接做 C → 修图不深, 易反复 - 三轨都做但顺序错 → 前面工作被推翻

整合状态对照表:

不健康状态	整合方向	整合后状态
1 号: 僵硬、批判	朝 7 号发展	放下执着, 享受过程
2 号: 黏附、操纵	朝 4 号发展	看见自己的真实需要
3 号: 虚假、耗竭	朝 6 号发展	允许自己害怕、不确定
4 号: 沉溺、戏剧化	朝 1 号发展	将感受落地为行动
5 号: 封闭、空洞	朝 8 号发展	走出头脑, 进入身体
6 号: 焦虑、投射	朝 9 号发展	信任他人, 也信任自己
7 号: 涣散、上瘾	朝 5 号发展	深潜, 延迟满足
8 号: 控制、攻击	朝 2 号发展	看见他人的脆弱, 允许被爱
9 号: 麻木、停滞	朝 3 号发展	行动力, 自我价值

第四部分: 咨询操作指南

4.1 三轴递进路径:6 阶段咨询流程

本节是 4.1 的重构版 (v2.2)

本节的设计逻辑跟 1.4 节”三轴融合的必要性”在语义上连贯: - 1.4 说三轴有递进路径 (依恋行为 → 九型动力 → 客体关系结构) - 1.4.1 说双轴三个具体场景回答不了 (关系重复 / 反移情 / 破裂反复) - 1.4.2 说双轴三个问题回答不了 - 1.4.3 说三轴缺一不可

本节的咨询流程按三轴递进路径展开: 从依恋开始, 经过依恋 + 九型、九型 + 客体, 到三轴同步, 最终三轴并用。共 6 个阶段, 每个阶段明确次数范围、主轴、任务。

与 1.4 节的对应详见末尾总结。

总框架: 三轴递进路径 (6 阶段, 完整见下表)

阶段	次数	主轴	任务
阶段 1	1-3 次	依恋为主 (安全基地)	建立关系

阶段	次数	主轴	任务
阶段 2	4-8 次	依恋 + 九型 (激活模式识别)	看见模式
阶段 3	9-15 次	九型 + 客体关系 (核心恐惧暴露)	看见动力
阶段 4	16-25 次	客体关系为主 (内在图修补)	修补结构
阶段 5	26-40 次	三轴同步 (整合检验)	巩固整合
阶段 6	长期	三轴并用 (内化咨询师)	维护结案

核心原则: - 每个阶段有主轴, 但其他两轴不停。比如阶段 1(依恋为主) 时, 你同时在听九型防御位和内在图, 只是不以它们为重点。- 不预设”几次必须完成”。1-3 次只是”通常范围”, 如果来访者早期就触发了客体关系层 (比如首次咨询就出现破裂), 你可以提前进阶段 4。- 阶段之间不是”结束 → 开始”, 是”主轴从 A 转到 B 再到 C, 但 A/B 仍然在用”。

阶段 1(1-3 次): 建立关系—依恋为主

主轴: 依恋 (安全基地) **次轴:** 九型 (初步类型印象)+ 客体关系 (初步内在图印象)

任务清单 (每次咨询必做):

次	主要任务	三轴工作
第 1 次	让来访者说话, 听他怎么”开题”	依恋: 看他的依恋象限 (焦虑/回避/混乱/安全) 九型: 听他的”主型味道” (防御位初步印象) 客体关系: 听他的”内在图”初步印象 (自体-客体表征)
第 2 次	跨轴穿插提问	依恋: 依恋象限访谈 九型: 主型探索 客体关系: 内在图初探 (“你描述父母, 他们是什么样的人?”)
第 3 次	反馈三轴假设	三轴都反馈: “我看你可能是焦虑型 + 2 号 + 内置’我不被需要’的内在图”

关键技术 (详见 4.2): - 4.2 技术 10: 关系剧本提问 (Relationship Script Inquiry)—提取内在图 - 4.2 各阶段关键技术的”技术 1: 依恋激活调节”—应急用

不要做的事: - 不要在这一阶段就”修”什么—你还没建立安全基地 - 不要追求”完美”评估—早期评估就是模糊的 - 不要”过度照顾”—急于让来访者”好起来”是你自己的内在图在响

阶段 1 结束标志: - 来访者能在咨询中自发地重复他的模式 (开始”你又这样”地跟你) - 你能说出三轴的**初步假设** (即使不确定) - 来访者开始对你的稳定感到**习惯** (可以接受你说”我不知道”)

阶段 2(4-8 次): 看见模式—依恋 + 九型

主轴: 依恋 (激活模式识别)+ 九型 (防御位识别) **次轴:** 客体关系 (留意内在图如何在咨询中重演)

任务清单:

任务	怎么做
看见激活模式	让来访者描述最近一次”发作”的具体场景 (案例回放)
看见防御位	在案例回放中, 识别他的九型防御位 (对抗/退行/警觉) 在怎么运作
建立预警信号	让他自己能在发作时 先认出 再反应—“这个反应是7分, 你能先停一下吗?”
触碰早期剧本	命名这个模式 可能 在他早期就开始了

关键技术: - 4.2 技术 1: 依恋激活调节 - 4.2 技术 2: 去激活的”反向”工作 (适合回避型) - 4.2 技术 3: 九型核心恐惧的”暴露练习” - 4.2 技术 5: 投射性认同识别 (咨询师自己观察)

典型反模式: - **只做依恋**, 不识别九型—来访者”知道”但不”看见” - **只做九型**, 不识别依恋—来访者”看见”但”不能稳定” - **跳过识别, 直接解释**—来访者没准备好, 你快他一步, 被推走

阶段 2 结束标志: - 来访者能**自己识别**他的激活信号 (不用你提醒) - 来访者能**自己命名**他的核心恐惧 (不用你命名) - 来访者能在发作后**自主调节** (身体层面)

阶段 3(9-15 次): 看见动力—九型 + 客体关系

主轴: 九型 (核心恐惧暴露与整合方向)+ 客体关系 (内在图浮现) **次轴:** 依恋 (继续监测稳定度)
任务清单:

任务	怎么做
核心恐惧暴露	“如果你的’不被需要’真的发生, 会发生什么?” —让他 真正停留 在这个恐惧里
哀悼理想化客体	来访者心里那个”如果我足够好就会一直爱我”的人—这是 幻想客体 , 要哀悼它本身
整合方向探索	他的九型向哪个健康层发展? —让他看见 类型是资源 , 不是”问题”
早期客体关系浮现	9 号 → 退缩的内在图; 2 号 → “不被需要”的内在图; 8 号 → “被利用”的内在图— 客体关系层自然显现

关键技术: - 4.2 技术 3: 九型核心恐惧的”暴露练习” - 4.2 技术 5: 投射性认同识别 (咨询师重点用—这是反移情浮现期) - 4.2 技术 6: 温尼科特时刻—在场、镜映、不完美但可修复的演示

典型反模式: - **绕过核心恐惧**, 直接给”健康方案”—来访者”知道但做不到” - **回避理想化客体的哀悼**—来访者继续抱着”如果我足够好…”“的幻想 - **压抑反移情**—“我不该被来访者气到, 我必须收起来”—1.4.1 场景 B 的错

阶段 3 结束标志: - 来访者能在**不焦虑**的情况下谈论他的核心恐惧 - 来访者能识别自己的**理想化客体幻想** - 咨询师能在反移情出现时**主动使用**它 (而不是压抑)

阶段 4(16-25 次): 修补结构—客体关系为主

主轴: 客体关系 (内在图修补 / 新客体表征内化) **次轴:** 依恋 (新安全基地)+ 九型 (整合行为)
任务清单:

任务	怎么做
修补破裂	主动承认破裂 + 邀请讨论 + 重新说 (见“破裂-修复”5步)
温尼科特”足够好”演示	你不完美的咨询 + 主动修复 → 让来访者看到“原来有人会主动修补”
新客体表征内化	多次”主动修复”让来访者内化”破裂是可以被修复的”—这是结构改变
整合行为实验	来访者在咨询外做”健康版”行为, 回来讨论—讨论内在图的变化

关键技术: - 4.2 技术 4: 三轴叙事整合 (咨询中后期) - 4.2 技术 5: 投射性认同识别与处理 (深度使用) - 4.2 技术 7: 破裂-修复循环—主动识别 + 承认 + 邀请讨论 + 重新说 + 拉回修补本身
典型反模式: - 跳过”修补”, 只做”认知重构”—来访者”知道”但不”内化”—避免破裂—破裂本身是新客体表征的来源 - 只做新经验, 不修补内在图—1.4.2 问题 3 的错

阶段 4 结束标志: - 来访者在咨询中主动识别破裂并能讨论它 - 来访者能感觉到”破裂是可以修复的” - 来访者能在咨询外主动修补自己与他人的关系 (内化显现)

阶段 5(26-40 次): 巩固整合—三轴同步

主轴: 三轴同步 **次轴:** 无 (都同等重要)
任务清单:

任务	怎么做
整合检验	用”5.3 三轴结案检查表”逐项检验
处理增长痛	整合型 2 号感到”我不再被需要”—这是新客体体验, 需要他停留
退行处理	如果来访者出现退行, 回到阶段 3(不是从头开始)
预警新问题	整合之后, 新问题浮现 (例:9 号整合后, “世界太吵”浮现)

关键技术: - 4.2 技术 4: 三轴叙事整合 (深度使用) - 4.2 技术 9: 内在图改写 + 阶段 5 的三轴整合检验提问 (追/躲模式、类型困扰、内在图变化)

典型反模式: - 看到进步就加速结案—整合期需要时间沉淀 - 退行时惊慌—退行是整合期的正常现象 - 只检验一个轴—1.4.3 强调三轴缺一不可

阶段 5 结束标志: - 三轴都有稳定的表现 - 来访者能自己命名他在三轴上的进步 - 增长痛已经过去

阶段 6(长期 / 结案后): 维护与内化—三轴并用**主轴:** 三轴并用 (都是来访者自己的) **次轴:** 无**任务清单:**

任务	怎么做
渐退	每周 → 每两周 → 每月 → 结案
最后一次破裂-修复	故意安排一次小破裂, 让他经历”修复”
内化检验	他能在”咨询师不在”时调用”咨询师会怎么做”吗?
计划复查	谈下”未来如果需要, 记得可以临时回来”

关键技术: - 4.2 技术 9: 内在图改写 + 整合检验三轴提问 - 4.2 技术 11: 渐退频率建议**典型反模式:** - 突然结束—重现”被抛弃”的内在图 - 永不结束—来访者”依赖咨询师”阻断内化 - 衰退期不警告—末期了才提结案, 让来访者”被抛弃”**阶段 6 结束标志:** - 来访者能描述出”我内在有个声音, 听起来象你” - 来访者能”在不在咨询室”时都能调节 - 半年后复查时, 新客体表征仍稳定**总结:6 阶段与三轴递进路径的对应**

与 1.4 节的对应:1.4 说三轴有递进路径 (依恋行为 → 九型动力 → 客体关系结构), 本节按此把咨询分成 6 个阶段, 主轴从依恋逐级递进到三轴并用。1.4.1 三个”双轴回答不了的场景”分别在阶段 1-4 解决,1.4.3”三轴缺一不可”在阶段 5-6 通过三轴同步/并用体现。

阶段	次数	主轴	核心任务
1	1-3	依恋	建立安全基地
2	4-8	依恋 + 九型	看见模式
3	9-15	九型 + 客体	看见动力
4	16-25	客体关系	修补结构
5	26-40	三轴同步	巩固整合
6	长期	三轴并用	维护结案

4.2 各阶段关键技术**技术 1: 依恋激活调节 (适合焦虑/混乱型)**

步骤: 1. 命名: “你现在的状态, 是你的依恋系统被拉响了” 2. 归位: “这不是’你’, 这是’你的系统’” 3. 身体: “让我们先慢下来, 告诉我你现在的呼吸是什么样的” 4. 资源: “在这个感觉里, 有没有一个地方是相对平静的?” 5. 再选择: “当你准备好, 我们一起看看, 这次你选择怎么做”

原理: 激活态下, 前额叶关闭, 直接做认知工作无效。先调节身体, 再处理意义。

技术 2: 去激活的”反向”工作 (适合回避型)

步骤: 1. 不催促: “我不会催你靠近” 2. 命名”不去感受”: “我注意到你说这件事时, 声音很平—你是否感到什么, 但暂时不想看?” 3. 小剂量身体: “你愿意试试, 一边说, 一边把手放在胸口吗?” 4. 肯定”敢感受”的勇气: “你刚才说的时候, 我看到你的眼眶动了—那对你来说不容易”

原理: 回避型的防御是”关闭感受”, 不是”没有感受”。咨询师要做的是让他/她觉得感受是安全的。

技术 3: 九型核心恐惧的”暴露练习”

步骤: 1. 命名恐惧: “你说, 你的’被需要’消失, 你会-?” 2. 邀请进入: “我们试试, 在这个画面里多待一会儿……告诉我, 你在里面看到了什么” 3. 不立即安抚: “这个感觉是不是很可怕?-让它在, 看看它会不会自己变化” 4. 身体陪伴: “你发现你在发抖-我和你一起, 在这一刻” 5. 重建: “我猜, 如果你’不被需要’, 但你仍然是值得被爱的-那对你来说需要多少时间才能相信?”

原理: 核心恐惧一旦被完整地经历而非回避, 它的影响力就开始减弱 (暴露疗法 + 完形疗法的整合)。

技术 4: 三轴叙事整合 (咨询中后期,v2.2 新增)

框架提问: - “现在回头看, 你的’追’或’躲’的模式, 从什么时候开始的?” - “如果那个时候的你, 看到现在这个一直在努力的你, 会说什么?” - “在你的’类型自动导航’里, 你最想保留哪个部分? 最想放下哪个部分?”

这让来访者从”被模式控制”走向”主动选择”。

技术 5(本次新增): 投射性认同识别与处理

什么时候用: 任何时候咨询师发现自己对来访者有强烈情绪、或来访者反复触发咨询师的”未完成议题”。

核心原理: 投射性认同是”双方共同制造的现实”, 不是来访者单方面的”投射”。咨询师不是”被动接收投射”, 而是共振或激活了来访者的内在图。

5 步识别法:

1. 停一下 - 觉察自己的强烈情绪 (“我怎么突然这么烦躁?”)
2. 命名情绪 - “这是我的, 还是来访者的?”
3. 追溯源头 - “来访者做了什么/说了什么, 触发了这个?”
4. 反推来访者 - “如果这是来访者’投射’给我的, 他内在的什么被激活了?”
5. 选择回应 - 不进入投射 (不变成”被投射的角色”), 也不强硬拒绝 (那会破坏联盟), 而是命名投射本身

回应模板: > “我注意到, 我说完那句话后, 你立刻变得愤怒了。我想知道, 这个愤怒真的是因为我说的吗? 还是因为它碰到了你内在的某个旧的愤怒?” > > (此时来访者通常会停顿, 因为他没意识到自己的”被旧愤怒激活”) > > “或者, 这个愤怒和某个过去的场景相似-你能想到吗?”

关键: 不否认来访者的情绪, 也不立即处理。先命名投射本身的存在, 让来访者看见。

技术 6(本次新增): 温尼科特时刻 (Winnicottian Moment)

什么时候用: 咨询中后期, 当来访者展示出脆弱/真实的瞬间。

什么是温尼科特时刻: > 来访者在咨询中真实地展示自己 (不是面具、不是角色、不是”应付”咨询师), 而咨询师以”足够好的”方式回应-既不完美 (不是”立即共情”)、也不冷漠 (不是”忽视”)、而是接住 + 不评判。

典型情境: - 来访者说了一句”我没对别人说过的话”, 然后沉默了-他在看咨询师的反应 - 这是一个关键瞬间: 如果咨询师”立即理解 + 长篇回应”, 可能让来访者觉得”咨询师太快接受了, 这不真实” - 最好的回应是: 等一下、眼神接触、然后简单的回应-“谢谢你告诉我” (这才是”足够好的”回应)

为什么有效: - 来访者的内在客体表征是”他人都不会接住我”, 咨询师接住了, 这个”新经验”会修补内在图 - 比起”咨询师完美理解”的体验, “咨询师没完全理解但仍然在”的体验更有疗愈力

避免的陷阱: - “我完全理解你”-太快, 假 - “我也经历过这个”-抢镜 - 长篇分析-让来访者觉得”被研究” - 沉默 + 眼神 + “我在听”-温尼科特时刻

技术 7(本次新增): 破裂-修复循环 (Rupture-Repair Cycle)

核心洞见: > 关系疗愈不来自”不破裂”,而来自”破裂后的修复”-这是最深层的疗愈。

什么是破裂: - 咨询师迟到 5 分钟 - 咨询师说了一句无意中伤来访者的话 - 咨询师忘了来访者说过的重要信息 - 咨询师走神了一两分钟

为什么破裂是礼物: - 来访者的内在图:“他人靠不住”-破裂验证了内在图 - 如果咨询师不修复,内在图被”再次验证” - 如果咨询师真诚修复(“我迟到了,对不起-这不是借口,是我的失误”),内在图被动摇

修复的 4 步: 1. 认错 - “这是我做错了”(不借口、不解释) 2. 命名影响 - “我想这可能让你感到被忽略/被伤害” 3. 连接 - “但我想让你知道,我仍然在这里,我关心你” 4. 询问 - “你能告诉我,你的感受吗?”

为什么有效: - 修复示范了”关系可以修复” - 修复提供了新经验(“原来破裂是可以修复的”) - 修复修补了”他人靠不住”的内在图

技术 8(本次新增): 命名分裂 (Naming the Splitting)

什么时候用: 来访者把咨询师(或伴侣)突然理想化或突然贬低时。

典型场景: - “你是世界上最好的咨询师”(上周还说”你根本不懂我”) - “他一开始是完美的,这周完全是个怪物” - “我今天状态超好”(明天的咨询”我又跌入谷底”)

回应模板: > “我注意到,你说我’最懂你’时,跟上周说我’不懂你’,是两个不同的人。这两个’我’都是你真实的部分-上周的你不相信我,今天的你信任我。这两个’我’都还在,只是今天信任的部分更多一些。” > > (引导来访者整合”好我”和”坏我”,而不是”全好”或”全坏”)

为什么有效: - 分裂是未整合的心智特征-能容纳”灰色”才能长大 - 命名分裂示范了”整合”-来访者看见”原来咨询师在容纳我的两端” - 这是深层的客体关系修补

技术 9(本次新增): 内在图改写 (Internal Schema Revision)

什么时候用: 咨询后期,来访者开始自发地叙述新经验时。

操作: - 来访者说:“今天我伴侣做了一件事,我以前会崩溃,但今天我只是难过了,没有崩溃” - 咨询师:强化这个新经验(“你注意到了吗?你的反应变了。以前的你,会陷入’我又要被抛弃’的脚本;今天的你,允许自己难过而不崩溃”)

为什么有效: - 内在图的改写不是”咨询师告诉来访者’你变了’“-是来访者自发看见自己的变化 - 咨询师的强化锚定了这个新经验,让它更稳定

技术 10(本次新增): 关系剧本提问 (Relationship Script Inquiry, 阶段 1-2 使用)

什么时候用: 前 3-5 次咨询,提取来访者的”内在图”。

操作(4 个问题): 1. “你描述一下你的妈妈(或主要照顾者),你会说她是怎样的人?” 2. “她是怎么对你的?” 3. “你觉得,小时候在她眼里,你是什么样的孩子?” 4. “在你的记忆里,有没有一个’如果你足够好/足够乖/足够强,他们就会一直爱你’的感觉?”

为什么有效: - 问题 1-2 提取”客体表征”(他人是什么样的) - 问题 3 提取”自体表征”(我是什么样的) - 问题 4 提取”关系模板”(我怎么与他人的模式) - 这三个抽出后,就是”内在图”的基本架构

案例: - 来访者说:“我妈是’又冷又远’的。她从来不会抱我。我在她眼里是’不重要的’。在那个家里,如果你足够乖,她才看你一眼。” - 提取后: 客体表征 = “他人是冷远的” / 自体表征 = “我是不重要的” / 关系模板 = “我乖 = 他人在” - 这是”咨询 20 分钟就能拿出的初步内在图”

技术 11(本次新增): 渐退频率建议 (阶段 6 使用)

什么时候用: 准备结案时,采”渐退”避免”突然被抛弃”。

推荐频率: - 正常期 (周中状态稳定): 每周 1 次 - 过渡期 1(间周状态稳定): 每两周 1 次 - 过渡期 2(月状态稳定): 每月 1 次 - 结案前 1-2 月: 每月 1 次 + 不定时”复查”机会 - 结案后: 主动保持”未来你遇到困难可以临时回来”的门

为什么有效: - 渐退给来访者”内化咨询师”的时间, 不是”突然失去” - 频率下降过程中, 你会看到他在”没有你”时的表现 - 保留复查机会 = 过渡性空间不关闭

4.3 伴侣咨询的特殊处理

伴侣咨询的双人评估 (第 1-2 次):

评估维度	提问	注意
各自依恋象限	“你在关系中最怕发生什么?”	焦虑型会说”被抛弃”, 回避型会说”被控制”, 混乱型两者都怕
各自九型主型	“你最受不了伴侣身上的什么?”	讨厌对方的地方, 往往是自己压抑的
互动循环	“你们吵架的固定剧本是什么?”	命名”追-躲”、“控-反控”、“演-看”等
触发点	“对方做什么/不做什么, 你会立刻不安?”	早年的按钮
修复尝试	“吵架后, 谁先低头? 怎么低头?”	修复模式也来自早期依恋

伴侣咨询的三阶段:

阶段 A: 翻译彼此 (让双方都”被听见”) - 轮流发言, 另一方不打断 - 复述: “我听到你说……, 我猜你的意思是……, 我说对了吗?” - 关键: 翻译, 不是评判

阶段 B: 命名循环 - 咨询师命名: “我注意到, 每次他没接你电话, 你就会打三个-然后他就开始关机-然后你更焦虑-他更退缩。这是一个循环, 没有人是坏人, 只是你们在这个系统里互相触发。”

阶段 C: 打破循环 - 给”追”的一方: 练习在激活时, 先停 30 分钟 - 给”躲”的一方: 练习主动给一个微小的回应 - 给”混乱”的一方: 练习说出”我现在混乱, 需要 10 分钟”

重要原则: - 不站队 - 不评判”对错” - 不替他们解决问题 - 让他们从”互相埋怨”走向”共同面对模式”

第五部分: 典型构型干预脚本

5.1 焦虑 × 2 号助人型

典型表现: - 总是先看见对方需要什么 - 通过”被需要”来确认”被爱” - 伴侣若不感激, 立刻受伤 - 容易越界, 过度付出, 事后又觉得”他不配” - 亲密关系中: 付出 → 期待回报 → 未得 → 情绪勒索 → 对方更退缩 → 更焦虑

评估要点: - 早期”被爱 = 被需要”的等式如何形成 - 哪些”付出”是真实的, 哪些是交易 - 压抑的”我自己的需要”长什么样

干预脚本:

首次咨询: > 咨询师: “你说, 你为他做了那么多, 但他不珍惜-我想先听你说, 过去一周, 你自己想做的事, 做了多少?” > (等待沉默) > 咨询师: “我发现, 你说’我’的时候, 常常后面跟的是’他’或’他需要’。你愿意我们试试, 接下来的 5 分钟, 只聊你想要什么?”

中期: > 咨询师: “上次我们看见, ‘不被需要’ 对你来说等于 ‘不被爱’。今天我想请你想象, 一个朋友 (不是伴侣) 对你说: ‘我不需要你为我做什么, 我就是单纯地爱你’ –你听到这句话, 第一反应是什么? > 来访者: “……我不信” > 咨询师: “不信–很诚实。我想问, 这份 ‘不信’, 在你多大的时候就有了?”

整合方向: - 让 2 号看见 “我可以被爱, 不需要先付出” - 练习 “不付出地接受” - 发展健康 2 号的 “真正助人” (看见对方需要, 而不是投射自己的需要)

客体关系视角 (本次新增):

客体关系要素 焦虑 × 2 号	
自体表征	“我是有价值的 (因为他需要我)”
客体表征	“他者是脆弱的、需要我的照顾”
关系模板	“我付出 = 他者感激 = 他者爱我”
投射性认同	投射 “无助” → 对方真的变得依赖、脆弱
典型破裂	付出未被感激 → 内在图被验证 (“我的价值被取消”)
温尼科特需求	镜映 (“看见我的付出”) 而非 “被需要” 驱动

客体关系干预 (2 号专属干预):

- 不进入 “被需要” 的角色: 咨询师不接受来访者的 “过度照顾” (如: 送礼、关心咨询师的生活等)。以拒绝但温和的方式, 帮助来访者看见 “我被拒绝了, 但咨询师还在”。
- 命名投射性认同: “你照顾我的时候, 我感觉到 ‘被需要’ –但这不是真实的咨访关系。我们的关系是: 你在这里被看见, 不是来 ‘被需要’ 的。”
- 提供 ‘未被打扰的’ 镜映: “你刚才说了一段很脆弱的话。我注意到你没有 ‘转换’ 为照顾我的角色–你让自己留在了脆弱里。这对你来说是新的。”
- 重写内在图: “你今天没有 ‘为他做事’。他没崩, 你也还在这里。这验证了: 你的价值不依赖他是否需要你。”

5.2 回避 × 5 号观察型

典型表现: - 在关系中保持 “观测距离” - 用思考替代感受 - 伴侣表达情感时, 自己会 “短路” (麻木/分析/转移话题) - 亲密升级时, 本能想撤 - 容易把 “独立” 等同于 “自由”, 把 “依赖” 等同于 “枷锁”

评估要点: - 早期 “需要 = 软弱” 的内化路径 - 身体被允许的边界 - 哪些时刻他其实想靠近, 但不敢

干预脚本:

首次咨询: > 咨询师: “你说, 你想解决 ‘太独立’ 的问题–但我想先说, 你的独立很可能保护过你。在你小时候, ‘不打扰’ 是不是你最安全的策略?” > 来访者: “……我妈那时很忙, 我自己玩最碍事” > 咨询师: “所以 ‘碍事’ 让你活下来, 现在它让你……?” > 来访者: “……没办法靠近她 (指伴侣)”

中期 (小心处理身体): > 咨询师: “现在, 当你想象 ‘她哭着跟你说, 我需要你’ –你身体有什么反应?” > 来访者: “想关上门” > 咨询师: “好。如果你允许这个感觉在, 而不立即关门–它会变成什么?” > (等待) > 咨询师: “你发现了吗? 它可能没有变成你害怕的 ‘吞没’ –它只是难, 但还在你承受范围内”

整合方向: - 允许 5 号在 “安全的小剂量” 下, 练习待在自己不舒服的感受里 - 不催他 “打开”, 而是一点点 “够近” - 发展健康 5 号的 “有选择的连接” (既独立, 也能深度共在)

客体关系视角 (本次新增):

客体关系要素	回避 × 5 号
自体表征	“我是会被侵入的、应被保护的”
客体表征	“他者是会入侵我空间的”
关系模板	“我退 = 我安全”
投射性认同	投射”入侵” → 对方真的开始”压过来”
典型破裂	咨询师表达关心 → 内在图被验证 (“咨询师也要入侵我”)
温尼科特需求	尊重他者 (“咨询师不压过来”) 而非”控制”

客体关系干预 (5 号专属干预):

- “不压过来”姿态: 咨询师不主动靠近、不表达过多关心、不追问感受。让 5 号”看见”咨询师没有入侵他-这本身是补上内在图的开始。
- 不要求”打开”: “我不需要你打开什么。今天你能坐在这里, 就是足够的。”
- 破裂后提供”退出选项”: 如果咨询师无意中”压过来”(过于热情的关心), 马上提供”你可以随时停止谈论这个”的选项。
- 接受沉默: 5 号可能咨询中沉默 10 分钟。咨询师不忙打破这个沉默, 不说”我们可以谈点别的吗?”。让他在咨询师的静默中发现”他没被入侵”。
- 重写内在图: “今天你说了 2 句你以前不会说的-我在那 2 句中, 没有’压过来’。你的身体能记下这个。”

5.3 混乱 × 4 号浪漫型

典型表现: - 关系中”渴望-恐惧”的剧烈摇摆 - 高度敏感, 容易感受到被拒绝 (甚至对方没拒绝) - 容易把自己的情绪”放大”或”戏剧化” - 看到”平凡的幸福”会无意识怀疑”这真的属于我吗?” - 在亲密关系中”测试”伴侣, 测试失败后愤怒 + 受伤 + 自我封闭

评估要点: - 早年的”被看见/被忽略”经验 - 哪些情境会让”系统失控” - 自我安抚能力 (混乱型通常极弱)

干预脚本:

首次咨询: > 咨询师: “你说, 你很害怕’被抛弃’, 但你又常常自己先走-这是怎么回事?” > 来访者: “我不是要走, 我是太害怕了” > 咨询师: “我理解。你能不能告诉我, 你最害怕的是’被离开’还是’被靠近之后又失去’?” > (这一步是把”现在的问题”和”过去的恐惧”分开)

中期 (工作”推-拉”): > 咨询师: “上周你说, 你又一次想’消失’-我想做个小练习。你愿意想象, 这次’消失’之后, 他真的来找你了-你在那个画面里, 是什么感觉?” > 来访者: “我怕他真的来了, 我不知道该做什么” > 咨询师: “所以, 你要’消失’, 有一部分是……不知道’被爱’该怎么接?” > 来访者: “……(哭)”

整合方向: - 给混乱 4 号”持续在场”的咨询师经验 (这本身就是治疗) - 训练”觉察到自己要推”的预警信号 - 发展健康 4 号的”将感受转化为创造” (而非沉溺)

客体关系视角 (本次新增):

客体关系要素	混乱 × 4 号
自体表征	“我是有缺陷的、不完整的”
客体表征	“他者是完整的、可以拯救我的”
关系模板	“我会被抛弃 = 我不够好”
投射性认同	投射”被抛弃” → 对方真的开始回避

客体关系要素 混乱 × 4 号

典型破裂 咨询师”不一致” (上周热情, 这周平静) → 内在图验证
 温尼科特需求 抱持 (“他者能接住我的戏剧化”) 而非”修复”

客体关系千顶 (混乱 4 号专属干预):

- 不进入”拯救者”角色: 混乱 4 号的投射性认同是”我不够好, 需要被拯救”。如果咨询师”过度共情”、“过度卷入”, 会被来访者”验证”为”只有咨询师能拯救我”-这强化了原模式。
- “说错话”变礼物: 混乱 4 号特别容易被咨询师的任何”不一致”验证。咨询师故意在合适的时候说”我可能错了”、“我这句话不太准” → 破裂-修复 → 重新建立”咨询师是真人不是”应该完美的拯救者”“。
- 提供”丑照”: 咨询师可以适度”示弱” (“今天我状态不太好”)。混乱 4 号看到”咨询师也不完美也能工作” → “我不完美也能被接受”。
- 重写内在图: “今天你没有’推’。你待在了不舒服里。这不是’我不够好’, 是’我可以不完美也被看见’。”

5.4 焦虑 × 6 号疑惑型

典型表现: - 反复求证”你真的爱我吗?” - 容易看到”被威胁”的细节 - 信任建立极慢, 崩塌极快
 - 在关系中, 要么过度依赖 (被焦虑驱动), 要么过度怀疑 (被恐惧驱动) - 容易”测试”伴侣, 测试本身破坏关系

干预脚本:

咨询师: “你刚才说, 你每次问’你爱我吗’, 对方沉默几秒, 你就开始脑补-我猜, 那个’几秒的沉默’对你来说, 等于’他已经在离开’?” 咨询师: “你愿意我们试试, 以后当你想要问’你爱我吗’时, 先在咨询里做一次预演-看你的系统在告诉你什么?”

整合方向: - 帮助 6 号区分”直觉”和”投射的怀疑” - 训练”等事实更清楚再做反应” - 发展健康 6 号的”信任能力” (信任自己, 也信任他人)

客体关系视角 (本次新增):

客体关系要素 焦虑 × 6 号

自体表征 “我是无依无靠的、需警觉的”

客体表征 “他者会背叛/惩罚/控制”

关系模板 “我警觉 = 我安全”

投射性认同 投射”不可信” → 对方真的开始不可信

典型破裂 咨询师”忘记”某件小重 → 内在图验证 (“咨询师也靠不住”)

温尼科特需求 可预测性 (“他能做他能做的事”) 而非”反恳求保证”

客体关系千顶 (6 号专属干预):

- “一致性”高于”反恳求保证”: 6 号经常要求”你保证你会一直在”。咨询师不说”我保证”, 而是在每次咨询中以身作则: 准点开始、准点结束、说到做到。6 号”从可预测性中学会信任”, 而不是”从保证中学会信任”。

- 破裂后认真修复:6号最看重”咨询师是否在出问题后能修复”。咨询师主动在咨访中偶发制造破裂(“我今天迟到2分钟”,“我上次说错了”),然后认真修复。这提供”破裂可以修复”的内在图。
- 不卷入”求证”:“你问我’你爱我吗’,我不会为了哄你而说’爱’。我会说:‘我在这里,今天、现在,我是关心你的。这是实际的。’
- 重写内在图:“这周你问我’你会在吗’,我在了。这不是’因为我保证了’,是’我今天是’。你可以从这个中学习信任,不是从’保证’中。”

5.5 回避 × 8 号挑战型

典型表现: - 外在强势,内在脆弱 - 不允许自己”被看到弱” - 亲密关系中,要么控制(因为控制 = 安全),要么”不战而走” - 容易被伴侣的”软弱”或”情绪”激活-然后攻击或撤退 - 用”我不需要任何人”保护内在那个”很怕被伤害的小孩”

干预脚本:

咨询师:“你说,你最讨厌’被控制’-但我也注意到,你常常比伴侣更先控制局面。这两件事,有没有可能是同一件事?” 咨询师:“你8号的外壳下面,是谁在害怕?”

整合方向: - 允许8号在绝对安全的咨询空间里,先承认脆弱 - 慢暴露原则:一次只碰一小片 - 发展健康8号的”有力量地靠近”(而非用力量推开)

客体关系视角(本次新增):

客体关系要素	回避 × 8 号
自体表征	“我是脆弱的、需保护的”
客体表征	“他者会利用我的脆弱”
关系模板	“我强 = 我不会被伤害”
投射性认同	投射”利用” → 对方真的开始退缩、怕他
典型破裂	咨询师表现出任何”弱” → 内在图验证(“咨询师也会被伤害”)
温尼科特需求	可受控的暴露(“在绝对安全下显示软”)而非”被打败”

客体关系千顶(8号专属干预):

- 不手软、不手硬:8号”检测”咨询师是否”同样强”。咨询师不能”手软”(会被视为”他”也不够强”),也不能”比8号更强”(会被视为”威胁”)。最佳位置是”温柔的坚定”。
- “不打击他的强”:8号的”强”是他用了很久的防御。咨询师不”打掉”这个强,而是”在这层强后面、你什么时候能休息一下?”-允许8号”足够安全后才展示脆弱”。
- 提供”能不反击”的体验:如果8号在咨询中攻击了咨询师,咨询师不反击。这提供”不反击不会被打败”的新经验-但咨询师要在事后真诚地表达”那句话伤害到我了”(是”也是人”的示范,不是”专业神圣”或”被打败”)。
- 重写内在图:“今天你说了’我不需要任何帮助’。但你依然来了。这个’然’是新的-你不需要,但你选择了需要。”

第六部分: 工具清单与评估模板

配套独立模块:11-工具清单与评估模板/ 目录 - 工具清单与评估模板-主文档.md — 本节的独立完整版 - 咨询师记录模板-单次咨询卡.md —1 分钟填完的标准化记录卡 - 评估量表与来访者自助工具.md —量表使用法 + 来访者自助工具包 (三栏日记/每周一问/激活态急救/咨询后反馈)

配套 4.1 三轴递进路径:6 阶段咨询流程的可操作工具配套 4.2 各阶段关键技术的 11 个技术 (见 4.2) 配套 5.4 案例概念化模板的标准化输出

6.1 评估量表

量表	用途	使用场景
ECR-R(Experiences in Close Relationships-Revised)	依恋象限评估	咨询前/每 3 个月复查
Riso-Hudson Enneagram Type Indicator(RHETI)	九型主型评估	咨询前/概念化时
Riso-Hudson 健康层级访谈	健康层级评估	概念化时/状态复查
DAS(Differentiation of Self Inventory)	自我分化程度	伴侣咨询
CTQ(Childhood Trauma Questionnaire)	早年创伤筛查	评估时 (必要时)

6.2 单次咨询结构模板 (60 分钟)

时段	内容	占比
0-5min	接续上次, 本次目标确认	5%
5-15min	情绪/状态扫描	15%
15-35min	核心工作 (命名模式/触碰恐惧/整合练习)	35%
35-45min	新行为实验或整合性收束	15%
45-55min	来访者反馈 + 咨询师回应	15%
55-60min	作业/下次预约	5%

6.3 咨询师记录模板

日期:

来访者:

阶段:

本次焦点: 依恋/九型/整合/其他

情绪状态(咨询前):

情绪状态(咨询后):

激活态出现?(是/否,何情境):

三轴观察(焦虑x/回避x,九型主型___,健康层级___,客体关系维度___):

本次关键洞见:

本次未完成议题:

下次方向:

风险评估:

6.4 给来访者的”自助工具”

日常练习: 三栏日记

情境	我的反应 (行为)	我现在能看见的模式
他没回消息	立刻发了三条长消息	我的”被抛弃”警报响了;2号在试图用力挽留
朋友迟到	一边说没事一边生气	我的”被忽视”按钮被按了;6号在投射怀疑
对方说”我需要空间”	立刻退回到工作	5号关闭了连接;其实”我需要空间” “他不要我”

每周一问: > “过去一周,我有没有一个时刻,我的反应是系统在保护我,但我已经不需要这个保护了?”

附录: 咨询师自我校准

咨询师本身也需要在三轴上有自我觉察 (v2.2 升级):

1. 你自己的依恋象限是什么?—会影响你对不同来访者的反应
 - 焦虑咨询师遇到回避来访者,容易”没被回应”而生气或退却
 - 回避咨询师遇到焦虑来访者,容易被压垮或麻木
2. 你自己的九型主型是什么?—会影响你的”盲区”
 - 9号咨询师可能不愿碰冲突
 - 6号咨询师可能过度警惕
 - 3号咨询师可能”看起来什么都会”但缺乏深度停留
3. 咨询师在咨询中也需要”被修复”—定期接受督导或个人咨询

金科玉律: > 你能陪来访者去多远,取决于你曾独自走多远。

结语

依恋告诉我们”在关系中怎么做”，九型告诉我们”为什么这样做”，客体关系告诉我们”他以为的世界长什么样”。

三者合一，咨询师才能在行为（当下）、动力（中层）、结构（深层）之间自如穿梭。依恋给当下的稳定，九型给觉察的方向，客体关系给改写的可能。**v2.2 的核心升级，就是从”双轴”走到”三轴”-把”内在地图”显性化，让咨询工作不止于”调节”，而能”修补”。**

愿这份指南成为你工作中的地图，而非枷锁-每个来访者都是新的故事，需要你带着地图，而不是按图索骥。

版本:v2.2 适用场景: 个人情感咨询、伴侣治疗、长期个人成长更新机制: 每 6 个月根据临床反馈修订发布日期:2026-07-21