

# 一念三轴·依恋 × 九型 × 客体关系三轴融合咨询框架

**品牌名:** 一念三轴·Yiinian Triaxis **作者:** 秦枫 (一念三轴原创作者) **商业支持:** 圆诺咨询 **理论描述:** 依恋 × 九型 × 客体关系三轴融合咨询框架 v2.2

适用对象: 情感咨询师、伴侣治疗师、亲密关系教练、个人成长陪伴者核心理念: 依恋是“关系操作系统”, 九型是“人格内核”, 客体关系是“内在剧本”, 三轴合一才能在咨询中既看清行为模式, 也看穿背后的动机驱动力与早期关系印记文档定位: 可直接落地的咨询师工作手册, 含理论、评估、流程、话术与干预技术框架性质: 本套件作者基于临床整合实践提出的**工作模型 (working model)**, 不是经过严格实证检验的学术理论, 三轴同时正交的具体整合方式为作者原创

## 目录

- 第一部分: 理论三轴 (依恋 × 九型 × 客体关系)
  - 1.1 依恋理论 (Bowlby-Ainsworth-Hazan-Shaver)
  - 1.2 九型人格 (Ichazo-Riso-Hudson)
  - 1.3 三个理论视角的整合
  - 1.4 三轴融合的必要性: 为什么必须升级 (v2.0)
  - 1.5 三轴的整合框架 (v2.0)
- 第二部分: 映射矩阵
  - 2.1 依恋象限 × 九型主型映射表
  - 2.2 翼型、压力点与健康层级
  - 2.3 关系中的“双人舞”-典型配对
- 第三部分: 咨询理论架构
  - 3.1 三轴诊断模型 (焦虑轴 × 回避轴 × 九型主型 + 客体关系维度)
  - 3.2 核心恐惧解码
  - 3.3 防御机制的三层识别
  - 3.4 整合成长路径
- 第四部分: 咨询操作指南
  - 4.1 五阶段咨询流程
  - 4.2 各阶段关键技术
  - 4.3 伴侣咨询的特殊处理
- 第五部分: 典型构型干预脚本
  - 5.1 焦虑 × 2 号助人型
  - 5.2 回避 × 5 号观察型
  - 5.3 混乱 × 4 号浪漫型
  - 5.4 焦虑 × 6 号疑惑型
  - 5.5 回避 × 8 号挑战型

- 第六部分: 工具清单与评估模板
- 附录: 咨询师自我校准

## 第一部分: 理论三轴 (依恋 × 九型 × 客体关系)

### 1.1 依恋理论

依恋 (Attachment) 是 Bowlby 在 1969 年提出的进化生物学概念, 后由 Ainsworth 通过” 陌生情境实验” 建立了实证基础, Hazan&Shaver(1987) 将其延伸至成人浪漫关系。

两个核心维度 (Brennan, Clark&Shaver, 1998 ECR 量表):

- 焦虑维度 (Attachment Anxiety): 对被抛弃、被忽视的恐惧程度
- 回避维度 (Attachment Avoidance): 对亲密、身体/情感接近的不舒适程度

由此划分出四种成人依恋风格:

| 风格                 | 焦虑 | 回避 | 核心体验            | 关系策略        |
|--------------------|----|----|-----------------|-------------|
| 安全型 (Secure)       | 低  | 低  | “我值得被爱, 他人基本可靠” | 灵活: 能靠近也能独立 |
| 焦虑型 (Pre-occupied) | 高  | 低  | “我不够好, 需要不断确认爱” | 黏附、追、情感激活   |
| 回避型 (Dismissive)   | 低  | 高  | “我不需要, 他人不可靠”   | 退缩、去激活、自我依赖 |
| 混乱型 (Fearful)      | 高  | 高  | “我想要但我怕靠近会受伤”   | 推拉、解离、创伤重演  |

关键洞见: - 依恋风格不是” 性格”, 而是关系中的情绪调节策略 - 它形成于早期与主要照顾者的互动, 但可在后续关系中被修复 - 它在压力下会激活, 稳定状态下会” 休眠”

### 1.2 九型人格

九型人格 (Enneagram) 的现代体系由智利心理学家 Claudio Naranjo 从 Oscar Ichazo 处继承, Riso&Hudson 做了体系化发展。其核心假设:

每个人都有一种主导的” 主型” (Type 1-9), 它由核心恐惧和核心欲望定义, 并配以特定的注意力习惯与防御机制。

| 类型    | 核心恐惧     | 核心欲望     | 注意力习惯          | 典型防御      |
|-------|----------|----------|----------------|-----------|
| 1 完美型 | 不完美、错误   | 善良、正直    | 看到” 应该” 与” 错误” | 压抑冲动、反当   |
| 2 助人型 | 不被需要、不被爱 | 被爱、被需要   | 关注他人需要         | 压抑自我、投射需求 |
| 3 成就型 | 无价值、不成功  | 有价值、值得赞赏 | 看向目标与形象        | 角色扮演、否认情感 |

| 类型    | 核心恐惧    | 核心欲望    | 注意力习惯       | 典型防御      |
|-------|---------|---------|-------------|-----------|
| 4 浪漫型 | 平凡、无独特性 | 找到自我、独特 | 关注”缺失”与”意义” | 内摄、抑郁式退缩  |
| 5 观察型 | 无能、被侵占  | 有能力、有空间 | 退入内心思考      | 与身体脱节、分离  |
| 6 疑惑型 | 无支持、被背叛 | 安全感、归属  | 看向威胁与权威     | 反恐惧、投射怀疑  |
| 7 享乐型 | 痛苦、被限制  | 自由、满足   | 看向可能性与逃避    | 合理化、升华、转移 |
| 8 挑战型 | 被控制、被伤害 | 自我保护、掌控 | 看向权力与公平     | 反向形成、否认脆弱 |
| 9 和平型 | 冲突、分离   | 平静、合一   | 看向他人节奏      | 麻醉、自我遗忘   |

关键洞见: - 九型描述的是注意力的”默认方向”和情绪的”默认回避” - 每个类型都有压力方向 (解离态) 与安全方向 (整合态) - 类型是”倾向”而非”牢笼”, 但它确实塑造了来访者对亲密的想象方式

### 1.3 三个理论视角的整合

前两节分别介绍了依恋理论和九型人格, 本节先给出一个”鸟瞰”, 把三个理论的’分工’说清楚 (每个理论的详细内容见 1.4、1.5):

| 理论   | 核心问题              | 类比  | 细节节     |
|------|-------------------|-----|---------|
| 依恋   | 来访者在关系中怎么做?(行为)   | 路径  | 1.1     |
| 九型   | 来访者为什么这样做?(动力)    | 目的地 | 1.2     |
| 客体关系 | 来访者内在的世界长什么样?(结构) | 地图  | 1.4、1.5 |

一个比喻: - 依恋告诉你来访者的”GPS 路径”(追 / 躲 / 推拉) - 九型告诉你他的”目的地”(他想去哪里、他害怕去不了哪里) - 客体关系告诉你他的”地图”(他以为世界长什么样、他以为别人会怎么对他)

整合的关键洞见: > 三个理论不是”三个流派让咨询师选”, 而是三个互补的视角, 缺一不可。> 1.4 论证”为什么必须三轴融合”, 1.5 给出”三轴如何整合操作”。

### 1.4 三轴融合的必要性: 为什么必须升级

**1.4.1 双轴的局限** 在情感咨询实践中, 依恋 × 九型 (双轴) 是常见的整合框架。但临床经验显示, 双轴在 3 个关键场景下不够 (本节基于整合实践经验, 非历史性声明):

场景 A: 关系中的”重复” - 双轴能识别”他在关系中追”(依恋)+”他怕不被需要”(九型 2 号) - 但无法解释: 为什么他在不同的伴侣身上重复同样的剧本? - 双轴看不到”来访者对’亲密’的内在想象”-这部分由客体关系回答

场景 B: 咨询师的”反移情” - 双轴能给来访者”分类”, 但解释不了咨询师为什么被这个来访者激活 - 经典例: 咨询师对 2 号来访者感到莫名的疲惫-这是来访者”投射性认同”的结果 - 客体关系给出了”投射性认同”这个机制, 让咨询师能识别 + 命名自己的反移情

场景 C: 咨询中的”破裂” - 双轴能描述”咨询师迟到 5 分钟, 来访者情绪崩溃”是”焦虑型激活” - 但无法解释: 为什么这种”激活”会反复发生, 且修复后还会再发生? - 客体关系给出了”内在图被验证”的机制-“5 分钟迟到”激活的是”他人忽略我”这个结构性图

### 1.4.2 为什么必须加第三轴 (客体关系) 第三轴 (客体关系) 回答了双轴回答不了的 3 个核心问题:

| 双轴回答不了的问题             | 客体关系的回答                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| “为什么他在不同伴侣身上重复同样的剧本?” | 因为他有内在客体关系图 (“自体-客体”配对), 它在早年形成, 持续到当下, 自动筛选/塑造新关系 |
| “为什么咨询师会被这个来访者激活?”    | 因为投射性认同-来访者把”自己的 X”放到咨询师身上, 咨询师在不知不觉中接受了这种投射       |
| “为什么破裂会反复发生?”         | 因为内在图被验证-破裂事件激活了早年的”我不行/他人不行”图, 修复只是暂时的, 新事件会再次激活  |

核心论点: > 依恋告诉你”他在做什么”(行为) > 九型告诉你”他为什么这样做”(动力) > 客体关系告诉你”他以为的世界长什么样”(结构) > > 没有第三轴, 你永远只能”修行为”, 无法”修结构”。

### 1.4.3 三轴缺一不可的临床证据 试想一个咨询情境: 来访者每次都在”咨询师迟到 5 分钟”后陷入情绪低落。

双轴分析: - 只问依恋: 这是焦虑型, 被抛弃感被激活, 建议自我安抚 - 只问九型: 这可能是 4 号, 他在意”被特殊对待” - 双轴融合: 焦虑型依恋 + 4 号九型 = “他对”不被特殊对待”的恐惧被激活”

问题: 双轴分析到此为止, 但修复后下次还会再发生。

三轴分析: - (依恋) 焦虑型对”被抛弃”的高敏感 + - (九型)4 号对”不被特殊对待”的恐惧 + - (客体关系) 他内在的”他人都忽略我”表征的”被验证”

三轴的临床价值: > - 依恋层: 命名激活, 身体调节 (短效) > - 九型层: 看见”我需要被特殊对待”的故事 (中效) > - 客体关系层: 修补内在图 (“这次咨询师迟到了 5 分钟, 但他还在, 他没有忘记我-这是新的内在图, 不是’他人都忽略我’的验证”)(长效)

关键: 没有客体关系层, 修复只是”安慰”, 不是”修补”。安慰下次还来, 修补能改变来访者的内在结构。

双轴升级三轴, 不是”否定双轴”, 而是”补完”:

| 框架                  | 能做的            | 不能做的         |
|---------------------|----------------|--------------|
| 单一理论 (只用依恋)         | 看见行为           | 看不见动力、看不见结构  |
| 双轴 (依恋 + 九型)        | 看见行为 + 动力      | 看不见结构、无法长效修补 |
| 三轴 (依恋 + 九型 + 客体关系) | 看见行为 + 动力 + 结构 | 能长效修补内在图     |

## 1.5 三轴的整合框架

本节是 1.4 论证的具体操作-“三轴如何在咨询中实际工作”。

### 1.5.1 三个理论回答三个不同的问题 (深化版)

| 维度   | 依恋            | 九型          | 客体关系               |
|------|---------------|-------------|--------------------|
| 理论源头 | 进化生物学 / 发展心理学 | 类型学 / 精神分析  | 精神分析 (克莱因派/自体心理学)  |
| 关注点  | 关系中的行为策略      | 行为的动力来源     | 行为的内在世界结构          |
| 时间视角 | 当下激活 (成年)     | 长期倾向 (终身)   | 长期表征 (早年 → 持续到当下)  |
| 临床抓手 | 身体反应、行为模式     | 核心恐惧、防御     | 移情、反移情、内在图         |
| 典型技术 | 安全基地、激活调节     | 暴露核心恐惧、整合方向 | 投射性识别、温尼科特时刻、破裂-修复 |

**1.5.2 客体关系的 5 个核心概念** 这 5 个概念是理解“三轴”的关键。详细图谱见 10-客体关系专题包/, 操作技术见 10-客体关系专题包-5 技术自评卡.md:

概念 1: 内在客体关系 (Internal Object Relations) - 自体表征: “我是什么样的” - 客体表征: “他人是什么样的” - 关系模板: 在新关系中期待、解读、行为的固定模式 - 例: 童年被忽视 → 自体“我不重要” + 客体“他人都忽略我” → 关系模板“在关系中我会被忽略”

概念 2: 投射性认同 (Projective Identification) - 把自己的某部分 (难以接受的) 放到对方身上 - 双向-对方不知不觉中接受, 共同制造“验证了投射”的情境 - 这是咨询师反移情 (countertransference) 的核心机制

概念 3: 分裂 (Splitting) - “偏执位”特征: 把好与坏完全分开 (全好/全坏互不相关) - 早期未整合的心智只能容纳“全好”或“全坏” - 临床表现: 理想化与贬低的快速切换

概念 4: 温尼科特的“足够好的母亲” - 完美不是好, “足够好”才是好 - 母亲不必永远正确、不必永远在场、不必永远共情 - 不完美的修复 (rupture-repair cycle) 是最深层的疗愈

概念 5: 自体客体 (Selfobject) 经验 (Kohut) - 一种被体验为自己的一部分的人 (虽然客观是另一个人) - 三种功能: 镜映 (我被看到)、理想化 (我仰望)、孪生/同类感 (我属于) - 自体客体的失败 → 3 号/4 号“必须特别”、5 号/8 号“必须强”、9 号“必须消失”

**1.5.3 三轴的层级关系 (从基础到上层)** 三轴不是“平等并列”的, 而是有层级关系的:

顶层: 客体关系 (结构层)  
 ↑ 决定“他以为的世界长什么样”  
 | → 这一层改变最难, 但最长效  
 |  
 中层: 九型 (动力层)  
 ↑ 决定“他为什么这样做”  
 | → 这一层是中层, 可缓慢改变  
 |  
 底层: 依恋 (行为层)  
 决定“他在关系中怎么做”  
 → 这一层最快变, 但最不稳定

为什么是“客体关系在顶层”?

| 层级      | 可改变性 | 改变方式        | 临床例             |
|---------|------|-------------|-----------------|
| 依恋 (行为) | 快变   | 给安全感 / 激活调节 | 来访者这周从“追”变成“等”了 |

| 层级        | 可改变性 | 改变方式               | 临床例                   |
|-----------|------|--------------------|-----------------------|
| 九型 (动力)   | 慢变   | 觉察核心恐惧 / 整合方向      | 来访者慢慢看到”我不是’被需要’才有价值” |
| 客体关系 (结构) | 最难变  | 修补内在图 (温尼科特/破裂-修复) | 来访者真的相信”他人会留下来”       |

临床含义: - 短期咨询 (8-20 次): 主要工作依恋层 + 部分九型层 - 中期咨询 (20-50 次): 依恋 + 九型 + 客体关系三层都做 - 长期咨询 (50+ 次): 客体关系层是核心工作, 这是最难但最长效的改变

反模式 (必须避免): - 跳过底层直接做顶层: 在来访者还没安全感时, 直接做”修补内在图”会失败 - 只做底层不做顶层: 能”安抚情绪”, 但结构性”重复”不会改变 - 顺序铁律: 先依恋 (给安全感) → 再九型 (觉察动力) → 最后客体关系 (修补结构)

**1.5.4 三轴的对话机制 (整合方法)** 三轴如何”对话”? - 一个来访者的三轴如何整合成一个连贯的理解?

整合公式 (三轴) = 依恋激活 × 九型动力 × 客体关系结构

例: 焦虑 × 2 号 × ”被忽略的内在图”

| 轴    | 内容                                                   |
|------|------------------------------------------------------|
| 依恋   | 焦虑型 (高焦虑、高敏感)                                        |
| 九型   | 2 号助人型 (核心恐惧: ”不被需要”、核心欲望: ”被爱”)                     |
| 客体关系 | 自体: ”我是有用的” + 客体: ”他人是脆弱的、需被照顾的” + 关系模板: ”我付出 = 他爱我” |

三轴”对话”: - 依恋提供”激活机制”: 焦虑型对”被抛弃”的高敏感, 让 2 号的”不被需要”恐惧特别容易被激活 - 九型提供”动力核心”: 2 号的”被需要 = 被爱”等式, 是行为的内在发动机 - 客体关系提供”结构图”: 自体”我是有用的” + 客体”他人需被照顾”, 是行为的内在剧本  
三者如何互相强化: - 焦虑型被”伴侣可能不需要我”激活 (依恋) - 2 号立刻用”我必须更付出”回应 (九型) - 内在图被验证: ”伴侣确实不需要我” (客体关系) - 循环强化-这就是为什么双轴看不见这个循环的全貌, 因为结构层 (客体关系) 缺失

临床干预如何”三轴对话”: - 依恋层: ”我现在感到你 (来访者) 的焦虑激活了-你能命名它的强度吗?” (身体觉察) - 九型层: ”你刚刚说’如果我不再付出, 我还有什么价值’-这是你 2 号的核心故事吗?” (动力觉察) - 客体关系层: ”你内在有一个图: ’他人都需要我, 否则就不要我’-但今天我 (咨询师) 在这里, 不是你’有用’, 而是因为我在-这是新的图, 你能接住吗?” (结构修补)

三个干预针对三个不同的层, 缺一不可。

**1.5.5 三轴冲突时的优先级** 当三轴”打架”时 (对同一个行为, 三轴的解释不同), 咨询师该信谁?

例: 来访者说”我不需要任何人”

- 依恋层解释: 回避型在用”去激活”策略保护自己
- 九型层解释: 5 号在”与身体脱节”-他真的不需要情感连接
- 客体关系层解释: 他内在图是”他人都不可靠, 自己最安全”-他在保护自己的内在图

优先级铁律: 安全 > 结构 (在安全没保障前, 不做结构工作)

| 优先级          | 适用情况                   | 先做什么               |
|--------------|------------------------|--------------------|
| 1. 安全 (依恋)   | 来访者当下激活、有自伤/自杀风险、严重耗竭  | 先稳定 (安全感、激活调节)     |
| 2. 动力 (九型)   | 来访者有基本安全、但核心恐惧反复激活     | 觉察动力 (命名核心恐惧、整合方向) |
| 3. 结构 (客体关系) | 来访者能稳定、动力被觉察、但内在图反复被验证 | 修补结构 (温尼科特、破裂-修复)  |

反模式: - 来访者严重焦虑 → 直接做”修补内在图” → 失败 - 来访者有基本稳定 → 一直做”安抚” → 永远不深入 - 顺序: 依恋 (给安全感) → 九型 (觉察动力) → 客体关系 (修补结构)

**1.5.6 三轴整合示例 (3 个真实场景)** 示例 1: 焦虑 × 2 号 × “被忽略的内在图” (已在 1.5.4 详述) - 依恋: 焦虑型激活 - 九型: 2 号核心恐惧 - 客体关系: 内在图验证 - 整合干预: 三层同步  
示例 2: 回避 × 8 号 × “被利用的内在图”

| 轴    | 内容                                              |
|------|-------------------------------------------------|
| 依恋   | 回避型 (低焦虑、高回避)                                   |
| 九型   | 8 号挑战型 (核心恐惧: “被控制、被伤害”、核心欲望: “自我保护、掌控”)        |
| 客体关系 | 自体: “我是脆弱的” + 客体: “他人是会利用我的” + 关系模板: “我强 = 我安全” |

三轴整合: - 回避型让 8 号”去激活”情绪, 看起来”很强” - 2 号核心恐惧”被控制”驱使他”先发制人” - 内在图”他人会利用我”自动验证-任何关系都被他解读为”利用”

整合干预: - 依恋层: “你刚才用 5 分钟讲完了过去 30 年的事-我感到你在’控制’节奏。这是你的回避在保护你。” (身体觉察) - 九型层: “你说’我不怕任何人’-但’不怕’也是一种保护, 你怕什么?” (动力觉察) - 客体关系层: “你内在有一个图: ‘他人都是想利用我’。但今天我 (咨询师) 在这里-我不是想利用你。我只是想认识你。这是新的图, 你能接住吗?” (结构修补)

示例 3: 混乱 × 4 号 × “不够好的内在图”

| 轴    | 内容                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 依恋   | 混乱型 (高焦虑、高回避-“我想要但我怕”)                                    |
| 九型   | 4 号浪漫型 (核心恐惧: “平凡、无独特性”、核心欲望: “找到自我、独特”)                  |
| 客体关系 | 自体: “我是坏的/有缺陷的” + 客体: “他人是好的/能拯救我的” + 关系模板: “我不够好 = 我会受伤” |

三轴整合: - 混乱型让 4 号同时渴望又害怕亲密-“我想要但我怕” - 4 号核心恐惧”平凡”让他戏剧化所有情绪 - 内在图”我不够好”让他选择性注意”自己不够好”的证据

整合干预: - 依恋层: “你同时想要靠近又想退-混乱型的’推-拉’在保护你。你能命名这个’推’和’拉’吗?” (双重觉察) - 九型层: “你说’我必须是独特的, 否则我不存在’-这是 4 号的核心故事。这是真的吗?” (动力觉察) - 客体关系层: “你内在有一个图: ‘我不够好, 他人是好的’。但今天我看到的是: 你在这里 (而不是那个’好的’他人)。你能让’你在这里’成为新的图吗?” (结构修补)

**1.5.7 12 构型的”内在客体关系图谱”(速览)** 每个构型都有其特定的”自体-客体”配对。详细图谱见 10-客体关系专题包/; 这里只列速览:

| 构型       | 自体表征         | 客体表征            | 关系模板        | 典型投射性认同              |
|----------|--------------|-----------------|-------------|----------------------|
| 焦虑 × 2 号 | “我是给予者”      | “他人是脆弱的、需要我的”   | 我照顾他 = 他爱我  | 投射”无助” → 对方真的变得依赖    |
| 焦虑 × 6 号 | “我是警觉的”      | “他人是潜在威胁”       | 我警觉 = 我安全   | 投射”不信任” → 对方真的变得不可信  |
| 焦虑 × 4 号 | “我是独特的/有缺陷的” | “他人是完整的/有爱的”    | 我不同 = 我值得被爱 | 投射”被抛弃” → 对方真的开始回避   |
| 回避 × 5 号 | “我是被入侵的”     | “他人是入侵的”        | 我退 = 我安全    | 投射”入侵” → 对方真的开始”压过来” |
| 回避 × 8 号 | “我是脆弱的”      | “他人是会利用我的”      | 我强 = 我安全    | 投射”被利用” → 对方真的开始退缩   |
| 回避 × 3 号 | “我是有价值的(角色)” | “他人是观众/裁判”      | 我成功 = 我值得存在 | 投射”评判” → 对方真的开始评判    |
| 混乱 × 4 号 | “我是坏的/有缺陷的”  | “他人是好的/能拯救我的”   | 我不够好 = 我会受伤 | 投射”被拯救” → 对方真的变得”超人” |
| 混乱 × 1 号 | “我是应该被批评的”   | “他人是会审判我的”      | 我完美 = 我安全   | 投射”审判” → 对方真的开始批评    |
| 混乱 × 9 号 | “我是不存在的”     | “他人是存在的/重要的”    | 我消失 = 我安全   | 投射”需要” → 对方真的开始提要求   |
| 安全 × 7 号 | “我是有趣的”      | “他人是有趣的(直到不有趣)” | 我们有趣 = 我存在  | 投射”无趣” → 对方真的开始无聊    |
| 安全 × 9 号 | “我是和的/配合的”   | “他人是冲突的/重要的”    | 我配合 = 我属于   | 投射”冲突” → 对方真的开始冲突    |
| 安全 × 3 号 | “我是有能力的(任务)” | “他人是需要我帮助的”     | 我有用 = 我被爱   | 投射”需要” → 对方真的开始依赖    |

这张表是”诊断 + 干预”的双重地图: - 诊断: 来访者的”自体-客体”配对是什么?  
- 干预: 咨询师不要进入这个配对中的”对方”角色 (避免强化投射性认同)

### 1.5.8 关键洞见 (本节小结)

- 三轴不是三个流派让咨询师选, 而是三个互补的视角, 缺一不可
- 层级关系: 依恋 (行为, 基础) → 九型 (动力, 中层) → 客体关系 (结构, 顶层)
- 顺序铁律: 先依恋 (给安全感) → 再九型 (觉察动力) → 最后客体关系 (修补结构)
- 对话机制: 三轴不是”分别处理”, 而是整合公式: 依恋激活 × 九型动力 × 客体关系结构
- 冲突优先级: 安全 > 结构 (在安全没保障前, 不做结构工作)
- 客体关系不是”行为”, 是”结构”-它是”来访者内在世界的建筑图纸”
- 修复不是”教育来访者新道理”, 而是让来访者在关系中体验到新的内在图



---

##  
第二  
部分:  
映射  
矩阵  
###  
2.1  
依恋  
象限  
 $\times$  九  
型主  
型映  
射表  
下表  
是临  
床经  
验与  
文献  
交叉  
验证  
后的  
典型  
对应  
(注  
意:  
不是  
1:1,  
而是  
高概  
率的”  
亲和  
性”  
):

——  
| 依  
恋象  
限 |  
高度  
亲和  
的九  
型 |  
中度  
亲和  
| 较  
低亲  
和 |  
内在  
逻辑  
||

——  
-|

——  
-|

——  
-|

——  
-|

——  
-||  
焦虑  
型  
(高  
焦虑/低  
回避) |  
2 号  
(助  
人  
型) 6  
号  
(疑  
惑  
型) |  
4 号  
(浪  
漫  
型) |  
1 号、  
3 号、  
9 号  
(健  
康  
层) |  
注意  
力朝  
向他  
人的  
爱/威  
胁,

---

重要提醒:  
- 这不是”诊断清单”,  
而是”咨询师该优先探索的方向” -  
任何依恋象限都可以与任何九型组合,  
只是亲和组合更容易在压力下出现 -  
个体差异巨大, 来访者的实际生活史比任何量表都重要

---

###  
2.2  
翼型、  
压力  
点与  
健康  
层级  
九型  
的”  
健康  
层  
级”  
(Lev-  
els of  
Development,Riso-  
Hudson  
9 层  
模  
型)  
与依  
恋象  
限的  
互动  
尤其  
关键:

---

- 健康层  
(1-3层):  
任何类型都更接近安全型依恋, 能在关系中灵活 - 平均层  
(4-6层):  
类型特征凸显, 依恋象限稳定显现 - 不健康层  
(7-9层):  
类型与依恋互相放大, 出现病理化反应  
压力方向(解离态)  
对依恋的影响:

---

| 九  
型主  
型 |  
压力  
方向  
| 在  
关系  
中的  
表现  
| 与  
依恋  
象限  
的共  
鸣 ||

---

-|

---

-|

---

-|

---

||  
1→4  
| 退  
缩、  
抑郁、  
自我  
贬损  
| 批  
评、  
隔离  
| 接  
近回  
避-  
混乱  
||

2→8  
| 控  
制、  
爆发、  
攻击  
| 情  
感勒  
索升  
级 |  
焦虑  
激活,  
接近  
混乱  
||

3→9  
| 脱  
机<sub>4</sub>  
空虚、  
解离  
| 情

---

临床意义: 咨询师要评估来访者当下处于哪个层级, 这比”他是什么类型”更重要。一个健康 2 号和一个不健康 2 号的依恋表现可能完全相反。

###

2.3  
关系中的”双人舞”- 典型配对

---

来访者最常问：“我们俩在一起为什么会变成这样？”——  
以下是临床上最常见的高摩擦配对：



——  
| 配  
对 |  
动态  
| 核  
心冲  
突 |  
干预  
方向  
||  
——|  
——|  
——

-|

——  
-||  
焦虑  
2 号  
× 回  
避 5  
号 |  
追-  
躲循  
环 |  
“我  
要靠  
近”  
vs  
“我  
需要  
空  
间” |  
翻译  
彼此  
语言:  
追 =  
爱,  
躲  
拒绝  
|| 焦  
虑 6  
号 ×  
回避  
8 号  
| 测  
试-  
反测  
试 |  
“你  
真的  
不会  
离开  
吗”  
vs 7  
“我  
不接  
受被

---

更深  
层规  
律: -  
配对  
不是”  
坏”  
的”,  
而是  
双方  
无意  
识地  
在重  
演早  
年的  
依恋  
剧本  
- 改  
变任  
何一  
方的  
反应  
模式,  
系统  
就会  
被迫  
重组  
- 咨  
询师  
的工  
作不  
是”  
裁  
判”,  
而是  
让双  
方都  
看见  
自己  
与对  
方的  
脚本

---


### 第三部分: 咨询理论架构

#### 3.1 三轴诊断模型 (依恋 + 九型 + 客体关系)

核心工具: 焦虑-回避-九型-客体关系四维评估

升级说明: 从 v1.0 的”双轴”升级到 v2.0 的”三轴”, 增加客体关系维度-评估来访者”内在世界长什么样”。

## 升级后的诊断模型




| 诊断轴  | 评估问题                      | 评估工具                  |
|------|---------------------------|-----------------------|
| 依恋   | “他/她在关系中怎么做？追？躲？推拉？”      | ECR-R 访谈版 / 临床观察      |
| 九型   | “他/她为什么这样做？怕什么？想要什么？”     | RH 主型访谈 / 童年叙事        |
| 客体关系 | “他/她内在的世界长什么样？以为他人会怎么对他？” | 内在图谱访谈 / 移情观察 / 反移情记录 |

**步骤一：依恋象限 (用 ECR-R 量表或临床访谈)** 我建议在咨询前两次访谈中, 完成以下评估。  
访谈版问题 (简版):

1. “你是否担心伴侣不像你爱他那样爱你?” (焦虑)
2. “你是否需要频繁的确认和保证?” (焦虑)
3. “你是否觉得在关系中很难完全放松?” (焦虑)
4. “你是否觉得靠近他人让你不太舒服?” (回避)
5. “你是否更愿意依靠自己, 而非他人?” (回避)
6. “你是否会因为不想被拒绝而避免寻求帮助?” (回避)

0-10 打分: - 焦虑维度 (Q1-Q3 均值) - 回避维度 (Q4-Q6 均值)

定位:



**步骤二：九型主型 (用 Riso-Hudson 主型问卷或临床访谈)** 关键提问：- “童年时，你觉得必须做到什么，才能被爱/不被抛弃？” → 核心恐惧入口 - “你最不能忍受自己身上发生什么？” → 核心欲望反向 - “你平时最常有的内心独白是什么？” → 注意力习惯 - “当你压力很大时，你会怎么做？” → 压力方向 (也是依恋的激活态) - “你最讨厌别人身上什么特质？” → 投影点 (往往指向自己压抑的部分)

**步骤三：健康层级评估** 用 Riso-Hudson 的健康层级访谈问题 (选 3 个关键情境)：

- 你最近一段关系的”日常模式”是怎样的？
- 你最近一次情绪崩溃是怎么发生的？你怎么处理的？
- 过去一年里，有没有你觉得自己”不是自己”的时刻？

通过具体叙事，判断来访者处于 9 层模型的哪一层。

**步骤四：综合诊断书写** 诊断模板示例：> 客户 L, 女, 32 岁。> 依恋象限：焦虑型 (焦虑 7.5, 回避 3.2) > 九型主型：2 号 (翼向 3) > 健康层级：第 5 层 (平均-不健康过渡) > 当前压力方向：2→8, 表现为关系中的爆发与控制 > 早年依恋脚本：父母情绪不稳，她必须通过”照顾弟弟”获得关注 > 当前主诉：亲密关系中过度付出，对方疏远后情绪崩溃

### 3.2 核心恐惧解码

九型的核心恐惧与依恋的内在工作模型之间存在深层对应：

| 九型核心恐惧      | 依恋工作模型          | 在关系中的”翻译”      |
|-------------|-----------------|----------------|
| 1 号：不完美/错误  | “我必须要是好的，才值得被爱” | 用完美主义掩盖被拒绝的恐惧  |
| 2 号：不被需要    | “我必须有用，才不会孤独”   | 把自己变成对方需要的样子   |
| 3 号：无价值     | “我必须成就，才配被看见”   | 靠成就赢得”入场券”     |
| 4 号：平凡/无独特性 | “我必须不同，才会被找到”   | 用戏剧化证明自己”真实存在” |
| 5 号：无能/被侵占  | “我必须自给自足，才能安全”  | 不需要，就不可能被夺走    |
| 6 号：无支持     | “我必须警觉，才不会被害”   | 提前预演灾难来获得掌控感   |
| 7 号：痛苦/被限制  | “我必须快乐，才不会陷入”   | 用新鲜感躲避深层的空虚    |
| 8 号：被控制/被伤害 | “我必须强大，才不会脆弱”   | 攻击性是先发制人的防御    |
| 9 号：冲突/分离   | “我必须平和，才不会被抛弃”  | 取消自己，融入对方      |

咨询应用：- 当来访者说”我害怕他/她不爱我”，先不要急着安抚 - 问：“如果你不被爱，对你来说意味着什么？(直抵九型核心恐惧) - 让来访者看见：我之所以这么累，是因为我在对抗一个‘如果我不 X，我就 Y’的内在等式

### 3.2.5 九型 × 客体关系: 从”为什么”到”内在世界”

九型告诉你为什么这样做, 客体关系告诉你内在世界长什么样。

| 九型 | 核心等式  | 内在自体表征      | 内在客体表征  | 关系模板     |
|----|-------|-------------|---------|----------|
| 1  | 我必须完美 | 我是有缺陷的      | 他人是会审判的 | 完美 = 安全  |
| 2  | 我必须有用 | 我是有价值的      | 他人是需要我的 | 被需要 = 被爱 |
| 3  | 我必须成就 | 我是有价值的 (角色) | 他人是观众   | 成功 = 入场  |
| 4  | 我必须不同 | 我是有缺陷的/独特的  | 他人是完整的  | 不同 = 被找到 |
| 5  | 我必须自足 | 我是有能力的      | 他人是会入侵的 | 自足 = 安全  |
| 6  | 我必须警觉 | 我是无助的       | 他人是会背叛的 | 警觉 = 安全  |
| 7  | 我必须快乐 | 我是会痛苦的      | 他人是会限制的 | 快乐 = 安全  |
| 8  | 我必须强  | 我是脆弱的       | 他人是会利用的 | 强 = 安全   |
| 9  | 我必须配合 | 我是不重要的      | 他人是重要的  | 配合 = 存在  |

干预升级: 不只是碰触核心恐惧, 还要修补内在图。例: 一个 2 号被揭穿”被需要 被爱”后, 如果只停留在这个认知层面, 他很快会回到”付出”模式。客体关系工作是: 在咨询室里, 让来访者体验到”我不被需要, 但咨询师还在、还爱我”-这是新的内在客体表征 (”他人不只在对我有用时在”)。

### 3.3 防御机制的三层识别

Bowlby 认为: 依恋的激活对应第二信号系统 (对威胁的高敏感); Kohut 认为: 自体受损的修复对应第一信号系统 (需要共情镜映); 九型体系则揭示: 每个类型都有自己惯用的”第一道防线”

三层防御框架:

第一层: 行为层 (依恋激活) - 焦虑: 黏附、追、情感激活、情绪化表达 - 回避: 退缩、躲、去激活、理性化 - 混乱: 推拉、戏剧化、解离

第二层: 认知层 (九型防御) - 1 号: 反刍、列清单、”应该”系统 - 2 号: 重新框架自己的付出、”我都是为了你好” - 3 号: 角色扮演、”这是我想做的事” - 4 号: 内摄、”我就是这样的人, 没人懂” - 5 号: 抽象化、”让我想想”、延迟行动 - 6 号: 灾难化预演、投射怀疑、反恐惧反向形成 - 7 号: 合理化、转移注意力、重新规划 - 8 号: 反向形成、”我才不在乎” - 9 号: 麻醉、自言自语拖延、隐性抗拒

第三层: 身份层 (核心信念) - ”我不值得被爱” (几乎所有非安全型的底层) - ”世界是不安全的” (焦虑/混乱) - ”我是孤独的” (回避/4 号) - ”我必须 \_\_\_\_\_ 才完整” (每个类型的”填补”策略)

咨询中的识别路径: > 看见行为 (第一层) → 命名认知 (第二层) → 触碰身份 (第三层) > 这一顺序不能颠倒, 直接碰第三层会激活防御而非穿透防御

第四层 (本次新增): 客体关系层 (内在世界结构)

这一层是”身份层”的结构性表达-身份不是抽象的信念, 而是一套配对的内在表征:

| 客体关系层 | 内容        | 举例                    |
|-------|-----------|-----------------------|
| 自体表征  | ”我是什么样的”  | ”我是不重要的”、”我是有缺陷的”     |
| 客体表征  | ”他人是什么样的” | ”他人是会忽略我的”、”他人是会伤害我的” |

| 客体关系层   | 内容              | 举例                      |
|---------|-----------------|-------------------------|
| 关系模板    | “我和他人的关系是怎么运作的” | “我付出 = 他爱我”、“我警觉 = 我安全” |
| 投射性认同模式 | “我如何让他人验证我的内在图” | 投射”入侵” → 对方真的压过来        |

三轴诊断的最终输出 (升级版):

来访者 [化名]

=====

#### 一、依恋诊断

- 象限: 焦虑 / 回避 / 混乱 / 安全
- 焦虑维度: \_\_
- 回避维度: \_\_
- 当前激活状态: 黏附 / 退缩 / 推拉 / 灵活

#### 二、九型诊断

- 主型: \_\_ 号
- 翼型: \_\_ 号
- 健康层级: \_\_ 层 (1-9)
- 压力方向: \_\_ 号
- 整合方向: \_\_ 号
- 核心等式: \_\_ = 被爱

#### 三、客体关系诊断 (新增)

- 自体表征: “我是什么样的”
- 客体表征: “他人是什么样的”
- 关系模板: \_\_ = \_\_
- 投射性认同模式: 投射 \_\_ → 对方 \_\_
- 温尼科特时刻的缺口: 哪种“足够好的”回应是他没有的?
- 自体客体需求: 镜映 / 理想化 / 孪生
- 分裂程度: 整体 / 部分 / 严重

#### 四、综合叙事

- 早年形成的核心等式与内在图
- 当下激活的行为 / 防御 / 关系模板
- 咨访关系中可能的投射性认同点

#### 五、干预路径

- 第一步 (轨道 A): 依恋修复
- 第二步 (轨道 B): 九型整合
- 第三步 (新增 轨道 C): 客体关系修补

### 3.4 整合成长路径 (三轨模型, 本次升级)

升级说明: 从双轨升级到三轨, 新增轨道 C: 客体关系修补-修补”内在图”, 不只修补”行为”和”动力”。

轨道 A: 依恋修复 (关系视角) 1. 创造安全基地 (咨询室本身就是) 2. 命名激活反应 (“你现在是被你的依恋系统拉走了”) 3. 慢下来, 回到身体 (调节自主神经) 4. 建立新经验 (“这次你没有被抛弃”)

轨道 B: 九型整合 (人格视角) 1. 看见类型自动导航 (“你的’付出’是自动的, 不是选择”) 2. 触碰核心恐惧 (“如果不被需要, 你会发生什么?”) 3. 发展不健康方向 (“你愿意让自己被’需要’之外的方式看见吗?”) 4. 走向整合 (“健康版的你, 会怎样做?”)

轨道 C: 客体关系修补 (本次新增, 内在世界视角) 1. 看见内在图 (“你’以为’他人会怎么对你?”) 2. 识别投射性认同 (“你是否总是让对方变成你怕的样子?”) 3. 破裂-修复循环 (“咨询师的失误可以被修复, 这本身是新经验”) 4. 温尼科特时刻 (“足够好的”回应咨询室里发生) 5. 重写内在图 (“你有机会拥有’新的内在表征’”)

三条轨道的关系 (执行顺序):

轨道 A (依恋修复)

↓ 先稳定身体与关系

轨道 B (九型整合)

↓ 再深挖动力

轨道 C (客体关系修补)

↓ 最后修补内在图

为什么这个顺序? - 轨道 A 必须先-如果来访者还处于激活态 (高焦虑/高回避), 任何”深挖”都会激活防御、复制创伤 - 轨道 B 在中间-只看行为, 不解动力, 来访者会”知道但做不到”; 九型整合让”知道”变成”看见” - 轨道 C 在最深-只看动力, 不修补内在图, 来访者会”看见但仍被旧图套住”; 客体关系修补让”看见”变成”自由”

反过来说: - 跳过 A 直接做 C → 创伤重演 - 跳过 B 直接做 C → 修图不深, 易反复 - 三轨都做但顺序错 → 前面工作被推翻


整合状态对照表:

| 不健康状态       | 整合方向    | 整合后状态         |
|-------------|---------|---------------|
| 1 号: 僵硬、批判  | 朝 7 号发展 | 放下执着, 享受过程    |
| 2 号: 黏附、操纵  | 朝 4 号发展 | 看见自己的真实需要     |
| 3 号: 虚假、耗竭  | 朝 6 号发展 | 允许自己害怕、不确定    |
| 4 号: 沉溺、戏剧化 | 朝 1 号发展 | 将感受落地为行动      |
| 5 号: 封闭、空洞  | 朝 8 号发展 | 走出头脑, 进入身体    |
| 6 号: 焦虑、投射  | 朝 9 号发展 | 信任他人, 也信任自己   |
| 7 号: 涣散、上瘾  | 朝 5 号发展 | 深潜, 延迟满足      |
| 8 号: 控制、攻击  | 朝 2 号发展 | 看见他人的脆弱, 允许被爱 |
| 9 号: 麻木、停滞  | 朝 3 号发展 | 行动力, 自我价值     |

## 第四部分: 咨询操作指南

### 4.1 五阶段咨询流程

总框架: 从看见到重建



**阶段 1: 建立关系与评估 (1-3 次)** 目标: - 收集三轴信息 (依恋 + 九型 + 客体关系) - 建立安全基地 - 初步识别健康层级 - 协商咨询目标

关键活动: - 第 1 次: 用”前 20 分钟聊生活史, 第 20-40 分钟聊当下困扰, 最后 20 分钟反馈”的结构 - 第 2 次: 做依恋象限访谈 + 九型主型探索 - 第 3 次: 给来访者反馈你的诊断假设, 邀请他/她修正

咨询师姿态: - 慢、稳、稳、稳-焦虑型和混乱型来访者尤其需要”咨询师不慌”的身体经验 - 不急于给建议, 先完整地听完 - 用”我注意到…”、“我有一个猜测…”、“我可能错了, 但…”“等软语言给出假设

反例: - “你这是典型的焦虑型依恋”(贴标签) - “我听到你说, 在他没回消息的几小时里你几乎无法集中精力-我很好奇, 在你身体的哪个位置, 最先感觉到这种不安?” (邀请来访者连接身体)

**阶段 2: 看见模式与触发 (4-8 次)** 目标: - 命名来访者当下的激活模式 (依恋策略 + 九型防御) - 建立”预警信号”-来访者能在发作时先认出再反应 - 触碰早期依恋剧本

核心技术: - “案例回放”: 让来访者描述最近一次”发作”的具体场景, 逐句慢放 - “双声道分离”: 帮他/她分离”情绪声道”(我很难过)和”叙事声道”(他不爱我) - “身体扫描”: 识别激活时的身体位置 (胸/胃/喉/肩), 为后面”调节自主神经”做准备

关键话术:

“当他在聚会里没主动介绍你的时候, 你身体哪里最先反应?” “如果这个反应是 7 分 (0-10), 你能先停一下, 不立即发那条消息吗?” “我想请你想一想: 这个’他不爱我’的想法, 是 100% 的事实, 还是你的系统在发出警报?”

避免: - “你想太多了”(否认情绪) - “你应该怎样怎样”(说教) - “你的系统在保护你, 我理解-但这个保护可能已经过时了, 我们一起看看”

**阶段 3: 哀悼与重建 (9-15 次)** 目标: - 哀悼”理想化依恋对象”(不是早年的父母, 而是来访者心里那个’如果我足够好就会一直爱我’的人) - 看见九型核心恐惧的根源 - 发展”内在安全基地”(而非永远找外在)

核心技术: - 空椅子技术: 让来访者对早年的照顾者/伴侣, 说出没说出口的话 - 依恋叙事重构: “我猜, 在你很小的时候, 如果妈妈没回应你, 对你来说可能意味着某种非常可怕的事-你愿意猜一猜, 那是什么吗?” - 核心恐惧暴露: “如果你的’不被需要’真的发生, 会发生什么?”-让他/她真正停留在这个恐惧里, 而非立刻安抚

关键话术:

“你说你’不能让他觉得不需要我’-我想请你试一个练习, 假装从今天起, 他真的不需要你了。你在这个画面里能待多久?” “如果’不被需要’不是终点, 而是一种你可以带着它活下去的状态-那会是什么样的?”

注意: - 这一阶段咨询师自己的稳定度至关重要 - 来访者可能出现退行、情绪爆发、甚至脱落-不要慌, 这是修复的必经之路 - 如果出现严重解离, 使用接地技术 (5-4-3-2-1 感官扫描)

**阶段 4: 新经验与整合 (16-25 次)** 目标: - 在咨询室内创造矫正性情感经验 - 整合依恋修复与九型成长 - 发展整合型人格 (而非”消灭”类型)

核心技术: - 咨询师作为”足够好的客体”: 当来访者测试时 (焦虑型会反复确认, 回避型会突然拉开距离, 混乱型会突然攻击), 保持稳定、不报复、不讨好 - “红绿灯”决策训练: - 红灯: 觉察到”激活态”, 停 - 黄灯: 做一次”这真的是事实, 还是系统警报”的区分 - 绿灯: 带着觉察选择回应 - 整合行为实验: 让来访者在咨询外做”健康版”的小行动, 然后回到咨询中讨论

关键话术:

“上周他没回你消息的时候, 你做了什么?-你选择等到第二天再问, 而不是立刻发三条长消息。我很好奇, 那对你来说是什么体验?” “你有没有发现, 你的’系统’在响警报, 但你没有完全服从它?”



这一阶段是真正的新经验: - 焦虑型: 体验”我表达了不满, 对方没离开” - 回避型: 体验”我靠近了一点, 对方没吞没我” - 混乱型: 体验”我推开了, 但对方还在, 我也没有因此崩溃”

**阶段 5: 维护与成长 (长期)** 目标: - 巩固整合 - 处理”成长痛”(整合期常有) - 转向”自我主导”, 而非”防御驱动”

关键任务: - 越来越少咨询师, 越来越多来访者自己的内在资源 - 面对”成长痛”: - 整合型 2 号可能感到”我不再被需要, 我存在干嘛?” - 整合型 5 号可能感到”我走出了孤独, 但世界太吵” - 这些是过渡期, 不是”咨询失败” - 季度回访: 可建议来访者每 3-6 个月做一次”咨询复查”, 防止回退

## 4.2 各阶段关键技术

**技术 1: 依恋激活调节 (适合焦虑/混乱型)** 步骤: 1. 命名: “你现在的状态, 是你的依恋系统被拉响了” 2. 归位: “这不是’你’, 这是’你的系统’” 3. 身体: “让我们先慢下来, 告诉我你现在的呼吸是什么样的” 4. 资源: “在这个感觉里, 有没有一个地方是相对平静的?” 5. 再选择: “当你准备好, 我们一起看看, 这次你选择怎么做”

原理: 激活态下, 前额叶关闭, 直接做认知工作无效。先调节身体, 再处理意义。

**技术 2: 去激活的”反向”工作 (适合回避型)** 步骤: 1. 不催促: “我不会催你靠近” 2. 命名”不去感受”: “我注意到你说这件事时, 声音很平-你是否感到什么, 但暂时不想看?” 3. 小剂量身体: “你愿意试试, 一边说, 一边把手放在胸口吗?” 4. 肯定”敢感受”的勇气: “你刚才说的时候, 我看到你的眼眶动了-那对你来说不容易”

原理: 回避型的防御是”关闭感受”, 不是”没有感受”。咨询师要做的是让他/她觉得感受是安全的。

**技术 3: 九型核心恐惧的”暴露练习”** 步骤: 1. 命名恐惧: “你说, 你的’被需要’消失, 你会-?” 2. 邀请进入: “我们试试, 在这个画面里多待一会儿……告诉我, 你在里面看到了什么” 3. 不立即安抚: “这个感觉是不是很可怕?-让它在, 看看它会不会自己变化” 4. 身体陪伴: “你发现你在发抖-我和你一起, 在这一刻” 5. 重建: “我猜, 如果你’不被需要’, 但你仍然是值得被爱的-那对你来说需要多少时间才能相信?”

原理: 核心恐惧一旦被完整地经历而非回避, 它的影响力就开始减弱 (暴露疗法 + 完形疗法的整合)。

**技术 4: 三轴叙事整合 (咨询中后期,v2.0)** 框架提问: - “现在回头看, 你的’追’或’躲’的模式, 从什么时候开始的?” - “如果那个小时候的你, 看到现在这个一直在努力的你, 会说什么?” - “在你的’类型自动驾驶’里, 你最想保留哪个部分? 最想放下哪个部分?”

这让来访者从”被模式控制”走向”主动选择”。

**技术 5(本次新增): 投射性认同识别与处理** 什么时候用: 任何时候咨询师发现自己对来访者有强烈情绪、或来访者反复触发咨询师的”未完成议题”。

核心原理: 投射性认同是”双方共同制造的现实”, 不是来访者单方面的”投射”。咨询师不是”被动接收投射”, 而是共振或激活了来访者的内在图。

5 步识别法:

1. 停一下 - 觉察自己的强烈情绪 (“我怎么突然这么烦躁?”)
2. 命名情绪 - “这是我的, 还是来访者的?”
3. 追溯源头 - “来访者做了什么/说了什么, 触发了这个?”
4. 反推来访者 - “如果这是来访者’投射’给我的, 他内在的什么被激活了?”

5. 选择回应 - 不进入投射 (不变成“被投射的角色”), 也不强硬拒绝 (那会破坏联盟), 而是命名投射本身

回应模板: > “我注意到, 我说完那句话后, 你立刻变得愤怒了。我想知道, 这个愤怒真的是因为我说的吗? 还是因为它碰到了你内在的某个旧的愤怒?” > > (此时来访者通常会停顿, 因为他没意识到自己的“被旧愤怒激活”) > > “或者, 这个愤怒和某个过去的场景相似-你能想到吗?”

关键: 不否认来访者的情绪, 也不立即处理。先命名投射本身的存在, 让来访者看见。

**技术 6(本次新增): 温尼科特时刻 (Winnicottian Moment)** 什么时候用: 咨询中后期, 当来访者展示出脆弱/真实的瞬间。

什么是温尼科特时刻: > 来访者在咨询中真实地展示自己 (不是面具、不是角色、不是“应付”咨询师), 而咨询师以“足够好的”方式回应-既不完美 (不是“立即共情”)、也不冷漠 (不是“忽视”)、而是接住 + 不评判。

典型情境: - 来访者说了一句“我没对别人说过的话”, 然后沉默了-他在看咨询师的反应 - 这是一个关键瞬间: 如果咨询师“立即理解 + 长篇回应”, 可能让来访者觉得“咨询师太快接受了, 这不真实” - 最好的回应是: 等一下、眼神接触、然后简单的回应-“谢谢你告诉我”(这才是“足够好的”回应)

为什么有效: - 来访者的内在客体表征是“他人都不会接住我”, 咨询师接住了, 这个“新经验”会修补内在图 - 比起“咨询师完美理解”的体验, “咨询师没完全理解但仍然在”的体验更有疗愈力

避免的陷阱: - “我完全理解你”-太快, 假 - “我也经历过这个”-抢镜 - 长篇分析-让来访者觉得“被研究” - 沉默 + 眼神 + “我在听”-温尼科特时刻

**技术 7(本次新增): 破裂-修复循环 (Rupture-Repair Cycle)** 核心洞见: > 关系疗愈不来自“不破裂”, 而来自“破裂后的修复”-这是最深层的疗愈。

什么是破裂: - 咨询师迟到 5 分钟 - 咨询师说了一句无意中伤来访者的话 - 咨询师忘了来访者说过的重要信息 - 咨询师走神了一两分钟

为什么破裂是礼物: - 来访者的内在图: “他人靠不住”-破裂验证了内在图 - 如果咨询师不修复, 内在图被“再次验证” - 如果咨询师真诚修复 (“我迟到了, 对不起-这不是借口, 是我的失误”), 内在图被动摇

修复的 4 步: 1. 认错 - “这是我做错了” (不借口、不解释) 2. 命名影响 - “我想这可能让你感到被忽略/被伤害” 3. 连接 - “但我想让你知道, 我仍然在这里, 我关心你” 4. 询问 - “你能告诉我, 你的感受吗?”

为什么有效: - 修复示范了“关系可以修复” - 修复提供了新经验 (“原来破裂是可以修复的”) - 修复修补了“他人靠不住”的内在图

**技术 8(本次新增): 命名分裂 (Naming the Splitting)** 什么时候用: 来访者把咨询师 (或伴侣) 突然理想化或突然贬低时。

典型场景: - “你是世界上最好的咨询师” (上周还说“你根本不懂我”) - “他一开始是完美的, 这周完全是个怪物” - “我今天状态超好” (明天的咨询“我又跌入谷底”)

回应模板: > “我注意到, 你说我‘最懂你’时, 跟上周说我‘不懂你’, 是两个不同的人。这两个‘我’都是你真实的部分-上周的你不相信我, 今天的你信任我。这两个‘我’都还在, 只是今天信任的部分更多一些。” > > (引导来访者整合“好我”和“坏我”, 而不是“全好”或“全坏”)

为什么有效: - 分裂是未整合的心智特征-能容纳“灰色”才能长大 - 命名分裂示范了“整合”-来访者看见“原来咨询师在容纳我的两端” - 这是深层的客体关系修补

**技术 9(本次新增): 内在图改写 (Internal Schema Revision)** 什么时候用: 咨询后期, 来访者开始自发地叙述新经验时。

操作: - 来访者说: “今天我伴侣做了一件事, 我以前会崩溃, 但今天我只是难过了, 没有崩溃”  
- 咨询师: 强化这个新经验 ( “你注意到了吗? 你的反应变了。以前的你, 会陷入’我又要被抛弃’的脚本; 今天的你, 允许自己难过而不崩溃” )

为什么有效: - 内在图的改写不是” 咨询师告诉来访者’ 你变了’ “-是来访者自发看见自己的变化 - 咨询师的强化锚定了这个新经验, 让它更稳定

### 4.3 伴侣咨询的特殊处理

伴侣咨询的双人评估 (第 1-2 次):

| 评估维度   | 提问                    | 注意                              |
|--------|-----------------------|---------------------------------|
| 各自依恋象限 | “你在关系中最怕发生什么?”        | 焦虑型会说”被抛弃”, 回避型会说”被控制”, 混乱型两者都怕 |
| 各自九型主型 | “你最受不了伴侣身上的什么?”       | 讨厌对方的地方, 往往是自己压抑的               |
| 互动循环   | “你们吵架的固定剧本是什么?”       | 命名”追-躲”、“控-反控”、“演-看”等           |
| 触发点    | “对方做什么/不做什么, 你会立刻不安?” | 早年的按钮                           |
| 修复尝试   | “吵架后, 谁先低头? 怎么低头?”    | 修复模式也来自早期依恋                     |

伴侣咨询的三阶段:

阶段 A: 翻译彼此 (让双方都”被听见”) - 轮流发言, 另一方不打断 - 复述: “我听到你说……, 我猜你的意思是……, 我说对了吗?” - 关键: 翻译, 不是评判

阶段 B: 命名循环 - 咨询师命名: “我注意到, 每次他没接你电话, 你就会打三个-然后他就开始关机-然后你更焦虑-他更退缩。这是一个循环, 没有人是坏人, 只是你们在这个系统里互相触发。”

阶段 C: 打破循环 - 给”追”的一方: 练习在激活时, 先停 30 分钟 - 给”躲”的一方: 练习主动给一个微小的回应 - 给”混乱”的一方: 练习说出”我现在混乱, 需要 10 分钟”

重要原则: - 不站队 - 不评判”对错” - 不替他们解决问题 - 让他们从”互相埋怨”走向”共同面对模式”

## 第五部分: 典型构型干预脚本

### 5.1 焦虑 × 2 号助人型

典型表现: - 总是先看见对方需要什么 - 通过”被需要”来确认”被爱” - 伴侣若不感激, 立刻受伤 - 容易越界, 过度付出, 事后又觉得”他不配” - 亲密关系中: 付出 → 期待回报 → 未得 → 情绪勒索 → 对方更退缩 → 更焦虑

评估要点: - 早期”被爱 = 被需要”的等式如何形成 - 哪些”付出”是真实的, 哪些是交易 - 压抑的”我自己的需要”长什么样

干预脚本:

首次咨询: > 咨询师: “你说, 你为他做了那么多, 但他不珍惜-我想先听你说, 过去一周, 你自己想做的事, 做了多少?” > (等待沉默) > 咨询师: “我发现, 你说’我’的时候, 常常后面跟的是’他’或’他需要’。你愿意我们试试, 接下来的 5 分钟, 只聊你想要什么?”

中期: > 咨询师: “上次我们看见, ‘不被需要’ 对你来说等于 ‘不被爱’。今天我想请你想象, 一个朋友 (不是伴侣) 对你说: ‘我不需要你为我做什么, 我就是单纯地爱你’ –你听到这句话, 第一反应是什么? > 来访者: “……我不信” > 咨询师: “不信–很诚实。我想问, 这份 ‘不信’, 在你多大的时候就有了?”

整合方向: - 让 2 号看见 “我可以被爱, 不需要先付出” - 练习 “不付出地接受” - 发展健康 2 号的 “真正助人” (看见对方需要, 而不是投射自己的需要)

客体关系视角 (本次新增):

| 客体关系要素 | 焦虑 × 2 号                    |
|--------|-----------------------------|
| 自体表征   | “我是有价值的 (因为他需要我)”           |
| 客体表征   | “他者是脆弱的、需要我的照顾”             |
| 关系模板   | “我付出 = 他者感激 = 他者爱我”         |
| 投射性认同  | 投射 “无助” → 对方真的变得依赖、脆弱       |
| 典型破裂   | 付出未被感激 → 内在图被验证 (“我的价值被取消”) |
| 温尼科特需求 | 镜映 (“看见我的付出”) 而非 “被需要” 驱动   |

客体关系干预 (2 号专属干预):

- 不进入 “被需要” 的角色: 咨询师不接受来访者的 “过度照顾” (如: 送礼、关心咨询师的生活等)。以拒绝但温和的方式, 帮助来访者看见 “我被拒绝了, 但咨询师还在”。
- 命名投射性认同: “你照顾我的时候, 我感觉到 ‘被需要’ –但这不是真实的咨访关系。我们的关系是: 你在这里被看见, 不是来 ‘被需要’ 的。”
- 提供 ‘未被打扰的’ 镜映: “你刚才说了一段很脆弱的话。我注意到你没有 ‘转换’ 为照顾我的角色–你让自己留在了脆弱里。这对你来说是新的。”
- 重写内在图: “你今天没有 ‘为他做事’。他没崩, 你也还在这里。这验证了: 你的价值不依赖他是否需要你。”

## 5.2 回避 × 5 号观察型

典型表现: - 在关系中保持 “观测距离” - 用思考替代感受 - 伴侣表达情感时, 自己会 “短路” (麻木/分析/转移话题) - 亲密升级时, 本能想撤 - 容易把 “独立” 等同于 “自由”, 把 “依赖” 等同于 “枷锁”

评估要点: - 早期 “需要 = 软弱” 的内化路径 - 身体被允许的边界 - 哪些时刻他其实想靠近, 但不敢

干预脚本:

首次咨询: > 咨询师: “你说, 你想解决 ‘太独立’ 的问题–但我想先说, 你的独立很可能保护过你。在你小时候, ‘不打扰’ 是不是你最安全的策略?” > 来访者: “……我妈那时很忙, 我自己玩最碍事” > 咨询师: “所以 ‘不碍事’ 让你活下来, 现在它让你……?” > 来访者: “……没办法靠近她 (指伴侣)”

中期 (小心处理身体): > 咨询师: “现在, 当你想象 ‘她哭着跟你说, 我需要你’ –你身体有什么反应?” > 来访者: “想关上门” > 咨询师: “好。如果你允许这个感觉在, 而不立即关门–它会变成什么?” > (等待) > 咨询师: “你发现了吗? 它可能没有变成你害怕的 ‘吞没’ –它只是难, 但还在你承受范围内”

整合方向: - 允许 5 号在 “安全的小剂量” 下, 练习待在自己不舒服的感受里 - 不催他 “打开”, 而是一点点 “够近” - 发展健康 5 号的 “有选择的连接” (既独立, 也能深度共在)

客体关系视角 (本次新增):

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 客体关系要素 | 回避 × 5 号                        |
| 自体表征   | “我是会被侵入的、应被保护的”                 |
| 客体表征   | “他者是会入侵我空间的”                    |
| 关系模板   | “我退 = 我安全”                      |
| 投射性认同  | 投射”入侵” → 对方真的开始”压过来”            |
| 典型破裂   | 咨询师表达关心 → 内在图被验证 ( “咨询师也要入侵我” ) |
| 温尼科特需求 | 尊重他者 ( “咨询师不压过来” ) 而非”控制”       |

客体关系干预 (5 号专属干预):

- “不压过来”姿态: 咨询师不主动靠近、不表达过多关心、不追问感受。让 5 号”看见”咨询师没有入侵他-这本身是补上内在图的开始。
- 不要求”打开”: “我不需要你打开什么。今天你能坐在这里, 就是足够的。”
- 破裂后提供”退出选项”: 如果咨询师无意中”压过来”(过于热情的关心), 马上提供”你可以随时停止谈论这个”的选项。
- 接受沉默: 5 号可能咨询中沉默 10 分钟。咨询师不忙打破这个沉默, 不说”我们可以谈点别的吗?”。让他在咨询师的静默中发现”他没被入侵”。
- 重写内在图: “今天你说了 2 句你以前不会说的-我在那 2 句中, 没有’压过来’。你的身体能记下这个。”

### 5.3 混乱 × 4 号浪漫型

典型表现: - 关系中”渴望-恐惧”的剧烈摇摆 - 高度敏感, 容易感受到被拒绝 (甚至对方没拒绝) - 容易把自己的情绪”放大”或”戏剧化” - 看到”平凡的幸福”会无意识怀疑”这真的属于我吗?” - 在亲密关系中”测试”伴侣, 测试失败后愤怒 + 受伤 + 自我封闭

评估要点: - 早年的”被看见/被忽略”经验 - 哪些情境会让”系统失控” - 自我安抚能力 (混乱型通常极弱)

干预脚本:

首次咨询: > 咨询师: “你说, 你很害怕’被抛弃’, 但你又常常自己先走-这是怎么回事?” > 来访者: “我不是要走, 我是太害怕了” > 咨询师: “我理解。你能不能告诉我, 你最害怕的是’被离开’还是’被靠近之后又失去’?” > (这一步是把”现在的问题”和”过去的恐惧”分开)

中期 (工作”推-拉”): > 咨询师: “上周你说, 你又一次想’消失’-我想做个小练习。你愿意想象, 这次’消失’之后, 他真的来找你了-你在那个画面里, 是什么感觉?” > 来访者: “我怕他真的来了, 我不知道该做什么” > 咨询师: “所以, 你要’消失’, 有一部分是……不知道’被爱’该怎么接?” > 来访者: “……(哭)”

整合方向: - 给混乱 4 号”持续在场”的咨询师经验 (这本身就是治疗) - 训练”觉察到自己要推”的预警信号 - 发展健康 4 号的”将感受转化为创造” (而非沉溺)

客体关系视角 (本次新增):

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 客体关系要素 | 混乱 × 4 号           |
| 自体表征   | “我是有缺陷的、不完整的”      |
| 客体表征   | “他者是完整的、可以拯救我的”    |
| 关系模板   | “我会被抛弃 = 我不够好”     |
| 投射性认同  | 投射”被抛弃” → 对方真的开始回避 |



---

客体关系要素 混乱 × 4 号

---

典型破裂 咨询师”不一致” (上周热情, 这周平静) → 内在图验证  
 温尼科特需求 抱持 ( “他者能接住我的戏剧化” ) 而非”修复”

---

客体关系千顶 (混乱 4 号专属干预):

- 不进入”拯救者”角色: 混乱 4 号的投射性认同是”我不够好, 需要被拯救”。如果咨询师”过度共情”、“过度卷入”, 会被来访者”验证”为”只有咨询师能拯救我”-这强化了原模式。
- “说错话”变礼物: 混乱 4 号特别容易被咨询师的任何”不一致”验证。咨询师故意在合适的时候说”我可能错了”、“我这句话不太准” → 破裂-修复 → 重新建立”咨询师是真人不是”应该完美的拯救者”“。
- 提供”丑照”: 咨询师可以适度”示弱” ( “今天我状态不太好” )。混乱 4 号看到”咨询师也不完美也能工作” → “我不完美也能被接受”。
- 重写内在图: “今天你没有’推’。你待在了不舒服里。这不是’我不够好’, 是’我可以不完美也被看见’。”

#### 5.4 焦虑 × 6 号疑惑型

典型表现: - 反复求证”你真的爱我吗?” - 容易看到”被威胁”的细节 - 信任建立极慢, 崩塌极快  
 - 在关系中, 要么过度依赖 (被焦虑驱动), 要么过度怀疑 (被恐惧驱动) - 容易”测试”伴侣, 测试本身破坏关系

干预脚本:

咨询师: “你刚才说, 你每次问’你爱我吗’, 对方沉默几秒, 你就开始脑补-我猜, 那个’几秒的沉默’对你来说, 等于’他已经在离开’?” 咨询师: “你愿意我们试试, 以后当你想要问’你爱我吗’时, 先在咨询里做一次预演-看你的系统在告诉你什么?”

整合方向: - 帮助 6 号区分”直觉”和”投射的怀疑” - 训练”等事实更清楚再做反应” - 发展健康 6 号的”信任能力” (信任自己, 也信任他人)

客体关系视角 (本次新增):

---

客体关系要素 焦虑 × 6 号

---

自体表征 “我是无依无靠的、需警觉的”  
 客体表征 “他者会背叛/惩罚/控制”  
 关系模板 “我警觉 = 我安全”  
 投射性认同 投射”不可信” → 对方真的开始不可信  
 典型破裂 咨询师”忘记”某件小重 → 内在图验证 ( “咨询师也靠不住” )  
 温尼科特需求 可预测性 ( “他能做他能说的事” ) 而非”反恳求保证”

---

客体关系千顶 (6 号专属干预):

- “一致性”高于”反恳求保证”: 6 号经常要求”你保证你会一直在”。咨询师不说”我保证”, 而是在每次咨询中以身作则: 准点开始、准点结束、说到做到。6 号”从可预测性中学会信任”, 而不是”从保证中学会信任”。

- 破裂后认真修复:6号最看重”咨询师是否在出问题后能修复”。咨询师主动在咨访中偶发制造破裂(“我今天迟到2分钟”,“我上次说错了”),然后认真修复。这提供”破裂可以修复”的内在图。
- 不卷入”求证”:“你问我’你爱我吗’,我不会为了哄你说’爱’。我会说:‘我在这里,今天、现在,我是关心你的。这是实际的。’
- 重写内在图:“这周你问我’你会在吗’,我在了。这不是’因为我保证了’,是’我今天是’。你可以从这个中学习信任,不是从’保证’中。”

### 5.5 回避 × 8号挑战型

典型表现: - 外在强势,内在脆弱 - 不允许自己”被看到弱” - 亲密关系中,要么控制(因为控制=安全),要么”不战而走” - 容易被伴侣的”软弱”或”情绪”激活-然后攻击或撤退 - 用”我不需要任何人”保护内在那个”很怕被伤害的小孩”

干预脚本:

咨询师:“你说,你最讨厌’被控制’-但我也注意到,你常常比伴侣更先控制局面。这两件事,有没有可能是同一件事?” 咨询师:“你8号的外壳下面,是谁在害怕?”

整合方向: - 允许8号在绝对安全的咨询空间里,先承认脆弱 - 慢暴露原则:一次只碰一小片 - 发展健康8号的”有力量地靠近”(而非用力量推开)

客体关系视角(本次新增):

| 客体关系要素 | 回避 × 8号                         |
|--------|---------------------------------|
| 自体表征   | “我是脆弱的、需保护的”                    |
| 客体表征   | “他者会利用我的脆弱”                     |
| 关系模板   | “我强 = 我不会被伤害”                   |
| 投射性认同  | 投射”利用” → 对方真的开始退缩、怕他            |
| 典型破裂   | 咨询师表现出任何”弱” → 内在图验证(“咨询师也会被伤害”) |
| 温尼科特需求 | 可受控的暴露(“在绝对安全下显示软”)而非”被打败”      |

客体关系干预(8号专属干预):

- 不手软、不手硬:8号”检测”咨询师是否”同样强”。咨询师不能”手软”(会被视为”他”也不够强”),也不能”比8号更强”(会被视为”威胁”)。最佳位置是”温柔的坚定”。
- “不打击他的强”:8号的”强”是他用了很久的防御。咨询师不”打掉”这个强,而是”在这层强后面、你什么时候能休息一下?”-允许8号”足够安全后才展示脆弱”。
- 提供”能不反击”的体验:如果8号在咨询中攻击了咨询师,咨询师不反击。这提供”不反击不会被打败”的新经验-但咨询师要在事后真诚地表达”那句话伤害到我了”(是”也是人”的示范,不是”专业神圣”或”被打败”)。
- 重写内在图:“今天你说了’我不需要任何帮助’。但你依然来了。这个’然’是新的-你不需要,但你选择了需要。”

## 第六部分: 工具清单与评估模板

### 6.1 评估量表

| 量表                                                | 用途     | 使用场景         |
|---------------------------------------------------|--------|--------------|
| ECR-R(Experiences in Close Relationships-Revised) | 依恋象限评估 | 咨询前/每 3 个月复查 |
| Riso-Hudson Enneagram Type Indicator(RHETI)       | 九型主型评估 | 咨询前/概念化时     |
| Riso-Hudson 健康层级访谈                                | 健康层级评估 | 概念化时/状态复查    |
| DAS(Differentiation of Self Inventory)            | 自我分化程度 | 伴侣咨询         |
| CTQ(Childhood Trauma Questionnaire)               | 早年创伤筛查 | 评估时 (必要时)    |

### 6.2 单次咨询结构模板 (60 分钟)

| 时段       | 内容                    | 占比  |
|----------|-----------------------|-----|
| 0-5min   | 接续上次, 本次目标确认          | 5%  |
| 5-15min  | 情绪/状态扫描               | 15% |
| 15-35min | 核心工作 (命名模式/触碰恐惧/整合练习) | 35% |
| 35-45min | 新行为实验或整合性收束           | 15% |
| 45-55min | 来访者反馈 + 咨询师回应         | 15% |
| 55-60min | 作业/下次预约               | 5%  |

### 6.3 咨询师记录模板

日期:

来访者:

阶段:

本次焦点: 依恋/九型/整合/其他

情绪状态(咨询前):

情绪状态(咨询后):

激活态出现?(是/否, 何情境):

三轴观察(焦虑x/回避x, 九型主型\_\_\_, 健康层级\_\_\_, 客体关系维度\_\_\_):

本次关键洞见:

本次未完成议题:

下次方向:

风险评估:



## 6.4 给来访者的”自助工具”

日常练习: 三栏日记

| 情境         | 我的反应 (行为) | 我现在能看见的模式                   |
|------------|-----------|-----------------------------|
| 他没回消息      | 立刻发了三条长消息 | 我的”被抛弃”警报响了;2号在试图用力挽留       |
| 朋友迟到       | 一边说没事一边生气 | 我的”被忽视”按钮被按了;6号在投射怀疑        |
| 对方说”我需要空间” | 立刻退回到工作   | 5号关闭了连接;其实”我需要空间”<br>“他不要我” |

每周一问: > “过去一周, 我有没有一个时刻, 我的反应是系统在保护我, 但我已经不需要这个保护了?”

## 附录: 咨询师自我校准

咨询师本身也需要在三轴上有自我觉察 (v2.0):

1. 你自己的依恋象限是什么?—会影响你对不同来访者的反应
  - 焦虑咨询师遇到回避来访者, 容易”没被回应”而生气或退却
  - 回避咨询师遇到焦虑来访者, 容易被压垮或麻木
2. 你自己的九型主型是什么?—会影响你的”盲区”
  - 9号咨询师可能不愿碰冲突
  - 6号咨询师可能过度警惕
  - 3号咨询师可能”看起来什么都会”但缺乏深度停留
3. 咨询师在咨询中也需要”被修复”—定期接受督导或个人咨询

金科玉律: > 你能陪来访者去多远, 取决于你曾独自走过多远。

## 结语

依恋告诉我们”在关系中怎么”, 九型告诉我们”为什么这样”。两者合一, 咨询师才能在当下的行为与底层的意义之间自如穿梭, 既给来访者当下的稳定, 也给他们长期的自由。

愿这份指南成为你工作中的地图, 而非枷锁—每个来访者都是新的故事, 需要你带着地图, 而不是按图索骥。

版本:v2.2 适用场景: 个人情感咨询、伴侣治疗、长期个人成长更新机制: 每6个月根据临床反馈修订发布日期:2026-07-21