

Discussion problem assignment:

问题一:

作为上节课的课堂测验，需要同学们继续完成测验题，并对两个方波信号的卷积结果进行总结。

Find the convolution of the following two signals:

$$x(t) = u(t) - u(t - T_1)$$

$$h(t) = u(t) - u(t - T_2)$$

$$T_1 < T_2$$

A:

这是典型的两个高度为 1、宽度不同的方波信号的卷积计算，结果是一个梯形信号。

但是，这个梯形信号的对应参数需要确定，包括起始、终止时间、幅度大小、梯形平台的起始和终止时间。

结果如图。输出信号起始于时间 0 点，持续时间是 $T_1 + T_2$ 。梯形平台的幅度是小方波的面积， T_1 。梯形平台起始于 T_1 时间，宽度是 $T_2 - T_1$ 。


在这门课程中，方波信号的卷积结果需要大家理解并记住，后续在考查中，可能需要同学们直接给出结果。


Solution:

$$x(t) = u(t) - u(t - T_1) = \begin{cases} 1, & 0 < t < T_1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$h(t) = u(t) - u(t - T_2) = \begin{cases} 1, & 0 < t < T_2 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$





第二题:

已知 $y(t) = x(t) * h(t)$ ，证明 $y(-t) = x(-t) * h(-t)$ 。

答案:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

Assume $x_1(t) = x(-t)$, $h_1(t) = h(-t)$

$$\begin{aligned}
 y_1(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\tau)h_1(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} x(-\tau)h(-(t-\tau))d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(-\tau)h(-t+\tau)d\tau \xrightarrow{\tau'=-\tau} \int_{+\infty}^{-\infty} x(\tau')h(-t-\tau')(-d\tau') \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau')h(-t-\tau')d\tau' = y(-t)
 \end{aligned}$$

这是一道典型的测验自己对卷积计算的细节掌握情况的题目，给大家一点时间对比一下自己的答案和给出的答案，有问题做个记录可以答疑。

基本的思路是，将 $x(-t)$ 和 $h(-t)$ 看成是新的信号， $x_1(t) = x(-t)$, $h_1(t) = h(-t)$ ，然后尝试代入 $x_1(t)$ 和 $h_1(t)$ 的卷积公式

$$= \int_{+\infty}^{-\infty}$$

比较容易出错的是这一步的，以及后续交换上下限会引入一个符号。这是与卷积求和不同的地方