

# 수열

- ▶ 미적분학에서 다루는 **수열**은 주로 무한수열을 뜻한다.
- ▶ 수열은 **자연수** 집합에서 정의된 함수의 일종이며, 일반적으로는 함숫값이 **실수체** 내부의 실수인 **실수열**이다.
- ▶ 일반적으로 수열  $\mathbf{a} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ 에서

$$a_1 := \mathbf{a}(1), \quad a_2 := \mathbf{a}(2), \quad a_3 := \mathbf{a}(3)$$

등으로 정의하며, 이 수열을

$$(a_1, a_2, a_3, \dots)$$

$$(a_n)_{n=1}^{\infty}$$

$$(a_n)$$

과 같은 다양한 표기로써 표현한다.

## 수렴과 발산

- ▶ 만약  $n$ 이 충분히 커지면  $a_n$ 이 실수  $l$ 에 가까워질 경우, 우리는  $(a_n)$ 이  $l$ 에 **수렴**한다고 하고,  $l$ 을 수열  $(a_n)$ 의 **극한값**이라 한다.
- ▶ 이를 수학적인 표기로 나타내면,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$$

이다.

- ▶ 수렴하지 않는 수열은 **발산**한다고 한다.
- ▶ 만약 수열  $(a_n)$ 의 각 항이 한없이 커지면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

로 표현하고, **양의 무한대로 발산**한다 말한다.

- ▶ 반면  $n$ 이 커질수록  $a_n$ 이 한없이 작아져 **음의 무한대로 발산**하는 경우도 있다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$$

### Example

양수  $\epsilon$ 에 대하여 극한  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + \epsilon)^n}{n}$ 의 수렴과 발산을 조사하자.  
이항정리에 의하면

$$(1 + \epsilon)^n = 1 + n\epsilon + \frac{1}{2}n(n-1)\epsilon^2 + \cdots > \frac{1}{2}n(n-1)\epsilon^2$$

이다. 그러므로

$$\frac{(1 + \epsilon)^n}{n} > \frac{1}{2}(n-1)\epsilon^2$$

이며, 우변은  $n$ 이 커지면 한없이 증가한다. 따라서 주어진 수열은 무한대로 발산한다. 따라서 그 결과를 활용하면 아래를 얻는다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n} = \infty \quad (a > 1)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n}{n} = 0$$

## 수렴하는 수열의 기본 성질

- ▶ 수열  $(a_n)$ 과 수열  $(b_n)$ 이 모두 수렴하면,  $(a_n + b_n)$ 이라는 수열과  $(a_n \cdot b_n)$ 이라는 새로운 수열이 모두 수렴하고,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \left( \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right) \cdot \left( \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \right)$$

이 성립한다.

- ▶ 또한 임의의 실수  $t$ 에 대하여  $(ta_n)$ 도 수렴하며

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (ta_n) = t \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

이 성립한다.

- ▶ 이를 수렴하는 수열의 기본 성질 혹은 극한의 기본 성질이라 부른다.

# 자연상수

▶ 자연상수는

$$e := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \approx 2.718$$

으로 정의한다.

▶ 위를 이용하면 아래의 극한도 쉽게 계산할 수 있다.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(\frac{n}{n-1}\right)^n} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{n-1}} \\&= \frac{1}{e} \cdot 1 = \frac{1}{e}\end{aligned}$$

# 급수

- ▶ 어떤 수열에서 초항부터  $n$ 항까지를 더하여 만든

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

에 대하여, 수열  $s_n$ 을 **급수**라 부른다.

- ▶ 급수는 아래처럼 표현할 수 있다.

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

$$\sum_{n \geq 1} a_n$$

$$\sum a_n$$

## 급수의 수렴과 발산

- ▶ 수열  $a_n$ 에서 얻은 급수가 어떤 실수  $l$ 에 수렴한다면,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = l$$

으로 나타내며,  $l$ 을 급수  $\sum a_n$ 의 **합**이라 부른다.

- ▶ 수렴하지 않는 급수는 **발산**한다고 부른다.
- ▶ 즉, 수열의 관점에서 보자면,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m a_n$$

이 존재하는지를 보자는 것이다.

# 일반항 판정법

## 일반항 판정법

급수  $\sum a_n$ 이 수렴하면,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

이다.

- ▶ 이는 곧  $a_n$ 이 0으로 수렴하지 않는다면 급수  $\sum a_n$ 은 절대로 수렴할 수 없다는 이야기이기도 하다.



## 일반항 판정법

**증명.**

급수  $\sum a_n$ 의 합을  $l$ 이라 하고 처음  $n$ 항까지의 합  $s_n$ 을 들여다보자.

그러면 임의의 양수  $\epsilon$ 에 대하여 유한 개의  $n$ 을 제외하곤

$|s_n - l| < \epsilon$ 일 것이다.

따라서

$$|a_n| = |s_n - s_{n-1}| \leq |s_n - l| + |s_{n-1} - l| < 2\epsilon$$

이다. 따라서

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$$

이다.

## Example

- ▶ 조화급수는 각 항이 등차수열의 역수로 이루어진 수열, 즉 조화수열에서 얻은 급수이다.



$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

을 생각하자. 이 급수는

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right) + \cdots$$

보다 빨리 증가하고, 따라서 발산함을 알 수 있다.

- ▶ 반면 일반항  $\frac{1}{n}$ 은 0으로 수렴한다. 따라서 일반항 판정법의 역은 성립하지 않는다.

## 수렴하는 급수의 기본 성질

- ▶ 실수  $t$ 와 수렴하는 급수  $\sum a_n$ 과  $\sum b_n$ 에 대하여 아래를 얻는다.

$$\sum (a_n + b_n) = \sum a_n + \sum b_n$$

$$\sum ta_n = t \sum a_n$$

- ▶ 단,

$$\sum (a_n \cdot b_n) \neq \left( \sum a_n \right) \cdot \left( \sum b_n \right)$$

일 수 있다.

## 등비급수

- ▶ 첫항이 1이고 **공비**가  $r$ 인 등비수열에서 얻은 **등비급수**

$$1 + r + r^2 + \dots$$

는 수학(상)에서 배웠듯이  $|r| < 1$ 일 때 수렴하며,

$$1 + r + r^2 + r^3 + \dots = \frac{1}{1-r} \quad (|r| < 1)$$

이다.



$$\frac{1}{1-r} - (1 + r + \dots + r^{n-1}) = \frac{r^n}{1-r}$$

을 응용하면

$$\frac{1}{1+\epsilon} \approx 1 - \epsilon$$

임을 보일 수도 있다.

## 비교판정법

- ▶ 일반항이 영 이상의 실수로 이루어진 급수를 **양항급수**라 부른다.
- ▶ 양항급수는 항상 증가하는 수열이므로, 무한대로 발산하거나 수렴하는 경우 두 가지만 존재한다. 따라서

$$\sum a_n < \infty$$

는 수렴한다는 것이나 매한가지이다.

## 비교판정법

$0 \leq a_n \leq b_n$ 일 때,

$$(1) \sum b_n < \infty \Rightarrow \sum a_n < \infty$$

$$(2) \sum a_n = \infty \Rightarrow \sum b_n = \infty$$

## Example

급수

$$\sum \frac{1}{n^2}$$

이 수렴함을 비교판정법을 이용해 증명해보자. 만약  $n \geq 2$ 이면

$$\frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n(n-1)}$$

이고, 급수

$$\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n(n-1)} = \sum_{n \geq 1} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 < \infty$$

은 수렴한다. 따라서 비교판정법으로부터 급수는 수렴한다. 단, 이 값을 미적분학에서는 구할 수 없다.

## 극한비교판정법

- ▶ 이 판정법은 24쪽의 4번 문제로부터 비롯된다. 즉, 본문에는 존재하지 않으니 수업시간에 가르치시는지를 확인하고 사용하자!

### 극한비교판정법

양의 수열  $(a_n)$ 과  $(b_n)$ 에 대하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = r$$

일 때,  $r$ 이 0이 아닌 유한한 값이면  $\sum a_n$ 이 수렴하는 것은  $\sum b_n$ 이 수렴하는 것과 필요충분조건이다.

# 거듭제곱근 판정법

## 거듭제곱근 판정법 - 1

양항급수  $\sum a_n$ 과 양수  $\epsilon < 1$ 에 대하여

(1) 모든  $n$ 에 대하여  $\sqrt[n]{a_n} < 1 - \epsilon$ 이면 급수  $\sum a_n$ 은 수렴하고,

(2) 모든  $n$ 에 대하여  $\sqrt[n]{a_n} > 1 + \epsilon$ 이면 급수  $\sum a_n$ 은 발산한다.

**증명.**

(1)  $a_n < (1 - \epsilon)^n$ 이며

$$\sum a_n < \sum (1 - \epsilon)^n < \infty$$

가 비교판정법에 의해 성립한다.

(2)  $a_n > (1 + \epsilon)^n$ 이며

$$\sum (1 + \epsilon)^n = \infty$$

이므로 비교판정법에 의해  $\sum a_n$ 도 발산한다.



# 거듭제곱근 판정법

## 거듭제곱근 판정법 - 2

양항급수  $\sum a_n$ 에서 극한값

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = r$$

이 존재한다고 하자. 이때  $r$ 을 **거듭제곱근 극한**이라 부르고

- (1)  $r < 1$ 이면 급수  $\sum a_n$ 은 수렴하고,
- (2)  $r > 1$ 이면 급수  $\sum a_n$ 은 발산한다.

**증명.**

$\epsilon = \frac{|r-1|}{2}$ 라고 두면 두 경우 모두  $\epsilon > 0$ 이다. 그런데  $r$ 의 정의에 의하여 유한 개의  $n$ 을 제외하면  $r - \epsilon < \sqrt[n]{a_n} < r + \epsilon$ 이 성립한다. 만약  $r < 1$ 이라면  $r + \epsilon \leq 1 - \epsilon$ 이고,  $r > 1$ 이라면  $r - \epsilon \geq 1 + \epsilon$ 이므로, 앞 페이지에 의하여  $\sum a_n$ 의 수렴과 발산이 결정된다.

## Example

급수

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\log n)^n}$$

의 수렴과 발산을 판정하여 보자. 이 급수에 대하여 비교판정법을 적용하기란 쉽지 않다.  $\log$ 라는 함수가 계산하기도 어려운 데다가,  $n$ 제곱이라는 거추장스러운 거듭제곱도 붙었기 때문이다. 반면, 거듭제곱근 극한이

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\log n} = 0 < 1$$

임을 알고 있기에, 주어진 급수는 수렴함을 쉽게 알 수 있다.

# 비율판정법

## 비율판정법 - 1

양수의 수열  $(a_n)$ 과  $0 < r < 1$ 에 대하여

(1) 모든  $n$ 에 대하여  $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq r$ 이면, 급수  $\sum a_n$ 은 수렴한다.

(2) 모든  $n$ 에 대하여  $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ 이면, 급수  $\sum a_n$ 은 발산한다.

**증명.**

(1)

$$a_{n+1} \leq r a_n \leq r^2 a_{n-1} \leq \cdots \leq r^n a_1$$

이 성립하고 등비급수  $\sum r^n a_1$ 이 수렴하므로 비교판정법에 의하여  $\sum a_n$ 이 수렴한다.

(2)

$$a_n \geq a_{n-1} \geq \cdots \geq a_1$$

이므로  $a_1$ 이 양수임에 따라

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$$

이고, 일반항 판정법에 의해  $\sum a_n$ 도 발산한다.

# 비율판정법

## 비율판정법 - 2

양수의 수열  $(a_n)$ 에서 극한값

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

이 존재한다고 하자. 이때

- (1)  $\rho < 1$ 이면  $\sum a_n$ 은 수렴한다.
- (2)  $\rho > 1$ 이면  $\sum a_n$ 은 발산한다.

## 비율판정법

증명.

(1)  $\rho < 1$ 이라면,  $\rho < r < 1$ 에 대하여  $n$ 이 충분히 크면,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq r < 1$$

이므로 비율판정법에 의해  $\sum a_n$ 이 수렴한다.

(2)  $\rho > 1$ 이라면  $n$ 이 충분히 클 경우

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$$

이므로 비율판정법에 의해  $\sum a_n$ 이 발산한다.

## Example

급수

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$$

을 비율판정법을 이용하여 수렴/발산 여부를 판단해보자.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n+1} = 0 < 1$$

이므로, 비율판정법에 의하여 이 급수는 수렴한다.


# 적분판정법

## 적분판정법

연속함수  $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 가 감소함수이고 항상 양수일 때,  $\sum f(n)$ 이 수렴할 필요충분조건은

$$\int_1^{\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b f(x) dx$$

가 수렴하는 것이다.



## 적분판정법

증명.

부등식

$$f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x)dx \leq f(n)$$

이  $f$ 의 연속성과 감소성에 의하여 성립한다. 이를  $n = 1$ 부터 더해 나가면,

$$f(2) + \cdots + f(n+1) \leq \int_1^{n+1} f(x)dx \leq f(1) + \cdots + f(n)$$

이다. 여기서 비교판정법을 이용한다면,  $\sum f(n)$ 이 수렴할 경우  
여기서  $\int_1^{n+1} f(x)dx$ 가  $n \rightarrow \infty$ 일 때 극한값을 가진다는, 즉  
수렴함을 알 수 있고 반대로 적분값이 수렴할 경우  
 $\sum f(n+1) = \sum f(n) - f(1)$ 이 수렴함을 알 수 있다. 따라서  
 $\sum f(n)$ 이 수렴한다.



### Example

제타함수는 아래와 같이 정의된다.

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \quad (s > 1)$$

이 함수에서,  $s > 1$ 이라면 함수  $f(x) = \frac{1}{x^s}$ 에 대하여 이 함수는 연속이고, 양수이며, 감소함수이다. 따라서  $\zeta(s)$ 가 유한할 조건은 적분판정법에 의해

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^s} dx$$

가 수렴하는 것이다. 만약  $s > 1$ 이라면

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^s} dx = \left[ -\frac{1}{-s+1} \cdot \frac{1}{x^{s-1}} \right]_1^{\infty} = \frac{1}{s-1}$$

이므로,  $\zeta(s)$ 는  $s > 1$ 일 때 유한하고 잘 정의된다. 반면  $s = 1$ 일 경우  $\infty$ 가 적분값이 되므로,  $s \leq 1$ 에서는 비교판정법에 의해 제타함수가 무한한 값을 가지고 정의되지 않는다.

## 교대급수정리

- ▶ 일반항이 0이 아닌 급수  $\sum a_n$ 에서 각 항  $a_n$ 의 부호가  $a_{n+1}$ 의 부호와 다르면, 이 급수를 **교대급수**라 부른다.

### 교대급수정리

- (1) 모든  $n$ 에 대하여  $a_n$ 과  $a_{n+1}$ 의 부호가 다르고
  - (2) 모든  $n$ 에 대하여  $|a_n| \geq |a_{n+1}|$ 이며,
  - (3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이면
- 교대급수  $\sum a_n$ 은 수렴한다.

## 절대수렴급수

- ▶ 급수  $\sum |a_n|$ 에 대하여, 급수  $\sum |a_n|$ 이 수렴하면, 처음 급수  $\sum |a_n|$ 은 **절대수렴**하다 말한다.
- ▶ 절대수렴하는 급수는 수렴한다.
- ▶ **증명.**  
실수  $a$ 에 대하여

$$a^+ = \max\{a, 0\}, \quad a^- = -\min\{a, 0\}$$

이라 두면

$$a = a^+ - a^-, \quad |a| = a^+ + a^-$$

임을 쉽게 알 수 있다. 이제  $0 \leq a^\pm \leq |a|$ 이므로, 비교판정법에 의하여  $\sum |a_n|$ 이 수렴하면, 급수  $\sum a_n^\pm$ 이 수렴하고, 그들의 차로써 표현되는  $\sum a_n$ 도 수렴한다.

### Example

만약 급수가 수렴하지만 절대수렴하지 않다면, 이를 **조건수렴**하다 말한다. 급수

$$\sum \frac{(-1)^n}{n}$$

이 조건수렴함을 보여 보자. 먼저, 이 급수는 모든  $n$ 에 대하여  $a_n$ 과  $a_{n+1}$ 의 부호가 다르고,  $|a_n| \geq |a_{n+1}|$ 이며,  $a_n$ 은 0으로 수렴한다. 따라서 교대급수정리에 의하여 수렴한다. 반면

$$\sum \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \sum \frac{1}{n}$$

은 발산함을 알고 있다. 따라서 절대수렴하지는 않는다.

## 총정리

- ▶ 수열과 급수, 그리고 그들의 수렴/발산에 대해 다루어 보았다.
- ▶ 급수가 수렴하는지를 판단하는 판정법에는 일반항 판정법, 비교판정법, 거듭제곱근 판정법, 비율판정법, 적분판정법, 교대급수정리가 있었다.
- ▶ 이외의 급수는 절대수렴함을 보여 수렴함을 보이거나, 등비급수 형태와 관련지어 증명하거나,  $\sum \frac{1}{n}$ 이 발산함을 증명할 때처럼 condensation시켜 보이는 다양한 방식으로 증명할 수 있다.
- ▶ 비교판정법과 교대급수정리에 대해서는 증명하지 않았는데, 이는 부록에서 다룰 **완비성 공리**의 개입이 필요하기 때문이다.
- ▶ 이 장과 관련된 대부분의 문제는 어떤 급수를 주고 다양한 방법을 이용해 이 급수가 수렴하는지를 판단하라는 식이다.

## 숙제 문제

- ▶ 14쪽 2, 5, 6, 8번
- ▶ 24쪽 1, 3번
- ▶ 27쪽 1, 2번
- ▶ 32쪽 1, 3번
- ▶ 36쪽 1, 3, 4, 5번
- ▶ 39쪽 1, 4번
- ▶ 프린트 3의 배수 문제