


# 극좌표계 곡선의 넓이

- ▶ 극좌표계에서  $0 \leq r \leq f(\theta)$ ,  $\theta_0 \leq \theta \leq \theta_1$ 로 표현된 영역의 넓이는 어떻게 구할까?



## 극좌표계 곡선의 넓이

### 극좌표계 곡선의 넓이

극좌표계에서  $0 \leq r \leq f(\theta)$ ,  $\theta_0 \leq \theta \leq \theta_1$ 로 둘러싸인 영역의 넓이는

$$A = \int_{\theta_0}^{\theta_1} \frac{1}{2} f(\theta)^2 d\theta$$

로 주어진다.

### Example

$r = 1$ ,  $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 로 표현되는 곡선은 원점을 중심으로 하고 반지름이 1인 원이다. 그러면

$$A = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} 1^2 d\theta = \pi$$


로, 우리가 아는 것과 같다.

### Example

곡선  $y = 1 + \cos \theta$ 에 의해 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (1 + \cos \theta)^2 d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} (2\pi + 0 + \pi) = \frac{3}{2} \pi \end{aligned}$$

이다.



# 극좌표계와 곡선의 길이

곡선의 길이

극좌표계에서

$$r = r(\theta), \quad \theta_0 \leq \theta \leq \theta_1$$

로 표현된 곡선의 길이는

$$l = \int_{\theta_0}^{\theta_1} \sqrt{r(\theta)^2 + r'(\theta)^2} d\theta$$

이다.

### Example


곡선  $r = 1 - \cos \theta$ 의 길이를 구하여보자. 그러면

$$r' = \sin \theta, \quad r^2 + r'^2 = 2 - 2 \cos \theta = 4 \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

이므로,

$$l = \int_0^{2\pi} \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta = \int_0^{2\pi} 2 \sin \frac{\theta}{2} d\theta = 8$$

이다.



## 숙제 문제

- ▶ 324쪽 1, 2, 3, 4, 5, 6번
- ▶ 343쪽 8번