

Типовой расчёт 1
по теории вероятностей и математической статистике

Проверил:
Хартов А. А. _____
«_____» _____ 2019г.
Оценка _____

Выполнил:
Студент группы Р3355
Федюкович С. А. _____
Вариант 21

Тема 1. Непосредственный подсчёт вероятностей в рамках классической схемы.

Задача 1

Условие

Какова вероятность того, что в наудачу выбранном четырёхзначном числе нет повторяющихся чисел?

Решение

1. Пространство элементарных событий ω состоит из множества четырёхзначных чисел $\{1000, 1001, \dots, 9999\}$. Его мощность равна:

$$\text{card}(\omega) = 9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 9000$$

2. Событие A , вероятность которого нам нужно найти, состоит из множества четырёхзначных чисел, в которых цифры числа не повторяются. Тогда:

$$\text{card}(A) = 9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 4536$$

3. Таким образом, искомая вероятность события A будет равна:

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\omega)} = \frac{4536}{9000} = \frac{63}{125} = 0,504$$

Ответ: $P(A) = 0,504$

Задача 2

Условие

В коробке лежат карандаши: двенадцать красных и восемь зелёных. Наудачу извлекают три. Какова вероятность того, что среди извлечённых будет хотя бы один красный карандаш?

Решение

1. Пространство элементарных событий ω состоит из всех сочетаний множества $\{1, 2, \dots, 20\}$ по 3. Его мощность равна числу этих сочетаний:

$$\text{card}(\omega) = C_{20}^3 = \frac{20!}{(20-3)!3!} = 1140$$

2. Пусть A — искомое событие. Найдём вероятность \bar{A} , которое будет состоять из всех сочетаний множества $\{1, 2, \dots, 8\}$ по 3. Тогда:

$$\text{card}(\bar{A}) = C_8^3 = \frac{8!}{(8-3)!3!} = 56$$

3. Тогда вероятность события \bar{A} будет равна:

$$P(\bar{A}) = \frac{\text{card}(\bar{A})}{\text{card}(\omega)} = \frac{56}{1140} = \frac{14}{285}$$

4. Таким образом, вероятность события A будет равна:

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{14}{285} = \frac{271}{285}$$

Ответ: $P(A) = \frac{271}{285}$

Задача 3

Условие

Цифры от 1 до 9 располагаются в случайном порядке. Какова вероятность того, что все нечётные цифры окажутся на нечётных местах?

Решение

1. Пространство элементарных событий ω состоит из всех перестановок множества $\{1, 2, \dots, 9\}$. Его мощность равна числу этих перестановок:

$$\text{card}(\omega) = P_9 = 9! = 362880$$

2. Событие A , вероятность которого нам нужно найти, состоит из множества девятизначных чисел, в которых нечётные цифры стоят на нечётных местах. Тогда:

$$\text{card}(A) = 5 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2880$$

3. Таким образом, искомая вероятность события A будет равна:

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\omega)} = \frac{2880}{362880} = \frac{1}{126}$$

$$\text{Ответ: } P(A) = \frac{1}{126}$$

Задача 4

Условие

Станция метро оборудована тремя независимо работающими эскалаторами. Вероятность безотказной работы в течение дня для первого эскалатора равна $9/10$, для второго — $8/10$, для третьего — $85/100$. Найти вероятность того, что в течение дня произойдёт поломка не более одного эскалатора.

Решение

1. Пусть A — искомое событие. Обозначим события безотказной работы с первого по третий эскалатор A_1 , A_2 и A_3 соответственно. Тогда искомая вероятность будет равна:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 A_2 A_3) + P(\overline{A_1} A_2 A_3) + P(A_1 \overline{A_2} A_3) + P(A_1 A_2 \overline{A_3}) = \\ &= 0,9 \cdot 0,8 \cdot 0,85 + 0,1 \cdot 0,8 \cdot 0,85 + 0,9 \cdot 0,2 \cdot 0,85 + 0,9 \cdot 0,8 \cdot 0,15 = \\ &= 0,941 \end{aligned}$$

$$\text{Ответ: } P(A) = 0,941$$

Задача 21

Условие

Предприятием послана автомашина за различными материалами на четыре базы. Вероятность наличия нужного материала на первой базе равна $9/10$, на второй — $85/100$, на третьей — $7/10$, на четвертой — $65/100$. Найти вероятность того, что только на первой базе не окажется нужного материала.

Решение

1. Пусть A — искомое событие. Обозначим события наличия материала с первой по четвертую базу A_1 , A_2 , A_3 и A_4 соответственно. Тогда искомая вероятность будет равна:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(\overline{A_1} A_2 A_3 A_4) + P(A_1 \overline{A_2} A_3 A_4) + P(A_1 A_2 \overline{A_3} A_4) + P(A_1 A_2 A_3 \overline{A_4}) = \\ &= 0,1 \cdot 0,85 \cdot 0,7 \cdot 0,65 + 0,9 \cdot 0,15 \cdot 0,7 \cdot 0,65 + 0,9 \cdot 0,85 \cdot 0,3 \cdot 0,65 + 0,9 \cdot 0,85 \cdot 0,7 \cdot 0,35 = \\ &= 0,4367 \end{aligned}$$

$$\text{Ответ: } P(A) = 0,4367$$

Тема 2. Геометрические вероятности

Задача 21

Условие

Из отрезка $[0, 1]$ наудачу выбираются три числа. Какова вероятность того, что их сумма не будет превышать единицу?

Решение

1. Областью Лебега Ω является куб со стороной 1:

$$\mu(\Omega) = 1$$

2. Обозначим три числа x , y и z , а интересующую нас область A :

$$A = \begin{cases} x + y + z \leq 1 \\ 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1 \\ 0 \leq z \leq 1 \end{cases}$$

3. Найдём объём области A :

$$\begin{aligned} \mu(A) &= \iiint_A dx \, dy \, dz = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} dz = \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (1-x-y) \, dy = \frac{1}{2} \int_0^1 (x-1)^2 \, dx = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

4. Таким образом, искомая вероятность будет равна:

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)} = \frac{1/6}{1} = \frac{1}{6}$$

Ответ: $P(A) = \frac{1}{6}$

Тема 3. Формула полной вероятности. Формула Байеса

Задача 21

Условие

На шахматную доску 4×4 ставят два ферзя. Какова вероятность того, что они бьют друг друга?

Решение

1. Пусть H_{Γ} — событие, состоящее в том, что ферзи расположились на одной горизонтали; $H_{\text{в}}$ — одной вертикали; $H_{\text{д}}$ — одной диагонали. Найдём их вероятности:

$$\begin{aligned}P(H_{\Gamma}) &= P(H_{\text{в}}) = 4 \cdot \frac{C_4^2}{C_{16}^2} = \frac{1}{5} \\P(H_{\text{д}}) &= 2 \cdot \frac{C_4^2 + 2 \cdot C_3^2 + 2 \cdot C_2^2}{C_{16}^2} = \frac{4}{15} \\P(A|H_{\Gamma}) &= P(A|H_{\text{в}}) = P(A|H_{\text{д}}) = 1\end{aligned}$$

2. Таким образом:

$$\begin{aligned}P(A) &= P(A|H_{\Gamma}) \cdot P(H_{\Gamma}) + P(A|H_{\text{в}}) \cdot P(H_{\text{в}}) + P(A|H_{\text{д}}) \cdot P(H_{\text{д}}) = \\&= 1 \cdot \frac{1}{5} + 1 \cdot \frac{1}{5} + 1 \cdot \frac{4}{15} = \frac{2}{3}\end{aligned}$$

Ответ: $P(A) = \frac{2}{3}$

Тема 4. Схема Бернулли

Задача 21

Условие

Вероятность того, что покупателю потребуется обувь 40-го размера равна 0,4. В обувной отдел вошли пять покупателей. Найти вероятность того, что по крайней мере двум из них потребуется обувь 40-го размера.

Решение

1. Пусть A — событие того, что в обувной отдел вошёл покупатель, которому требуется обувь 40-го размера:

$$\begin{aligned}p &= P(A) = 0,4 \\q &= 1 - p = 0,6 \\n &= 5\end{aligned}$$

2. Найдём вероятность $P_5(2, 5)$ того, что количество покупателей, которым нужна обувь 40-го размера заключено между 2 и 5:

$$\begin{aligned}P_5(2, 5) &= C_5^2 \cdot 0,4^2 \cdot 0,6^3 + C_5^3 \cdot 0,4^3 \cdot 0,6^2 + C_5^4 \cdot 0,4^4 \cdot 0,6^1 + C_5^5 \cdot 0,4^5 = \\&= 10 \cdot 0,36 \cdot 0,064 + 10 \cdot 0,216 \cdot 0,16 + 5 \cdot 0,1296 \cdot 0,4 + 1 \cdot 0,07776 = 0,91296\end{aligned}$$

Ответ: $P_5(2, 5) = 0,91296$