

2. Множества

”Множество множества”

Март 2025

1 Основни задачи

Дефиниция (операции върху множества).

- $A \cup B := \{a \mid a \in A \vee a \in B\}$ /обединение/,
- $A \cap B := \{a \mid a \in A \wedge a \in B\}$ /сечение/,
- $A \setminus B := \{a \mid a \in A \wedge a \notin B\}$ /разлика/,
- $A \Delta B := \{a \mid a \in A \oplus a \in B\}$ /симетрична разлика/,
- $A \times B := \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$ /декартово произведение/,
- $\overline{A^U} = A^{\complement} := \{a \mid a \notin A \wedge a \in U\}$ /допълнение/, където U ($A \subseteq U$) е някакъв универсум.

Забележка. Най-голям универсум няма! (помислете защо)

Дефиниция (унарни операции). Унарно обединение $\bigcup A$ на множество A дефинираме като

$$\bigcup A := \{x \mid \exists a \in A : x \in a\}.$$

Унарно сечение за *непразно* множество A дефинираме като

$$\bigcap A := \{x \mid \forall a \in A : x \in a\}.$$

Имайте предвид, че $\bigcap \emptyset$ не е добре дефинирано.

Свойство (Свойства на операциите върху множества).

- асоциативност на обединението, сечението, сим. разлика: $A \cup B \cup C = A \cup (B \cup C)$, $A \cap B \cap C = A \cap (B \cap C)$, $A \Delta B \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$
- комутативност на обединението, сечението, сим. разлика: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$, $A \Delta B = B \Delta A$
- *De Morgan: $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$, $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
- дистрибутивен закон: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$, $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
- свойства на празното множество и универсума: $A \cup \emptyset = A$, $A \cap \emptyset = \emptyset$, $A \cup U = U$, $A \cap U = A$
- двойно допълнение: $\overline{\overline{A}} = A$
- поглъщане (absorption): $A \cup (A \cap B) = A$, $A \cap (A \cup B) = A$
- *други полезни: $A \setminus B = A \cap \overline{B}$

Полезно. Забележете, че операциите върху множества (без декартовото) доста напомнят логическите (което не е изненадващо, ако се загледаме в дефинициите им по-горе). Обединението е аналог на дизюнкцията, сечението на конюнкцията, допълнението на негацията, симетричната разлика на изключващото или.

Въпрос: Кое тогава "отговаря" на импликацията?

Всъщност релацията "подмножество" носи подбна информация. По-ясно това става от връзката: $B \subseteq A$ тстк $\forall a[(a \in B) \rightarrow (a \in A)]$.

Свойство. Подобно на таблиците на истинност при логиката, тук отново можем да правим таблици на включване, вместо Т и F обаче стойностите са 1 (елементът е част от множеството) и 0 (не е част от него).

Малко за парадокса на Ръсел: Използваме "множество" като базово понятие, което не дефинираме. Идва обаче въпросът всичко ли може да бъде множество (или по-конкретно всяко нещо, което може да се дефинира като колекция, ли е множество). Известно време се е считало, че може. Оказва се обаче, че такова безразборно ползване на понятието довежда до неконсистентност, парадокси. Ето пример с такъв:

Парадокс на Ръсел: Нека $R = \{x \mid x \notin x\}$, тогава за произволно множество y : $y \in R$ тстк $y \notin y$, замествайки $y = R$: $R \in R \Leftrightarrow R \notin R$, което е виден парадокс. Проблемът тук не е във възможността множество да бъде елемент на себе си, а конкретно вчитането на R за множество. За да се избегнат такива противоречия, са установени различни аксиоматични системи, които регулират кое е валидно множество (съответно в тях R не е такова).

Задача 1. Кои от следните са верни?

- | | | | |
|--|--|--|---|
| а) $a \in \{\{a\}, b\}$ | б) $a \subseteq \{a, b\}$ | в) $a \subseteq \{a, \{a\}\}$ | г) $\{a\} \in \{b, c, a\}$ |
| д) $a \in \{b, \{a, b\}, a\}$ | е) $\{a, b\} \subseteq \{a, c, \{a, b\}\}$ | ж) $\{a, b\} \subseteq \{a, \{a, b\}, b\}$ | з) $\{a, b\} \in \{a, \{a, b\}, b\}$ |
| и) $\{\{a, b\}\} \in \{a, \{a, b\}, b\}$ | й) $\{\{a, b\}\} \subseteq \{a, b, \{a, b\}\}$ | к) $\{a, b\} \in \{a, b\}$ | л) $\emptyset \in \{a, b\}$ |
| м) $\emptyset \in \{a, \emptyset\}$ | н) $\emptyset \in \emptyset$ | о) $\emptyset \subseteq \{a, b\}$ | п) $\{\emptyset\} \subseteq \{a, \emptyset\}$ |
| р) $\{\emptyset\} \subseteq \{a\}$ | с) $\emptyset \in \{a, b\}$ | т) $\{\emptyset\} \in \{a, \emptyset\}$ | у) $a \in \mathcal{P}(\{a, b\})$ |

Решение. Не, не, не, не, не, не, да, да, не, да, не, не, да, не, да, да, не, не, не, не; ■

Задача 2. Нека A е множество. Вярно ли е, че ако $|\mathcal{P}(A)| = 0$, то $A = \emptyset$.

Решение. Ако сте се сетили, поздравления, Вие сте *майстор на математическата логика*. Отговорът е ДА. Всъщност степенното множество никога не е празно (все пак $\emptyset$ е подмножество на всяко друго), но цялото твърдение е вярно, защото това е (леко скрита) импликация с antecedent F. :) ■

Задача 3. Съществува ли множество A , за което $A \cap \mathcal{P}(A^2) \neq \emptyset$? Ако не, обосновайте защо, ако да, дайте поне два примера.

Решение. Съществува, ето две възможни:

- $A = \{\emptyset, \dots\}$, понеже $\emptyset$ е подмножество на всяко друго, то $\emptyset \in A \cap \mathcal{P}(A^2)$
- $A = \{a, b, \{(a, b)\}\} = \{a, b, \{\{\{a\}, \{a, b\}\}\}\}$, тогава $(a, b) \in A^2$, окъдето $\{(a, b)\} \in \mathcal{P}(A)$ ■

Задача 4. За множества A, B да се докаже, че $A \setminus B = A \cap \overline{B}$.

Решение. $x \in A \setminus B \equiv (x \in A) \wedge (x \notin B) \equiv (x \in A) \wedge (x \in \overline{B}) \equiv x \in (A \cap \overline{B})$ ■

Задача 5. Ако A, B, C са множества, да се докаже, че $(A \setminus C) \cup (B \setminus C) = (A \cup B) \setminus C$

Решение. $(A \setminus C) \cup (B \setminus C) = (A \cap \overline{C}) \cup (B \cap \overline{C}) = (A \cup B) \cap \overline{C} = (A \cup B) \setminus C$ ■

Задача 6. Да се докаже, че $A \cap B \subseteq A \cup B$.

Решение. Ето 3 възможни решения:

1 н.) С таблица:

A	B	$A \cap B$	$A \cup B$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

От нея се вижда, че винаги когато елемент принадлежи на $A \cap B$, то той принадлежи и на $A \cup B$, т.е. $\forall x : (x \in A \cap B) \rightarrow (x \in A \cup B)$, откъдето $A \cap B \subseteq A \cup B$. ■

2 н.) Достатъчно е да докажем, че $\forall x : (x \in A \cap B) \rightarrow (x \in A \cup B)$, т.е. $(x \in A \cap B) \rightarrow (x \in A \cup B)$ е тавтология. За начало нека за конкретен x , p е съждението $x \in A$, а q е съждението $x \in B$:

$$(x \in A \cap B) \rightarrow (x \in A \cup B) \equiv$$

$$(x \in A \wedge x \in B) \rightarrow (x \in A \vee x \in B) \equiv$$

$$(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q) \equiv$$

$$\neg(p \wedge q) \vee (p \vee q) \equiv$$

$$\neg p \vee \neg q \vee p \vee q \equiv T$$
 ■

3 н.) Може да докажем и че е валиден изводът: $\frac{x \in A \cap B}{\therefore x \in A \cup B}$, или $\frac{p \wedge q}{\therefore p \vee q}$:

$$p \wedge q \quad \begin{array}{c} \text{правило за опростяване} \\ \vdash \end{array} \quad p \quad \begin{array}{c} \text{правило за добавяне} \\ \vdash \end{array} \quad p \vee q$$
 ■

Задача 7. Да се докаже, че $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$.

Решение. Ако пробваме да решим с таблица, възниква проблем с декартовото произведение - то борава с наредени двойки, което не се вписва в таблицата.

Решаваме с еквивалентни преобразувания: За произволна наредена двойка z :

$$z = (z_1, z_2) \in A \times (B \cup C) \equiv (z_1 \in A) \wedge (z_2 \in B \cup C) \equiv (z_1 \in A) \wedge ((z_2 \in B) \vee (z_2 \in C)) \stackrel{\text{дистрибутивност}}{\equiv} [(z_1 \in A) \wedge (z_2 \in B)] \vee [(z_1 \in A) \wedge (z_2 \in C)] \equiv [z \in A \times B] \vee [z \in A \times C] \equiv z \in (A \times B) \cup (A \times C)$$

Тоест произволен елемент принадлежи на лявата страна от условието точно когато принадлежи и на дясната, т.е. двете съвпадат. ■

Задача 8. Да се докаже, че $B \subseteq C$, то $B \setminus C = \emptyset$.

Решение. Ще демонстрираме 3 възможни решения:

1 н.) С таблица:

B	C	$B \setminus C$
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

Полезно. Когато имаме допълнителни условия (например от вида $B \subseteq C$), задраскваме редове, неотговарящи на условието.

Ето защо в случая се абстрахираме от третия ред на таблицата, който не отговаря на условието (понеже в B има елемент, който не е в C), и разглеждаме само останалите.

В оставащите редове се вижда, че за всеки елемент x , $x \notin B \setminus C$ (навсякъде в последната колона

има 0), тоест $B \setminus C = \emptyset$. ■

2 н.) Допускаме противното - нека $B \setminus C \neq \emptyset$, т.е. $\exists x \in B : x \notin C$. Тогава обаче $B \not\subseteq C \Rightarrow$ противоречие с условието. ■

3 н.) Спокойно може да се гледа на условието като на импликация, за която трябва да се докаже, че винаги е вярна (т.е. тавтология).

$$\begin{aligned}(B \subseteq C) \rightarrow (B \setminus C = \emptyset) &\equiv \\ \forall x(x \in B \rightarrow x \in C) \rightarrow \neg \exists y(y \in B \wedge y \notin C) &\equiv \\ \neg \forall x(x \notin B \vee x \in C) \vee \neg \exists y(y \in B \wedge y \notin C) &\equiv \\ \exists x(x \in B \wedge x \notin C) \vee \neg \exists y(y \in B \wedge y \notin C) &\equiv \\ \exists x(x \in B \wedge x \notin C) \vee \neg \exists x(x \in B \wedge x \notin C) &\equiv T \quad \blacksquare\end{aligned}$$

Задача 9. Да се докаже, че $(A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times D)$.

Задача 10. Намерете редица от множества $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ такава, че $\forall i \in \mathbb{N} : A_i \supseteq A_{i+1}$, но $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i = \emptyset$

Решение. това е сравнително тривиален пример от гледна точка на анализа: сечението на отворените интервали $(0, 1), (0, \frac{1}{2}), \dots, (0, \frac{1}{n}), \dots$ е именно празното множество (защо интервалите са множества?) ■

Задача 11. Вярно ли е, че:

- ако $C \subseteq A \cup B$, то $C \subseteq A \vee C \subseteq B$
- ако $C \subseteq A \cap B$, то $C \subseteq A \wedge C \subseteq B$
- ако $A \subseteq B$, то $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$
- $A = B$ тстк $\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B)$
- $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$
- $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$

Решение.

- Невинаги е вярно, ето контрапример: $A = \{1, 2\}, B = \{3, 4\}, C = \{1, 3\}$ (обратната посока обаче винаги е вярна).
- За разлика от предното, това е винаги вярно. За произволен елемент $x \in C : x \in C \subseteq (A \cap B) \subseteq A \Rightarrow x \in A$, значи $\forall x \in C : x \in A \Rightarrow C \subseteq A$ аналогично и $x \in C \subseteq (A \cap B) \subseteq B \Rightarrow x \in B \Rightarrow \forall x \in C : x \in B \Rightarrow C \subseteq B$. Получихме $(C \subseteq A) \wedge (C \subseteq B)$.
- Да. Нека $S \in \mathcal{P}(A)$ е произволно подмножество на A , тогава $S \subseteq A \subseteq B \Rightarrow S \in \mathcal{P}(B)$. Понеже S е произволно, то $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.
- Да, вярно е. Ако $A = B$, то очевидно и $\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B)$. Обратно, да допуснем, че $\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B)$. Понеже $A \in \mathcal{P}(A)$, то $A \in \mathcal{P}(B)$, или $A \subseteq B$. Аналогично и $B \subseteq A$. Следва, че двете множества са съвпадат.
- Ще докажем исканото на две части (като покажем, че лявата част се съдържа в дясната и обратно). Нека $S \in \mathcal{P}(A \cap B) \Rightarrow S \subseteq A \cap B \Rightarrow (S \subseteq A) \wedge (S \subseteq B) \Rightarrow (S \in \mathcal{P}(A)) \wedge (S \in \mathcal{P}(B)) \Rightarrow S \in (\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B))$. Това показва, че всеки елемент от лявото множество е и в дясното, откъдето $\mathcal{P}(A \cap B) \subseteq \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.
Сега наобратно: нека $S \in (\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)) \Rightarrow (S \in \mathcal{P}(A)) \wedge (S \in \mathcal{P}(B)) \Rightarrow (S \subseteq A) \wedge (S \subseteq B) \Rightarrow S \subseteq A \cap B \Rightarrow S \in \mathcal{P}(A \cap B)$.
- Не е винаги вярно, ето контрапример: $A = \{1\}, B = \{2\}$, тогава $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(\{1, 2\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$, докато $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}$. ■

Задача 12. Ако A е множество от множества, докажете, че $A \subseteq \mathcal{P}(\bigcup A)$ (с $\bigcup A$ означаваме $\bigcup_{a \in A} a$).

Решение. Трябва да покажем, че ако $x \in LHS$, то $x \in RHS$. Нека $x \in A$, значи $\bigcup_{a \in A} a = a_1 \cup \dots \cup a_n$, откъдето $x \subseteq \bigcup A$ (понеже за произволни множества $V \subseteq V \cup W$). От $x \subseteq \bigcup A$ директно следва, че $x \in \mathcal{P}(\bigcup A)$. ■

По-формално това може да се изкаже и така: нека $a \in A$, значи $\forall x \in a : x \in \bigcup A \Rightarrow x \subseteq \bigcup A \Rightarrow x \in \mathcal{P}(\bigcup A)$, т.е. всеки елемент на A е и елемент на $\mathcal{P}(\bigcup A) \Rightarrow A \subseteq \mathcal{P}(\bigcup A)$. ■

Задача 13. Нека S е множество и $A_0, A_1, A_2, \dots$ са негови подмножества такива, че $A_0 \subseteq A_1 \subseteq \dots$ (т.е. $A_n \subseteq A_{n+1}$). Дефинираме $B_0 := A_0, B_{n+1} := A_{n+1} \setminus A_n$. Докажете, че $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} B_i$.

Решение. Ще покажем поотделно двете включвания. Равенството ще следва от тях:

($\subseteq$): Нека $x \in \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$. Следователно съществува i такава, че $x \in A_i$. Нека изберем най-малкото i , за което това е вярно. Това означава, че $i = 0$ или $i > 0$ и $x \notin A_{i-1}$. Ако $i = 0$, то $x \in A_0 = B_0 \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} B_i$ и сме готови. Ако пък сме във втория случай, то отново $x \in A_i \setminus A_{i-1} = B_i \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} B_i$. Следователно $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} B_i$. ✓

($\supseteq$): Нека $x \in \bigcup_{i \in \mathbb{N}} B_i$. Тогава съществува i такава, че $x \in B_i$. Но $B_0 = A_0$, а при $i > 0 : B_i = A_i \setminus A_{i-1} \subseteq A_i$. Следователно $x \in A_i \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$. Получаваме и $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} B_i \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$. ■

Задача 14. Ако A, B, C, X са множества и $B \subseteq A$, и $A \cap C = \emptyset$, да се намери X (изразено чрез A, B, C), което е решение на системата:

$$\begin{cases} A \setminus X = B \\ X \setminus A = C \end{cases}$$

Решение. С диаграми на Вен лесно можем да се ориентираме, че търсеното решение е единствено и е именно $(A \cup C) \setminus B = (A \setminus B) \cup C$. Сега да докажем:

1 н.) От $A \setminus X = B$ можем да извлечем следната информация:

- $A \setminus X = B \Rightarrow A \setminus (A \setminus X) = A \setminus B$, т.е. $A \cap X = A \setminus B$, откъдето $A \setminus B \subseteq X$ (1.1)
- От дефиницията на разлика на множества следва и, че $X \cap B = \emptyset$ (1.2)

От $X \setminus A = C$ пък можем да извлечем следната информация:

- Отново директно от дефиницията на разлика $C \subseteq X$ (2.1) (казано по-просто, щом след премахване на нещо от X е останало C , то C е част от X)
- Понеже $X \cup A = (X \setminus A) \cup A = C \cup A$, то $X \subseteq A \cup C$ (2.2) (понеже ако $V \cup W = Q$, то $V \subseteq Q$)

От (1.1), (2.1) следва, че $A \setminus B \subseteq X$ и $C \subseteq X$, откъдето $(A \setminus B) \cup C \subseteq X$.

От (1.2), (2.2) следва, че $X \cap B = \emptyset$ и $X \subseteq A \cup C$, откъдето $X \subseteq (A \cup C) \setminus B = (A \setminus B) \cup C$.

От горните две получаваме и двете посоки на включването, т.е. $(A \setminus B) \cup C \subseteq X \subseteq (A \setminus B) \cup C$, значи $X = (A \setminus B) \cup C$. ■

2 н.) С цел улеснение, ще искаме да ползваме операцията допълнение на множество, но за целта ни трябва подходящ универсум, дефинираме $U = A \cup B \cup C \cup X$. Макар още да не знаем X , от втория ред в системата се вижда, че $X \subseteq A \cup C$, значи $U = A \cup B \cup C \cup X = A \cup B \cup C$. Ползвайки $V \setminus W = V \cap \overline{W}$, системата можем да запишем и в следния вид:

$$\begin{cases} A \cap \overline{X} = B \Rightarrow \overline{A} \cup X = \overline{B} \\ X \cap \overline{A} = C \end{cases}$$

Искаме да изразим X само с неща, които знаем. Ще ползваме, че за произволни множества V, W е вярно, че: $V = (V \cup W) \setminus (W \setminus (V \cap W))$ (вижте на диаграма). След заместване $V = X, W = \overline{A}$ се получава: $X = (X \cup \overline{A}) \setminus (\overline{A} \setminus (X \cap \overline{A})) = \overline{B} \setminus (\overline{A} \setminus C) = \overline{B} \cap \overline{(\overline{A} \cap \overline{C})} = \overline{B} \cap (A \cup C) = (A \cup C) \setminus B$. ■

Забележка. Всъщност никъде не използвахме експлицитно условията $B \subseteq A$ и $A \cap C = \emptyset$. Те са дадени само за да гарантират непротиворечивост на условието (може да лесно да видите, че ако бъдат нарушени, системата няма как да бъде в сила).

Задача 15 (предложи М. Георгиев). Да се докаже, че за множество A е вярно $\bigcup A \subseteq A$ тстк $A \subseteq \mathcal{P}(A)$. Множество, изпълняващо тези свойства, се нарича *транзитивно*.

Задача 16. Нека F е фамилия от n различни подмножества на множество A , $n \geq 2$. Докажете, че съществуват поне n различни множества от вида $A \triangle B$, $A, B \in F$ ($A \triangle B$ е симетричната разлика на множествата).

Решение. Достатъчно е да направим наблюдението, че $A \triangle B \neq A \triangle C$ тстк $B \neq C$ (достатъчна ни е само обратната посока).

Лема: Ако $B \neq C$, то $A \triangle B \neq A \triangle C$

Д-во на лемата: допускаме противното, че $B \neq C$, но $A \triangle B = A \triangle C = S$. От $B \neq C$, б.о.о $\exists x_0 : x_0 \in B \wedge x_0 \notin C$ (съответно може и наобратно). Сега имаме:

- От една страна $x_0 \in S = A \triangle B$ тстк $x_0 \notin A$ (защото вече занем, че $x_0 \in B$)
- От друга страна $x_0 \in S = A \triangle C$ тстк $x_0 \in A$ (защото вече занем, че $x_0 \notin C$)

Но тогава $x_0 \notin A \Leftrightarrow x_0 \in A$, абсурдно, противоречие с допускането. $\square$

Ако $A_1, \dots, A_n$ са множествата от фамилията, то $A_1 \triangle A_1, A_1 \triangle A_2, \dots, A_1 \triangle A_n$ според лемата са именно n различни множества от искания вид. $\blacksquare$

Задача 17 (*). Нека $F = \{A_1, A_2 \dots A_k\}$ е фамилия от различни подмножества на A , като $|A| = n$. Ако всеки две множества от F се пресичат, докажете, че $k \leq 2^{n-1}$.

Решение. Да групираме всички възможни подмножества на A (общо 2^{n-1}) по двойки, като всяко да бъде в двойка с допълнението си до A , т.е. произволно подмножество S е в двойка с $A \setminus S$. Това са 2^{n-1} двойки.

Ако $k > 2^{n-1}$, то от принципа на Дирихле (който официално ще вземем след 3 занятия) измежду множествата от фамилията ще има поне две, които са част от една двойка (напр. A_i и $A_j, i \neq j$). Но тогава те не се пресичат, противоречие с допускането, значи $k \leq 2^{n-1}$. $\blacksquare$

Дефиниция (фамилия). Множество от множества наричаме фамилия.

Забележка. Формално в аксиоматичната система ZF протоелементи (прости единици, които изграждат множества) няма, там всички обекти са множества, така че случай, различен от горния, там е невъзможен. Ние обаче считаме, че такива най-прости съставни елементи съществуват.

Дефиниция (покритие, разбиване). Фамилия от множества $F = X_1, \dots, X_k$ наричаме *покритие* на непразното множество A , ако са изпълнени:

1. $\forall i : X_i \subseteq A$ /опционално, следва от 3/,
2. $\forall i : X_i \neq \emptyset$,
3. $\bigcup_{i=1}^k X_i = A$;

Ако освен това е изпълнено: $\forall i \forall j, i \neq j : X_i \cap X_j = \emptyset$, то покритието се нарича *разбиване*.

Задача 18 (ДР1 И 23). Нека A е множество, а P, R са произволни негови разбивания. Да се докаже, че множеството $F = \{X \cap Y | X \in P \wedge Y \in R\} \setminus \{\emptyset\}$ също е разбиване на A .

**Въпрос: защо " $\emptyset$ " е във фигурни скоби?*

Решение. Последователно проверяваме по дефиницията. Понеже X, Y са множества, то сечението им е множество, така че F наистина е фамилия от множества (за определеност нека $F = \{F_1, \dots, F_k\}$). При това:

- X, Y са елементи от разбиванията P, R на A , така че сеченията им F_i са подмножества на A . ✓

- Понеже *елементът* празно множество е премахнат от фамилията (" $\setminus \{\emptyset\}$ "), то всеки елемент $F_i \neq \emptyset$. ✓

- Сега да покажем, че $\bigcup_{i=1}^k F_i = A$. Разглеждаме конкретен елемент $a \in A$. Понеже P, R са разбивания на A , то съществуват множества $X_0 \in P$ и $Y_0 \in R : a \in X_0 \wedge a \in Y_0 \Rightarrow a \in X_0 \cap Y_0 = F_0 \Rightarrow a \in \bigcup_{i=1}^k F_i$. С това заключаваме, че всеки елемент от A е "покрит". ✓

- Остава да проверим дали $\forall i \forall j, i \neq j : F_i \cap F_j = \emptyset$. По дефиниция $F_i = X \cap Y, (X \in P) \wedge (Y \in R)$, съответно нека $F_i = X_1 \cap Y_1, F_j = X_2 \cap Y_2$, където $(X_1, X_2 \in P) \wedge (Y_1, Y_2 \in R)$. Понеже $F_i \neq F_j$, то $(X_1 \neq X_2) \vee (Y_1 \neq Y_2)$. Б.о.о. е изпълнено първото, $X_1 \neq X_2$, нещо повече, тъй като те са част от разбиване, то те не се пресичат, $X_1 \cap X_2 = \emptyset$, но тогава и сечението $F_i \cap F_j = (X_1 \cap Y_1) \cap (X_2 \cap Y_2) = X_1 \cap X_2 \cap Y_1 \cap Y_2 = \emptyset \cap Y_1 \cap Y_2 = \emptyset$. ✓

Всички изисквания от дефиницията са изпълнени, значи даденото множество наистина е разбиване. ■

Задача 19 (*). Нека $F = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ е фамилия от r -елементни множества. Ако сечението на всеки $r + 1$ множества от F е непразно, да се докаже, че и сечението на всички n множества от F е непразно.

Решение. Последователно (по индукция) ще докажем, че сечението на всеки k от множествата е непразно, където $k > r$.

База: за $k = r + 1$ сечението на всеки $r + 1$ множества е непразно по условие. ✓

ИП: Нека сечението на всеки $k, r < k < n$ множества е непразно.

ИС: Нека $B_1, B_2, \dots, B_{k+1}$ са произволни множества от фамилията, искаме да докажем, че тяхното сечение също е непразно. От И.П.:

$$B_2 \cap B_3 \cap \dots \cap B_k \cap B_{k+1} = C_1 \neq \emptyset$$

$$B_1 \cap B_3 \cap \dots \cap B_k \cap B_{k+1} = C_2 \neq \emptyset$$

...

$$B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_{k-1} \cap B_{k+1} = C_k \neq \emptyset$$

Тоест във всяко C_t има елемент от B_{k+1} . Но последното множество е r -елементно и $k > r$. Тогава от принципа на Дирихле съществуват индекси $i, j; 0 < i \neq j \leq k$ такива, че множествата C_i, C_j имат общ елемент с $B_{k+1} \Rightarrow C_i \cap C_j \neq \emptyset$ откъдето $B_1 \cap \dots \cap B_{k+1} = [B_1 \dots B_{i-1} \cap B_{i+1} \dots B_{k+1}] \cap [B_1 \dots B_{j-1} \cap B_{j+1} \dots B_{k+1}] = C_i \cap C_j \neq \emptyset$, с което индукционната стъпка е завършена. ✓

От индукцията директно следва, че сечението на всички n множества е непразно. ■

Задача 20 ()**. Дадена е A с n елемента. Да се докаже, че ако подмножествата $A_1, A_2, \dots, A_k$ на A са такива, че $\forall i \neq j : |A_i \cap A_j| = 1$, то $k \leq n$.

Решение (Ланджев, ОТ 2008). Ще ползваме алгебричен подход за решаването на задачата. На всяко от множествата съпоставяме характеристичен вектор $v_i := (e_1^i, \dots, e_n^i)$, където $e_j^i = 1$, ако елементът a_j на A принадлежи на подмножеството A_i и $e_j^i = 0$ в противен случай. Ще покажем, че векторите $v_1, v_2, \dots, v_k$ са линейно независими.

Нека $c_1 v_1 + \dots + c_k v_k = \emptyset$ е тяхна нулева линейна комбинация. Можем да забележим, че от дефиницията ни скалярното $\langle v_i, v_j \rangle = |A_i \cap A_j| = 1$. Тогава $\emptyset = \langle v_i, \emptyset \rangle = \langle v_i, \sum_{i=1}^k c_i v_i \rangle = c_1 + \dots + c_{i-1} + c_i |A_i| + c_{i+1} + \dots + c_k = c_1 + \dots + c_k + c_i(|A_i| - 1)$. Тогава $S := c_1 + \dots + c_k = -c_i(|A_i| - 1) = c_i(1 - |A_i|) \forall i \leq k$.

Но понеже $1 - |A_i| \leq 0$, то $\forall i$: коефициентите c_i имат еднакъв знак (противоположен на този на сумата им). Това е единствено възможно при $S = 0$ и $c_i(1 - |A_i|) = 0$ (*), $\forall i \leq k$.

Ако за някое $i_0 : |A_{i_0}| = 1$, то директно от условието $\forall i \leq k : A_{i_0} \subseteq A_i$, а отгук $\forall i, j : A_i \cap A_j = A_{i_0}$, значи всеки друг елемент на A попада в не повече от едно от множествата, така $k \leq 1 + (n - 1) = n$.

В противен случай $\forall i \leq k : |A_i| \neq 1 \stackrel{(*)}{\Rightarrow} \forall i \leq k : c_i = 0$. Единствената линейна комбинация,

която дава нулевия вектор е тривиалната, тогава векторите са линейно независими. В n -мерно пространство има най-много n линейно независими вектора, значи и тук $k \leq n$. ■

Задача 21 (**Sperner's theorem). Дадена е фамилия $F = \{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ от подмножества на A , като $|A| = n$ и никои две множества от фамилията не са сравними по отношение на включването, т.е. $\forall i, j \leq k, i \neq j : A_i \not\subseteq A_j$. Да се докаже, че $k \leq \binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$.

Решение. Нека F е така избрана фамилия, че за нея се достига най-голяма стойност за k (т.е. разглеждаме едно оптимално решение). Нека също $d := \max\{|A_i| \mid A_i \subseteq A\}$ и $S := \{A_i \subseteq A \mid |A_i| = d\}$. Да допуснем, че $d > \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$. Дефинираме $S' := \{B \mid (\exists A_i \in S)[B \subseteq A_i] \wedge (|B| = d - 1)\}$.

Правим наблюдението, че $(\forall A_i \in F \setminus S)(\forall B \in S')[A_i \not\subseteq B \wedge B \not\subseteq A_i]$. Нека B_i е произволно.

- От дефиницията на S' , $\exists A_j \in S : B \subset A_j$. Тогава $A_i \subseteq B$ влече $A_i \subset A_j$, което е невъзможно, т.е. $\forall i \leq k : A_i \not\subseteq B$.
- Обратно, ако за някое $A_{i_0} \in F \setminus S : B \subset A_{i_0}$, то $|A_{i_0}| \geq d$, но от избора ни d да е най-голямата възможна мощност, $|A_{i_0}| = d$, но тогава $A_{i_0} \in S \Rightarrow A_{i_0} \notin F \setminus S$, което е противоречие

Понеже множествата в S' са с еднаква мощност, то никое от тях не се включва в друго. Имайки предвид и горното наблюдение, заключаваме, че фамилията $(F \setminus S) \cup S'$ изпълнява изискването от условието.

Имаме също, че $|(F \setminus S) \cup S'| = |F| - |S| + |S'|$, което следва от $S \subseteq F$ и това, че множествата $F \setminus S$ и S' са чужди (непресичащи се). Но $|S'| \geq \frac{|S| \cdot d}{n - d + 1}$ - причината е, че всяко множество от S задава d на брой $(d - 1)$ -елементни подмножества, същевременно всяко от последните участва в не повече от $n - d + 1$ на брой множества от S (тоест е преброено не повече от толкова пъти). Но по допускане, $d > \lfloor \frac{n}{2} \rfloor \Rightarrow n - d + 1 < n - \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1 \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1 \leq d$, но тогава $\frac{d}{n - d + 1} > 1$, откъдето $|S'| \geq \frac{|S| \cdot d}{n - d + 1} > |S|(F \setminus S) \cup S'| = |F| - |S| + |S'| > |F|$, което е по-добро решение от първоначалното, което е противоречие с максималния избор. Значи максимално k се достига при $\max\{|A_i| \mid A_i \subseteq A\} =: d \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

По аналогичен начин можем да докажем, че съществува решение, за което $\min\{|A_i| \mid A_i \subseteq A\} \geq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$. Този факт, комбиниран с горното, ни дава съществуване на оптимално решение, в което всички множества от F са с мощност точно $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$. Но тогава $|F| \leq \binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$. ■

Задача 22 (*Предложи Богдан Стаменов). Дадено е множество A с $|A| = 2n$. Подмножества X и Y на наричаме съседни, ако $|X \cap Y| = 1$ и $X \cup Y = A$. Да се докаже, че могат да бъдат избрани най-много $\frac{2^{2n} + \binom{2n}{n} - 2}{2}$ подмножества на A така, че никои две от тях не са съседни.

Задача 23 (*IMO Shortlist 2002, C5). Нека $r \geq 2$ е фиксирано цяло число и нека F е безкрайна фамилия от множества, всяко от които с мощност r . Известно е, че сечението на всеки две множества от фамилията е непразно. Да се докаже, че съществува множество с мощност $r - 1$, което има непразно сечение с всяко множество от фамилията.

Решение. Ще докажем с индукция, че за всяко $k < r$ съществува k -елементно множество A , което се включва (като подмножество) в безброй много множества от фамилията или има непразно сечение с всички множества от F (всъщност тогава сме готови и исканото е доказано). За краткост да обозначим това свойство с $P(k)$.

База: При $k = 0$ очевидно $\emptyset$ върши работа, понеже е подмножество на всяко множество от F .

ИП: Нека за някое $k < r$ е в сила $P(k)$.

ИС: Ако $k + 1 < r$, ще покажем, че е в сила $P(k + 1)$. По предположение съществува k -елементно A , което се включва в безброй много множества от фамилията или има непразно сечение с всички множества от F . Ако второто е в сила, то произволно $(k + 1)$ -елементно надмножество на A също би пресичало всички множества от F . Да допуснем обаче, че само първото е изпълнено и съществува множество $S = \{x_1, \dots, x_r\}$ от F , което има празно сечение с A . От безброй многото множества във F , които включват (са надмножества на) A , всяко едно трябва да има общ елемент със S . Следователно поне един от елементите x_i на S се съдържа в безброй много от тях. Тогава $A \cup \{x_i\}$

също се включва в безброй много множества от F . ✓

В частност при $k = r - 1$ това ни дава, че съществува множество A с $|A| = r - 1$, което *се включва* (като подмножество) в безброй много множества от фамилията или има непразно сечение с всички множества от F . Първият случай обаче не е възможен, понеже по аргументацията от ИС би следвало, че съществува r -елементно множество, което е подмножество на безброй многото множества от F , т.е. трябва да съвпада с всяко от тях, противоречие. Остава единствено вариантът да съществува множество с $r - 1$ елемента, което пресича всички множества от фамилията. ■

Задача 24 (***Erdős-Ko-Rado theorem*). Нека $F = \{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ е фамилия от r -елементни подмножества на n -елементно множество A , като $r < \frac{n}{2}$. Ако сечението на всеки две множества от F е непразно, да се докаже, че $k \leq \binom{n-1}{r-1}$.