

פתרון:

שאלה 1. א.

$$f(x) = \begin{cases} -1 & -\pi \leq x < -\frac{\pi}{3} \\ 0 & -\frac{\pi}{3} \leq x < \frac{\pi}{3} \\ 1 & \frac{\pi}{3} \leq x < \pi \end{cases}$$

הפונקציה $f(x)$ א"ז לכן ניתן לתאר אותה כטור פורייה רק עם סינוסים, מכאן ש- $a_n = a_0 = 0$ ו-

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_n \left[a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) \right] \Big|_{L=2\pi} = \sum_n b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{L}\right)$$

b_n נתון ע"י:

$$b_n = \frac{2}{L} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx$$

נציב את הפונקציה ונשתמש בזהות עבור אינטגרל זוגי על טווח סימטרי:

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = -\frac{2}{\pi} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \frac{\cos(nx)}{n} \Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\pi}$$

$$b_n = \frac{2}{n\pi} \left((-1)^n - \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) \right)$$

מכאן שניתן לכתוב את $f(x)$ כ-

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi} \left((-1)^n - \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) \right) \sin(nx)$$

ב. מבקשים מאיתנו לחשב את סכום הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{[(-1)^n - \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)] \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)}{n}$$

נשים לב שזו התשובה שקיבלנו בסעיף א' עבור $x = \frac{\pi}{3}$ (בלי הקבוע שלפני הטור).

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi} \left((-1)^n - \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) \right) \sin(nx)$$

$$x = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \frac{\pi}{2} f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left((-1)^n - \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) \right) \sin\left(\frac{\pi}{3}n\right)$$

נותר למצוא את הערך של $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ נשים לב שזו נקודת אי רציפות של הפונקציה והיא ניתנת ע"י המשוואה:

$$f(x_0) = \frac{1}{2} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} [f(x_0 + \epsilon) + f(x_0 - \epsilon)]$$

נקבל:

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$$

נציב הכל ונקבל:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left((-1)^n - \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) \right) \sin\left(\frac{\pi}{3}n\right) = \frac{\pi}{2} f\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\pi}{4}$$

שאלה 2. צריך למצוא טור קוסינוס עבור הפונקציה $f(t) = \cosh(t-1)$ בטווח $0 \leq t \leq 1$ עם מחזור $L = 2$. הכוונה בטור קוסינוסים היא שהפונקציה שנקבל בפיתוח תהיה זוגית.

יש שתי דרכים לעשות את זה:

$$f(t) = \begin{cases} \cosh(1-t) & -1 \leq t < 0 \\ \cosh(t-1) & 0 \leq t \leq 1 \end{cases} \quad \text{1. לכתוב את הפונקציה } f(t) \text{ בהרכבה:}$$

ולמצוא את a_n ו- b_n כרגיל.

2. להניח מראש שהפונקציה שנקבל היא זוגית, כלומר לקבוע ש- $b_n = 0$ (כל האיברים הא"ז בטור שווים ל0), עם מחזור $L = 2$ בטווח $-1 \leq t \leq 1$.

נפתור את התרגיל בדרך השנייה.

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1} a_n \cos\left(\frac{\pi n t}{L}\right)$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{L} \int_{-1}^1 \cosh(t-1) \cos\left(\frac{\pi n t}{L}\right) dt \stackrel{\cosh(x)=\cos(ix)}{=} 2 \int_0^1 \cos(i(t-1)) \cos(\pi n t) dt \\ &= \int_0^1 [\cos(i(t-1) + \pi n t) + \cos(i(t-1) - \pi n t)] dt = \left[\frac{\sin(t(i + \pi n t) - i)}{i + \pi n t} + \frac{\sin(t(i - \pi n t) - i)}{i - \pi n t} \right]_0^1 \\ &= \left\{ \left[\frac{\sin \pi n}{i + \pi n} + \frac{\sin \pi n}{i - \pi n} \right] - \left[\frac{\sin(-i)}{i + \pi n} + \frac{\sin(-i)}{i - \pi n} \right] \right\} = \sin(i) \left(\frac{1}{i + \pi n} + \frac{1}{i - \pi n} \right) \\ a_n &= \frac{2 \sinh(1)}{\pi^2 n^2 + 1} \end{aligned}$$

$$a_0 = 2 \int_0^1 \cos(i(t-1)) \cos(\pi n t) dt = \left|_{n=0} 2 \int_0^1 \cos(i(t-1)) dt = 2 \frac{\sin(i(t-1))}{i} \right|_0^1 = -2i(\sin(0) - \sin(-i))$$

$$a_0 = 2 \sinh(1)$$

קיבלנו שהטור קוסינוסים הוא:

$$f(t) = \sinh(1) + \sum_{n=1} \frac{2 \sinh(1)}{\pi^2 n^2 + 1} \cos(\pi n t)$$

צריך להוכיח ש:

$$\sum_{n=1} \frac{1}{\pi^2 n^2 + 1} = \frac{1}{e^2 + 1}$$

נשים לב שאם נציב $t = 0$ בביטוי שקיבלנו ונעביר אגפים נקבל את הביטוי שביקשו להוכיח.

$$\begin{aligned} \sum_{n=1} \frac{1}{\pi^2 n^2 + 1} &= \frac{f(0) - \sinh(1)}{2 \sinh(1)} = \frac{1}{2} \frac{\cosh(-1) - \sinh(1)}{\sinh(1)} = \frac{1}{2} \frac{e^{-1} + e^{-1} - e + e^{-1}}{e - e^{-1}} \\ \sum_{n=1} \frac{1}{\pi^2 n^2 + 1} &= \frac{1}{e^2 - 1} \end{aligned}$$

מש"ל.

בחלק הבא צריך למצוא את הערכים של $\sum_{n=1} (\pi^2 n^2 + 1)^{-1}$ עבור n זוגי ואי-זוגי. נפרק קודם כל את הטור שמצאנו ל n זוגי ואי-זוגי:

$$\underbrace{\sum_{n=1} \frac{1}{\pi^2 (2n)^2 + 1}}_{=S_{\text{even}}} + \underbrace{\sum_{n=1} \frac{1}{\pi^2 (2n-1)^2 + 1}}_{=S_{\text{odd}}} = \frac{1}{e^2 - 1} = \frac{1}{2} \frac{\cosh(1) - \sinh(1)}{\sinh(1)}$$

נשים לב שאם נציב $t = 1$ בטור קוסינוסים שמצאנו עבור $f(t)$ נקבל טור מתחלף:

$$f(t) \Big|_{t=0} = \cosh(0) = \sinh(1) + \sum_{n=1} \frac{2 \sinh(1)}{\pi^2 n^2 + 1} (-1)^n \quad (1)$$

נעביר אגפים, נסדר את הטור לאותה הצורה כמו מקודם, ונפצל לטור זוגי ואי-זוגי:

$$\underbrace{\sum_{n=1} \frac{1}{\pi^2 (2n)^2 + 1}}_{=S_{\text{even}}} - \underbrace{\sum_{n=1} \frac{1}{\pi^2 (2n-1)^2 + 1}}_{=S_{\text{odd}}} = \frac{\cosh(0) - \sinh(1)}{2 \sinh(1)} \quad (2)$$

נחבר את משוואה 1 עם 2 ונקבל:

$$S_{\text{even}} = \frac{\cosh(1) + \cosh(0) - 2 \sinh(1)}{4 \sinh(1)}$$

באותה צורה נחסר בין שתי המשוואות ונקבל את הביטוי עבור S_{odd} :

$$S_{\text{odd}} = \frac{\cosh(1) - \cosh(0)}{4 \sinh(1)}$$

שאלה 3.

$$f(x) = \cosh(x), \quad -1 \leq x \leq 1$$

נמצא את טור הקוסינוסים כמו שביקשו עם מחזור 2.

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1} a_n \cos(\pi n x)$$

$$\begin{aligned} a_n &= \int_{-1}^1 \cosh(x) \cos(\pi n x) dx = 2 \int_0^1 \cos(ix) \cos(\pi n x) dx = \int_0^1 [\cos(x(i + \pi n)) + \cos(x(i - \pi n))] \\ &= \left[\frac{\sin(x(i + \pi n))}{i + \pi n} + \frac{\sin(x(i - \pi n))}{i - \pi n} \right] \Big|_0^1 = \frac{\sin((i + \pi n))}{i + \pi n} + \frac{\sin((i - \pi n))}{i - \pi n} \stackrel{\sin(a+b)=\sin a \cos b + \cos a \sin b}{=} -\frac{2 \sin(i) \cos(\pi n)}{1 + \pi^2 n^2} \\ &= \frac{2 \sinh 1}{1 + \pi^2 n^2} (-1)^n \end{aligned}$$

$$a_0 = 2 \int_0^1 \cos(ix) dx = 2 \sinh(1)$$

מצאנו את $f(x)$:

$$f(x) = \sinh(1) + \sum_{n=1} \frac{2 \sinh 1 (-1)^n}{1 + \pi^2 n^2} \cos(\pi n x)$$

נמצא את טור הקוסינוסים עבור

$$g(x) = x^2, \quad -1 \leq x \leq 1$$

באותה הצורה.

$$\begin{aligned} a_n &= 2 \int_0^1 x^2 \cos(\pi n x) dx = 2 \left[\frac{x^2 \sin(\pi n x)}{\pi n} + \frac{2x \cos(\pi n x)}{\pi^2 n^2} - \frac{2 \sin(\pi n x)}{\pi^3 n^3} \right] \Big|_0^1 \\ &= \frac{4(-1)^n}{\pi^2 n^2} \end{aligned}$$

$$a_0 = 2 \int_0^1 x^2 dx = \frac{2}{3}$$

מצאנו את $g(x)$:

$$g(x) = \frac{1}{3} + \sum_{n=1} \frac{4(-1)^n}{\pi^2 n^2} \cos(\pi n x)$$

מבקשים מאיתנו להוכיח את הקשר הבא בעזרת שתי אינטגרציות של $f(x)$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2 \pi^2 (n^2 \pi^2 + 1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sinh(1)} - \frac{5}{6} \right)$$

$$\begin{aligned} \cosh(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum a_n \cos(\pi n x) \quad / \int dx \\ \Rightarrow \sinh(x) &= \frac{a_0}{2} x + \sum \frac{a_n}{\pi n} \sin(\pi n x) + A \\ x = 0 &\Rightarrow \sinh(0) = 0 = A \end{aligned}$$

נבצע אינטגרציה נוספת:

$$\begin{aligned}\cosh(x) &= \frac{a_0}{4}x^2 - \sum \frac{a_n}{\pi^2 n^2} \cos(\pi n x) + B \\ \cosh(x) &= \frac{1}{2} \sinh(1)x^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \sinh(1)(-1)^{n+1}}{n^2 \pi^2 (n^2 \pi^2 + 1)} \cos(\pi n x) + B\end{aligned}$$

צריך למצוא את B , נציב $x = 0$, אחרי העברת אגפים נקבל:

$$B = 1 - 2 \sinh(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\pi^2 n^2 (\pi^2 n^2 + 1)} = 1 + 2 \sinh(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\underbrace{\frac{(-1)^n}{n^2 \pi^2}}_{=-\frac{1}{12}} + \underbrace{\frac{(-1)^{n+1}}{\pi^2 n^2 + 1}}_{=\frac{1}{2} - \frac{1}{2 \sinh(1)}} \right)$$

את הסכום הראשון ניתן למצוא בעזרת הטור שמצאנו עבור $g(x)$ ואת הסכום השני באמצעות הטור הראשון שמצאנו עבור $f(x)$.

$$B = \frac{5}{6} \sinh(1)$$

נציב ב $f(x)$:

$$f(x) = \frac{1}{2} \sinh(1)x^2 + 2 \sinh(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2 \pi^2 (n^2 \pi^2 + 1)} \cos(\pi n x) + \frac{5}{6} \sinh(1)$$

נציב $x = 0$ ונעביר אגפים:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2 \pi^2 (n^2 \pi^2 + 1)} = \frac{1}{2 \sinh(1)} \left(1 - \frac{5}{6} \sinh(1) \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sinh(1)} - \frac{5}{6} \right)$$

מש"ל.

שאלה 4.

א. צריך לחשב את טור הקוסינוסים של הפונקציה $f(x) = x(\pi - x)$ בתחום $[0, \pi]$. נעשה את זה באותה צורה כמו בתרגילים הקודמים באמצעות:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_n \left[a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) \right]$$

ו-

$$a_n = \frac{2}{L} \int_{x_0}^{x_0+L} f(x) \cos\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) dx, \quad b_n = \frac{2}{L} \int_{x_0}^{x_0+L} f(x) \sin\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) dx$$

b_n שווה ל-0.

נציב ב- a_n

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x(\pi - x) \cos(2nx) dx = \frac{2}{\pi} \left[x(\pi - x) \frac{\sin(2nx)}{2n} + (\pi - 2x) \frac{\cos(2nx)}{4n^2} + 2 \frac{\sin(2nx)}{8n^3} \right] \Big|_0^\pi$$

$$a_n = -\frac{1}{n^2}$$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x(\pi - x) dx = \frac{2}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} x^2 - \frac{1}{3} x^3 \right] \Big|_0^\pi = \frac{1}{3} \pi^2$$

נציב הכל בטור פורייה:

$$f(x) = \frac{\pi^2}{6} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cos(2nx)$$

ב. 1.

צריך למצוא את סכום הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$. נציב בטור $x = 0$:

$$f(0) = 0 = \frac{\pi^2}{6} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cos(2n \cdot 0) = \frac{\pi^2}{6} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

2. צריך למצוא את סכום הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$. נשתמש בזהות פרסבל:

$$\frac{1}{L} \int_{x_0}^{x_0+L} |f(x)|^2 dx = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \quad (3)$$

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\pi (x(\pi - x))^2 dx = \frac{\pi^4}{30}$$

$$\frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{\pi^4}{36} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^4}$$

נפתור את המשוואה עבור הסכום:

$$\frac{\pi^4}{30} = \frac{\pi^4}{36} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^4}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

שאלה 5.

א. צריך למצוא את טור פורייה עבור הפונקציה $f(x) = \cos(ax)$ בתחום $[-\pi, \pi]$, a הוא מספר ממשי אך לא שלם.

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(ax) \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [\cos((a+n)x) + \cos((a-n)x)] dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin((a+n)x)}{a+n} + \frac{\sin((a-n)x)}{a-n} \right] \Big|_0^{\pi} = \frac{2a \sin(a\pi)(-1)^n}{a^2 - n^2} \end{aligned}$$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(ax) dx = \frac{2}{\pi} \frac{\sin(ax)}{a} \Big|_0^{\pi} = \frac{2 \sin(a\pi)}{a\pi}$$

$$f(x) = \frac{\sin(a\pi)}{a\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2a \sin(a\pi)(-1)^n}{a^2 - n^2} \cos(nx)$$

ב.

נציב בטור שקיבלנו $x = \pi$:

$$f(\pi) = \cos(a\pi) = \frac{\sin(a\pi)}{a\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2a \sin(a\pi)(-1)^{2n}}{a^2 - n^2} = \frac{\sin(a\pi)}{a\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2a \sin(a\pi)}{a^2 - n^2} \quad / : \sin(a\pi)$$

$$\cot(a\pi) = \frac{1}{\pi} \left[\frac{1}{a} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2a}{n^2 - a^2} \right]$$

שימו לב שבוצעה ההחלפה $a^2 - n^2 = -(n^2 - a^2)$.