

Gewone breedborst

Oedemera nobilis

Zeldzaamheidstatus

Zeldzaam




Beschrijving

Degewone breedborst, breedborstloopkever, zwarte breedkever of zwarte tor (*Abax parallelepipedus*) is een kever die behoort tot de familie loopkevers (Carabidae). [1][2]

Gevonden in

- Momignies Life BNIP 24 mares de l'arboretum (HA), Monceau-Imbrechies (HA)

Seizoenspatroon



Seizoensanalyse

Het seizoenspatroon van de Gewone breedborst kever, waarbij ze typisch het meest worden waargenomen in de zomer, kan worden verklaard door verschillende biologische en ecologische factoren. In de lente zijn kevers meestal nog inactief of bezig met het zoeken naar voedsel en geschikte partners om zich voort te planten. Dit verklaart waarom de waarnemingen in het voorjaar relatief laag zijn. Naarmate de zomer nadert, worden de temperaturen warmer en gaan de meeste kevers actiever op zoek naar voedsel, partners en geschikte plaatsen om hun eitjes te leggen. De zomer is dus het seizoen waarin kevers het meest actief zijn en dit verklaart waarom de waarnemingen in de zomer het hoogst zijn. In de herfst beginnen de temperaturen af te nemen en worden de dagen korter. Dit kan leiden tot een afname van activiteit bij kevers, aangezien ze zich mogelijk voorbereiden op de winter. Daarom zijn de waarnemingen in de herfst iets lager dan in de zomer. In de winter zijn de meeste kevers inactief. De koude temperaturen en beperkte beschikbaarheid van voedsel zorgen ervoor dat kevers in een rustfase gaan, wat resulteert in lagere waarnemingen in de winter. Samengevat kunnen we stellen dat het seizoenspatroon van de Gewone breedborst kever wordt beïnvloed door factoren zoals temperatuur, beschikbaarheid van voedsel, voortplantingsgedrag en rustperiodes. Dit verklaart waarom ze typisch het meest worden waargenomen in de zomer, wanneer deze factoren gunstig zijn voor hun activiteit en voortplanting.