人工智能导论 ----- 作业 3 (总分 75 分)

12月8日课堂上提交(打印和手写都可以)

问题 1----- 概率计算 (共 24 分)

以下表所列是 3 个随机变量(每个变量有两个值可取)的联合概率分布。请根据这个表,计 算以下第二个表里所列的条件或边缘概率值(请精确到小数点后三位)。

X_0	X_1	X_2	$P(X_0, X_1, X_2)$
0	0	0	0.160
1	0	0	0.160
0	1	0	0.160
1	1	0	0.080
0	0	1	0.060
1	0	1	0.100
0	1	1	0.200
1	1	1	0.080

Expression	Value
$P(X_0=1,X_1=0,X_2=1)$	
$P(X_0=0,X_1=1)$	
$P(X_2=0)$	
$P(X_1=0 X_0=1)$	
$P(X_0=1,X_1=0 X_2=1)$	
$P(X_0=1 X_1=0,X_2=1)$	

以上表中的计算数值依次为: 0.100, 0.360, 0.56, 0.62, 0.227, 0.625

问题 2 ----- 概率计算 2 (共 24 分)

在以下前三个表里给出的是先验概率分布 P(X), 和两个条件分布 P(Y|X)和 P(Z|Y). 一个事实是,当给定 Y 的值后,Z 是独立于 X。所有变量都是只有两个取值(0 或 1).请根据连锁法则,计算最后两个联合分布的表格里空缺的概率值。(结果请精确到小数点后三位)

X	P(X)
0	0.100
1	0.900

Y	X	P(Y X)
0	0	0.200
1	0	0.800
0	1	0.600
1	1	0.400

Z	Y	P(Z Y)
0	0	0.400
1	0	0.600
0	1	0.200
1	1	0.800

X	Y	P(X,Y)	
0	0		
1	0		
0	1		
1	1		

X	Y	Z	P(X,Y,Z)
0	0	0	
1	0	0	0.216
0	1	0	0.016
1	1	0	•
0	0	1	0.012
1	0	1	
0	1	1	0.064
1	1	1	

左边表中空格内的数值依次为: 0.02, 0.54, 0.08, 0.36 右边表中空格内的数值依次为: 0.008, 0.072, 0.324, 0.288

问题 3 ----- 概率计算 3 (共 16 分)

根据以下各小题里提供的概率分布表,判断相应提问的独立性或条件独立性假设是否成立。

3-1) X 是否独立于 Y? 是

X	Y	P(X,Y)
0	0	0.140
1	0	0.060
0	1	0.560
1	1	0.240

X	P(X)
0	0.700
1	0.300

Y	P(Y)
0	0.200
1	0.800

3-2) X 是否独立于 Y? 否

	X	Y	P(X,Y)
(0	0	0.220
,	1	0	0.420
()	1	0.160
,	1	1	0.200

X	P(X)
0	0.380
1	0.620

Y	P(Y)
0	0.640
1	0.360

X	Y	Z	P(X,Y,Z)
0	0	0	0.090
1	0	0	0.090
0	1	0	0.030
1	1	0	0.090
0	0	1	0.140
1	0	1	0.140
0	1	1	0.280
1	1	1	0.140

X	Z	P(X Z)
0	0	0.400
1	0	0.600
0	1	0.600
1	1	0.400

X	Y	Z	P(X Y,Z)
0	0	0	0.500
1	0	0	0.500
0	1	0	0.250
1	1	0	0.750
0	0	1	0.500
1	0	1	0.500
0	1	1	0.667
1	1	1	0.333

3-4) X 是否独立于 Y,当给定 Z 的值后? 是

X	Y	Z	P(X,Y,Z)
0	0	0	0.048
1	0	0	0.072
0	1	0	0.192
1	1	0	0.288
0	0	1	0.180
1	0	1	0.180
0	1	1	0.020
1	1	1	0.020

X	Z	P(X Z)
0	0	0.400
1	0	0.600
0	1	0.500
1	1	0.500

X	Y	Z	P(X Y,Z)
0	0	0	0.400
1	0	0	0.600
0	1	0	0.400
1	1	0	0.600
0	0	1	0.500
1	0	1	0.500
0	1	1	0.500
1	1	1	0.500


问题 4----- 贝叶斯网络属性-- 马可夫毯 (共1分)

假设有一个贝叶斯网络,包括(但不限于)变量 X, Y, Z, Z 不在 X 的马可夫毯里,问以下哪些判断为真? 1, 5

- 1) 如果 X 是 Y 的一个后代,但是 Y 不是 X 的一个直接父,那么,给定 X 的马可夫毯后,X 是独立于 Y 的。
- 2) 如果 X 是独立于 Z, 但是 X 在给定 Y 后不独立于 Z, 那么 Y 是在 X 的马可夫毯里。
- 3) 如果 X 在给定 Y 后是独立于 Z 的,那么 Y 一定是在 X 的马可夫毯里。
- 4) 如果 X 的所有子和父都被观察到值后,那么 X 是独立于 Z 的。
- 5) 如果 Y 既不是 X 的一个后代,也不是 X 的一个父,那么,只给定 X 的父的值后,X 是独立于 Y 的。
- 6) 以上论断都不正确。

问题 5 ----- 贝叶斯网络和概率计算 (共 6 分)

假设一个去医院就诊的人可能有一个症状(S),这个症状可能由两个不同的疾病(A 和 B)所导致。还知道基因 G 上的一个变异很可能导致疾病 A 的发生。以下给出了这个贝叶斯网络,以及相应的概率分布表。请分别计算下面提问所涉的概率值。



5-1) 计算概率 P(+g, +a, +b, +s)?

0.04

5-2) 计算一个病人患疾病 A 的概率?

0.19

5-3) 计算患有疾病 B 的情况下,还患有 A 的概率? 0.19 5-4) 在得知病人有症状 S, 并患有 B的情况下, 该病人患有 A的概率是多少? 0.2267 5-5) 在得知病人患有 A, 那么该病人携带致病基因 G 的概率是多少? 0.5263 5-6) 在得知病人患有 B, 那么该病人携带致病基因 G 的概率是多少? 0.1 问题 6----- 连锁法 (共 4 分) 请在以下每个小题里,在给定相应独立性假设下,选出所有和提问概率相等价的表达式。 6-1) 假定没有独立性假设, P(A, B|C) = c) \square P(C|A)P(A|B)P(B)P(C) $\square P(B,C|A)P(A)$ P(B,C) $\Box P(A|B,C)P(B|C)$

 $\frac{P(A|C)P(B,C)}{P(C)}$

c) d)
$\Box P(A B,C)P(B C)$
$ \frac{P(A C)P(B,C)}{P(C)} $
6-3)假定没有独立性假设, P(A B,C)=b,d
$ \frac{P(C A)P(A B)P(B)}{P(C)} $
$\square P(A C)P(C B)P(B)$
P(B,C) $P(C A,B)P(B A)P(A)$
P(B C)P(C)
6-4)假定在给定C后,A独立于B,那么,P(A B,C)=b,c,d
$ \frac{P(C A)P(A B)P(B)}{P(C)} $
P(C A,B)P(B A)P(A) $ P(B C)P(C)$

6-2) 假定给定 C 后, A 独立于 B, 则 P (A, B | C) =