

中国科学技术大学 2018-2019 学年第二学期
数学分析(B2) 期末考试试卷(A卷)参考解答

一、(本题 10 分) 设已知方程 $\phi\left(x + \frac{z}{y} + \frac{z}{x}\right) = 0$ 确定了隐函数 $z = f(x, y)$. 求 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y}$.

解 记 $w = x + \frac{z}{y} + \frac{z}{x}$. 则 $\phi(w) = 0$. 分别对 x, y 求导, 得

$$\phi'(w) \cdot \left(1 + \frac{z'_x}{y} + \frac{z'_x x - z}{x^2}\right) = 0,$$

$$\phi'(w) \cdot \left(\frac{z'_y y - z}{y^2} + \frac{z'_y}{x}\right) = 0.$$

.....(5分)

因此,

$$1 + \frac{z'_x}{y} + \frac{z'_x x - z}{x^2} = 0, \quad \frac{z'_y y - z}{y^2} + \frac{z'_y}{x} = 0.$$

因而

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z - \frac{x^2 y}{x + y}.$$

.....(10分)

二、(本题 10 分) 求曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 包含在圆柱 $x^2 + y^2 = 2x$ 内的部分面积。

解 记 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2x\}$. 则 D 的面积为 $\sigma(D) = \pi$. 对于曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 有 $z'_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, $z'_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$(2分)

于是所求曲面面积为

$$S = \iint_D \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy \tag{6分}$$

$$\begin{aligned} &= \iint_D \sqrt{1 + \frac{x^2}{x^2 + y^2} + \frac{y^2}{x^2 + y^2}} dx dy \\ &= \iint_D \sqrt{2} dx dy \end{aligned} \tag{8分}$$

$$\begin{aligned} &= \sqrt{2} \cdot \sigma(D) \\ &= \sqrt{2}\pi. \end{aligned} \tag{10分}$$

三、(本题 10 分) 求积分 $I = \iiint_V \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}} dV$, 其中 V 为椭球 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 内部。

解 作变换 $x = au, y = bv, z = cw$. 则 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = abc$ 2分

记 $B = \{(u, v, w) | u^2 + v^2 + w^2 \leq 1\}$.

$$\begin{aligned} I &= \iiint_V \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}} dV \\ &= \iiint_B \sqrt{1 - u^2 - v^2 - w^2} \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} du dv dw \\ &= abc \iiint_B \sqrt{1 - u^2 - v^2 - w^2} du dv dw \quad (\text{.....4分}) \end{aligned}$$

作球坐标变换 $u = r \sin \theta \cos \varphi$, $v = r \sin \theta \sin \varphi$, $w = r \cos \theta$, $r \in (0, 1)$, $\theta \in (0, \pi)$, $\varphi \in (0, 2\pi)$. 则有

$$\begin{aligned} \iiint_B \sqrt{1 - u^2 - v^2 - w^2} du dv dw &= \iiint_{\substack{0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi}} \sqrt{1 - r^2} \cdot r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \\ &= \int_0^1 \sqrt{1 - r^2} \cdot r^2 dr \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \\ &= 4\pi \int_0^1 \sqrt{1 - r^2} \cdot r^2 dr \quad (\text{.....8分}) \\ &= 4\pi \cdot \frac{1}{8} = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

故 $I = \frac{\pi}{2} abc$. (.....10分).

四、(本题 10 分) 设 $\vec{v} = \frac{y^2 + z^2}{r^3} \mathbf{i} - \frac{xy}{r^3} \mathbf{j} - \frac{xz}{r^3} \mathbf{k}$ 是定义在 $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ 上的向量场, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

(1) 证明: \vec{v} 的旋度 $\nabla \times \vec{v} = 0$;

(2) 求向量场 \vec{v} 的势函数。

解 (1) $\nabla \times \vec{v}$ 的第一个分量等于

$$\begin{aligned} & -\frac{\partial}{\partial y} \frac{xz}{r^3} + \frac{\partial}{\partial z} \frac{xy}{r^3} \\ &= \frac{3xz}{r^4} \frac{y}{r} - \frac{3xy}{r^4} \frac{z}{r} = 0; \end{aligned}$$

第二个分量等于

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial z} \frac{y^2 + z^2}{r^3} + \frac{\partial}{\partial x} \frac{xz}{r^3} \\ &= \frac{2z}{r^3} - \frac{3(y^2 + z^2)}{r^4} \frac{z}{r} + \frac{z}{r^3} - \frac{3xz}{r^4} \frac{x}{r} \\ &= \frac{1}{r^5} (3zr^2 - 3zr^2) = 0; \end{aligned}$$

第三个分量等于

$$\begin{aligned} & -\frac{\partial}{\partial x} \frac{xy}{r^3} - \frac{\partial}{\partial y} \frac{y^2 + z^2}{r^3} \\ &= -\frac{y}{r^3} + \frac{3xy}{r^4} \frac{x}{r} - \frac{2y}{r^3} + \frac{3(y^2 + z^2)}{r^4} \frac{y}{r} \\ &= \frac{1}{r^5} (-3yr^2 + 3yx^2 + 3y(y^2 + z^2)) = 0. \end{aligned}$$

(.....5分)

(2) 设 $\vec{v} = \nabla \phi$, 由 $\frac{\partial \phi}{\partial z} = -\frac{xz}{r^3}$ 可得

$$\phi(x, y, z) = \frac{x}{r} + f(x, y).$$

代入到等式 $\frac{\partial \phi}{\partial y} = -\frac{xy}{r^3}$ 可得 $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$. 最后利用

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{y^2 + z^2}{r^3} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{x}{r}$$

可得 $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$, 所以

$$\phi = \frac{x}{r} + c.$$

(.....10分)

五、(本题 15 分) 设向量场 $\vec{v} = -x\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - \frac{1}{4}}\mathbf{k}$, 曲面 $S = \{x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$, 它的正向是外法向。求向量场 $\nabla \times \vec{v}$ 在定向曲面 S 上的积分

$$\iint_S \nabla \times \vec{v} \cdot d\vec{S}.$$

解 (法1) 直接计算可得

$$\nabla \times \vec{v} = \frac{y}{\sqrt{r^2 - \frac{1}{4}}}\mathbf{i} - \frac{x}{\sqrt{r^2 - \frac{1}{4}}}\mathbf{j} + y\mathbf{k}. \quad (\text{.....2分})$$

单位球面的单位外法向场 $\vec{n} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, 所以

$$\nabla \times \vec{v} \cdot \vec{n} = yz.$$

将曲面 S 分为两部分: $S^+ : z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, $S^- : z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$, 他们有相同的面积元 $dS = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}dxdy$. 所以

$$\begin{aligned} \iint_S \nabla \times \vec{v} \cdot d\vec{S} &= \iint_S yz dS \\ &= \iint_{S^+} yz dS + \iint_{S^-} yz dS \\ &= \iint_{x^2+y^2 < 1} y\sqrt{1-x^2-y^2} \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}} dxdy - \\ &\quad \iint_{x^2+y^2 < 1} y\sqrt{1-y^2-z^2} \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}} dxdy \\ &= 0 \end{aligned}$$

(法2) 记 $\vec{F} = \frac{2}{\sqrt{3}}y\mathbf{i} - \frac{2}{\sqrt{3}}x\mathbf{j} + y\mathbf{k}$. 则在 S 上 $\nabla \times \vec{v} = \vec{F}$. 因为 \vec{F} 在 $B = \{x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ 上光滑. 故, 由 Gauss 公式, 有

$$\iint_S \nabla \times \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_B \operatorname{div} \vec{F} d\sigma = 0.$$

六、(本题 15 分) 计算无穷积分 $I = \int_1^{+\infty} t^2 e^{t(2-t)} dt$.

解

$$\begin{aligned} I &= \int_1^{+\infty} t^2 e^{-(t-1)^2+1} dt \\ &= \int_0^{+\infty} (u+1)^2 e^{-u^2+1} du && (t = u+1) \\ &= e \left[\int_0^{+\infty} u^2 e^{-u^2} du + 2 \int_0^{+\infty} u e^{-u^2} du + \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du \right] \\ &= e \left[\frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \sqrt{w} e^{-w} dw + \int_0^{+\infty} e^{-w} dw + \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} w^{-\frac{1}{2}} e^{-w} dw \right] \\ &= e \left[\frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) + \Gamma(1) + \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \right] \\ &= e \left(\frac{1}{4} \sqrt{\pi} + 1 + \frac{1}{2} \sqrt{\pi} \right) \\ &= e \left(\frac{3}{4} \sqrt{\pi} + 1 \right) \end{aligned}$$

七、(本题 15 分) 设 $f(x) = \cosh(x-1)$, $0 \leq x \leq 1$. 求该函数的余弦级数, 并证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2\pi^2 + 1} = \frac{1}{e^2 - 1}.$$

解 将 $f(x)$ 偶延拓到 $[-1, 1]$ 使之成为偶函数, 再以 2 为周期延拓到 $(-\infty, \infty)$ 使之成为整个数轴上的偶函数, 此时 $f(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上连续.

$$a_0 = 2 \int_0^1 f(x) dx = 2 \int_0^1 \cosh(x-1) dx = 2 \sinh(x-1) \Big|_0^1 = 2 \sinh 1.$$

(.....3分)

$$\begin{aligned} a_n &= 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx = 2 \int_0^1 \cosh(x-1) \cos n\pi x dx \\ &= 2 \left[\frac{\cosh(x-1)}{n\pi} \sin n\pi x \Big|_0^1 - \frac{1}{n\pi} \int_0^1 \sinh(x-1) \sin n\pi x dx \right] \\ &= -\frac{2}{n\pi} \int_0^1 \sinh(x-1) \sin n\pi x dx \\ &= -\frac{2}{n\pi} \left[-\frac{\sinh(x-1) \cos n\pi x}{n\pi} \Big|_0^1 + \frac{1}{n\pi} \int_0^1 \cosh(x-1) \cos n\pi x dx \right] \\ &= \frac{2 \sinh 1}{n^2\pi^2} - \frac{1}{n^2\pi^2} a_n. \end{aligned}$$

故, $a_n = \frac{2 \sinh 1}{n^2\pi^2 + 1}$. (..... 10 分)

于是所求 Fourier 级数为

$$\cosh(x-1) = \sinh 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \sinh 1}{n^2\pi^2 + 1} \cos n\pi x, \quad x \in [0, 1].$$

(.....13分)

在上式中取 $x = 0$ 可得

$$\cosh 1 = \sinh 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \sinh 1}{n^2\pi^2 + 1}.$$

因而,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2\pi^2 + 1} = \frac{1}{e^2 - 1}.$$

(.....15分)

八、(本题 15 分, 每小题 5 分) 设 $F(t) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin tx}{1+x^2} dx$. 求证:

1) $F(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续.

2) $F(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导.

3) $F(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上二阶可导且满足方程 $F''(t) - F(t) = -\frac{1}{t}$.

证明 1) 记 $f(x, t) = \frac{\sin tx}{1+x^2}$. 则 $|f(x, t)| \leq \frac{1}{1+x^2}$. 由于 $f(x, t)$ 是二元连续函数, 且 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$ 收敛, 根据 Weierstrass 判别法知 $F(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续.

2) 求偏导, 可得 $\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{x \cos tx}{1+x^2}$. 因为 $\frac{x}{1+x^2}$ 在 $x > 1$ 递减趋于 0, 且对于任意 $t_0 > 0$, $\left| \int_{t_0}^b \cos tx dx \right| \leq \frac{2}{t_0}$. 根据 Dirichlet 判别法知, $\int_0^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx$ 在 $[t_0, +\infty)$ 上一致收敛. 故, $F(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 且

$$F'(t) = \int_0^{+\infty} \frac{x \cos tx}{1+x^2} dx \quad (1)$$

3) 对 (1) 式右端分部积分, 得

$$\begin{aligned} F'(t) &= -\frac{1}{t} \int_0^{+\infty} \frac{(1-x^2) \sin tx}{(1+x^2)^2} dx \\ &= -\frac{1}{t} \int_0^{+\infty} \frac{\sin tx}{(1+x^2)^2} dx + \frac{2}{t} \int_0^{+\infty} \frac{x^2 \sin tx}{(1+x^2)^2} dx. \end{aligned}$$

故,

$$tF'(t) + F(t) = 2 \int_0^{+\infty} \frac{x^2 \sin tx}{(1+x^2)^2} dx. \quad (2)$$

上式还可表为

$$tF'(t) - F(t) = -2 \int_0^{+\infty} \frac{\sin tx}{(1+x^2)^2} dx. \quad (3)$$

因为 $\frac{\sin tx}{(1+x^2)^2}$ 关于 t 的导函数为 $\frac{x \cos tx}{(1+x^2)^2}$, 它有控制函数 $\frac{x}{(1+x^2)^2}$. 根据 Weierstrass 判别法知 $tF'(t) - F(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 且

$$(tF'(t) - F(t))' = -2 \int_0^{+\infty} \frac{x \cos tx}{(1+x^2)^2} dx.$$

这说明 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有二阶导数, 且

$$tF''(t) = -2 \int_0^{+\infty} \frac{x \cos tx}{(1+x^2)^2} dx.$$

对上式右端分部积分, 得

$$\begin{aligned} tF''(t) &= \frac{\cos tx}{1+x^2} \Big|_{x=0}^{x=+\infty} - \int_0^{+\infty} \frac{-t \sin tx}{1+x^2} dx \\ &= -1 + t \int_0^{+\infty} \frac{\sin tx}{1+x^2} dx \\ &= -1 + tF(t). \end{aligned}$$

因而 $F''(t) - F(t) = -\frac{1}{t}$.