

(复习课)(Part A)

一、第二型曲线积分

1. 平面上曲线

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad \int_l Pdx + Qdy = \int_{\text{起点参数}}^{\text{终点参数}} (P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t))dt$$

简化：曲线在某个坐标轴的投影为一个点，则关于该坐标轴坐标的积分为0

2. 空间上曲线

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

$$\int_l Pdx + Qdy + Rdz = \int_{\text{起点参数}}^{\text{终点参数}} (P(x(t), y(t), z(t))x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t))dt$$

简化：曲线在某个坐标轴的投影为一个点，则关于该坐标轴坐标的积分为0

二、第二型曲面积分

$$\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$$

1. 分面算法 $\Sigma: z = g(x, y), (x, y) \in D_{xy}$ 单值曲面

$$\iint_{\Sigma} Rdx dy = \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, g(x, y))dx dy \quad \begin{cases} "+", < \vec{n}, \vec{k} > < \frac{\pi}{2} \\ "- ", < \vec{n}, \vec{k} > > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

2. 统一到同一坐标面上 $\Sigma: z = g(x, y), (x, y) \in D_{xy}$

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy &\stackrel{\text{统一}}{=} \iint_{\Sigma} (P(-g'_x) + Q(-g'_y) + R)dx dy \stackrel{\text{分面计算}}{=} \\ &\pm \iint_{D_{xy}} P(x, y, g(x, y))(-g'_x) + Q(x, y, g(x, y))(-g'_y) + R(x, y, g(x, y))dx dy \end{aligned}$$

三、公式

1. 格林公式 **不闭合则补线：平行坐标轴补（关于坐标轴的积分为0）**

设曲线 C 是平面闭曲面 D 的边界闭曲线，曲线 C 与 D 的方向满足 D 总是在曲线 C 前进

方向的左侧, $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在 D 上具有连续的一阶偏导数, 则

$$\int_C Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

2. 高斯公式 不闭合则补面: 平行坐标面补, (关于坐标面的两个轴积分为 0)

设空间闭区域 V 是由分片光滑的闭曲面 Σ 围成, Σ 的方向是外法方向,

$$P(x, y, z),$$

$Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 在 V 上具有连续的一阶偏导数, 则

$$\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz$$

3. 斯托克斯 (Stokes) 公式(不考)

设 S 是空间有向闭曲面, l 是 S 的边界闭曲线, l 的方向对 S 而言满足右手螺旋,

即右手拇

指指向 S 的法方向, 另外四指为 l 的方向, P , Q , R 在 S 上具有连续的一阶偏

导数, 则

$$\int_l Pdx + Qdy + Rdz = \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

四、路径无关

平面曲线 $\int_l Pdx + Qdy$ 与路径无关

$$\Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y} \Leftrightarrow \oint_C Pdx + Qdy = 0 \Leftrightarrow du = Pdx + Qdy \text{ 全微分}$$

$$\text{原函数为 } u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} Pdx + Qdy + C = \int_{x_0}^x P(x, y_0)dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y)dy + C$$

五、全微分方程(不考)

$$Pdx + Qdy = 0 \text{ 满足 } \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}, \text{ 通解: } \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} Pdx + Qdy = C$$

$$\text{六、向量场 } \vec{F} = (P, Q, R), \text{ 散度: } \operatorname{div} \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

$$\text{旋度: } \operatorname{rot} \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \text{ (不考)}$$

(结课周) (典例课 第二型曲线/曲面积分 三个公式 积分与路径无关)

1. 求 $\int_{\widehat{AB}} (x+y)dx + (x-y)dy$, \widehat{AB} 是

(1) 单位圆弧 $x^2 + y^2 = 1, x > 0, y > 0$

(2) 折线 AOB , 其中 $A(1,0)$, $B(0,1)$

2. $\oint_C xy^2 dy - x^2 y dx$, C 是圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 的正向

3. $\oint_l e^x [(1-\cos y)dx - (y-\sin y)dy]$, l 是区域 $\{(x,y) | 0 < x < \pi, 0 < y < \sin x\}$ 的正向围

线

4. $\int_l (e^x \sin y - y)dx + (e^x \cos y - 1)dy$, l 是由点 $A(a,0)$ 到点 $O(0,0)$ 的上半圆周

5. $\int_C (e^x \sin y - y^3)dx + (e^x \cos y + x^3)dy$, C 是沿半圆周 $x = -\sqrt{a^2 - y^2}$ 从点 $A(0,-a)$ 到

点 $B(0,a)$ 的弧

6. $\int_{\widehat{AB}} (x^2 y \cos x + 2xy \sin x - y^2 e^x)dx + (x^2 \sin x - 2ye^x)dy$, \widehat{AB} 是沿椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

从点 $A(3,0)$ 到 $B(1, \frac{4\sqrt{2}}{3})$ 的一段弧

7. 验证: 在整个 xOy 平面上, $xy^2 dx + x^2 y dy$ 是某个函数 $u(x,y)$ 的全微分, 并求

$$u(x,y)$$

8. 验证: $\frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$ 在右半面 ($x > 0$) 内是某个函数 $u(x,y)$ 的全微分, 并求出

$$u(x,y)$$

9. 试求参数 λ , 使得在任何不包含 $y=0$ 的区域上曲线积分

$$\int_C \frac{x}{y} (x^2 + y^2)^\lambda dx - \frac{x^2}{y^2} (x^2 + y^2)^\lambda dy \quad \text{与路径无关, 并求}$$

$$u(x, y) = \int_{(1,1)}^{(x,y)} \frac{x}{y} (x^2 + y^2)^\lambda dx - \frac{x^2}{y^2} (x^2 + y^2)^\lambda dy$$

10. $\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, L 是平面上任意一条正向曲线

11. 求微分方程 $(x + ye^x)dx + e^x dy = 0$ 的通解

12. $\iint_{\Sigma} (x + y - z) dz dx$, Σ 是平面 $x + y + z = 1$ 在第一卦限部分的上侧

13. $\iint_{\Sigma} (x + z^2) dx dy + x dy dz$, Σ 是上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 的下侧

14. 求向量场 $\vec{A} = x^3 \vec{i} + y^3 \vec{j} + z^3 \vec{k}$ 在 $(1, 0, -1)$ 处的散度 $\text{div} \vec{A}$

(无穷级数复习课)

题型：正项级数、交错级数敛散性判别，绝对收敛与条件收敛判别，抽象级数敛散性判别//幂级数的收敛域（收敛半径、收敛区间），函数的幂级数展开，幂级数求和

一、数项级数

① 性质： $\sum a_n$ 中若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ ，则 $\sum a_n$ 发散（万用的标准）

二、正项级数敛散性判别法： $a_n > 0$ ， $\sum a_n$

② 比值或根值法：若正项级数 $\sum a_n$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = r$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = r$ ，则若 $r < 1$ ，

则 $\sum a_n$ 收敛，若 $r > 1$ ， $\sum a_n$ 发散，若 $r = 1$ ，无法判断

③ 比较法：如果正项级数 $\sum a_n$ ， $\sum b_n$ 满足 $a_n < b_n$ ，则若 $\sum b_n$ 收敛，则 $\sum a_n$ 收

敛，若 $\sum a_n$ 发散，则 $\sum b_n$ 发散（ $\frac{a_{n+1}}{a_n} < \frac{b_{n+1}}{b_n}$ （推论））

④ 比阶法：如果正项级数 $\sum u_n$ ， $\sum v_n$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = C$ ，则若 $C \neq 0$ ， $\sum u_n$ ， $\sum v_n$

具有相同的敛散性，若 $C = 0$ ，则当 $\sum v_n$ 收敛，则 $\sum u_n$ 收敛，若 $C = \infty$ ，当 $\sum v_n$

发散，则 $\sum u_n$ 发散。

⑤ 部分和数列 $\{S_n\}$ 有上界 $\Leftrightarrow \sum a_n$ 收敛

三、常用尺子

等比级数 $\sum r^n \begin{cases} |r| < 1, \text{收敛} \\ |r| \geq 1, \text{发散} \end{cases}$ p 级数 $\sum \frac{1}{n^p} \begin{cases} p > 1, \text{收敛} \\ 0 < p \leq 1, \text{发散} \end{cases}$

四、交错项级数 $\sum (-1)^n a_n$, $\sum (-1)^{n-1} a_n$

莱布尼兹定理: 若 $a_n > 0$, $\{a_n\} \downarrow$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则 $\sum (-1)^n a_n$, $\sum (-1)^{n-1} a_n$ 收敛

1. 若 $\sum |a_n|$ 收敛, 则 $\sum a_n$ 收敛, 称 $\sum a_n$ 为绝对收敛

2. 若 $\sum |a_n|$ 发散, $\sum a_n$ 收敛, 则称 $\sum a_n$ 为条件收敛

五、幂级数 $\sum a_n x^n$

收敛半径 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ 收敛区间 $x \in (-R, R)$

收敛域: $(-R, R) \pm$ ($x = \pm R$ 时使 $\sum a_n x^n$ 收敛的点)

六、函数的幂级数展开与幂级数的求和 (注意起始下标位置)

(方法) 利用已知函数的幂级数展开、幂级数的和, 通过四则运算、换元、求导、求积分, 得到所求函数的幂级数展开、幂级数求和

特征与办法: 有 n 的倍数 \leftarrow 求导

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in (-\infty, +\infty) \leftarrow \text{有阶乘}$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad x \in (-1, 1) \leftarrow \text{分母有 } n \leftarrow \text{求积分}$$

一、判断敛散

$$1. \sum \frac{3n^n}{(1+n)^n} \quad 2. \sum \frac{2^n n!}{n^n} \quad 3. \sum \frac{n^{n-1}}{(n+1)^{n+1}}$$

解：1. (性质) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^n}{(1+n)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{(1+\frac{1}{n})^n} = \frac{3}{e} \neq 0$ ，发散

2. (比值) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}(n+1)!/(n+1)^{n+1}}{2^n n! / n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \cdot \frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n} = \frac{2}{e} < 1$ ，收敛

3. (比阶) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n^{n-1}}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n \cdot n}{(n+1)^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot n}{(1+\frac{1}{n})^n \cdot (n+1)} = \frac{1}{e} \neq 0$ ，且 $\frac{1}{n^2}$ 收敛

4. $\sum (-1)^n \int_n^{n+1} \frac{e^{-x}}{x} dx$ 5. $\sum (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{3n-1}}$ (题 4、5 要区分是条件、绝对)

解：4. $\left| (-1)^n \int_n^{n+1} \frac{e^{-x}}{x} dx \right| = \int_n^{n+1} \frac{e^{-x}}{x} dx < \int_n^{n+1} e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_n^{n+1}$

$= -(\frac{1}{e^{n+1}} - \frac{1}{e^n}) = -(\frac{1}{e} - 1) \frac{1}{e^n}$ 且 $\sum \frac{1}{e^n} = \sum (\frac{1}{e})^n$ 收敛

由比较判别法， $\sum \left| (-1)^n \int_n^{n+1} \frac{e^{-x}}{x} dx \right|$ 收敛

所以 $\sum (-1)^n \int_n^{n+1} \frac{e^{-x}}{x} dx$ 收敛且为绝对收敛

5. $\left| (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{3n-1}} \right| = \frac{1}{\sqrt{3n-1}} > \frac{1}{\sqrt{3n}}$ 且 $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散，所以 $\sum \frac{1}{\sqrt{3n-1}}$ 发散

$\sum (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{3n-1}}$ 设 $a_n = \frac{1}{\sqrt{3n-1}} > 0$

$a_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{3(n+1)-1}} < a_n$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ，所以 $\sum (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{3n-1}}$ 收敛，且为条件收敛

二、幂级数

1. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 4^n}{n^2 + 1} x^n$ 收敛域

解：设 $a_n = \frac{3^n + 4^n}{n^2 + 1}$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{3^n + 4^n}{n^2 + 1}}{\frac{3^{n+1} + 4^{n+1}}{(n+1)^2 + 1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(3^n + 4^n)((n+1)^2 + 1)}{(3^{n+1} + 4^{n+1})(n^2 + 1)} \right|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{3}{4}\right)^n + 1}{\left(\frac{3}{4}\right)^n \cdot 3 + 4} = \frac{1}{4}, \text{ 收敛区间 } \left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$$

$$\text{由于 } \left| \frac{3^n + 4^n}{n^2 + 1} \left(\pm \frac{1}{4}\right)^n \right| = \left(\left(\frac{3}{4}\right)^n + 1\right) \frac{1}{n^2 + 1} < \frac{2}{n^2} \text{ 且 } \sum \frac{1}{n^2} \text{ 收敛}$$

$$\text{所以当 } x = \pm \frac{1}{4} \text{ 时, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 4^n}{n^2 + 1} \left(\pm \frac{1}{4}\right)^n \text{ 绝对收敛, 所以收敛域为 } \left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right]$$

$$2. \text{ 将 } \frac{x}{9+x^2} \text{ 展成 } x \text{ 的幂级数 (展开: 参考 } \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, x \in (-1, 1) \text{)}$$

$$\text{解: } \frac{x}{9+x^2} = \frac{x}{9} \cdot \frac{1}{1+\frac{x^2}{9}} = \frac{x}{9} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x^2}{9}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{9^{n+1}}$$

$$\frac{x^2}{9} \in (-1, 1), \text{ 所以 } x \in (-3, 3)$$

$$\text{当 } x = -3 \text{ 时, } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(-3)^{2n+1}}{9^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{9^n (-3)}{9^n \cdot 9} = -\frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$$

$$n \rightarrow \infty \text{ 时, } -\frac{1}{3}(-1)^n \text{ 不} \rightarrow 0, \text{ 所以 } x = -3 \text{ 时发散}$$

同理 $x = 3$ 时, 亦发散

$$\text{所以 } \frac{x}{9+x^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{9^{n+1}}, \text{ 收敛域为 } x \in (-3, 3)$$

$$3. (1) \text{ 求 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9n^2 - 3n - 2} \text{ 的和 (数项级数求和)}$$

$$\text{解: 原式} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3n-2} - \frac{1}{3n+1} \right)$$

$$S_n = \frac{1}{(3 \times 1 - 2)(3 \times 1 + 1)} + \frac{1}{(3 \times 2 - 2)(3 \times 2 + 1)} + \cdots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{1 \times 4} + \frac{1}{4 \times 7} + \cdots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} \\
&= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{7} + \cdots + \frac{1}{3n-2} - \frac{1}{3n+1} \right) \\
&= \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{3n+1} \right) = \frac{n}{3n+1}
\end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3n+1} = \frac{1}{3}, \text{ 所以 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9n^2-3n-2} \text{ 的和是 } \frac{1}{3}$$

(2) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \cdot n^3}{n!}$ 的和 (幂级数求和)

解: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \cdot n^3}{n!}$, 转化为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{n!} x^n$ 幂级数, 设 $a_n = \frac{n^3}{n!}$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{n^3}{n!}}{\frac{(n+1)^3}{(n+1)!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{n}{n+1} \right)^3 \cdot (n+1) \right| = \infty$$

收敛域为 $(-\infty, +\infty)$

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{n!} x^n &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n-1)(n-2) + An(n-1) + Bn + C}{n!} x^n \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n-1)(n-2) + 3n(n-1) + n}{n!} x^n \\
&= \sum_{n=3}^{\infty} \frac{x^n}{(n-3)!} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{3x^n}{(n-2)!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n-1)!} \quad e^x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \\
&= x^3 \sum_{n=3}^{\infty} \frac{x^{n-3}}{(n-3)!} + 3x^2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-2}}{(n-2)!} + x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \\
&= x^3 e^x + 3x^2 e^x + x e^x, \quad x \in (-\infty, +\infty)
\end{aligned}$$

$$x = 2, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \cdot n^3}{n!} = 8e^2 + 12e^2 + 2e^2 = 22e^2$$