度普利尤单抗注射液说明书摘要-300mg

【药品名称】

通用名称： 度普利尤单抗注射液　　商品名称： 达必妥®/Dupixent®

英文名称： Dupilumab Injection　汉语拼音： Dupuliyou Dankang Zhusheye

【成份】本品活性成份为度普利尤单抗。度普利尤单抗系采用中国仓鼠卵巢细胞（CHO-K1）表达制备的靶向白细胞介素-4受体亚基α (IL-4R- α)的全人单克隆抗体(lgG4型)，能够抑制IL-4/IL-13信号传导。辅料：组氨酸、盐酸组氨酸、盐酸精氨酸、聚山梨酯80、醋酸钠、冰醋酸、蔗糖和注射用水。

【适应症】本品用于治疗外用药控制不佳或不建议使用外用药的 6 个月及以上儿童和成人中重度特应性皮炎。本品可与或不与外用皮质类固醇联合使用。

本品用于治疗适合系统治疗的中度至重度结节性痒疹的成人患者。

本品适用于 6 岁及以上儿童和成人哮喘患者的维持治疗，其中包括：1）经中-高剂量吸入性糖皮质激素（ICS）联合其他哮喘控制药物治疗后仍控制不佳的伴有 2 型炎症（以嗜酸性粒细胞增加和/或呼出气一氧化氮（FeNO）升高为特征）的哮喘患者；2）口服糖皮质激素依赖性的哮喘患者。

本品用于吸入性糖皮质激素（ICS）、长效β2 受体激动剂（LABA）和长效抗胆碱能药物（LAMA）三联治疗，或如果 ICS 不适用时 LABA/LAMA 二联治疗未控制的以血嗜酸性粒细胞升高为特征的慢性阻塞性肺疾病成人患者维持治疗。

本品适用于治疗大疱性类天疱疮成人患者。

【规格】300 mg（2.0 mL） /支（预充式注射器）

【用法用量】本品应由具有适应症诊断和治疗经验的医疗卫生专业人员处方。

剂量

特应性皮炎

成人

推荐成人患者使用本品的初始剂量为 600 mg（300 mg 注射两次），继以每两周一次给予 300 mg，皮下注射给药。

儿童 （6个月-17岁） 6个月至17岁儿童患者的推荐剂量详见下表。

6 个月至 5 岁儿童患者的给药剂量		6-17 岁儿童患者的给药剂量		
体重	初始剂量 [a]和后续给药*	体重	初始剂量	后续给药*
5kg至小于15 kg	200mg (一剂200mg注射液) Q4W	15kg至小于30 kg	600mg (两剂300mg注射液)	300 mg Q4W
15kg至小于30 kg	300 mg (一剂300mg注射液) Q4W	30kg至小于60 kg	400 mg (两剂200mg注射液)	200mg Q2W
		60 kg及以上	600mg (两剂300mg注射液)	300mg Q2W

[a]在6个月至5岁的特应性皮炎儿童患者中，不推荐使用初始负荷剂量。

*Q2W：每两周一次；Q4W：每四周一次

本品可与或不与外用皮质类固醇联合使用。可使用外用钙调神经磷酸酶抑制剂，但应仅限于问题部位，如面部、颈部、褶皱区域和生殖器部位。

本品治疗特应性皮炎16周后无效的患者应考虑停止治疗。一些在初始治疗中部分应答的患者可能会在16周后的继续治疗中获得病情改善。若本品治疗必须中止，患者仍能成功接受重新治疗。

结节性痒疹

推荐成人患者使用本品的初始剂量为 600 mg（300 mg 注射两次），继以每两周一次（Q2W）给予 300 mg。

本品可与或不与外用皮质类固醇联合使用。

结节性痒疹临床试验数据适用于接受长达 24 周治疗的患者。本品治疗结节性痒疹 24 周后无效的患者应考虑停止治疗。

哮喘

成人和青少年（12 岁及以上）12 岁及以上成人和青少年患者的推荐剂量详见下表。

初始剂量	后续给药*
400 mg（两剂 200 mg 注射液）	200 mg Q2W
口服糖皮质激素依赖性哮喘患者或合并中重度特应性皮炎患者的剂量	
600 mg（两剂 300 mg 注射液）	300 mg Q2W

* Q2W – 每两周一次

6-11 岁儿童哮喘患者的推荐剂量详见下表。

体重	初始剂量[a]和后续给药*
15kg至 < 30kg	300 mg Q4W
30kg及以上	200 mg Q2W

a.对于6至11岁儿童哮喘患者，不推荐使用初始负荷剂量。

* Q2W – 每两周一次； Q4W – 每四周一次；

对于合并中重度特应性皮炎的6至11岁儿童哮喘患者的推荐剂量参见特应性皮炎6个月至17岁儿童患者的推荐剂量，该推荐剂量包括了初始负荷剂量。

慢性阻塞性肺疾病

推荐成人患者使用本品 300 mg，每两周给药一次（Q2W）。

本品用于长期治疗。尚未研究用药超过 52 周的情况。经本品治疗 52 周后仍无效的 COPD 患者，应考虑对其停止治疗。

大疱性类天疱疮

推荐成人患者使用本品的初始剂量为 600 mg（300 mg 注射两次），继以每两周一次给予 300 mg，皮下注射给药。

给药方法

皮下使用。本品通过皮下注射至大腿或腹部，肚脐周围5厘米以内的区域除外。如果由他人进行注射，也可注射于上臂。每支预充式注射器仅供一次性使用。

对于400 mg初始剂量，应在不同的注射部位接连注射两次200 mg本品。

对于600 mg初始剂量，应在不同的注射部位接连注射两次300 mg本品。

建议每次注射时轮换注射部位。本品不应注射至脆弱、受损或有瘀伤、疤痕的皮肤上。

在医疗卫生专业人员认可的情况下，患者可以自行注射本品，或者由患者的看护人员进行给药。12岁及以上青少年使用度普利尤单抗时，建议由成人实施给药或在成人监督下用药。在12岁以下儿童中，应由看护人员给药。在使用前，应根据包装说明书中的使用说明，对患者和/或看护人员，提供适当的准备和使用本品的培训。

错过用药

每两周一次给药的患者错过一次给药时，在计划给药日后7天内补充给药，然后恢复原先的给药计划；如未能在计划给药日期后7天内完成补充给药，等待至下一个计划给药时点给药。

每四周一次给药的患者错过一次给药时，在计划给药日后7天内补充给药，然后恢复原先的给药计划；如未能在计划给药日期后7天内完成补充给药，补充注射后重新建立新的给药计划。

特殊人群

老年患者(≥65岁)：对于老年患者，不建议调整剂量。

肾功能不全：轻度或中度肾损害患者不需要调整剂量。本品在严重肾损害患者中的数据极其有限。

肝损伤：尚无本品在肝功能损害患者中的数据。

体重：不建议对特应性皮炎成人患者或结节性痒疹成人患者或 12 岁及以上成人和青少年哮喘患者根据体重调整剂量。

6个月至17岁特应性皮炎患者的推荐维持剂量为200 mg Q4W(5kg至小于15kg)，300 mg Q4W(15kg至小于30kg），200 mg Q2W(30kg至小于60kg）和300 mg Q2W (60kg及以上)。

6 至11 岁哮喘患者的推荐维持剂量为 300 mg Q4W（15 kg 至小于 30 kg）和200 mg Q2W（30 kg 及以上）。

【禁忌】对本品活性成份或者其他任何辅料有超敏反应者禁用。

【不良反应】在特应性皮炎、哮喘和其它适应症中，最常见的不良反应是注射部位反应（包括红斑、水肿、瘙痒、疼痛和肿胀）、结膜炎、过敏性结膜炎、关节痛、口腔疱疹和嗜酸性粒细胞增多。在其它适应症中报告的另外的不良反应为注射部位淤青。报告了血清病、血清病样反应、速发过敏反应和溃疡性角膜炎罕见病例。

【生产企业】企业名称：Sanofi Winthrop Industrie；生产地址：1051 Boulevard Industriel， 76580 Le Trait, France

【境内联系人】名称：上海荣恒医药有限公司；地址：上海市静安区延安中路 1228 号 1906 室；联系方式： 800(400)-820-8884

(源自达必妥®说明书20260225版)

度普利尤单抗注射液说明书摘要-200mg

【药品名称】

通用名称： 度普利尤单抗注射液　　商品名称： 达必妥®/Dupixent®

英文名称： Dupilumab Injection　 汉语拼音： Dupuliyou Dankang Zhusheye

【成份】本品活性成份为度普利尤单抗。度普利尤单抗系采用中国仓鼠卵巢细胞（CHO-K1）表达制备的靶向白细胞介素-4受体亚基α (IL-4R- α)的全人单克隆抗体(lgG4型)，能够抑制IL-4/IL-13信号传导。辅料：组氨酸、盐酸组氨酸、盐酸精氨酸、聚山梨酯80、醋酸钠、冰醋酸、蔗糖和注射用水。

【适应症】本品用于治疗外用药控制不佳或不建议使用外用药的 6 个月及以上儿童和成人中重度特应性皮炎。本品可与或不与外用皮质类固醇联合使用。

本品适用于 6岁及以上儿童和成人哮喘患者的维持治疗，其中包括：1）经中-高剂量吸入性糖皮质激素（ICS）联合其他哮喘控制药物治疗后仍控制不佳的伴有 2 型炎症（以嗜酸性粒细胞增加和/或呼出气一氧化氮（FeNO）升高为特征）的哮喘患者；2）口服糖皮质激素依赖性的哮喘患者。

【规格】200 mg (1.14 mL)/支（预充式注射器）

【用法用量】本品应由具有适应症诊断和治疗经验的医疗卫生专业人员处方。

<u>剂量</u>

特应性皮炎

成人

推荐成人患者使用本品的初始剂量为600mg (300mg注射两次)，继以每两周一次给予300mg，皮下注射给药。

儿童 （6个月-17岁） 6个月至17岁儿童患者的推荐剂量详见下表。

6 个月至 5 岁儿童患者的给药剂量		6-17 岁儿童患者的给药剂量		
体重	初始剂量 [a]和后续给药*	体重	初始剂量	后续给药*
5kg至小于15 kg	200mg (一剂200mg注射液) Q4W	15kg至小于30 kg	600mg (两剂300mg注射液)	300 mg Q4W
15kg至小于30 kg	300 mg (一剂300mg注射液) Q4W	30kg至小于60 kg	400 mg (两剂200mg注射液)	200mg Q2W
		60 kg及以上	600mg (两剂300mg注射液)	300mg Q2W

[a]在6个月至5岁的特应性皮炎儿童患者中，不推荐使用初始负荷剂量。

*Q2W：每两周一次；Q4W：每四周一次

本品可与或不与外用皮质类固醇联合使用。可使用外用钙调神经磷酸酶抑制剂，但应仅限于问题部位，如面部、颈部、褶皱区域和生殖器部位。

本品治疗特应性皮炎16周后无效的患者应考虑停止治疗。一些在初始治疗中部分应答的患者可能会在16周后的继续治疗中获得病情改善。若本品治疗必须中止，患者仍能成功接受重新治疗。

哮喘

成人和青少年（12 岁及以上）12 岁及以上成人和青少年患者的推荐剂量详见下表。

初始剂量	后续给药*
400 mg（两剂 200 mg 注射液）	200 mg Q2W
口服糖皮质激素依赖性哮喘患者或合并中重度特应性皮炎患者的剂量	
600 mg（两剂 300 mg 注射液）	300 mg Q2W

*Q2W – 每两周一次

6-11 岁儿童哮喘患者的推荐剂量详见下表。

体重	初始剂量[a]和后续给药*
15kg至 < 30kg	300 mg Q4W
30kg及以上	200 mg Q2W

a.对于6至11岁儿童哮喘患者，不推荐使用初始负荷剂量。

* Q2W – 每两周一次； Q4W – 每四周一次；

对于合并中重度特应性皮炎的6至11岁儿童哮喘患者的推荐剂量参见特应性皮炎6个月至17岁儿童患者的推荐剂量，该推荐剂量包括了初始负荷剂量。

<u>给药方法</u>

皮下使用。本品通过皮下注射至大腿或腹部，肚脐周围5厘米以内的区域除外。如果由他人进行注射，也可注射于上臂。每支预充式注射器仅供一次性使用。

对于400 mg初始剂量，应在不同的注射部位接连注射两次200 mg本品。

对于600 mg初始剂量，应在不同的注射部位接连注射两次300 mg本品。

建议每次注射时轮换注射部位。本品不应注射至脆弱、受损或有瘀伤、疤痕的皮肤上。

在医疗卫生专业人员认可的情况下，患者可以自行注射本品，或者由患者的看护人员进行给药。12岁及以上青少年使用度普利尤单抗时，建议由成人实施给药或在成人监督下用药。在12岁以下儿童中，应由看护人员给药。在使用前，应根据包装说明书中的使用说明，对患者和/或看护人员，提供适当的准备和使用本品的培训。

<u>错过用药</u>

每两周一次给药的患者错过一次给药时，在计划给药日后7天内补充给药，然后恢复原先的给药计划；如未能在计划给药日期后7天内完成补充给药，等待至下一个计划给药时点给药。

每四周一次给药的患者错过一次给药时，在计划给药日后7天内补充给药，然后恢复原先的给药计划；如未能在计划给药日期后7天内完成补充给药，补充注射后重新建立新的给药计划。

<u>特殊人群</u>

老年患者(≥65岁)：对于老年患者，不建议调整剂量。

肾功能不全：轻度或中度肾损害患者不需要调整剂量。本品在严重肾损害患者中的数据极其有限。

肝损伤：尚无本品在肝功能损害患者中的数据。

体重：

不建议对特应性皮炎成人患者或12岁及以上成人和青少年哮喘患者根据体重调整剂量。

6个月至17岁特应性皮炎患者的推荐维持剂量为200 mg Q4W(5kg至小于15kg)，300 mg Q4W(15kg至小于30kg），200 mg Q2W(30kg至小于60kg）和300 mg Q2W (60kg及以上)。

6 至11 岁哮喘患者的推荐维持剂量为 300 mg Q4W（15 kg 至小于 30 kg）和200 mg Q2W（30 kg 及以上）。

【禁忌】对本品活性成份或者其他任何辅料有超敏反应者禁用。

【不良反应】在特应性皮炎、哮喘和其它适应症中，最常见的不良反应是注射部位反应（包括红斑、水肿、瘙痒、疼痛和肿胀）、结膜炎、过敏性结膜炎、关节痛、口腔疱疹和嗜酸性粒细胞增多。在其它适应症中报告的另外的不良反应为注射部位淤青。报告了血清病、血清病样反应、速发过敏反应和溃疡性角膜炎罕见病例。

【生产企业】企业名称：Sanofi Winthrop Industrie；生产地址：1051 Boulevard Industriel， 76580 Le Trait, France

【境内联系人】名称：上海荣恒医药有限公司；地址：上海市静安区延安中路 1228 号 1906 室；联系方式： 800(400)-820-8884

(源自达必妥®说明书20260225版)