

입원 경과 요약

___씨는 ___일에 중양 간절제술과 간장소장결합술(Roux-en-Y 통로) 및 췌장절제술을 받기 위해 병원에 입원하셨습니다. 수술 후 회복이 잘 되어 PACU로 이송되어 안정된 상태로 전환되었습니다. 수술 후 메스꺼움과 구토가 발생했으나, 정맥 주사로 수액과 메토클로프라미드를 투여하여 증상을 완화시켰고, 안정된 상태로 병상으로 이송되었습니다. 통증은 경구 옥시코돈과 정맥 주사 PCA로 조절되었습니다. 수술 후 명확한 액체 식사로 시작하여 허용되는 범위 내에서 일반 식사로 전환되었습니다. 소변량은 정상이었습니다. 수술 후 4일째에 안정된 상태로 퇴원하셨습니다.

퇴원 지침

매일 샤워하되, 상처 부위는 부드러운 비누로 부드럽게 씻어 주세요. 목욕이나 수영은 금지합니다. 매일 상처 부위를 확인하여 붓기나 분비물이 있는지 확인하세요.

상처 부위에 로션, 크림, 가루, 연고 등을 사용하지 마세요.

매일 아침, 자신을 측정 한 후, 제공된 일기장에 체중을 기록해 주세요.

어떤 걱정스러운 증상이 있으면 즉시 병원에 전화하거나 응급실에 방문하세요.

마약류 진통제를 복용하는 동안 운전은 금지합니다.

지칠 수 있으며, 이는 다음 몇 주 동안 점차 호전될 것입니다.

수술 후 10파운드(약 4.5kg)보다 무거운 물건을 들어 올리거나 밀거나 끌지 마세요. 의사 ___ 선생님을 만나기 전까지는 그러지 마세요.

브라를 착용한 상태로 충돌 스포츠나 축구를 하지 마세요. 의사 ___ 선생님을 만나기 전까지는 그러지 마세요.

수술 후 2주간 아스피린 또는 아스피린이 포함된 제품을 복용하지 마세요. 수술 전부터 복용하던

경우라면 의사가 복용을 계속할 수 있다고 허가해 주면 복용할 수 있습니다.

2주간 항염증제(예: 모트린, 아디비, 아스피린 등)를 복용하지 마세요. 의사의 허락이 없으면 복용하지 마세요.

어떤 질문이나 걱정이 있으시면 언제든지 문의해 주세요.