

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

MATHEMATISCHES INSTITUT



Dr. Peter Philip Lukas Emmert, Tobias König Wintersemester 2018/2019 4. Februar 2019

## Analysis für Informatiker und Statistiker

## Abschlussklausur

Nachname:	Vorname:
Matrikelnr.:	Fachsemester:
Abschluss:	Bachelor   Master
	Version der Prüfungsordnung (Jahreszahl):
	□ Diplom □ Anderes:
Hauptfach:	□ Statistik □ Informatik □ Medieninf. □ Bioinf. □ Phys. □
Nebenfach:	$\Box$ Mathematik $\Box$ Wirtschaftsm. $\Box$ Inf. $\Box$ Phys. $\Box$ Stat. $\Box$
Anrechnung	der Credit Points für das 🚨 Hauptfach 🚨 Nebenfach (Bachelor / Master)
Bitte schalten	Sie Ihr Mobiltelefon aus und legen es nicht auf den Tisch; legen Sie bitte Ihren
Personalauswe	is oder Reisepass sichtbar auf den Tisch. Bitte überprüfen Sie, ob Sie 5 Aufga-
ben erhalten h	naben. Schreiben Sie bitte nicht in den Farben rot oder grün. Schreiben Sie auf
jedes Blatt Il	nren <b>Nachnamen und Vornamen</b> . Lösen Sie bitte jede Aufgabe auf dem dafür
vorgesehenen I	Blatt. Falls der Platz nicht ausreicht, verwenden Sie bitte die leeren Seiten am
	nerken dies auf dem Angabenblatt der entsprechenden Aufgabe. Bitte achten Sie
	ie zu jeder Aufgabe nur eine Lösung abgeben; streichen Sie deutlich durch, was
nicht gewertet	
Sie haben 90 I	Minuten Zeit, um die Klausur zu bearbeiten.

Erlaubte Hilfsmittel: Schreibstifte und Radierer, sonst keine.

Lösungen: Rechnungen und Beweise sollten mit allen Zwischenschritten klar aufgeschrieben werden. Resultate ohne hinreichende, folgerichtige Begründungen werden nicht akzeptiert (wenn in der Aufgabenstellung nicht anders angegeben). Falls sich Ergebnisse in Form von Brüchen, Wurzeln oder Ähnlichem ergeben, so lassen Sie sie in dieser Form, und versuchen Sie nicht, sie als gerundete Dezimalzahlen zu schreiben.

## Viel Erfolg!

Aufgabe	B1	B2	ВЗ	B4	В5	Σ
max. Punkte	20	20	20	20	20	100

Name:		

Aufgabe B 1. [20 Punkte]

(a) (10 Punkte) Formulieren Sie die Quotientenregel für Ableitungen (natürlich inklusive ihrer Voraussetzungen).

(b) (10 Punkte) Es sei  $M \subseteq \mathbb{R}$ ,  $a \in M$ ,  $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ . Formulieren Sie die Definition (mit  $\epsilon$  und  $\delta$ ) der Aussage "f ist stetig in a".

Name:	

Aufgabe B 2. [20 Punkte]

(a) (5 Punkte) Es sei  $c \in \mathbb{R}$ . Geben Sie (ohne Beweis) die (aus der Vorlesung bekannte) Ableitung der Funktion

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := e^{cx},$$

an.

(b) (15 Punkte) Es sei  $k \in \mathbb{N}$ . Betrachten Sie die Funktion

$$g: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) := e^{-kx}.$$

Zeigen Sie mit einem Induktionsbeweis, dass

$$\forall_{n \in \mathbb{N}} g^{(n)} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad g^{(n)}(x) = (-1)^n k^n e^{-kx}, \tag{1}$$

wobei  $g^{(n)}$  die Ableitung n. Ordnung von g bezeichnet, und Sie (a) benutzen dürfen.

Name:		

Aufgabe B 3. [20 Punkte]

Vereinfachen Sie die folgenden Ausdrücke soweit wie möglich (bei dieser Aufgabe genügt es, das Ergebnis ohne Begründung anzugeben; bei jeder Teilaufgabe gibt es für das korrekte Ergebnis 2 Punkte, sonst 0 Punkte):

- (a) (2 Punkte) Vereinfachen Sie in  $\mathbb{C}$ :  $(i+1)^2$
- (b) (2 Punkte) Vereinfachen Sie in  $\mathbb{C}$ : |3+4i|
- (c) (2 Punkte)  $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} ]-n,n[$
- (d) (2 Punkte)  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} ]-n,n[$
- (e) (2 Punkte)  $e^{\ln 17}$
- (f) (2 Punkte)  $\prod_{k=1}^{3} k^{-1}$
- (g) (2 Punkte)  $\sum_{k=0}^{\infty} (\frac{1}{2})^k$
- **(h)** (2 Punkte)  $\lim_{k\to\infty} \frac{1}{k} \sin k$
- (i) (2 Punkte) Schreiben Sie die Menge  $f(\mathbb{N})$  für  $f: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{C}$ ,  $f(n) := e^{i\pi n}$ , ohne f.
- (j) (2 Punkte) Schreiben Sie die Menge  $f^{-1}(B_1(0))$  für  $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}, f(x) = x$ , ohne f.

Name:		

Aufgabe B 4. [20 Punkte]

(a) (10 Punkte) Vereinfachen Sie soweit wie möglich:

$$\lim_{n \to \infty} \frac{3n + 5n^3 - 6n^2}{10n^3 - 5 + 3n}$$

(b) (10 Punkte) Bestimmen Sie für die Folge  $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$  mit  $a_n:=\frac{1}{2n^2}$  ein  $N\in\mathbb{N}$  so, dass für alle n>N gilt  $|a_n-L|<\frac{1}{200}$ , wobei L den Grenzwert der Folge bezeichnet (aus Ihrem Argument muss sich insbesondere die Korrektheit Ihrer Lösung ergeben). Hinweis: Bestimmen Sie zunächst L.

Name:		

Aufgabe B 5. [20 Punkte]

(a) (5 Punkte) Geben Sie die Definition dafür an, dass eine Funktionenfolge  $(f_k)_{k\in\mathbb{N}}$ ,  $f_k: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ , für  $k \to \infty$  punktweise gegen  $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  konvergiert.

- (b) (5 Punkte) Geben Sie die Definition dafür an, dass eine Funktionenfolge  $(f_k)_{k\in\mathbb{N}}$ ,  $f_k: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ , für  $k \to \infty$  gleichmäßig gegen  $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  konvergiert.
- (c) (5 Punkte) Für  $k \in \mathbb{N}$  sei  $f_k : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ ,  $f_k(x) := (\sin x)/k$ . Beweisen oder widerlegen Sie, dass  $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$  für  $k \to \infty$  punktweise gegen  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ , f(x) := 0, konvergiert.
- (d) (5 Punkte) Beweisen oder widerlegen Sie, dass die Folge  $(f_k)_{k\in\mathbb{N}}$  aus (c) für  $k\to\infty$  gleichmäßig gegen  $f:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}, f(x):=0$ , konvergiert.

Name:			

Name:			