

# 概率统计1——概率

## 基本概念

- **随机试验**: 对一个不确定现象通过观察, 测量, 实验等手段获取其结果的过程
- **样本空间**: 所有随机试验结果的总和, 如掷色子的样本空间为 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ , 记作 $\Omega$ 。样本空间可以是无限集
- **随机事件**: 样本空间的子集
- **样本点**: 样本空间中的元素, 也就是一次随机试验的单个结果, 记作 $\omega$
- **互不相容事件**: 事件 $A, B$ 不同时发生, 即 $A \cap B = \phi$
- **对立事件**:  $A, B$ 互不相容且 $A \cup B = \Omega$ , 记作 $A = \bar{B}, B = \bar{A}$
- **完备事件组**:  $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互不相容, 且 $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$

$\Omega$ ——必然事件——样本空间——全集

$\phi$ ——不可能事件——空集

## 概率的公理化描述

概率测度 (Probability Measure) 是一个从事件映射到实数域的实函数, 其定义域为样本空间 $\Omega$ , 上域为实数域 $R$ , 值域为 $[0, 1]$ . 任何一个概率测度都必须满足以下公理:

### 基本公理

- **非负性公理**: 任何一个事件 $A$ 发生的概率不可能为负, 即 $0 \leq P(A)$
- **规范性公理**: 样本空间作为一个事件必然发生, 即 $P(\Omega) = 1$
- **完全可加性公理**: 若事件 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ 两两互不相容, 则
$$P(A_1 + A_2 + A_3 + \dots + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \dots + P(A_n), n \in N^+$$

### 基本公理的推论

1.  $P(A) = 1 - P(\bar{A})$

**证明**: 因为事件 $A$ 与 $\bar{A}$ 两两互不相容, 即 $A \cap \bar{A} = \phi, A \cup \bar{A} = \Omega$ , 故
$$P(\Omega) = P(A + \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}) = 1, \text{证毕}$$

2.  $P(A - B) = P(A) - P(AB)$ (事件的减法性原理)

**证明:**  $A = (A - B) \cup AB$ , 又因为显然  $A - B$  与  $AB$  互不相容, 则根据公理3, 有  $P(A) = P(A - B) + P(AB)$ , 证毕

3.  $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ (事件的加法性原理)

**证明:** 因为  $A \cup B = A \cup (B - AB)$ , 且  $A$  与  $(B - AB)$  互不相容, 则显然根据完全可加性公理, 有  $P(A + B) = P(A) + P(B - AB)$ . 根据事件的减法性原理, 有  $P(B - AB) = P(B) - P(B \cap AB) = P(B) - P(AB)$ . 因此, 有  $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ , 证毕.

**三个事件的加法公式:**

$$P(A + B + C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$$

**例题1:**  $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$ ,  $P(AB) = 0$ ,  $P(AC) = P(BC) = \frac{1}{16}$ , 求:

1.  $ABC$  中至少发生一个
2.  $ABC$  都不发生

## 条件概率

有的时候, 两个事件之间不是相互独立的, 往往某个事件的发生与否会对另一个事件的发生可能性产生影响, 这个时候, 我们就需要使用条件概率公式去描述这种现象了。

**定义1:** 设  $\Omega$  为样本空间,  $A, B$  为两个事件且  $P(B) > 0$ , 则称在  $B$  已经发生的条件下  $A$  发生的概率为  $A$  对  $B$  的条件概率, 记作  $P(A|B)$

条件概率的本质是将样本空间从所有事件都发生的  $\Omega$  缩小到原来仅仅  $B$  发生的事件的集合  $\Omega_B$  中去, 然后在这个新集合中计算  $A$  发生的概率。因此条件概率的计算公式就是:

$$P(A|B) = \frac{\Omega_{AB}/\Omega}{\Omega_B/\Omega} = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

**例题2:** 编号为1—6的球, 随机取一个观察其编号, 现设  $A_1$  表示取到1号,  $A_2$  取到2号,  $A_3$  取到大于4号的球;  $B$  表示取到偶数的球。求:

1. 在取到偶数的情况下取到2号球的概率
2. 在取到偶数的情况下  $A_3$  发生的概率

**条件概率的性质:**

- $P(A|B) \geq 0$
- $P(\Omega|B) = 1$
- 设  $A_1, A_2, \dots, A_n, n \in N^+$  互不相容, 则  $P(\sum_{i=1}^{\infty} A_i|B) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i|B)$

条件概率的乘法公式：

- $P(AB) = P(B)P(A|B) = P(A)P(B|A)$
- $P(ABC) = P(A)P(B|A)P(C|AB)$  (超过三个可依次类推)

**例题3:** 如果天气多云时有雨的概率是0.3, 且天气多云的概率是0.2, 那么天气多云且有雨的概率是?

**课后作业1:** 假设一共有100个产品, 其中10个不合格, 现在从中不放回抽取3个, 问第一次第二次抽到次品并且第三次抽到的才是正品的概率有多大?

## 全概率公式

**定义2:** 设  $A_1, A_2, A_3 \dots A_n$  是某个完备事件组, 且  $P(A_i) > 0$ ,  $B$  是某个同一样本空间中的其他事件, 则有

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$$

全概率公式的意义在于, 当需要求某个事件的发生概率时, 我们可以去求该事件在各种不同情况下发生的概率, 最终求其总和。

**例题4:** 假设现有10个零件, 其中7个是合格品, 3个是次品, 现已经取走2个零件, 则问当取第三个零件时, 是正品的概率有多大?

**例题5:** 盒子中有3个红球和1个蓝球, 无重复的抽取两个, 则第二个球是红色的概率是多少?

**课后作业2:** 假设现在有10个产品, 其中分别有0, 1, 2个次品的概率均为  $\frac{1}{3}$ , 并且由于质检存在误差, 将正品误检为次品的概率为0.02, 将次品误检为正品的概率为0.05。现在随机从10个产品中抽取1个送检, 则问: 该产品检验通过的概率有多少?

## 贝叶斯公式

贝叶斯公式是一种已知结果反求起因的数学模型, 也就是导致某个事件发生的起因有多种, 现在已

知该事件发生了，那么请问引发该事件发生的各个起因的概率分别是多少？

其实贝叶斯公式就是一种条件概率公式的变形，其具体定义如下所示：

**定义3:** 设  $A_1, A_2, A_3 \dots A_n$  某个完备事件组，且  $P(A_i) > 0$ ,  $B$  是同一样本空间中可由  $A_1, A_2, A_3 \dots A_n$  引发的某个已知事件, 则

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i B)}{P(B)} = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)}$$

**例题6:** 设某种疾病的发病概率为0.0004，其中由于医院的检测手段存在误差，其中真正的患者被诊断为有病的概率为0.99，健康的人被诊断为有病的概率为0.001。现某人经医院检查被确诊，则此人确实有病的概率有多大？

**课后作业3:** 设全国有0.4的人玩LOL, 玩LOL的群体中, 0.7是男性, 不玩LOL的群体中, 0.2是男性。已知Bob是男性，问：他是LOL玩家的概率是多大？

## 事件的独立性

事件的独立性的概念是指：已知一个事件发生不能为我们提供另一个事件是否发生的信息，或一个事件的发生不影响另一个事件的发生概率。即  $P(A) = P(A|B)$ 。进一步地，由于  $P(AB) = P(B)P(A|B)$ ，因此，当两个事件互相独立时，有

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

上式子便是两个事件独立的充分必要条件

独立事件的性质：

- $\phi$  和  $\Omega$  与任意事件  $A$  都独立
- $A$  与  $B$  独立，则  $A$  与  $\bar{B}$ ,  $\bar{A}$  与  $B$ ,  $\bar{A}$  与  $\bar{B}$  都互相独立

我们讨论事件多于两个时的独立性问题。我们首先给出事件**两两独立**(pairwise independent)和**互相独立**(mutually independent)的概念。

所谓两两独立，是指在同一样本空间  $\Omega$  中有某事件集  $A_1, A_2, \dots, A_n$ ，从其中任意选取两个  $A_i, A_j$   $i, j \in 1, 2, 3 \dots n$ ，都有  $P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j)$  成立。

所谓互相独立，是指在同一样本空间  $\Omega$  中有某事件集  $A_1, A_2, \dots, A_n$ ，其任意的子集  $A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{im}$   $i1, i2 \dots im \in 1, 2, 3 \dots n$  满足  $P(A_{i1} A_{i2} \dots A_{im}) = P(A_{i1})P(A_{i2}) \dots P(A_{im})$

很显然地，互相独立的定义已经包含了两两独立，若一个事件组是互相独立的，则其必然也是两两独立的。那么反过来的情况如何呢？下例将给出否定的答案：

抛掷两次骰子，令 $A$ 表示第一次得到正面， $B$ 表示第二次得到正面， $C$ 表示总共得到一次正面。则易知

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}, P(AB) = P(A)P(B) = \frac{1}{4}$$

$$P(AC) = P(A)P(C|A) = \frac{1}{4} = P(A)P(C), P(BC) = P(B)P(C|B) = \frac{1}{4} = P(B)P(C)$$

所以显然此时 $ABC$ 是两两独立的，但是显然 $P(ABC) = 0 \neq P(A)P(B)P(C) = \frac{1}{8}$

究其原因，我们可以发现 $P(ABC) = P(A)P(B|A)P(C|AB)$ ,当 $ABC$ 两两独立时有 $P(B) = P(B|A)$ ,但是却无法保证 $P(C) = P(C|AB)$ 。因此我们可以发现，互相独立的概率意义在于:给出一个事件组并从该事件组中任选一个子集，则该子集中的事件同时发生时，事件组中剩余的任一事件对其保持独立

**例题7:** 一个电路中，第一个元件与第二三个串联起来的元件形成一个并联电路，设 $A_i$ 表示第 $i$ 个元件保持正常工作，且 $P(A_i) = p, i = 1, 2, 3$ 。问该电路正常工作的概率是多少？

**课后作业4:** 设有一套密码，每个技术员能够将其破译的概率为0.6，并且每个技术员的破译工作都是相互独立的.则问：如果需要以0.99以上的可能性将其破译，那么至少需要几个技术员？