量子物理学特論 2018/10/24

g1840624 鷲津 優維

1 問い

$$\left\{ \begin{array}{l} |\phi_n\rangle = \cos\theta \, |-,n+1\rangle - \sin\theta \, |+,n\rangle \\ |\psi_n\rangle = \sin\theta \, |-,n+1\rangle + \cos\theta \, |+,n\rangle \end{array} \right.$$

のとき、以下の式が成り立つことを示す。

$$\sum n(|\phi_n\rangle \langle \phi_n| + |\psi_n\rangle \langle \psi_n|) + |-,0\rangle \langle -,0| = 1$$

2 解

シグマの和の中身を計算すると、

$$\begin{aligned} |\phi_n\rangle \left\langle \phi_n| + |\psi_n\rangle \left\langle \psi_n| &= (\cos\theta \mid -, n+1\rangle - \sin\theta \mid +, n\rangle)(\cos\theta \mid -, n+1| - \sin\theta \mid +, n|) \\ &+ (\sin\theta \mid -, n+1\rangle + \cos\theta \mid +, n\rangle)(\sin\theta \mid -, n+1| + \cos\theta \mid +, n|) \\ &= (\cos^2\theta + \sin^2\theta) \mid -, n+1\rangle \mid -, n+1| \\ &+ (\cos\theta \sin\theta - \cos\theta \sin\theta)(\mid -, n+1\rangle \mid +, n| \mid +, n\rangle \mid -, n+1|) \\ &+ (\cos^2\theta + \sin^2\theta) \mid +, n\rangle \mid +, n| \end{aligned}$$

これの和をとると、

$$\sum_{n}(\left|-,n+1\right\rangle \left\langle -,n+1\right|+\left|+,n\right\rangle \left\langle +,n\right|)=\sum_{n}\left|-,n+1\right\rangle \left\langle -,n+1\right|+\sum_{n}\left|+,n\right\rangle \left\langle +,n\right|$$

第 2 項は braket の中身が n=0 からの和になっているが、第 1 項では braket の中身が n=1 からの和になっている。揃えるために $|-,0\rangle\langle-,0|$ を加えると、

$$\sum_{n} (|\phi_{n}\rangle \langle \phi_{n}| + |\psi_{n}\rangle \langle \psi_{n}|) + |-,0\rangle \langle -,0|$$

ここで、

$$\sum_{n} \left| - \right\rangle \left\langle - \right| + \left| + \right\rangle \left\langle + \right| = 1$$

なので、

$$\sum_{n} (|\phi_{n}\rangle \langle \phi_{n}| + |\psi_{n}\rangle \langle \psi_{n}|) + |-,0\rangle \langle -,0| = 1$$

となる。