雨温図　勉強後のプリント

練習問題 ／ 都立入試実践対策問題

氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　実施日　　月　　日　　得点　　／100

目安50分（練習20分・実践25分・見直し5分）。動画を閉じて取り組む。
練習は問1〜11の55点，実践は3大問の45点。答えはこの冊子の解答欄に書く。
練習のグラフは学習用の模式データで，特定都市の観測値ではない。


〔問1〕　動画で覚えた，雨温図を見る四つの観点を，確認する順に書きなさい。　5点

① ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　② ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

③ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　④ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿


〔問2〕　次の地点は赤道より北と南のどちらにあると考えられるか。最も暖かい月と最も寒い月を根拠にして説明しなさい。　5点

資料1




〔問3〕　次の折れ線の形だけから，地点が赤道の北側か南側かを確定できるか。判断とその理由を書きなさい。　5点

資料2



練習問題　2／5

〔問4〕　A～Cはいずれも乾燥帯ではない。Aの気候帯名，B・Cの気候名を書きなさい。また，Aの気温の年較差を求め，Aを寒帯から区別する気温の基準を書きなさい。　5点





A ＿＿＿＿＿＿＿＿　B ＿＿＿＿＿＿＿＿　C ＿＿＿＿＿＿＿＿

Aの年較差（℃）＿＿＿＿＿＿＿＿

基準＿＿＿＿＿＿＿＿

〔問5〕　略地図中のMとNは，ともに赤道に近い地点である。Mの標高は約70m，Nの標高は約2,500mである。Nの気温がMより低い理由を，地形に着目して説明しなさい。　5点





● は地点の位置を示す。


＿＿＿＿＿＿＿＿


＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿

練習問題　3／5


〔問6〕　次のA・Bは，降水量を表したものである。それぞれの年降水量を求め，BがAの何倍か を書きなさい。　5点






A（mm）＿＿＿＿＿＿　B（mm）＿＿＿＿＿＿　BはAの（倍）＿＿＿＿＿＿


〔問7〕　次のA・Bは，ともに年降水量が50mmである。「雨が少ないので，どちらも暑い砂漠の地域だ」とする判断は妥当か。両方の気温の特徴に触れて説明しなさい。　5点





練習問題　4／5


〔問8〕　次の地点の年降水量と，12～3月の降水量の合計を求めなさい。また，雨の多い12～3月は，その地点のどの季節に当たるか。気温を根拠に説明しなさい。　5点



月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
mm	350	320	220	80	20	5	2	3	10	50	100	240


年降水量（mm）＿＿＿＿＿＿＿＿　12～3月の合計（mm）＿＿＿＿＿＿＿＿


〔問9〕　次の地点で降水量が多くなるのは，その地点のどの季節か。暑い時期の月と，雨の多い時期の月を挙げて説明しなさい。　5点



練習問題　5／5


〔問10〕　次の雨温図の特徴に最も合う地点を，略地図中のA～Dから一つ選びなさい。さらに，気温と降水量から，選んだ根拠をそれぞれ説明しなさい。　5点






地点

〔問11〕　次の雨温図の特徴に最も合う地点を，略地図中のE～Hから一つ選びなさい。最も気温の高い時期と，その時期の雨の降り方を根拠にして説明しなさい。　5点






地点

次のページから実践問題。各小問は独立している。前の小問で選んだ記号を使って，次の小問の選択肢を消去しないこと。

1　次の略地図を見て，あとの各問に答えよ。　　各問5点・計15点

都立入試実践対策問題（オリジナル）。全3大問。各問は独立した資料を用いている。




● は都市の位置を示す。A～Dは問1，P～Sは問2，W～Zは問3で用いる。

〔問1〕　Ⅰは，略地図中のA～Dのいずれかの都市について述べた文章である。Ⅱのア～エは，その四つの都市の雨温図である。Ⅰの都市に当てはまる地点と雨温図を，それぞれ一つ選べ。　5点

Ⅰ

この都市は，南アジアにある大きな半島の西岸に位置し，アラビア海に面している。内陸へ進むとデカン高原が広がる国の主要な港湾都市であり，綿工業や映画産業の発達でも知られる。

Ⅱ



（気象庁 ClimatView の月別平年値より作成）

地点（A～D）　　雨温図　（ア～エ）

〔問2〕・〔問3〕は次のページにある。どの問も，この略地図を用いて解答する。

〔問2〕 次の表のア～エは，前ページの略地図中のP～Sの都市の気候を示す。P～Sに当てはまるものを，ア～エからそれぞれ一つずつ選べ。ただし，同じ記号は二度使わない。 5点

	最寒月の平均気温（℃）	最暖月の平均気温（℃）	年降水量（mm）	12～2月の降水量の合計（mm）	6～8月の降水量の合計（mm）
ア	−36.9	19.8	234.0	26.8	107.3
イ	10.7	18.2	499.8	304.9	4.8
ウ	26.8	28.6	2,122.7	659.0	430.2
エ	5.7	19.0	633.4	165.9	154.6

（気象庁 ClimatView の月別平年値より作成）

P [ ] Q [ ] R [ ] S [ ]

〔問3〕 Ⅰの表のア～エは，前ページの略地図中のW～Zの都市の気候を示す。Ⅱの条件に当てはまるものを，Ⅰのア～エと，略地図中のW～Zからそれぞれ一つ選べ。 5点

Ⅰ

	1月の平均気温（℃）	7月の平均気温（℃）	12～2月の降水量の合計（mm）	6～8月の降水量の合計（mm）
ア	−21.4	19.1	7.8	190.9
イ	26.8	27.5	865.1	243.3
ウ	21.6	12.5	32.3	243.2
エ	10.1	28.9	154.4	21.8

（気象庁 ClimatView の月別平年値より作成）


Ⅱ

調査するのは，1月の平均気温が7月より高く，6～8月の降水量の合計が12～2月の合計の5倍以上になる都市である。表の数値と略地図を照合すると，この条件を満たす都市を一つに絞ることができる。

表（ア～エ） [ ] 地点（W～Z） [ ]

〔計算・考え方のメモ〕

2 次の略地図を見て，あとの各問に答えよ。　　各問5点・計15点




● は都市の位置を示す。A～Dは問1，P～Sは問2，W～Zは問3で用いる。

〔問1〕　Ⅰは，略地図中のA～Dのいずれかの都市について述べた文章である。Ⅱのア～エは，その四つの都市の雨温図である。Ⅰの都市に当てはまる地点と雨温図を，それぞれ一つ選べ。　5点

Ⅰ

この都市は，南アメリカ大陸の北西部にある，太平洋とカリブ海の両方に面した国の首都である。赤道よりやや北のアンデス山脈の高地に位置し，観測地点の標高は2,500mを超える。

Ⅱ



（気象庁 ClimatView の月別平年値より作成）

地点（A～D）　　雨温図　（ア～エ）

〔問2〕・〔問3〕は次のページにある。どの問も，この略地図を用いて解答する。

〔問2〕 次の表のア～エは，前ページの略地図中のP～Sの都市の気候を示す。P～Sに当てはまるものを，ア～エからそれぞれ一つずつ選べ。ただし，同じ記号は二度使わない。 5点

	最寒月の平均気温（℃）	最暖月の平均気温（℃）	年降水量（mm）	12～2月の降水量の合計（mm）	6～8月の降水量の合計（mm）
ア	26.8	28.6	2,122.7	659.0	430.2
イ	−6.2	19.7	713.0	148.6	239.5
ウ	5.7	19.0	633.4	165.9	154.6
エ	−21.4	19.1	277.7	7.8	190.9

（気象庁 ClimatView の月別平年値より作成）

P［　　］ Q［　　］ R［　　］ S［　　］

〔問3〕 Ⅰの表のア～エは，前ページの略地図中のW～Zの都市の気候を示す。Ⅱの条件に当てはまるものを，Ⅰのア～エと，略地図中のW～Zからそれぞれ一つ選べ。 5点

Ⅰ

	1月の平均気温（℃）	7月の平均気温（℃）	最寒月の平均気温（℃）	年降水量（mm）
ア	10.7	17.7	10.7	499.8
イ	24.9	27.7	24.9	2,250.7
ウ	23.5	13.1	13.1	973.0
エ	22.8	17.3	16.5	2.1

（気象庁 ClimatView の月別平年値より作成）


Ⅱ

調査するのは，1月の平均気温が7月より高く，最も寒い月の平均気温が10℃以上で，年降水量が10mm未満になる都市である。雨が少ないことだけを根拠に場所を決めず，気温の季節変化と略地図を合わせて確かめる。

表（ア～エ）［　　］ 地点（W～Z）［　　］

〔計算・考え方のメモ〕

3　次の略地図を見て，あとの各問に答えよ。　　各問5点・計15点




● は都市の位置を示す。A～Dは問1，P～Sは問2，W～Zは問3で用いる。

〔問1〕　Ⅰは，略地図中のA～Dのいずれかの都市について述べた文章である。Ⅱのア～エは，その四つの都市の雨温図である。Ⅰの都市に当てはまる地点と雨温図を，それぞれ一つ選べ。　5点

Ⅰ

この都市は，一つの大陸を主な国土とする国の南西部に位置し，インド洋に面している。同じ国の東岸にある大都市からは遠く離れ，周辺の地域では小麦の栽培や羊の飼育が行われている。

Ⅱ



（気象庁 ClimatView の月別平年値より作成）

地点（A～D）　　雨温図　（ア～エ）

〔問2〕・〔問3〕は次のページにある。どの問も，この略地図を用いて解答する。

〔問2〕 次の表のア～エは，前ページの略地図中のP～Sの都市の気候を示す。P～Sに当てはまるものを，ア～エからそれぞれ一つずつ選べ。ただし，同じ記号は二度使わない。 5点

	最寒月の平均気温（℃）	最暖月の平均気温（℃）	年降水量（mm）	12～2月の降水量の合計（mm）	6～8月の降水量の合計（mm）
ア	26.6	28.6	2,381.2	865.1	243.3
イ	17.7	21.9	812.6	241.2	67.1
ウ	−2.8	27.2	530.8	10.2	357.4
エ	10.7	18.2	499.8	304.9	4.8

（気象庁 ClimatView の月別平年値より作成）

P [ ] Q [ ] R [ ] S [ ]

〔問3〕 Ⅰの表のア～エは，前ページの略地図中のW～Zの都市の気候を示す。Ⅱの条件に当てはまるものを，Ⅰのア～エと，略地図中のW～Zからそれぞれ一つ選べ。 5点

Ⅰ

	最寒月の平均気温（℃）	最暖月の平均気温（℃）	年降水量（mm）	6～9月の降水量の合計（mm）
ア	−21.4	19.1	277.7	219.2
イ	−6.2	19.7	713.0	305.6
ウ	24.9	30.7	2,250.7	2,143.1
エ	26.8	28.6	2,122.7	563.6

（気象庁 ClimatView の月別平年値より作成）

Ⅱ

調査するのは，年降水量が2,000mm以上で，6～9月の降水量の合計が年降水量の90%以上を占める都市である。年降水量が多い都市の中から，降水が特定の時期に集中する都市を選ぶ。

表（ア～エ） [ ] 地点（W～Z） [ ]

〔計算・考え方のメモ〕

解答・解説　練習問題 1〜5

問題をすべて解いてから確認する。記述は，下記の要素を含む同じ意味の表現も正答とする。

〔問1〕 5点

北半球か南半球か → 気温の傾向 → 雨の多さ → 雨の季節

地図や説明文で場所の見当をつけた後，この順番で雨温図を調べる。名前だけでなく，順番まで思い出せたか確認する。

採点：四つの名称に各1点，四つがこの順番なら1点。

〔問2〕 5点

南半球。1月が最も暖かく，7月が最も寒いから。

日本と気温の高低の時期が逆なので，赤道の南側を考える。グラフの縦軸は各月の平均気温であり，ある一日の最高気温ではない。

採点：南半球2点，1月が最暖月2点，7月が最寒月1点。

〔問3〕 5点

確定できない。気温の変化が小さく，暑い季節と寒い季節の違いがはっきりしないから。

年中高温で年較差が小さいグラフでは，わずかな山や谷だけで半球を決めない。実際の位置は地図の緯度で確認する。

採点：確定できない2点，年較差が小さく季節差が不明瞭という理由3点。

〔問4〕 5点

A：冷帯（亜寒帯）　B：ツンドラ気候　C：氷雪気候
Aの年較差：18−（−24）＝42℃
基準：最暖月の平均気温が10℃以上あること。

冬の低温だけで寒帯と判断しない。Bは最暖月が8℃で0℃以上10℃未満，Cは最暖月でも−9℃で0℃未満なので区別できる。Aは乾燥帯ではないという条件と，冬の厳しい低温を合わせて冷帯と判断する。

採点：三つの名称，42℃，最暖月10℃以上に各1点。

〔問5〕 5点

NはMより標高が高く，標高が高いほど気温が低くなるから。

同じように赤道に近い場所でも，高地は低地より涼しい。ここでは南米のアンデスの高地を想定している。低緯度という条件と標高の条件を両方読む。

採点：Nの標高が高い2点，標高の上昇が気温低下をもたらすという説明3点。

解答・解説　練習問題 6〜11

〔問6〕 5点

A：50×12＝600mm　B：200×12＝2,400mm
B÷A＝2,400÷600＝4倍

棒の見た目は同じ高さでも，縦軸の上端が100mmと400mmで異なる。目盛りを読んでから12か月分を合計する。

採点：二つの年降水量に各2点，4倍に1点。

〔問7〕 5点

妥当でない。Aは高温・少雨だが，Bは最暖月でも0℃未満で，南極の内陸などが考えられる。

Aはサハラ砂漠などの乾燥地域を考える。降水量には雪を水に換算した量も含まれ，極めて低温の地域にも降水量の少ない地点がある。

採点：判断1点，Aの高温・少雨1点，Bの年中低温2点，低温地域にも少雨がある1点。

〔問8〕 5点

年降水量：1,400mm　12〜3月：240＋350＋320＋220＝1,130mm
夏を中心とする時期。12〜3月は6〜8月より気温が高いから。

年中高温で，12〜3月ごろが雨季，6〜8月ごろが乾季になる南半球の例。オーストラリア北部のダーウィンなどを候補にできる。年間合計が多くても，毎月多雨とは限らない。

採点：二つの数値に各2点，気温を根拠に夏と説明できれば1点。

〔問9〕 5点

冬。暑い12〜2月ごろが夏で，多雨となる6〜8月ごろは冬に当たる。

南半球では日本と季節が逆になる。このように夏に乾燥し冬に雨が多い型から，パースやケープタウンなどを候補にできる。

採点：冬1点，暑い月の範囲2点，多雨の月の範囲2点。

〔問10〕 5点

A（ロンドン付近）。夏は18℃ほどで涼しく，冬も6℃ほどで穏やかで，一年中降水があるから。

海の影響などを受ける西ヨーロッパの典型例。Bはインド西岸，Cはシベリア，Dはアマゾン川流域であり，示された気温と降水の両方には合わない。

採点：A1点，夏が涼しい1点，冬が穏やか1点，通年降水2点。

〔問11〕 5点

G（シドニー付近）。1月ごろに高温なので南半球であり，夏にも雨が降るから。

Hのパース付近も南半球だが，夏は乾燥するため合わない。Eのアテネは北半球，Fのシンガポールは年中高温で年較差が小さい。

採点：G1点，高温月から南半球を判断2点，夏にも降水がある2点。

解答・解説　実践 1

各問5点。複数の解答を求める問は，すべて正しい場合に5点とする（都立型の採点）。

〔問1〕　地点 B ／ 雨温図 ア

半島の西岸・アラビア海・デカン高原という位置関係から，インド西岸のムンバイを選ぶ。

ムンバイは5月の平均気温が30.7℃と最も高い。暑い月が必ず7〜8月になるわけではないので，地図の緯度と組み合わせる。

年中24.9℃以上で，年降水量は2,250.7mm。6〜9月に2,143.1mmの降水が集中し，冬の雨はわずかである。夏の季節風の影響が大きい地域と結び付ける。

四つの雨温図の対応：ア＝ムンバイ　／　イ＝リマ　／　ウ＝北京　／　エ＝シドニー。

〔問2〕　P＝エ　Q＝ウ　R＝ア　S＝イ

対応	地点	判断の根拠
P＝エ	ロンドン	高緯度の西ヨーロッパでも冬は比較的穏やか。両期間に降水がある。
Q＝ウ	シンガポール	赤道近くで年中高温。気温の年較差が小さく，降水量も多い。
R＝ア	ヤクーツク	シベリアの内陸。冬の厳しい寒さと，極めて大きい年較差に注目。
S＝イ	サンフランシスコ	北米西岸。6〜8月は少雨で，12〜2月にはまとまった雨が降る。

〔問3〕　表 ウ ／ 地点 Y

表	1月＞7月	6〜8月÷12〜2月	5倍以上
ア	×	24.5倍	○
イ	×	0.3倍	×
ウ	○	7.5倍	○
エ	×	0.1倍	×

ウは243.2÷32.3≒7.5倍で条件を満たす。1月の方が高温なので南半球。地図のYにあるケープタウンを選ぶ。6〜8月の多雨は，この地点では冬の降水である。

北半球か南半球か → 気温の傾向 → 雨の多さ → 雨の季節。
この順番で判断し，地点の位置と説明文に矛盾がないか確かめる。

解答・解説　実践 2

各問5点。複数の解答を求める問は，すべて正しい場合に5点とする（都立型の採点）。

〔問1〕　地点 C ／ 雨温図 イ

南米北西部，太平洋とカリブ海に面するコロンビアの首都，アンデスの標高2,500m超という条件から，ボゴタを選ぶ。

年平均13.6℃で，最暖月と最寒月の差は1.0℃。低緯度にあるのに涼しいという組合せを，標高の高さと結び付ける。

年較差が小さいだけではマナウスと混同する。月平均気温の高さを比較すれば，年中高温のマナウスと区別できる。ナイロビも高地だが，説明文の大陸・国の位置と合わない。

四つの雨温図の対応：ア＝ナイロビ　／　イ＝ボゴタ　／　ウ＝北京　／　エ＝マナウス。

〔問2〕　P＝イ　Q＝エ　R＝ウ　S＝ア

対応	地点	判断の根拠
P＝イ	モスクワ	ユーラシア北西部の内陸。冬は氷点下になるが，夏は10℃を超える。
Q＝エ	ウランバートル	中央アジアに近い内陸。年較差が大きく，年間の降水量も少ない。
R＝ウ	ロンドン	高緯度の西ヨーロッパでも冬は比較的穏やか。両期間に降水がある。
S＝ア	シンガポール	赤道近くで年中高温。気温の年較差が小さく，降水量も多い。

〔問3〕　表 エ ／ 地点 X

表	1月＞7月	最寒月≧10℃	年降水量＜10mm
ア	×	○	×
イ	×	○	×
ウ	○	○	×
エ	○	○	○

エだけが三つの条件をすべて満たす。南半球にあり，年間を通して極端に雨が少ない南米太平洋岸のリマがXに当たる。少雨だけでは高温と決められない。

北半球か南半球か → 気温の傾向 → 雨の多さ → 雨の季節。
この順番で判断し，地点の位置と説明文に矛盾がないか確かめる。

解答・解説　実践 3

各問5点。複数の解答を求める問は，すべて正しい場合に5点とする（都立型の採点）。

〔問1〕　地点 B ／ 雨温図 エ

大陸を主な国土とするオーストラリアの南西部で，インド洋に面する都市はパースである。

1〜2月が高温，7月が低温なので南半球。夏の12〜2月は少雨で，冬の6〜8月に降水が多い。
地中海性気候の特徴を示す。

アテネも夏に乾燥するが北半球である。シドニーは南半球でも夏に降水があり，ロンドンは北半球で夏が比較的涼しい。

四つの雨温図の対応：ア＝シドニー　／　イ＝ロンドン　／　ウ＝アテネ　／　エ＝パース。

〔問2〕　P＝ウ　Q＝エ　R＝イ　S＝ア

対応	地点	判断の根拠
P＝ウ	北京	東アジア。冬は低温・少雨，夏には気温と降水量がともに高くなる。
Q＝エ	サンフランシスコ	北米西岸。6〜8月は少雨で，12〜2月にはまとまった雨が降る。
R＝イ	ナイロビ	赤道近くの東アフリカの高地。低地の熱帯地域ほどは高温にならない。
S＝ア	マナウス	南米のアマゾン川流域。年中高温で，どの月にも降水がある。

〔問3〕　表 ウ ／ 地点 X

表	年2,000mm以上	6〜9月÷年×100	90%以上
ア	×	78.9%	×
イ	×	42.9%	×
ウ	○	95.2%	○
エ	○	26.6%	×

ウは2,143.1÷2,250.7×100≒95.2%で，二つの条件を満たす。南アジアの西岸のXがムンバイである。エも年降水量は多いが，指定された4か月の割合が条件に合わない。

北半球か南半球か → 気温の傾向 → 雨の多さ → 雨の季節。
この順番で判断し，地点の位置と説明文に矛盾がないか確かめる。

採点表・復習の目安

設問	配点	採点する要素	得点
練習1	5	四つの名称 4点，四つを指定順に並べる 1点	／5
練習2	5	南側・南半球 2点，1月が最も暖かい 2点，7月が最も寒い 1点	／5
練習3	5	確定できない 2点，年較差が小さく高低の季節が不明瞭 3点	／5
練習4	5	Aの名称 1点，Bの名称 1点，Cの名称 1点，42℃ 1点，最暖月10℃以上 1点	／5
練習5	5	Nの方が高い標高にある 2点，標高の上昇と気温の低下を因果で説明 3点	／5
練習6	5	600mm 2点，2400mm 2点，4倍 1点	／5
練習7	5	妥当でない 1点，Aは高温・少雨 1点，Bは最暖月でも0℃未満／年中非常に低温 2点，低温の地域も少雨になりうる 1点	／5
練習8	5	1400mm 2点，1130mm 2点，気温を根拠に夏の時期と説明 1点	／5
練習9	5	冬 1点，12〜2月ごろが夏 2点，6〜8月ごろに多雨 2点	／5
練習10	5	A 1点，夏が涼しい 1点，冬が比較的温暖 1点，通年降水 2点	／5
練習11	5	G 1点，1月ごろが高温で南半球 2点，夏も雨が降り，夏季乾燥ではない 2点	／5
実践1-1	5	地点と雨温図の両方が正答 5点	／5
実践1-2	5	四つの対応が全て正答 5点	／5
実践1-3	5	表と地点の両方が正答 5点	／5
実践2-1	5	地点と雨温図の両方が正答 5点	／5
実践2-2	5	四つの対応が全て正答 5点	／5
実践2-3	5	表と地点の両方が正答 5点	／5
実践3-1	5	地点と雨温図の両方が正答 5点	／5
実践3-2	5	四つの対応が全て正答 5点	／5
実践3-3	5	表と地点の両方が正答 5点	／5

練習55点＋実践45点＝100点。練習の記述は同義表現を認める。実践は誤答を含む組合せに部分点を与えない。計算メモは採点しない。

復習する動画の位置：北半球か南半球か 00:51 ／ 気温の傾向 01:53 ／ 雨の多さ 04:15 ／ 雨の季節 05:58 ／ 総合練習 07:55

作成・資料について

本冊子はacademia作成のオリジナル教材であり，東京都教育委員会作成の入試問題ではない。
紙面・解答形式の参照：東京都教育委員会「令和8年度・社会」大問2及び正答表。本文・設問・選択肢は新規作成。

実践の数値：気象庁 ClimatView「Monthly Normal」。各都市の代表観測所の月別平年値を利用。年平均気温は月平均の単純平均，年降水量と期間合計は月別値の合計として小数第1位に丸めた。出典ページで確認できない観測期間を一律に補っていない。

アテネ（観測所番号 16716）
ボゴタ（観測所番号 80222）
リマ（観測所番号 84628）
マナウス（観測所番号 82331）
ムンバイ（観測所番号 43057）
パース（観測所番号 94610）
シンガポール（観測所番号 48698）
ウランバートル（観測所番号 44292）
北京（観測所番号 54511）
ケープタウン（観測所番号 68816）
ロンドン（観測所番号 3772）
モスクワ（観測所番号 27612）
ナイロビ（観測所番号 63740）
サンフランシスコ（観測所番号 72494）
シドニー（観測所番号 94767）
ヤクーツク（観測所番号 24959）

略地図：Natural Earth 1:110m 国界データ（パブリックドメイン）。点は観測地点を示す。
練習問題の数値は学習用の模式データ。出典保存資料を照合して作成。作成日：2026年10月11日。