

Задача 10: Кое-что о диагоналях правильного многоугольника

Астахов Александр, Шишко Тимофей, Накорнеева Юлия
Лицей БНТУ



Резюме:

Решены пункты: 0, 1, 2, 5а, 5б, частично решены пункты 3 и 4. Предложено обобщение. При исследовании данной задачи получены следующие основные результаты:

0. В правильном $2n + 1$ угольнике имеется $n - 1$ различных по длине диагоналей.

1. А) Для $A_1A_2...A_7$ — правильного семиугольника. Доказано, что:

$$\frac{A_1A_3}{A_1A_2} - \frac{A_1A_3}{A_1A_4} = 1$$

Б) Для $A_1A_2...A_{2k+1}$ — правильного $(2k + 1)$ -угольника. Доказано, что:

$$\frac{A_1A_3}{A_1A_2} - \frac{A_1A_k}{A_1A_{k+1}} = 1$$

В) Для $A_1A_2...A_{3k+1}$ — правильного $(3k + 1)$ -угольника. Доказано, что:

$$\frac{A_1A_2}{A_1A_{k+1}} + \frac{A_1A_k}{A_1A_{k+2}} = 1$$

2. Для $A_1A_2...A_9$ — правильного девятиугольника. Доказано, что:

А)

$$\frac{A_1A_4}{A_1A_2} - \frac{A_1A_2}{A_1A_3} = 2$$

Б)

$$\frac{A_1A_4}{A_1A_3} + \frac{A_1A_3}{A_1A_5} = 2$$

В)

$$\frac{A_1A_5}{A_1A_2} - \frac{A_1A_4}{A_1A_5} = 2$$

3. При $n > 2$ в правильном $(2n + 1)$ -угольнике со стороной a существуют три диагонали, с необязательно различными длинами d_1, d_2, d_3 такие, что

$$\frac{d_1}{a} - \frac{d_2}{d_3} \in \mathbb{N}$$

4. Для правильного $(2n + 1)$ -угольника, в котором l_1, l_2, l_3, l_4 — длины отрезков соединяющих какие-то вершины (не все одинаковые). Доказано, что:

$$\frac{l_1}{l_2} + \frac{l_3}{l_4} \in \mathbb{N}$$

5. А) Для $A_1A_2...A_7$ — правильного семиугольника. Доказано, что:

$$\frac{1}{A_1A_2} = \frac{1}{A_1A_3} + \frac{1}{A_1A_4}$$

Б) Для $A_1A_2...A_{15}$ — правильного пятнадцатиугольника. Доказано, что:

$$\frac{1}{A_1A_2} = \frac{1}{A_1A_3} + \frac{1}{A_1A_5} + \frac{1}{A_1A_8}$$

6. Предложены и изучены свои направления исследования в задаче.

Постановка задачи:

0. Пусть $A_1A_2\dots A_{2n+1}$ — правильный $(2n+1)$ -угольник ($n \geq 2$). Напомним, что диагональю многоугольника называется отрезок соединяющий две несоседние вершины. Сколько существует различных по длине диагоналей в правильном $(2n+1)$ -угольнике?

1. А) Пусть $A_1A_2\dots A_7$ — правильный семиугольник. Докажите, что

$$\frac{A_1A_3}{A_1A_2} - \frac{A_1A_5}{A_1A_4} = 1$$

Б) Пусть $A_1A_2\dots A_{2k+1}$ — правильный $(2k+1)$ -угольник. Докажите, что

$$\frac{A_1A_3}{A_1A_2} - \frac{A_1A_{k+1}}{A_1A_{k+2}} = 1$$

В) Пусть $A_1A_2\dots A_{3k+1}$ — правильный $(3k+1)$ -угольник. Докажите, что

$$\frac{A_1A_2}{A_1A_{k+1}} + \frac{A_1A_k}{A_1A_{k+2}} = 1$$

2. Пусть $A_1A_2\dots A_9$ — правильный девятиугольник. Докажите, что

А)

$$\frac{A_1A_4}{A_1A_2} - \frac{A_1A_6}{A_1A_3} = 2$$

Б)

$$\frac{A_1A_4}{A_1A_3} + \frac{A_1A_5}{A_1A_6} = 2$$

В)

$$\frac{A_1A_5}{A_1A_2} - \frac{A_1A_7}{A_1A_4} = 2$$

3. При каких n в правильном $(2n+1)$ -угольнике со стороной a существуют три диагонали с не обязательно различными длинами d_1, d_2, d_3 такие, что

$$\frac{d_1}{a} - \frac{d_2}{d_3} \in \mathbb{N}$$

Попробуйте описать множество троек диагоналей (d_1, d_2, d_3) , для которых выполняется это свойство.

4. При каких n в правильном $(2n+1)$ -угольнике, в котором l_1, l_2, l_3, l_4 — длины отрезков соединяющих какие-то вершины (не все одинаковые), что

$$\frac{l_1}{l_2} + \frac{l_3}{l_4} \in \mathbb{N}$$

Попробуйте описать множество четверок (l_1, l_2, l_3, l_4) таких отрезков, для которых выполняется это свойство

5. А) Пусть $A_1A_2\dots A_7$ — правильный семиугольник. Докажите, что

$$\frac{1}{A_1A_2} = \frac{1}{A_1A_3} + \frac{1}{A_1A_4}$$

Б) Пусть $A_1A_2\dots A_{15}$ — правильный пятнадцатигульник. Докажите, что

$$\frac{1}{A_1A_2} = \frac{1}{A_1A_3} + \frac{1}{A_1A_5} + \frac{1}{A_1A_8}$$

В) Найдите все n , при которых существует правильный n -угольник со стороной a , в котором найдутся различные диагонали $d_1\dots d_k$, $k \leq n$, такие, что будет выполняться

$$\frac{1}{a} = \frac{1}{d_1} + \dots + \frac{1}{d_k}$$

6. Предложите свои направления исследования в этой задаче и изучите их.

Решение:

Пункт 0: Пусть $A_1 A_2 \dots A_{2n+1}$ — правильный $(2n+1)$ -угольник ($n \geq 2$). Напомним, что диагональю многоугольника называется отрезок соединяющий две несоседние вершины. Сколько существует различных по длине диагоналей в правильном $(2n+1)$ -угольнике?

Рассмотрим одну точку, так как для правильного $(2n+1)$ -угольника все точки являются равносильными, в силу симметрии. Из одной точки выходит $(2n+1) - 3$ диагоналей и, опять же, в силу симметрии, количество различных по длине диагоналей в правильном $(2n+1)$ -угольнике равно:

$$\frac{2n+1-3}{2} = n-1$$

Пункт 1:

Многоугольник будем задавать на комплексной плоскости вписанным в единичную окружность. Вершинам правильного n -угольника будем ставить в соответствие корни уравнения $z^n - 1 = 0$. В таком случае вершине A_k ставится в соответствие комплексное число z^{k-1} . Так как $|z^t| = 1$, мы можем домножить любой модуль вектора вида $|z^{k_1} - z^{k_2}|$ на данное выражение.

Сумму или разность их модулей можно объединять в один модуль если они сонаправлены и коллинеарны.

1. Вектора являются сонаправленными тогда и только тогда, когда их аргументы равны.
2. Так как вектора вписаны в единичную окружность, значит для соблюдения условия коллинеарности, достаточно выполнения следующего соотношения: $z^{k_1+k_2} = z^{k_3+k_4}$ для любых векторов вида $z^{k_1} - z^{k_2}$, $z^{k_3} - z^{k_4}$.

Б) **Утверждение:** в правильном $(2k+1)$ -угольнике имеет место: $\frac{A_1 A_3}{A_1 A_2} - \frac{A_1 A_k}{A_1 A_{k+1}} = 1$

$$\frac{|z^2 - 1|}{|z - 1|} - \frac{|z^{k-1} - 1|}{|z^k - 1|} = 1,$$

$$|z^2 - 1| |z^k - 1| - |z^{k-1} - 1| |z - 1| = |z - 1| |z^k - 1|,$$

$$|z^2 - 1| |z^k - 1| = |z - 1| (|z^{k-1} - 1| + |z^k - 1|)$$

Воспользуемся тем, что $|z| = 1$ и $|z^{k+1}| = 1$:

$$|z^2 - 1| |z^k - 1| = |z - 1| (|z| |z^{k-1} - 1| + |z^{k+1}| |z^k - 1|)$$

$$|z^2 - 1| |z^k - 1| = |z - 1| (|z^k - z| + |z^{k+1} - 1|)$$

Так как вектора $z^k - z$ и $z^{k+1} - 1$ коллинеарны и сонаправлены, сумма их модулей равно модулю суммы:

$$|z^2 - 1| |z^k - 1| = |z - 1| (|z^k - z + z^{k+1} - 1|)$$

$$|z^2 - 1| |z^k - 1| = |z - 1| |z + 1| |z^k - 1|$$

Преобразовав выражение, получим:

$$|z^2 - 1| |z^k - 1| = |z^2 - 1| |z^k - 1|. \blacksquare$$

А) Является частным случаем пункта 1Б) при $k = 3$.

В) **Утверждение:** в правильном $(3k+1)$ -угольнике имеет место: $\frac{A_1 A_2}{A_1 A_{k+1}} + \frac{A_1 A_k}{A_1 A_{k+2}} = 1$

$$\frac{|z-1|}{|z^k-1|} + \frac{|z^{k-1}-1|}{|z^{k+1}-1|} = 1$$

$$|z-1| |z^{k+1}-1| + |z^{k-1}-1| |z^k-1| = |z^k-1| |z^{k+1}-1|,$$

$$|z-1| |z^{k+1}-1| = |z^k-1| (|z^{k+1}-1| - |z^k-z|)$$

Так как вектора $|z^{k+1}-1|$ и $|z^k-z|$ коллинеарны и сонаправлены, разность их модулей равно модулю разностей:

$$|z-1| |z^{k+1}-1| = |z^k-1| |z^{k+1}-1-z^k+z|$$

$$|z-1| |z^{k+1}-1| = |z^k-1| |z^k(z-1) + (z-1)|$$

$$|z-1| |z^{k+1}-1| = |z^k-1| |z^k+1| |z-1|$$

$$|z-1| |z^{k+1}-1| = |z^{2k}-1| |z-1|$$

Так как $z^{3k+1} = 1$, $|z^{2k}| = 1$ имеем:

$$|z-1| |z^{k+1}-1| |z^{2k}| = |z-1| |z^{2k}-1|.$$

$$|z-1| |z^{2k}-1| = |z-1| |z^{2k}-1|. \blacksquare$$

Пункт 2:

А) **Утверждение:** в правильном девятиугольнике имеет место: $\frac{A_1 A_4}{A_1 A_2} - \frac{A_1 A_2}{A_1 A_3} = 2$

$$\frac{|z^3-1|}{|z-1|} - \frac{|z-1|}{|z^2-1|} = 2,$$

$$|z^3-1| |z^2-1| - |z-1|^2 = |z-1| |z^2-1| + |z-1| |z^2-1|,$$

$$|z^3-1| |z^2-1| - |z-1| |z^2-1| = |z-1| |z^2-1| + |z-1|^2,$$

$$(|z^3-1| - |z-1|) |z^2-1| = |z-1| (|z-1| + |z^2-1|),$$

Воспользуемся тем, что $|z| = 1$, $|z^8| = 1$, $|z^3| = 1$:

$$(|z^3-1| - |z-1||z|) |z^2-1| = |z-1| (|z-1| + |z^2-1|),$$

$$(|z^3-1| - |z^2-z|) |z^2-1| = |z-1| (|z-1| + |z^2-1|),$$

$$(|z^3-1| - |z^2-z|) |z^2-1| = |z-1| (|z^8||z-1| + |z^3||z^2-1|),$$

Так как вектора z^3-1 и z^2-z коллинеарны и сонаправлены, сумма их модулей равно модулю суммы:

$$|z^3-1-z^2+z| |z^2-1| = |z-1| (|z^8-1| + |z^5-z^3|),$$

Так как вектора z^8-1 и z^5-z^3 коллинеарны и сонаправлены, сумма их модулей равно модулю суммы:

$$|z^3-1-z^2+z| |z^2-1| = |z-1| |z^8-1+z^5-z^3|,$$

$$|z-1| |z^2+1| |z^2-1| = |z-1| |z^3+1| |z^5-1|,$$

Преобразовав выражение, получим:

$$|z^4-1| = |z^3+1| |z^5-1|,$$

Воспользуемся тем, что $|z^5| = 1$:

$$|z^5||z^4-1| = |z^3+1| |z^5-1|,$$

Напомним, что, так как $z^n = 1$ для любого n -угольника имеем:

$$|z^5-1| = |z^3+1| |z^5-1|,$$

$$|z^3+1| = 1$$

Найдем модуль данного вектора с помощью тригонометрической формы записи комплексных чисел.

$$1 = |z^3 + 1| = \sqrt{(1 + \cos 3 \frac{2\pi}{9} + i \sin 3 \frac{2\pi}{9})(1 + \cos 3 \frac{2\pi}{9} - i \sin 3 \frac{2\pi}{9})} = 1. \blacksquare$$

Б) **Утверждение:** в правильном девятиугольнике имеет место: $\frac{A_1 A_4}{A_1 A_3} + \frac{A_1 A_3}{A_1 A_5} = 2$

$$\frac{|z^3 - 1|}{|z^2 - 1|} + \frac{|z^2 - 1|}{|z^4 - 1|} = 2,$$

$$|z^3 - 1| |z^4 - 1| + |z^2 - 1|^2 = |z^2 - 1| |z^4 - 1| + |z^2 - 1| |z^4 - 1|,$$

$$|z^3 - 1| |z^4 - 1| - |z^2 - 1| |z^4 - 1| = |z^2 - 1| |z^4 - 1| - |z^2 - 1|^2,$$

$$|z^4 - 1| (|z^3 - 1| - |z^2 - 1|) = |z^2 - 1| (|z^4 - 1| - |z^2 - 1|),$$

Домножив на $|z^6| = 1$ и $|z^2| = 1$ соответствующие выражения, получим:

$$|z^4 - 1| (|z^6| |z^3 - 1| - |z^2| |z^2 - 1|) = |z^2 - 1| (|z^4 - 1| - |z^2 - 1|),$$

Преобразовав выражение, так же как и в предыдущем пункте, получим:

$$|z^4 - 1| (|z^6 - 1| - |z^4 - z^2|) = |z^2 - 1| (|z^4 - 1| - |z^3 - z|),$$

Далее, используя коллинеарность и сонаправленность векторов, преобразуем, как в предыдущем пункте:

$$|z^4 - 1| |z^6 - 1 - z^4 + z^2| = |z^2 - 1| |z^4 - 1 - z^3 + z|,$$

$$|z^4 - 1| |z^4 + 1| |z^2 - 1| = |z^2 - 1| |z^3 + 1| |z - 1|,$$

Так как рассматривается девятиугольник, то $z^9 = 1$. Домножив на $|z| = 1$ соответствующие выражения, получим:

$$|z| |z^8 - 1| = |z - 1| = |z - 1| |z^3 + 1|,$$

$$1 = |z^3 + 1|.$$

Найдем модуль данного вектора с помощью тригонометрической формы записи комплексных чисел.

$$1 = |z^3 + 1| = \sqrt{(1 + \cos 3 \frac{2\pi}{9} + i \sin 3 \frac{2\pi}{9})(1 + \cos 3 \frac{2\pi}{9} - i \sin 3 \frac{2\pi}{9})} = 1. \blacksquare$$

В) **Утверждение:** в правильном девятиугольнике имеет место: $\frac{A_1 A_5}{A_1 A_2} - \frac{A_1 A_4}{A_1 A_5} = 2$

$$\frac{|z^4 - 1|}{|z - 1|} - \frac{|z^3 - 1|}{|z^4 - 1|} = 2,$$

Приведем к общему знаменателю.

$$|z^4 - 1|^2 - |z^3 - 1| |z - 1| = |z - 1| |z^4 - 1| + |z - 1| |z^4 - 1|,$$

$$|z^4 - 1|^2 - |z - 1| |z^4 - 1| = |z^3 - 1| |z - 1| + |z - 1| |z^4 - 1|,$$

$$|z^4 - 1| (|z^4 - 1| - |z - 1|) = |z - 1| (|z^3 - 1| + |z^4 - 1|),$$

Домножив на $|z^5| = 1$, $|z^2| = 1$ и $|z| = 1$, $|z^5| = 1$ соответствующие выражения, получим:

$$|z^4 - 1| (|z^5| |z^4 - 1| - |z^2| |z - 1|) = |z - 1| (|z| |z^3 - 1| + |z^5| |z^4 - 1|),$$

$$|z^4 - 1| (|z^5 - 1| - |z^3 - z^2|) = |z - 1| (|z^4 - z| + |z^5 - 1|),$$

Далее, используя коллинеарность и сонаправленность векторов, преобразуем, как в предыдущих пунктах:

$$|z^4 - 1| |z^5 - 1 - z^3 + z^2| = |z - 1| |z^4 - z + z^5 - 1|,$$

$$|z^4 - 1| |z^2 - 1| |z^3 + 1| = |z - 1| |z^4 - 1| |z + 1|,$$

$$|z^3 + 1| = 1.$$

Найдем модуль данного вектора с помощью тригонометрической формы записи комплексных чисел.

$$1 = |z^3 + 1| = \sqrt{(1 + \cos 3 \frac{2\pi}{9} + i \sin 3 \frac{2\pi}{9})(1 + \cos 3 \frac{2\pi}{9} - i \sin 3 \frac{2\pi}{9})} = 1. \blacksquare$$

Пункт 3: При каких n в правильном $(2n + 1)$ -угольнике со стороной a существуют три диагонали с необязательно различными длинами d_1, d_2, d_3 такие, что

$$\frac{d_1}{a} - \frac{d_2}{d_3} \in \mathbb{N}$$

Попробуйте описать множество троек диагоналей (d_1, d_2, d_3) , для которых выполняется это свойство.

При $n > 2$ в каждом правильном $(2n + 1)$ -угольнике, есть такое соотношение:

$$\frac{A_1 A_3}{A_1 A_2} - \frac{A_1 A_n}{A_1 A_{n+1}} = 1$$

Данное соотношение доказано в пункте 1.Б исходной постановки задачи.

Значит при $n > 2$ в каждом правильном $(2n + 1)$ -угольнике существуют три диагонали с необязательно различными длинами d_1, d_2, d_3 такие, что $\frac{d_1}{a} - \frac{d_2}{d_3} \in \mathbb{N}$

При $n = 2$ многоугольник является правильным пятиугольником. Так как в пятиугольнике все диагонали имеют одинаковую длину, наше выражение примет вид: $\frac{d}{a} - 1$.


$\triangle AMB \sim \triangle ABC$, треугольники подобны по двум углам ($\angle CAB$ – общий, $\angle ABE = \angle ACB$), тогда:

$$\frac{AB}{AC} = \frac{AM}{AB} \Rightarrow \frac{a}{d} = \frac{d - a}{a} \Rightarrow d = \frac{a(\sqrt{5} - 1)}{2}$$

Тогда выражение примет вид:

$$\frac{d}{a} - 1 = \frac{\frac{a(\sqrt{5}-1)}{2}}{a} - 1 = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} - 1 \notin \mathbb{N}$$

Что не является натуральным числом. То есть в правильном пятиугольнике не существуют три диагонали, с необязательно различными длинами d_1, d_2, d_3 , такие что $\frac{d_1}{a} - \frac{d_2}{d_3} \in \mathbb{N}$.



Пункт 4: При каких n в правильном $(2n + 1)$ -угольнике, в котором l_1, l_2, l_3, l_4 — длины отрезков соединяющих какие-то вершины (не все одинаковые), что

$$\frac{l_1}{l_2} + \frac{l_3}{l_4} \in \mathbb{N}$$

Попробуйте описать множество четверок (l_1, l_2, l_3, l_4) таких отрезков, для которых выполняется это свойство.

Пусть $l_1 = l_2$ и $l_3 = l_4$, тогда наше выражение будет равно двум. Таким образом в каждой $2n + 1$ угольнике есть такое соотношение.

Пункт 5:

А) **Утверждение:** В правильном семиугольнике имеет место: $\frac{1}{A_1 A_2} = \frac{1}{A_1 A_3} + \frac{1}{A_1 A_4}$

$$\frac{1}{|z - 1|} = \frac{1}{|z^2 - 1|} + \frac{1}{|z^3 - 1|},$$

Приведем к общему знаменателю.

$$\frac{1}{|z - 1|} = \frac{|z^2 - 1| + |z^3 - 1|}{|z^2 - 1| |z^3 - 1|},$$

$$|z - 1| (|z^2 - 1| + |z^3 - 1|) = |z^2 - 1| |z^3 - 1|,$$

Домножив на $|z^5| = 1$, $|z| = 1$ соответствующие выражения, получим:

$$|z - 1| (|z^5| |z^2 - 1| + |z| |z^3 - 1|) = |z^2 - 1| |z^3 - 1|,$$

$$|z - 1| (|z^7 - z^5| + |z^4 - z|) = |z^2 - 1| |z^3 - 1|,$$

Напомним, что, так как $z^n = 1$ для любого n -угольника, имеем:

$$|z - 1| (|z^5 - 1| + |z^4 - z|) = |z^2 - 1| |z^3 - 1|,$$

Так как вектора $z^5 - 1$ и $z^4 - z$ коллинеарны и сонаправлены, сумма их модулей равно модулю суммы:

$$|z - 1| (|z^5 - 1| + |z^4 - z|) = |z^2 - 1| |z^3 - 1|,$$

$$|z - 1| |z^4 - 1| |z + 1| = |z^2 - 1| |z^3 - 1|,$$

$$|z^4 - 1| = |z^4| |z^3 - 1| = |z^4 - 1|. \blacksquare$$

Б) **Утверждение:**

В правильном пятиугольнике имеет место: $\frac{1}{A_1 A_2} = \frac{1}{A_1 A_3} + \frac{1}{A_1 A_5} + \frac{1}{A_1 A_8}$

$$\frac{1}{|z - 1|} = \frac{1}{|z^2 - 1|} + \frac{1}{|z^4 - 1|} + \frac{1}{|z^7 - 1|},$$

$$\frac{1}{|z - 1|} - \frac{1}{|z^7 - 1|} = \frac{1}{|z^2 - 1|} + \frac{1}{|z^4 - 1|},$$

Приведем к общему знаменателю.

$$\frac{|z^7 - 1| - |z - 1|}{|z - 1| |z^7 - 1|} = \frac{|z^4 - 1| + |z^2 - 1|}{|z^2 - 1| |z^4 - 1|},$$

Домножив на $|z^3| = 1$ и $|z| = 1$ соответствующие выражения, получим:

$$\frac{|z^7 - 1| - |z^3| |z - 1|}{|z - 1| |z^7 - 1|} = \frac{|z^4 - 1| + |z| |z^2 - 1|}{|z^2 - 1| |z^4 - 1|},$$

$$\frac{|z^7 - 1| - |z^4 - z^3|}{|z - 1| |z^7 - 1|} = \frac{|z^4 - 1| + |z^3 - z|}{|z^2 - 1| |z^4 - 1|},$$

Далее, используя коллинеарность и сонаправленность векторов, преобразуем, как в предыдущих пунктах:

$$\begin{aligned}\frac{|z^7 - 1 - z^4 + z^3|}{|z - 1| |z^7 - 1|} &= \frac{|z^4 - 1 + z^3 - z|}{|z^2 - 1| |z^4 - 1|}, \\ \frac{|z^4 + 1| |z^3 - 1|}{|z - 1| |z^7 - 1|} &= \frac{|z^3 - 1| |z + 1|}{|z^2 - 1| |z^4 - 1|}, \\ \frac{|z^4 + 1|}{|z^7 - 1|} &= \frac{1}{|z^4 - 1|},\end{aligned}$$

Преобразовав выражение, так же как и в предыдущем пункте, получим

$$\begin{aligned}|z^8 - 1| &= |z^7 - 1| \\ |z^8| |z^7 - 1| &= |z^8 - 1| \\ |z^8 - 1| &= |z^8 - 1|. \blacksquare\end{aligned}$$

Обобщение:

Рассмотрим n -мерный гиперкуб со стороной $a = 1$:

Координаты его вершин это кортежи длины n , состоящие из нулей и единиц. Понятно, что длины его диагоналей, не являющиеся диагоналями квадрата, принадлежат множеству: $\{\sqrt{k}\}$, $k \in \{3, 4, \dots, n\}$.

Найдем с какой размерности в гиперкубе существует соотношение:

$$1 = \frac{1}{a} = \sum_{i=1}^m \frac{1}{d_i},$$

где d_i — длина различных диагоналей гиперкуба.

В силу того, что $a = 1$ и утверждения о том, что сумма иррациональных значений радикалов натуральных чисел не может быть рациональным числом, что доказано в статье "Иррациональность суммы радикалов" журнала "квант" 1972 года. Получаем то, что если $\sum_{i=1}^m \frac{1}{d_i}$ — рациональна, то и каждое слагаемое — рационально. Значит, наименьшая размерность гиперкуба в которой выполняется это условие является 36. Так как: $1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$. При меньших длинах диагоналей это невозможно.

Получение новых соотношений:

Приведем бесконечную серию подобных сумм обратных длин диагоналей:

$$\text{Докажем, что } 1 = \frac{1}{2} + \sum_{i=1}^m \frac{1}{3^i} + \frac{1}{2 \cdot 3^m}.$$

Доказательство:

Так как данная сума представляет собой сумму геометрической прогрессии имеем:

$$\sum_{i=1}^m \frac{1}{3^i} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3^m}$$

Подставим данное выражение в исходное имеем:

$$\frac{1}{2} + \sum_{i=1}^m \frac{1}{3^i} + \frac{1}{2 \cdot 3^m} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3^m} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3^m} = 1. \blacksquare$$

Таким образом каждое m -соотношение из серии начинает выполняться начиная с размерности $(2 \cdot 3^m)^2$.

Литература:

1. Камнев Л. Н. Иррациональность суммы радикалов. Квант. – 1972. – N 2.– С. 26-27.
2. Я. П. Понарин "Алгебра комплексных чисел в геометрических задачах"