Epidemic dynamics and paired arrival-time shift by community size

$n=50$, random-connected, $d\approx 10.0$, $L=10$, $k=1$, $\beta=0.001$, $T_{arr,max}=20000$, $T_{traj}\leq 20000$, $N=100$
$n=100$, random-connected, $d\approx 10.0$, $L=10$, $k=1$, $\beta=0.001$, $T_{arr,max}=20000$, $T_{traj}\leq 20000$, $N=100$
$n=250$, random-connected, $d\approx 10.0$, $L=10$, $k=1$, $\beta=0.001$, $T_{arr,max}=20000$, $T_{traj}\leq 20000$, $N=100$
$n=1000$, random-connected, $d\approx 10.0$, $L=10$, $k=1$, $\beta=0.001$, $T_{arr,max}=20000$, $T_{traj}\leq 20000$, $N=100$
$n=50$, random-connected, $d\approx 10.0$, $L=10$, $k=5$, $\beta=0.001$, $T_{arr,max}=20000$, $T_{traj}\leq 20000$, $N=100$
$n=100$, random-connected, $d\approx 10.0$, $L=10$, $k=5$, $\beta=0.001$, $T_{arr,max}=20000$, $T_{traj}\leq 20000$, $N=100$
$n=250$, random-connected, $d\approx 10.0$, $L=10$, $k=5$, $\beta=0.001$, $T_{arr,max}=20000$, $T_{traj}\leq 20000$, $N=100$
$n=1000$, random-connected, $d\approx 10.0$, $L=10$, $k=5$, $\beta=0.001$, $T_{arr,max}=20000$, $T_{traj}\leq 20000$, $N=100$
$n=50$, random-connected, $d\approx 10.0$, $L=10$, $k=10$, $\beta=0.001$, $T_{arr,max}=20000$, $T_{traj}\leq 4000$, $N=100$
$n=100$, random-connected, $d\approx 10.0$, $L=10$, $k=10$, $\beta=0.001$, $T_{arr,max}=20000$, $T_{traj}\leq 4000$, $N=100$
$n=250$, random-connected, $d\approx 10.0$, $L=10$, $k=10$, $\beta=0.001$, $T_{arr,max}=20000$, $T_{traj}\leq 20000$, $N=100$
$n=1000$, random-connected, $d\approx 10.0$, $L=10$, $k=10$, $\beta=0.001$, $T_{arr,max}=20000$, $T_{traj}\leq 20000$, $N=100$
total infected $I(t)$
time
Full Micro
MicroMacro (independent RNG)
$T_i^{MM}-T_i^{Micro}$
community index
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000
17500
20000
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
0
2
4
6
8