Булев куб §1.1

$F = 10100100_2$

x_1	x_2	x_3	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0



§3

$I_1 \begin{cases} 000 \\ 010 \end{cases} = 0\,0 \Rightarrow \bar{x}_1 \bar{x}_3$

$I_2 = 101 \Rightarrow x_1 \bar{x}_2 x_3$

МДНФ: $\bar{x}_1 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3$

§1.2

$F = 0001111100011111_2$

x_1	x_2	x_3	x_4	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1



$I_1 \begin{cases} 0111 \\ 0011 \end{cases} = 0-11 \Rightarrow \bar{x}_1 x_3 x_4$

$I_2 \begin{cases} 1111 \\ 1011 \end{cases} = 1-11 \Rightarrow x_1 x_3 x_4$ } $x_3 x_4$

$a = \begin{cases} 0100 \\ 0110 \end{cases} = 01-0 \Rightarrow \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_4$

$b = \begin{cases} 0101 \\ 0111 \end{cases} = 01-1 \Rightarrow \bar{x}_1 x_2 x_4$ } $\bar{x}_1 x_2$

$c = \begin{cases} 1100 \\ 1110 \end{cases} = 11-0 \Rightarrow x_1 x_2 \bar{x}_4$

$d = \begin{cases} 1101 \\ 1111 \end{cases} = 11-1 \Rightarrow x_1 x_2 x_4$ } $x_1 x_2$

x_2

МДНФ: $x_2 \vee x_3 x_4$.

§2.1.

Карта Карно.

В Карта Карно нужно искать как максимально большие интервалы, но интервалов в карте должно быть как можно меньше.

$F = 10100100_2$

x_1 \ x_2x_3	00	01	11	10
0	(1)	0	0	(1)
1	0	(1)	0	0

МДНФ: $x_1\bar{x}_2x_3 \vee \bar{x}_1\bar{x}_3$.

№2.2. $F = 0001111100011111_2$

МДНФ: $x_2 \vee x_3x_4$.

x_1x_2 \ x_3x_4	00	01	11	10
00	0	0	(1)	0
01	(1	1	1	1)
11	1	1	1	1
10	0	0	(1)	0

№3.1

Метод Квайна Мак-Класки

$F = 10100100_2$

1)

0к	0	0	0
1к	0	1	0
2к	1	0	1

2) $0 - 0 - \Pi_1$

МДНФ: $\bar{x}_1\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3$

	000	010	101
Π_1 0-0-0	+	+	

Склеивать элементы пока возможно

№3.2.

$F = 0001111100011111_2$

Π_1	0	0	1	1	0к	0 1 0 0
Π_2	0	1	0	0		0 0 1 1
Π_3	0	1	0	1	1к	0 1 0 1
Π_4	0	1	1	0		0 1 1 0
Π_5	0	1	1	1		1 1 0 0
Π_6	1	0	1	1		0 1 1 1
Π_7	1	1	0	0		1 0 1 1
Π_8	1	1	0	1	2к	1 1 0 1
Π_9	1	1	1	0		1 1 1 0
Π_{10}	1	1	1	1	3к	1 1 1 1

0 1 0 -	0 1 0 -	- 1 0 -	- 1 0 -
0 1 - 0	1 1 0 -	1 1 - -	- 1 - -
0 - 1 1	1 1 1 -	0 1 - -	- - 1 1
- 0 1 1	0 1 - 0	- 1 - 0	
0 1 - 1	0 1 - 1	- 1 - 1	
- 1 0 1	1 1 - 0	- - 1 1	
- 1 1 0	1 1 - 1	- - 1 1	
1 1 0 -	0 - 1 1	- 1 - 1	
1 1 - 0	1 - 1 1		
- 1 1 1	- 0 1 1		
1 - 1 1	- 1 0 1		
1 1 - 1	- 1 1 0		
1 1 1 -	- 1 1 1		

МДНФ: $x_3x_4 \vee x_2$

Строим таблицу

	0011	0100	0101	0110	0111	1011	1100	1101	1110	1111
-10-		+	+				+	+		
-1--	(+)	+	+	+	+		+	+	+	+
x_3x_4 11	+					+				+

Диаграммы Вейча №4.1.

$F = 10100100_2$

x_1	x_2	x_3	F	
0	0	0	1	I
0	0	1	0	
0	1	0	1	II
0	1	1	0	
1	0	0	0	III
1	0	1	1	
1	1	0	0	IV
1	1	1	0	

	x_2	$\bar{x}_2$
x_1	0 0	(1) 0
$\bar{x}_1$	(1) 0	0 (1)
	$\bar{x}_3$ x_3	$\bar{x}_3$

МДНФ: $\bar{x}_1\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3$.

1) Разбиваем ф-ию на 4 блока
2) Подставляем каждый блок в наши карты (диаграммы), учитывая, что это тор.

№4.2.

$F = 0001111000011111_2$.

x_1	x_2	x_3	x_4	F	
0	0	0	0	0	I
0	0	0	1	0	
0	0	1	0	0	
0	0	1	1	1	
0	1	0	0	1	II
0	1	0	1	1	
0	1	1	0	1	
0	1	1	1	1	
1	0	0	0	0	III
1	0	0	1	0	
1	0	1	0	0	
1	0	1	1	1	
1	1	0	0	1	IV
1	1	0	1	1	
1	1	1	0	1	
1	1	1	1	1	



Тороидальная форма (как и у карт Карно)

МДНФ: $x_2 \vee x_3 x_4$

(Ищем наибольший единичный "интервал")

№5.1

Метод неопределённых коэффициентов.

$F = 10100100_2$

x_1	x_2	x_3	x_1x_2	x_1x_3	x_2x_3	$x_1x_2x_3$	F
0	0	0	00	00	00	000	1
0	0	1	00	01	01	001	0
0	1	0	01	00	10	010	1
0	1	1	01	01	11	011	0
1	0	0	10	10	00	100	0
1	0	1	10	11	01	101	1
1	1	0	11	10	10	110	0
1	1	1	11	11	11	111	0

1) Вычеркиваем нули ф-ии.

2) Вычеркиваем в столбцах уже вычеркнутые значения.

3) Вычеркиваем поглощённые конъюнкты.

4) Зоре фун-ии.

МДНФ: $\bar{x}_1\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3$.

№5.2.

$F = 0001111000011111_2$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_1x_2	x_1x_3	x_1x_4	x_2x_3	x_2x_4	x_3x_4	$x_1x_2x_3$	$x_1x_2x_4$	$x_1x_3x_4$	$x_2x_3x_4$	$x_1x_2x_3x_4$	F
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	000	000	000	0000	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	000	001	001	001	0001	0
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	001	000	010	010	0010	0
0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	001	001	011	011	0011	1
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	010	010	000	100	0100	1
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	010	011	001	101	0101	1
0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	011	010	011	110	0110	1
0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	011	011	011	111	0111	1
1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	100	100	100	000	1000	0
1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	100	101	101	001	1001	0
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	101	100	110	010	1010	0
1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	101	101	111	011	1011	1
1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	110	110	100	100	1100	1
1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	110	111	101	101	1101	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	111	110	110	110	1110	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	111	111	111	111	1111	1

Используя законы склеивания и поглощения:

МДНФ: $x_2 \vee x_3x_4$.