# 基于共表达图与风格条件流的啤酒风味预测、归因与生成

## 摘　要

啤酒风味由两百余种化合物在极宽浓度域内的协同与拮抗共同决定，单一化合物的气味活度值无法解释混合效应。本文以 250 款商业啤酒的 231 个化合物指标与 50 维 0–6 分制感官评分为对象，按**数据审计、感官预测、化合物归因、风味生成**四步推进，每一问都给出所用模型、具体做法与量化结果，全部数字可由随附源码一次复现。

**针对问题一**，本文采用**多任务图扩散网络 MT-GNN 与非负岭堆叠集成**。做法上，先用校准浓度表反证出对数变换底数为 10（斜率 1.0000、$R^2 = 1.0000$），并识别出 231 列中有 **33 列实为原始浓度**、**102 列存在检出限左删失**、73 个缺失单元，据此构造缺失指示与封底指示两类变量；再把化合物相关矩阵转为**共表达图扩散算子** $\boldsymbol{S} = (1-\alpha)\boldsymbol{I} + \alpha\tilde{\boldsymbol{A}}$ 与原始特征拼接，送入双分支共享隐层网络一次输出 50 维，最后用非负岭回归对十个基模型做堆叠。结果表明，在按风格分层的 5 折 × 3 重复交叉验证下，**集成模型平均** $R^2 = 0.268$，高于文献梯度提升基线的 0.21 与 0.22，**50 维中有 25 维超过该基线**，最高单维 $R^2 = 0.74$（醇感），最难的总体喜好维度 $R^2 = 0.125$，为文献同项的 1.4 倍；**MT-GNN 是十个模型中唯一 50 维全为正者**（最低 $R^2 = 0.0005$），说明共享隐层把统计强度传导到了弱信号维度。消融实验如实表明，缺失与封底指示、图扩散的边际增益均在噪声范围内（$|\Delta| < 0.01$），**增益主要来自多任务结构与集成而非单一特征工程**。最终交付 $250 \times 50$ 的 0–6 分制评分表、整数分级表，以及实测覆盖率为 7.5% 的预测区间。

**针对问题二**，本文采用**贪心模块度优化与五路证据秩融合**。做法上，先在 $|\rho| \geq 0.45$ 的共表达图上做社区发现，并剔除会挤占名额的理化参数代理变量，得到 34 个社区、**模块度** $Q = 0.549$，其中 6 个主社区覆盖 200 个化合物且与酿造生化通路一一对应；再对每个感官维度并行计算**秩相关、SHAP、置换重要性、ElasticNet 稳定性选择、互信息**五路排序，加权融合后取前三名。稳定性用 **bootstrap 入选频率**与**跨方法 Jaccard 系数**双指标度量，化学合理性用阈值—OAV、化学类别、代谢来源、社区一致性四条判据核验，并以 `6.csv` 交叉相关矩阵作独立外部验证。结果表明，**Top-1 的 bootstrap 入选频率均值达 0.72**（随机基线 0.33），**76% 的维度其 Top-3 至少两项落在同一社区**，19/68 个可算 OAV 的条目满足 $\mathrm{OAV} > 1$，据此识别出里那醇、香叶醇、甲基庚烯酮、乙酸乙酯、DMS 等公认关键致香物，统计证据与化学语义相互印证。

**针对问题三**，本文采用**风格条件潜因子流 SCLF 与带约束的高斯最优传输**。做法上，先用并行分析定阶取 $K = 14$ 个潜因子，以 6 层仿射耦合流建模风格条件密度 $p(\boldsymbol{z} \mid s)$，采样时按该风格缺陷 OAV 的 95% 分位做拒绝采样；再做跨风格迁移，用 **Bures-Wasserstein 最优传输**同时对齐目标风格的均值与协方差，然后沿源谱到目标谱的连线做**单调二分投影**，把缺陷化合物逐样本钳制在物理下界与源样本值之间。结果表明，条件流的**负对数似然为 -19.030**，明显优于高斯收缩模型的 10.611；16 种风格的生成样本**风格保真度均值 0.81**（随机基线 0.045）、多样性比 0.75，未出现模式坍塌；在 Pils/Lager 到 Tripel 的迁移中，被判为 Tripel 的比例由 0.00 升至 **0.64**，平均迁移强度 $\lambda = 0.80$，而**缺陷 OAV 构造性不恶化**（DMS 为 1.00 倍、双乙酰 0.84 倍、4VG 0.94 倍），平均缺陷分由 0.113 降至 0.088。

**创新点**：一是发现并量化了附件未说明的量纲混用（33 列原始浓度）与检出限左删失（102 列、占 12.60% 观测），把数据契约固化为三问共享的判定；二是把共表达图同时用于预测侧的特征增广与归因侧的社区一致性判据，使模块级信号成为可检验的对象；三是用五路秩融合、双稳定性指标、四判据化学合理性与外部矩阵独立验证，把归因从排行榜升级为可复核论证；四是把跨风格迁移写成**带单调缺陷约束的最优传输**，以单一标量 $\lambda$ 刻画迁移强度，兼具可解释性与可审计性。

**关键词**：共表达图；图扩散；多任务学习；稳定性选择；归一化流；最优传输；啤酒风味

# 一、 问题重述

## （一） 问题背景

啤酒的风味是原料、酵母代谢与陈化过程共同作用的产物，其感官表现由数百种挥发性与非挥发性化合物在极宽浓度区间内的协同与拮抗决定。酿造学界长期用“气味活度值（odour activity value, OAV）”刻画单一化合物对香气的贡献，即 $\mathrm{OAV} = C/T$，其中 $C$ 为实测浓度、$T$ 为该化合物在啤酒基质中的气味阈值；$\mathrm{OAV} > 1$ 通常意味着该物质可被感知 [1, 2]。然而**真实啤酒是数百种化合物共存的多组分体系**：酯类贡献果香、萜烯类贡献酒花草本香、高级醇贡献醇厚感、含硫化合物与醛酮类在微量时即构成缺陷。单一化合物的 OAV 无法解释“同样是 $\mathrm{OAV} < 1$ 的两种物质，混合后香气显著增强”这类协同效应，也难以回答“哪些化合物真正决定了某一条感官维度的评分”。

本题提供的商用啤酒风味代谢数据集，把这一难题转化为一个可计算的多视图建模问题：既有 250 款商业啤酒在 231 个化学指标上的实测丰度，也有经专业品评小组按 0–6 分制评定的 50 个感官维度，还给出了化合物之间、感官维度之间、化学与感官之间的三张相关矩阵，以及气味阈值与化合物来源标注。数据同时**真实地含有缺失值、检出限以下截断与量纲混用**，这正是真实代谢组数据的常态。

## （二） 需要解决的问题

题目要求围绕“化合物 $\rightarrow$ 感官”这一映射，完成三项递进的任务。

**问题一：数据缺失条件下的感官评分。**以 `1.csv` 的化合物丰度为输入，给出 `3.xlsx` 所定义的 Aroma 与 Flavour 两套共约 40 个感官维度（连同口感、缺陷、香料与总体维度共 50 维）的 0–6 分制分级评分结果。难点在于：样本量仅 250 而特征 231 维，特征数 $\approx$ 样本数；感官标签本身是品评小组的均值，噪声大、部分维度极难预测；化合物矩阵还存在系统性缺失与检出限截断。

**问题二：化合物–风味分析。**利用 `2.csv` 的化合物相关矩阵构建化合物共表达图，结合 `1.csv` 的特征，为每个感官维度给出 Top-3 关键因素化合物，并对结果做**稳定性**与**化学合理性**两类论证。稳定性需用 bootstrap 重采样下的入选频率、或不同建模方法间 Top-3 的 Jaccard 系数来量化；化学合理性需要把统计关联还原到化合物类别、代谢来源与气味阈值层面。

**问题三：风味与“风味指纹”生成。**以 `tasting_category_fine` 为风格标签，学习**风格条件生成模型**：在给定风格（如 Tripel、Kriek、Lambic）下生成合理的化合物谱，并给出对应的感官画像；同时完成**跨风格迁移**，例如把 Pils/Lager 的化合物谱迁移为 Tripel 风格，且要求缺陷化合物（DMS、双乙酰、4VG、反式-2-壬烯醛、陈酒花等超阈值项）**不恶化**。

# 二、 问题分析

## （一） 总体认识

三问构成一条**“表征 $\rightarrow$ 归因 $\rightarrow$ 生成”**的递进链条：问题一把“化学谱 $\rightarrow$ 感官评分”建成高维小样本回归，其产物（可靠的感官预测器）是问题三评估生成样本感官合理性的**度量工具**；问题二从同一批数据中挖出化学–感官的**因果候选集**，其产物（关键化合物清单）反向约束问题三的生成方向，使“生成”不至于沦为无意义的随机采样。三问共享同一套数据契约：对数底数、缺失机制、左删失规则、0–6 分制标定必须在同一处定义一次，否则三问结论不可相互印证。因此本文先做
textbf 一次严格的数据审计（第四章），再依次建模。

技术路线如图 1 所示。





**图 1**　全文技术路线：审计层统一数据契约，建模层三问共享特征与评估口径，问题二的归因结果反向约束问题三的生成方向

## （二）　问题一的分析

问题一的数学本质是一个 $\mathbb{R}^{231} \to \mathbb{R}^{50}$ 的**多输出高维小样本回归**，有三个结构性困难必须分别处理。

**（1）维数灾难与共线性。**231 个化合物中，萜烯类 65 个、酯类 59 个，同类化合物之间相关系数常在 0.8 以上（如乙酸乙酯与总酯 $r = 0.77$）。这正是普通最小二乘失效的典型场景：本文实测未加正则的岭回归在留出法下平均 $R^2 = -0.45$，比“直接用均值预测”还差。必须用强正则化或特征筛选把有效自由度压到样本量以下。

**（2）多任务结构未被利用。**50 个感官维度高度相关（本文实测平均 $|\rho| = 0.17$，Aroma 与 Flavour 两套内部同族维度相关可达 0.7 以上）。若为每个维度独立训练一个模型（这是最直接的做法），等于放弃了“麦芽香-总体”对“麦芽香-面包”的信息增益。因此本文把它当作**多任务学习**问题 [3]，用低秩因子或共享隐层显式共享统计强度。

**（3）标签噪声与极端值。**感官分是品评小组均值，本身含主观方差；部分啤酒在“烟熏焦”维度上出现极端高分，会把 $R^2$ 这类平方损失指标严重拉低。这解释了为什么文献中线性模型在此类数据上会出现**负** $R^2$——这不是代码错误，而是平方损失对长尾标签的固有脆弱性。

据此，问题一的分析策略是：先把特征工程做扎实（缺失插补 + 稳健缩放 + 共表达图扩散），再在同一交叉验证协议下横向比较“线性 → 树模型 → 潜因子多任务 → 图神经网络 → 堆叠”五级模型，最后用分裂一致性给出预测区间，使交付的 0–6 分数**附带可信度**而非孤立数值。

### （三） 问题二的分析

问题二要回答的不是“哪些化合物与某感官统计相关”，而是“**哪些化合物是该感官的可靠驱动因素**”。二者的差别在于**稳定性**：231 个特征、250 个样本下，单次拟合得到的“重要性排序”有很大比例是噪声。因此必须回答三个层次的问题：

(1) **结构层**：化合物之间存在怎样的共表达模块？同一模块内的化合物往往共享代谢通路（如乙酸酯类共用乙酰辅酶 A 前体），这为“Top-3 化学合理性”提供了先验——若某感官的 Top-3 恰好落在同一模块，其可信度高于三个孤立化合物。

(2) **归因层**：如何把“重要性”的定义做得不依赖单一模型？本文采用五路证据（秩相关、SHAP、置换重要性、稳定性选择、互信息）做秩融合，因为不同方法对非线性、交互与共线性的敏感方向不同，融合后结论更稳健。

(3) **验证层**：稳定性用 bootstrap 入选频率与跨方法 Jaccard 双指标量化；化学合理性则把 Top-3 还原为“化合物类别 + 代谢来源 + OAV 量级”，并与 `6.csv` 给出的独立交叉相关证据对照。

### （四） 问题三的分析

问题三要求的不只是“生成像样的数”，而是“**生成符合风格语义、且不引入缺陷**的化合物谱”，这是一个带约束的条件生成问题。三处风险点决定了建模选择：

**（1）样本极不平衡**。22 种风格中 Faro 仅 3 款、Brut 4 款。若对每种风格独立训练生成器，小样本风格必然过拟合。因此必须先降维到潜因子空间，并让各风格共享协方差结构（收缩估计），使稀有风格向总体“借力”。

**（2）生成空间必须是化学可行域**。231 维原始化合物空间对 250 个样本而言过于稀疏，直接在其中做密度估计不可行；而完全不留自由度又退化为“复制训练样本”。折中方案是在潜因子空间建模密度、再解码回化合物空间，并用**分布层面的指标**（而非目视）验证生成质量。

**（3）跨风格迁移必须显式约束缺陷**。“把 Pils/Lager 变成 Tripel”若只做朴素插值，会连带把 DMS、双乙酰、4VG 等缺陷一并放大。因此迁移必须写成**带约束的优化**：先在潜空间用最优传输给出“风格对齐”的目标点，再沿源点–目标点连线做单调搜索，取满足缺陷不恶化的最远可行点。这样得到的迁移路径既可解释（$\lambda$ 越大越像目标风格），又可审计（缺陷单调不增）。

## 三、 模型假设与符号说明

### （一） 模型假设

**假设 1. 样品代表性假设**：250 款商业啤酒构成比利时商业啤酒市场的代表性样本，其风格分布与化合物分布可代表该类产品总体。该假设仅用于把样本结论外推到“同类商业啤酒”，不外推到工业拉格或家庭自酿。

**假设 2. 品评一致性假设**：同一款啤酒的 0–6 分感官分是训练有素品评小组的一致估计，评分的随机误差零均值且与化合物浓度独立。该假设使回归的目标函数无系统偏差，仅含方差。

**假设 3. 对数变换假设**：`1.csv` 中未标注量纲的多数列是浓度的 $\log_{10}$ 变换（负值对应浓度 $< 1$），少数列为原始浓度；具体到哪一列由 § 二用校准浓度表逐列反证，不作整体假定。

**假设 4. 检出限假设**：某化合物在大量样本上取到同一最小值时，该值是仪器检出限而非真实浓度，真实值落在区间 $(-\infty,\, v_{\min}]$；建模时以“封底指示变量”显式吸收这一信息。

**假设 5. 风格可分假设**：`tasting_category_fine` 给出的风格标签在化学谱上可分，即存在从化合物谱到风格的判别函数，且其准确率显著高于随机基线。该假设是问题三“风格条件生成”可评估的前提，并由 § 七实测检验。

**假设 6. 迁移可行性假设**：跨风格迁移的目标化合物谱落在训练样本张成的化学可行域内，因此沿潜空间直线插值不会产生化学上不可能的负浓度或超量级浓度；该假设由迁移后浓度的边界检查实测核验。

### （二） 符号说明

本文全局符号列于表 1，各章局部符号在首次出现处另行说明。

**表 1** 主要符号说明

| 符号 | 含义 | 单位 / 取值域 |
|---|---|---|
| $n$ | 啤酒样本数 | 250 |
| $p$ | 化合物特征维数 | 231 |
| $q$ | 感官维度数 | 50 |
| $\boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^{n\times p}$ | 化合物丰度矩阵（插补后） | 无量纲 |
| $x_{ij}$ | 第 $i$ 款酒第 $j$ 个化合物的数值 | 见 § 二 |
| $y_{ik}$ | 第 $i$ 款酒第 $k$ 个感官维度得分 | 0–6 分制 |
| $s_i$ | 第 $i$ 款酒的风格标签 | 22 类之一 |
| $\boldsymbol{z}_i \in \mathbb{R}^K$ | 第 $i$ 款酒在 $K$ 维潜因子空间的坐标 | 无量纲 |
| $K$ | 潜因子个数（并行分析确定） | 正整数 |
| $\rho_{jk}$ | 化合物 $j$ 与 $k$ 的皮尔逊相关系数 | $[-1,1]$ |
| $w_{jk}$ | 共表达图边权，$w_{jk}=\lvert\rho_{jk}\rvert$ | $[0,1]$ |
| $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{D}$ | 图邻接矩阵与度矩阵 | — |
| $\boldsymbol{S}$ | 图扩散算子，$\boldsymbol{S}=(1-\alpha)\boldsymbol{I}+\alpha\tilde{\boldsymbol{A}}$ | — |
| $R^2$ | 决定系数，$1-\sum(y-\hat{y})^2/\sum(y-\bar{y})^2$ | $(-\infty,1]$ |
| $\Phi^{-1}$ | 标准正态分位数函数 | — |
| $T_c$ | 化合物 $c$ 的气味阈值 | $\mu\mathrm{g}\cdot\mathrm{L}^{-1}$ 或 $\mathrm{mg}\cdot\mathrm{L}^{-1}$ |
| $\mathrm{OAV}_c$ | 气味活度值，$\mathrm{OAV}_c=C_c/T_c$ | 无量纲 |
| FD | Fréchet 距离（分布层面的生成质量） | 同 $\boldsymbol{X}$ 量纲 |
| $\lambda$ | 跨风格迁移强度，$0\le\lambda\le 1$ | 无量纲 |
| $B$ | bootstrap 重采样次数 | 200 |
| $\alpha$ | 图扩散强度（正则参数） | $[0,1]$ |

## 四、 数据审计与探索性分析

数据审计不是“清洗一下再建模”的例行公事。本题的三处关键设定——**对数变换底数**、**缺失与检出限机制**、**0–6 分制标定**——若判错，后面三问的结论会系统性偏移且互相矛盾。本章逐项给出**可复算**的判定依据。

### （一） 数据结构与对齐

八份附件的数据形态如表 2。需要特别注意两点：其一，`4.csv` 的 `beer_id` 列是**截断后**的条码——250 行中有 **213 行**与 `1.csv` 的同名酒款不一致（例如 `5413970150111` 被记为 `5413970000000`），因此**不能**用 `beer_id` 做主键；本文全程以 `beer` 编号（1–250）对齐，实测 250 行一一对应。其二，`2.csv` 与 `6.csv` 使用**规范化学名**（`Acetaldehyde`、`Carbon disulfide`），而 `1.csv` 使用转义列名（`acetaldehyde`、`CS2`），二者需建立映射。

**表 2**　附件数据形态与本文用途

| 文件 | 规模 | 内容 | 本文用途 |
|---|---|---|---|
| `1.csv` | $250 \times 234$ | 231 个化合物丰度 + 风格标签 | 问题一、三的自变量 |
| `2.csv` | $231 \times 231$ | 化合物间皮尔逊相关 | 问题二共表达图；问题一图扩散 |
| `3.xlsx` | 13 工作表 | 0–6 分制品评卡（含锚点描述） | 感官维度定义与分制依据 |
| `4.csv` | $250 \times 52$ | 50 维感官评分（标准化后） | 问题一、三的监督目标 |
| `5.csv` | $50 \times 50$ | 感官维度间 Spearman 相关 | 多任务结构证据 |
| `6.csv` | $44 \times 50$ | 化学 × 感官交叉相关 | 问题二独立验证证据 |
| `7.csv` | $250 \times 188$ | 186 个评论香气描述符 | 探索性佐证（未入模） |
| `8.xlsx` | 6 工作表 | 阈值 / 来源 / 校准浓度 / 价格 | OAV 与化学合理性 |

`2.csv` 的 231 个规范名与 `1.csv` 的 231 个转义名并非一一可字符串匹配：其中 11 个存在拼写差异（`Terpiryl acetate`、`Tobacarol`、`Kongol`、`Epicubenol` 等）。本文用“规范名 $\rightarrow$ 化学名 $\rightarrow$ 原名”三级归一化（小写、去标点、希腊字母展开）配合人工核对，建成 **231 $\rightarrow$ 231 的双射**，无遗漏、无重复。

## （二）　对数变换底数的判定

附件说明称“部分数值为原始浓度经对数变换后的结果（负值对应浓度小于 1）”，但**未给出底数**；同时又说明“少量理化参数列保留原始量纲”。这留下两个必须回答的问题：底数是 10 还是 $e$？哪些列根本没做变换？

本文用 `8.xlsx` 的 *Calibrated chemical dataset* 工作表反解：该表给出 70 个化合物换算到真实浓度（$\mathrm{mg \cdot L^{-1}}$ 或 $\mu\mathrm{g \cdot L^{-1}}$）后的数值，与 `1.csv` 同酒款同行。对每个化合物回归

$$\log_{10} C_c = a\, v_c + b, \tag{1}$$

其中 $v_c$ 为 `1.csv` 数值、$C_c$ 为校准浓度。若底数为 10，应有 $a = 1,\ b = 0$；若底数为 $e$，则 $a = 1/\ln 10 = 0.4343$。实测 37 个化合物给出

$$a = 1.0000, \qquad b = 0.0000, \qquad R^2 = 1.0000, \tag{2}$$

而以 $e$ 为底解释时斜率偏差达 56.6%。**故底数为 10**，即 $C_c = 10^{v_c}$，单位为阈值表 `unit` 列所标单位。图 4(b) 给出全部散点与两条理论直线的对照。

更进一步，本文对 70 个有校准值的列逐列检验两个恒等关系哪个在数值精度内成立：$\log_{10} C_c \equiv v_c$ 抑或 $C_c \equiv v_c$。结果是 **33 列**（$\mathrm{mg \cdot L^{-1}}$ 或 $\mu\mathrm{g \cdot L^{-1}}$ 量纲下的原始浓度）满足后者，且其最大值可达 $1.26 \times 10^4$（2-甲基四氢呋喃-3-酮）、$7.26 \times 10^3$（$\gamma$-壬内酯）、$5.99 \times 10^3$（$\beta$-大马酮）。这些恰是气味阈值极低、以 $\mu\mathrm{g \cdot L^{-1}}$ 计的**超痕量致香物**。附件说明只提“少量理化参数列保留原始量纲”，**并未提及这 33 个风味化合物也保留原始量纲**——若一律按 $10^v$ 处理，其 OAV 会被低估或高估数个量级，问题二的化学合理性论证与问题三的缺陷约束都会失真。表 3 列出其中变化最剧烈的 8 列。

**表 3**　判定为“原始浓度”的 33 列中的代表（其余见附录表 20）

| 化合物列名 | 最小值 | 最大值 | 化学类别 |
|---|---|---|---|
| X2.methyltetrahydrofuran.3.one | 0.000 | $1.26 \times 10^4$ | 酮类 |
| gamma.nonalactone | 0.000 | $7.26 \times 10^3$ | 内酯类 |
| X.E..beta.damascenone | 0.004 | $5.99 \times 10^3$ | 萜烯类 |
| X3.methylbutanal | 0.000 | 127.06 | 醛类 |
| X2.3.butanedione（双乙酰） | 0.000 | 121.73 | 酮类 |
| E.caryophyllene | 0.000 | 40.93 | 萜烯类 |
| linalool | 0.013 | 32.49 | 萜烯类 |
| X.E..2.nonenal（反式-2-壬烯醛） | 0.000 | 14.91 | 醛类 |

### （三）　缺失机制与检出限左删失

1.csv 共 57 750 个单元格，其中缺失 **73 个（0.126%）**，集中在 9 列（amyl.acetate 10.8%、aroma_hops_sum 5.2%、methylpyrazine 4.8%、X2.3.butanedione 3.6% 等）。缺失比例虽低，但集中在**痕量化合物**上，其缺失本身可能携带信息（低于检出限即未检出），故本文采用“中位数插补 + 缺失指示变量”而**不是**删除样本。

更值得注意的是**左删失**：有 **102 个化合物**存在 5% 以上的样本取到同一个最小值（X6.methyl.5.hept 与 limonene 达 84.8%、CS2 83.6%、X4VG 67.2%），封底单元格合计 **7275 个，占总观测的 12.60%**。这类“地板值”是仪器检出限而非真实浓度：真实值落在 $(-\infty, v_{\min}]$ 内。若把它当作精确观测，等于人为制造了一个远离数据主体的伪簇，会让任何基于距离或协方差的方法（包括问题二的相关图与问题三的潜因子）失真。本文的处理是：保留数值不删样本（避免丢失“未检出”这一事实），同时为封底比例 $> 5\%$ 的列构造**封底指示变量** $I_j = \mathbb{1}[x_{ij} = v_{j,\min}]$，作为附加特征进入问题一的模型，使“是否检出”与“检出值多少”被分开建模。图 4(a) 给出封底比例的分布。

### （四）　感官 0–6 分制的标定

4.csv 的感官值**不是**原始 0–6 分，而是标准化/中心化后的连续值。实测各维均值为 $-0.049 \sim 0.000$（说明**确已中心化**），但标准差为 $0.370 \sim 0.723$（**并非**单位方差），且全局极差 $-2.151 \sim 6.172$ 无法通过单一平移落回 $[0, 6]$。因此不能按“$z$ 分数反标准化”还原。

本文采用**保序的逐维线性映射**：

$$\tilde{y}_{ik} = 6 \cdot \frac{y_{ik} - y_{k,\min}}{y_{k,\max} - y_{k,\min}}, \tag{3}$$

即把每一维的观测值线性拉伸到官方 0–6 区间。该映射**保序**（维持品评小组对 250 款酒的相对排序，这是感官分唯一可靠的信息），并使交付结果满足题目“0–6 分制分级评分”的要求；分级结果再由 round($\tilde{y}$) 截断到 $\{0, \ldots, 6\}$ 给出。需要说明的是，由于原始平移量不可辨识，本文所有**模型评价指标**（$R^2$、MAE、Spearman）均在标准化尺度上计算，它与 0–6 尺度等价（$R^2$ 与 Spearman 对仿射变换不变），不受该映射影响。

标定后各维均值为 $0.221 \sim 3.364$，其中 A_esters_all（酯香总体）均值最高（3.098），A_malt_burn（烟熏焦）最低（0.615），与“商业啤酒以果香为主导风味”的常识一致。

### （五）　感官结构与共表达结构

**感官侧**：50 维感官的平均 $|\rho| = 0.17$，但呈明显的块状结构（图 2）：Aroma 的 15 维与 Flavour 的 15 维各自成块，同族维度之间高度相关（如麦芽香-总体与麦芽香-面包 $\rho > 0.7$），而缺陷维度（DMS、双乙酰、反式-2-壬烯醛）与酯香维度呈负相关。这一结构从数据上支

持了问题一采用**多任务学习**而非逐维独立建模的判断：块内共享统计强度是可利用的免费信息。





**图 2**　50 个感官维度的 Spearman 相关结构（层次聚类排序）：Aroma 与 Flavour 两套各自成块、同族强相关，缺陷维度与酯香/酒花维度负相关

**化学侧**：取 $|\rho| \geq 0.3$ 为边，`2.csv` 构成含 **4033 条边**、平均度 34.9 的共表达图；取 $|\rho| \geq 0.45$ 并做力导向布局后（图 3），网络清晰分裂为酯类模块、萜烯类模块与醇/酸/硫模块。模块的化学类别构成（图 3(b)）显示：模块 M1 以酯类为主、M2 以萜烯为主，说明共表达结构主要反映**代谢通路来源**（乙酸酯类共用乙酰辅酶 A 前体、萜类共用甲羟戊酸/MEP 途径），而非随机噪声。这一结论是问题二“化学合理性”的先验基础：若某感官的 Top-3 落在同一模块，其可信度高于三个跨模块的孤立化合物。

上述块状结构可以定量刻画，而不必只依赖热图的目视。记第 $k$ 与第 $k'$ 个感官维度的 Spearman 相关为 $\rho_{kk'}$，把全部 $\binom{50}{2} = 1225$ 个维度对按是否属于同一感官分组分成两组，分别求平均绝对相关：

$$\bar{\rho}_{\text{in}} = \frac{1}{|\mathcal{P}_{\text{in}}|} \sum_{(k,k') \in \mathcal{P}_{\text{in}}} |\rho_{kk'}|, \qquad \bar{\rho}_{\text{out}} = \frac{1}{|\mathcal{P}_{\text{out}}|} \sum_{(k,k') \in \mathcal{P}_{\text{out}}} |\rho_{kk'}|, \tag{4}$$

其中 $\mathcal{P}_{\text{in}}$ 为同组维度对（261 对），$\mathcal{P}_{\text{out}}$ 为跨组维度对（964 对）。实测 $\bar{\rho}_{\text{in}} = 0.204$、$\bar{\rho}_{\text{out}} = 0.161$，即**块内关联强度是块间的 1.27 倍**；若两组本该无差别，这一比值应接近 1。分组的组内平均相关差异很大：口感组（Mouthfeel，7 维）最高，达 0.378，说明“酒体、醇感、碳酸感、回味”在品评员的认知中高度耦合、难以独立打分；Aroma 与 Flavour 分别为 0.180 与 0.202；缺陷组最低（0.162），反映缺陷的发生是零散事件而非系统维度。

最强的一对是“陈酒花”与“马厩 Brett”（$\rho = 0.966$）。二者在多数样品上同时缺失、只在少数野生菌参与的样品上同时出现，属于典型的**共同缺失型伪相关**——这提醒后续归

因不能把共现直接当作因果，也正是问题二要用五路证据而非单一相关系数做归因的原因之一。





**图 3**　化合物共表达图：(a) 力导向布局，节点大小表示度、颜色表示共表达模块；(b) 各模块的化学类别构成，酯类与萜类分别主导不同模块

## （六）　气味阈值、来源标注与 OAV

`8.xlsx` 的阈值表给出 261 条化合物的来源（Malt / Hops / Yeast / Wild flora / Spices / Others）、气味阈值与异味描述，其中与 `1.csv` 可匹配者 47 条、含可用阈值者 **43 条**、显式标注“异味”者 7 条（乙醛、二乙基硫、DMS、硫化氢、甲硫醇、双乙酰、$SO_2$）。结合 § 二的逐列量纲判定，本文对 **41 个化合物**计算了 OAV，结果符合酿造学常识：里那醇（OAV 中位数 13.6）、香茅醇 8.8、香叶醇 4.4 等萜烯类长期处于阈值以上（这解释了为何酒花香是商业啤酒的主导香气）；DMS 中位数 1.41、双乙酰 0.95，恰在阈值附近浮动，说明缺陷是“少数样品的越界”而非普遍现象（DMS 有 67.2% 的样品 OAV $>1$，双乙酰 44.8%，4VG 仅 6.4%）。

OAV 的计算必须建立在 § 二的逐列量纲判定之上，否则超痕量致香物会被系统性高估。正式地，对第 $i$ 个样品的第 $c$ 个化合物，

$$\mathrm{OAV}_{ic} = \frac{C_{ic}}{T_c}, \qquad C_{ic} = \begin{cases} 10^{\,v_{ic}}, & c \in \mathcal{L}_{\log}, \\ v_{ic}, & c \in \mathcal{L}_{\mathrm{raw}}, \end{cases} \tag{5}$$

其中 $v_{ic}$ 为 `1.csv` 中的原始数值，$\mathcal{L}_{\log}$ 与 $\mathcal{L}_{\mathrm{raw}}$ 分别为对数变换列与原始浓度列（由 § 二逐列判定），$T_c$ 为气味阈值。表 4 列出 OAV 中位数最高的 10 个化合物：里那醇、香茅醇、香叶醇三种萜烯醇的 OAV 中位数分别为 13.58、8.79、4.38，且分别有 98.4%、92.4%、76.0% 的样品超过阈值，说明**酒花香是商业啤酒最稳定的可感知香气**；异戊醇乙酸酯（3.62）与乙酸乙酯（1.15）反映酯香；DMS 与硫化氢代表硫代谢；乙酸来自野生菌群。41 个可算 OAV 的化合物中，有 12 个的 OAV $>1$ 样品占比超过半数——这一比例说明**真正的“常驻香气”只占少数**，多数化合物处于阈值附近，其感官贡献依赖于基质与协同效应，这正是单一 OAV 不足以解释风味、必须建模的物理原因。

**表 4**　气味活度值（OAV）中位数最高的 10 个化合物

| 化合物 | 阈值 $T_c$ | 单位 | 来源 | OAV 中位数 | OAV $>1$ 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 里那醇 Linalool | 0.027 | mg/L | Hops | 13.58 | 98.4% |
| 香茅醇 Citronellol | 0.025 | mg/L | Hops | 8.79 | 92.4% |
| 蛋白质 Protein | 1.024 | g/L | Others | 7.33 | 99.6% |
| 香叶醇 Geraniol | 0.032 | mg/L | Hops | 4.38 | 76.0% |
| 氨 Ammonia | 2.600 | mg/L | Malt | 3.68 | 87.6% |
| 乙酸异戊酯 | 0.603 | mg/L | Yeast | 3.62 | 84.4% |
| 硫化氢 $H_2S$ | 3.500 | $\mu$g/L | Yeast | 2.43 | 92.0% |
| 二甲基硫 DMS | 17.250 | $\mu$g/L | Malt | 1.41 | 67.2% |
| 乙酸 Acetic acid | 0.140 | g/L | Wild flora | 1.21 | 61.6% |
| 乙酸乙酯 Ethyl acetate | 24.000 | mg/L | Yeast | 1.15 | 65.6% |





**图 4**　数据审计六联图：(a) 检出限封底比例分布；(b) 对数底数判定（散点严格落在 $y = x$ 上，33 列为原始浓度）；(c) 各类化合物丰度分布；(d) 22 种风格样本量；(e) 50 维感官目标分布；(f) 感官维度相关矩阵

本节的所有判定（底数 10、33 列原始浓度、102 列封底、0–6 标定、231 双射映射、41 个 OAV）均由 `src/01_audit.py` 一次运行复算，输出 `audit_report.txt` 与 `prepared.npz`，供后续三问共享。

## 五、　问题一：缺失数据条件下的感官评分模型

### （一）　问题的形式化

记第 $i$ 款啤酒的化合物向量为 $\boldsymbol{x}_i \in \mathbb{R}^p$（$p = 231$）、感官向量为 $\boldsymbol{y}_i \in \mathbb{R}^q$（$q = 50$）。目标是用 $\{(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{y}_i)\}_{i=1}^{n}$（$n = 250$）学到一个映射

$$\hat{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}), \qquad \boldsymbol{f} : \mathbb{R}^{231} \to \mathbb{R}^{50}, \tag{6}$$

使每个维度的期望平方损失最小。由于共有 $q$ 个输出，评价采用**逐维决定系数**并取均值：

$$\overline{R^2} = \frac{1}{q}\sum_{k=1}^{q}\left(1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_{ik}-\hat{y}_{ik})^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_{ik}-\bar{y}_k)^2}\right). \tag{7}$$

选择 $\overline{R^2}$ 而非单一维度指标，是因为它能同时惩罚“某个维度崩掉”与“多数维度平庸”，与竞赛评审对整体可用性的要求一致。

## （二） 预处理：三处数据缺陷的显式建模

### 1. 缺失与左删失的分离处理

记 $M_{ij} = \mathbb{1}[x_{ij}\ \text{缺失}]$、$F_{ij} = \mathbb{1}[x_{ij} = v_{j,\min}]$（$v_{j,\min}$ 为第 $j$ 列最小值，见 §4.3）。插补采用训练折内中位数：

$$\tilde{x}_{ij} = \begin{cases} \text{median}_{i' \in \mathcal{T}}\{x_{i'j}\}, & x_{ij}\ \text{缺失}, \\ x_{ij}, & \text{否则}, \end{cases} \tag{8}$$

其中 $\mathcal{T}$ 为当前训练折。并**仅对存在缺失的列**追加缺失指示 $M_{ij}$（9 列）；封底指示 $F_{ij}$ 作为消融项单独检验（§8.2）。这样做的理由是：“未检出”与“检出值恰好很低”在机制上不同，前者是信息缺失、后者是弱信号，混为一谈会让模型把检出限当成真实浓度。

### 2. 稳健缩放

对数变换后的化合物丰度仍有长尾（§4.2 的原始浓度列表中，2-甲基四氢呋喃-3-酮的极差跨越四个数量级）。直接标准化会让单个极端值主导协方差，故采用**缩尾 + IQR 稳健化**：

$$x_{ij}^{\mathrm{w}} = \min\{\max\{x_{ij},\, q_{1,j}\},\, q_{99,j}\}, \qquad z_{ij} = \frac{x_{ij}^{\mathrm{w}} - \text{median}_j}{\text{IQR}_j}, \tag{9}$$

其中 $q_{1,j}, q_{99,j}$ 为该列 1% 与 99% 分位数，$\text{IQR}_j$ 为四分位距。缩尾在训练折上估计分位点后同时作用于训练与验证折，避免信息泄漏。

### 3. 共表达图扩散特征

§4.5 已确认化合物按代谢通路成块相关，这意味着**单个化合物的信号往往被其模块整体承载**。为此把 `2.csv` 的相关矩阵转为图扩散算子。以 $w_{jk} = |\rho_{jk}|$ 为边权、每行只保留 $k_{\text{top}} = 8$ 条最强边并对称化得 $\boldsymbol{M}$，再取归一化邻接 $\tilde{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{D}^{-1/2}\boldsymbol{M}\boldsymbol{D}^{-1/2}$，定义**单跳扩散**：

$$\boldsymbol{S} = (1-\alpha)\boldsymbol{I} + \alpha\tilde{\boldsymbol{A}}, \qquad \boldsymbol{X}^{\mathrm{d}} = \boldsymbol{S}\boldsymbol{X}, \tag{10}$$

$\alpha \in [0,1]$ 控制“自身”与“模块邻居”的混合比例。$\alpha = 0$ 退化为原始特征，$\alpha = 1$ 完全用邻居平均值替代自身。模型输入为拼接 $[\boldsymbol{X},\, \boldsymbol{X}^{\mathrm{d}}] \in \mathbb{R}^{2p}$，使模型既能读取单化合物信号、也能读取模块级信号。$\alpha$ 与 $k_{\text{top}}$ 的取值在 §8.2 做敏感性检验。

## （三） 五级模型：从线性到图神经网络的横向比较

### 1. 统一的评价协议

所有模型都在同一协议下评估，否则比较无从谈起。记第 $r$ 次重复（$r = 1, \ldots, R, R = 3$）把 $n = 250$ 个样本划成 $K = 5$ 折 $\{\mathcal{F}_1^{(r)}, \ldots, \mathcal{F}_K^{(r)}\}$，划分按风格分层，即每个折内第 $s$ 种风

格的样本数与总体成比例：

$$\left|\mathcal{F}_m^{(r)} \cap \mathcal{S}_s\right| \;\approx\; \frac{n_s}{K}, \qquad m = 1, \ldots, K, \;\; \forall s, \tag{11}$$

其中 $\mathcal{S}_s$ 为第 $s$ 种风格的样本集合、$n_s = |\mathcal{S}_s|$。分层的必要性在于 22 种风格的样本量从 3 到 31 不等，若随机划分，某些折可能完全没有 Tripel 或 Lambic 样本，模型在该折上等于“没见过该风格”。对每一折，用其余 $K-1$ 折拟合、对留出折预测，得折外（out-of-fold）预测 $\hat{y}_{ik}^{(r,m)} = \hat{f}_k^{(-m)}(\boldsymbol{x}_i)$；同一样本在每次重复中恰好被预测一次，再对 $R$ 次重复取平均：

$$\hat{y}_{ik} = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^{R} \hat{f}_k^{(-m(i,r))}(\boldsymbol{x}_i), \tag{12}$$

$m(i,r)$ 表示样本 $i$ 在第 $r$ 次重复中所属的折。全部 $50 \times 250$ 个预测都由 (12) 汇总后再代入 (7) 计算，因此评价用的样本**从未参与训练**。总计 $5 \times 3 = 15$ 次训练，每次用 200 个样本拟合、50 个样本评估。重复的作用不只是降噪：$R$ 次重复之间的预测离散度被直接用作 §5.6 的预测区间宽度，因此它同时给出了不确定性的度量。

为使结论可归因，本文在同一交叉验证协议下比较五级复杂度的模型（表 5）。

**表 5**　问题一的五级模型与设计意图

| 层级 | 模型 | 设计意图（为什么需要它） |
|---|---|---|
| L0 | Ridge | 强正则线性基线；检验“$p \approx n$ 下正则化是否足够” |
| L0 | ElasticNet | 稀疏基线；检验“特征选择能否替代正则” |
| L0 | PLS | 化学计量学经典方法 [6]；检验潜变量回归 |
| L1 | RandomForest | 非线性基线 [5]；检验交互效应 |
| L1 | GBR | 文献口径的梯度提升 [4]；**文献同类任务的主流基线** |
| L1 | 直方图 GBR | 直方图加速的梯度提升；检验实现差异与超参稳健性 |
| L2 | 潜因子 Ridge | 对 $\boldsymbol{Y}$ 做 SVD 取 $K$ 个感官潜因子再回归；检验多任务共享 |
| L3 | MT-GNN | 图扩散双分支多任务网络（本文主模型） |
| L4 | Stack | 以 L0–L3 的 OOF 预测为元特征逐维非负岭回归 |

### 2. 潜因子多任务回归

把感官矩阵中心化后做奇异值分解 $\boldsymbol{Y} - \bar{\boldsymbol{Y}} = \boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^{\top}$，取前 $K$ 个右奇异向量 $\boldsymbol{V}_K \in \mathbb{R}^{q \times K}$ 作为**感官潜因子**，则

$$\boldsymbol{y}_i \approx \bar{\boldsymbol{y}} + \boldsymbol{V}_K \boldsymbol{t}_i, \qquad \hat{\boldsymbol{t}}_i = \boldsymbol{W}^{\top} \boldsymbol{z}_i, \tag{13}$$

仅对 $K$ 个潜因子做岭回归。自由度由 $q \cdot p$ 降为 $K \cdot p$（$K = 8$ 时降为 $8/50$），这是“多任务共享”最直接的形式：$K$ 个因子同时被 $q$ 个输出共享。$K$ 取 8 与 15 两档以检验敏感性。

### 3. MT-GNN：图扩散双分支多任务网络

设 $[\boldsymbol{X}, \boldsymbol{X}^{\mathrm{d}}]$ 分别送入两个独立的编码分支（各含批归一化、SiLU 激活与 Dropout），拼接后接 50 维输出头：

$$\boldsymbol{h}_i^{(1)} = \phi\big(\boldsymbol{W}_1 \boldsymbol{x}_i + \boldsymbol{b}_1\big), \qquad \boldsymbol{h}_i^{(2)} = \phi\big(\boldsymbol{W}_2 \boldsymbol{x}_i^{\mathrm{d}} + \boldsymbol{b}_2\big), \tag{14}$$

$$\boldsymbol{o}_i = \boldsymbol{W}_o\, \phi\big(\boldsymbol{W}_c[\boldsymbol{h}_i^{(1)}; \boldsymbol{h}_i^{(2)}] + \boldsymbol{b}_c\big) + \boldsymbol{b}_o, \tag{15}$$

损失为对标准化标签的 Huber 损失（$\beta = 0.5$）：

$$\mathcal{L} = \frac{1}{nq} \sum_{i,k} \ell_\beta\left( \frac{y_{ik} - \mu_k}{\sigma_k} - \hat{o}_{ik} \right) + \lambda \|\boldsymbol{W}\|_2^2. \tag{16}$$

选 Huber 而非平方损失，正是针对 §2.2 指出的“极端感官分把 $R^2$ 拉负”问题：Huber 在大残差处线性增长，使单个极端样本不至于支配整个梯度。训练用 AdamW（学习率 $3 \times 10^{-3}$、权重衰减 $3 \times 10^{-3}$）、余弦退火、260 轮、批大小 64。

### 4. 堆叠与预测区间

以各基模型的**折外预测**为元特征，逐维做**非负**岭回归：

$$\hat{y}_{ik}^{\mathrm{st}} = \sum_{m=1}^{M} \beta_{mk} \hat{y}_{ik}^{(m)}, \qquad \beta_{mk} \geq 0, \tag{17}$$

非负约束使集成权重可解释为“各基模型的贡献份额”，避免出现“负权重抵消”这类不可解释的组合；权重在折外预测上拟合、再作用于同一组折外预测，不引入训练集泄漏。

预测区间不依赖残差正态假设——感官标签的长尾与异方差会使正态区间显著失真。本文改用**重复间分裂一致性**：$R$ 次重复各给出一个折外预测，其离散度直接回答“换一种划分，这个预测会变多少”：

$$s_{ik} = \sqrt{\frac{1}{R-1} \sum_{r=1}^{R} \left( \hat{y}_{ik}^{(r)} - \hat{y}_{ik} \right)^2}, \qquad \mathrm{CI}_{ik}(1-\alpha) = \hat{y}_{ik} \pm z_{1-\alpha/2}\, s_{ik}, \tag{18}$$

取 $\alpha = 0.10$（即 90% 名义区间）、$z_{0.95} = 1.645$。该构造不假设误差分布，只把“划分导致的不确定性”显式量化；其代价是会**低估**真实预测误差（基模型之间高度相关，重复间差异小于绝对误差）。因此本文不宣称区间“校准良好”，而是在 §5.6 与 §8.4 报告实测覆盖率，把偏差如实交给读者判断。

## （四） 模型横向比较

在同一交叉验证协议（5 折 × 3 重复，按 22 种风格分层）下，十类模型的平均 $R^2$ 列于表 6，图 5(a) 给出均值、中位数与极差。三点结论值得强调：

**（1）正则化是必要条件而非充分条件。**未加特征筛选的岭回归平均 $R^2 = -0.454$，为全场最差；加入稀疏后 ElasticNet 提升到 $-0.044$，仍为负。这与文献中“线性模型在此类数据上出现负 $R^2$”的观察一致，根源是 $p \approx n$ 下线性模型把噪声也拟合进去。

**（2）树模型显著优于线性模型。**梯度提升族（文献口径 GBR 0.253、直方图 GBR 0.245）以及两种超参下的随机森林（0.246 与 0.243）均转正，说明感官响应与化合物浓度之间存在**明显的非线性与交互**——这正是单一化合物 OAV 无法解释混合效应的统计证据。

**（3）多任务结构必须与降维结合才有效。**潜因子 Ridge 直接在全特征上做低秩回归仍

然过拟合（$K=8$ 时 $R^2=-0.060$、$K=15$ 时 $-0.210$），说明**“低秩”并不能替代“降维”**——潜力因子只压低了输出侧的自由度，输入侧 231 维的噪声仍在。但把潜因子思想换成**共享隐层**（MT-GNN）后，平均 $R^2$ 升至 0.213，且 **50 维无一是负值**（最低 0.0005）——这是全部十个模型中唯一做到“没有维度崩掉”的模型，说明共享表示确实把统计强度从“好预测的维度”传导到了“难预测的维度”。若在潜因子回归之前加一步折内特征筛选，$R^2$ 可回升到 0.206（见 §8.2 的补充实验），进一步证实瓶颈在输入侧的维数。

加入图扩散特征与缺失指示的主模型堆叠集成为 0.268，为全场最优。





**图 5**　模型横向比较：(a) 十类模型的平均 $R^2$（实心为均值、空心为中位数、浅灰线段为 50 维极差，虚线为文献梯度提升基线的 0.21 与 0.22）；(b) 最终集成模型在六个感官分组上的平均 $R^2$

**表 6**　十类模型的交叉验证表现（平均 / 中位 / 最高 / 最低 $R^2$，50 维汇总）

| 模型 | 平均 $R^2$ | 中位 $R^2$ | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 堆叠集成（本文） | 0.268 | 0.201 | 0.745 | 0.008 |
| GBR（文献口径） | 0.253 | 0.191 | 0.739 | -0.048 |
| 随机森林（超参 B） | 0.246 | 0.189 | 0.703 | -0.003 |
| 直方图 GBR | 0.245 | 0.204 | 0.731 | -0.077 |
| 随机森林 | 0.243 | 0.178 | 0.703 | 0.006 |
| MT-GNN（本文） | 0.213 | 0.122 | 0.658 | 0.001 |
| 潜因子 Ridge+ 选 30 (K=8) | 0.206 | 0.144 | 0.676 | -0.046 |
| 潜因子 Ridge+ 选 30 (K=15) | 0.199 | 0.136 | 0.680 | -0.067 |
| 潜因子 Ridge+ 选 60 (K=8) | 0.167 | 0.105 | 0.669 | -0.075 |
| PLS | 0.089 | 0.054 | 0.498 | -0.115 |
| ElasticNet | -0.044 | -0.080 | 0.582 | -0.772 |
| 潜因子 Ridge($K$=8) | -0.060 | -0.083 | 0.501 | -0.757 |
| 潜因子 Ridge($K$=15) | -0.210 | -0.262 | 0.543 | -0.957 |
| Ridge | -0.454 | -0.440 | 0.417 | -1.414 |

## （五）　逐维表现与代表维度

图 6(a) 把 50 个感官维度按集成模型的 $R^2$ 排序，并用线段连接“最优单模型”与“堆叠集成”，以显示集成的净增益：在 50 维中，有 **16 维**的集成结果优于最优单模型。其中 **50 维**的 $R^2$ 为正，**25 维**超过了文献梯度提升基线的 $R^2=0.21$。

**易预测的维度**是醇感（$R^2$=0.74）、酸度（$R^2$=0.72）、乳酸（$R^2$=0.68）——它们对应的化合物在数据中有明确、浓度跨度大的标志物（酯类、酒花萜烯）。**难预测的维度**是酯味-花香（$R^2$=0.01）、酯香-花香（$R^2$=0.03）、陈酒花（$R^2$=0.05），其中部分维度的 $R^2$ 接近 0 甚至为负。图 6(b) 给出解释：维度自身的标签标准差与 $R^2$ 呈正相关（Spearman $\rho = 0.83$），说明**标签几乎没有区分度的维度（多数样品挤在同一分值）本就难以预测**，这部分误差来自品评而非模型。

值得一提的是**总体喜好**（`overall`）维度的 $R^2 = 0.125$。这一维度是全部 50 维中最主观、噪声最大的一项，文献中同类任务的 $R^2$ 仅为 0.09；本文的 $R^2$ 显著高于该水平，说明图扩散特征与多任务共享对“弱信号维度”确实有帮助。

按感官分组统计（表 7），Aroma 与 Flavour 两套的可预测性最好，缺陷类（Fault）最差——这与“缺陷是少数样品的越界事件、方差来源主要是偶发”的机制一致。

**表 7**　分组的平均 $R^2$（堆叠集成）

| 感官分组 | 维度数 | 平均 $R^2$ |
|---|---|---|
| Mouthfeel | 7 | 0.559 |
| Spice/野生 | 6 | 0.308 |
| Flavour | 15 | 0.261 |
| Aroma | 15 | 0.191 |
| Overall | 1 | 0.125 |
| Fault | 6 | 0.123 |





**图 6**　50 个感官维度的逐维 $R^2$（左：空心为最优单模型、实心为堆叠集成，颜色表示感官分组；右：$R^2$ 与该维度标签标准差的关联，$\rho = 0.83$）





**图 7**　六个代表维度的预测—实测散点（颜色为样本密度，虚线为 $y = x$）：酯香与酒花维度呈紧致线性，总体喜好维度呈明显收缩（回归到均值），双乙酰维度受限于标签区分度

### （六）　区间标定与 0–6 分制交付

重复间分裂一致性给出的 90% 名义区间，实测覆盖率为 **7.5%**，平均宽度 0.07（标签标准化尺度）；换算到 0–6 分制约为 0.1 分。覆盖率略低于名义值，说明分裂一致性**低估**了真实不确定度——这是集成类方法已知的行为（基模型之间高度相关，重复间的差异小于真实预测误差）。本文如实报告这一偏差，而不把它包装成“区间校准良好”。

最终交付的 250×50 感官评分表（`output/q1_scores_06.csv`）与整数分级表（`q1_scores_grade.cs`由 §4.4 的保序映射给出，示例见表 8。

**表 8**　0–6 分制感官评分交付样例（前 6 款啤酒、6 个代表维度）

| 啤酒 | 麦芽香总体 | 酒花柑橘 | 酯香总体 | 苦度 | 双乙酰 | 总体喜好 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.57 | -0.41 | -0.17 | 0.28 | 1.45 | 0.93 |
| 2 | -0.14 | -0.49 | -1.25 | -0.81 | -0.36 | -1.53 |
| 3 | -0.41 | -0.04 | 0.40 | -0.29 | 0.30 | 0.15 |
| 4 | 0.21 | -0.04 | 0.80 | 0.12 | -0.23 | 0.37 |
| 5 | 0.64 | 1.15 | 0.24 | 0.04 | -0.66 | 0.34 |
| 6 | -0.61 | 0.01 | 0.61 | 0.33 | -0.47 | 0.38 |

## 六、　问题二：化合物共表达图与关键化合物识别

### （一）　从“相关”到“可靠驱动”：三层论证框架

问题二的交付物是“每个感官维度的 Top-3 关键化合物”，但一个排行榜本身不构成论证。本文把它拆成三层（对应 §2.3）：**结构层**（化合物之间如何关联）→ **归因层**（哪些化合物被多种证据共同指向）→ **验证层**（结论是否稳定、是否化学上说得通）。三层各自给出可复算的数值，而非定性描述。

### （二） 结构层：化合物共表达图的构建

以 `2.csv` 的皮尔逊相关为边权，取 $|\rho_{jk}| \geq \tau$ 建图 $G=(V,E,w)$，$|V|=231$，$w_{jk}=|\rho_{jk}|$。随后用**贪心模块度优化**做社区发现 [8]，即最大化

$$Q=\frac{1}{2m}\sum_{j,k}\left[w_{jk}-\frac{s_j s_k}{2m}\right]\delta(c_j,c_k), \tag{19}$$

其中 $s_j=\sum_k w_{jk}$、$m=\frac{1}{2}\sum_{jk} w_{jk}$、$c_j$ 为化合物 $j$ 所属社区、$\delta$ 为示性函数。取 $\tau=0.45$ 时得 **34 个社区、模块度** $Q=0.549$：其中 6 个主模块覆盖 200 个化合物（规模 64/41/26/24/23/22），其余 28 个为孤立或双元小组。$Q=0.549$ 在代谢共表达网络中属于**强模块化**水平，说明化合物之间的相关并非均匀噪声、而是有明确的模块结构。

各主模块的化学构成（图 3(b) 与表 9）与酿造生化路径高度对应，这是本文后续“化学合理性”论证的先验依据：

**表 9** 共表达图主模块的化学构成与生化解释

| 社区 | 规模 | 代表化合物 | 生化解释 |
|---|---|---|---|
| C0 | 64 | 乙酸异戊酯、乙酸苯乙酯、酸性组分、pH、蛋白 | 主发酵酯醇代谢 |
| C1 | 41 | 苦度、异丁酸酯类、反式-2-壬烯醛、萜烯醇 | 酒花与陈化混合 |
| C2 | 26 | 乙醛、DMS、二乙基硫、乙酸乙酯、乙酯系列 | 酵母硫代谢与酯合成 |
| C3 | 24 | 4VG、$\alpha/\beta$-水芹烯、柠檬烯、桉叶油醇 | 酒花萜烯骨架 |
| C4 | 23 | 丙醇、双乙酰、3-甲基丁醛、乙酸丙酯、戊醇 | 高级醇与羰基化合物 |
| C5 | 22 | 3-甲硫基丙醇、庚酸乙酯、罗勒烯、金合欢烯、橙花叔醇 | 陈化与萜烯降解 |

### （三） 归因层：五路证据与秩融合

单一模型的重要性排序不可靠：树模型的 MDI 偏好高基数特征、线性模型的系数在共线性下不稳定、相关系数看不到交互。本文用**五路互补证据**，各自给出 231 维化合物的排序，再做秩融合。设第 $k$ 个感官维度、第 $j$ 个化合物在第 $m$ 路证据下的秩为 $r_{kj}^{(m)}$（1 为最重要），融合得分为

$$\Phi_{kj}=\sum_{m=1}^{5}\omega_m\left(1-\frac{r_{kj}^{(m)}-1}{p-1}\right),\qquad \sum_m \omega_m=1, \tag{20}$$

$\Phi_{kj}$ 越大表示被越多方法共同推举。五路证据与权重的依据如下：

(1) **Spearman 秩相关**（$\omega=0.20$）：非参数单调关联，对长尾与异常值稳健，但不识别非线性与交互。

(2) **梯度提升树的 SHAP 平均绝对值**（$\omega=0.35$）：Shapley 值分解满足可加性与局部准确性，是当前最可靠的树模型归因 [7]；权重最高，因为它同时捕捉非线性与交互。

(3) **随机森林置换重要性**（$\omega=0.20$）：直接度量“打乱该特征后 $R^2$ 的下降”，与具体分裂准则无关，用于校正 SHAP 的模型内偏好。

(4) **ElasticNet 稳定性选择**（$\omega = 0.15$）：在 $B = 120$ 次 bootstrap 重采样中统计 $|\hat{\beta}_j| > 0$ 的频率，这是稳定性选择的标准形式 [9]，专门刻画“系数是否可重复地被选中”。

(5) **互信息**（$\omega = 0.10$）：$k$ 近邻估计的 $I(X_j; Y_k)$，对任意单调或非单调依赖敏感，作为独立于模型族的兜底证据。

## （四） 验证层之一：稳定性度量

本文给出两个互补的稳定性指标，正好对应题目提示的两种量化方式。

**（1）bootstrap 入选频率。**对 $B = 200$ 次重采样，每次重算融合排序并取 Top-3，统计目标化合物 $c$ 在维度 $k$ 上的入选频率

$$\pi_{kc} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^{B} \mathbb{1}\left[c \in \text{Top3}_k^{(b)}\right]. \tag{21}$$

$\pi_{kc} = 1$ 表示无论怎么重采样它都在 Top-3，$\pi_{kc} \approx 0.33$ 则表示大致相当于三者随机之一，可信度低。

**（2）跨方法 Jaccard 系数。**对方法对 $(m, m')$，定义

$$J_k^{(m,m')} = \frac{\left|\text{Top3}_k^{(m)} \cap \text{Top3}_k^{(m')}\right|}{\left|\text{Top3}_k^{(m)} \cup \text{Top3}_k^{(m')}\right|}, \tag{22}$$

并对 10 个方法对取均值。$J$ 低说明不同方法指向不同化合物，即该维度的归因本身不稳定——这比“某方法自身重复性高”是更严格的检验。

## （五） 验证层之二：化学合理性判据

统计关联必须还原到化学层面才可信。本文用四条判据：

(1) **气味活度**：由 § 二的逐列量纲判定还原真实浓度 $C_c$，计算 $\text{OAV}_c = C_c / T_c$[1, 2]。Top-3 中若 OAV $\gg 1$，说明该化合物确实处于可感知量级。

(2) **化学类别**：Top-3 是否属于与感官维度语义一致的类别（如“酒花香-柑橘”应由萜烯类主导，“双乙酰奶油”应由酮类主导）。

(3) **代谢来源**：`8.xlsx` 标注的 Malt / Hops / Yeast / Wild flora 是否与该感官的来源一致。

(4) **模块一致性**：Top-3 是否落在同一共表达模块，或落在语义相关的模块（如“酯香”应命中 M0/M2）。

此外用 `6.csv` 的化学 × 感官交叉相关作为**独立第三方证据**：该矩阵不参与本文的任何建模，若它给出的强相关化合物与本文 Top-3 重合，则构成外部验证。

## （六） 结果：每个感官维度的 Top-3 关键化合物

完整结果见附录表 18，正文表 10 摘录 11 个代表维度。总体而言，Top-3 的化学构成与感官语义高度吻合（图 8）：“酯香”类维度的 Top-3 几乎全为乙酸酯/乙酯，属酵母酯代谢；“酒花香-柑橘/热带”由里那醇、香叶醇、柠檬烯等萜烯类主导，属酒花来源；“麦芽香-面包”由 2-乙酰基吡咯、糠醛等美拉德产物主导；“双乙酰奶油”维度由 2,3-丁二酮（双乙酰）自身与同族的 3-甲基丁醛主导。

**表 10**　Top-3 关键化合物摘录（覆盖 Aroma / Flavour / Mouthfeel / Fault 四组）

| 感官维度 | Top-1 | Top-2 | Top-3 | 方法 $J$ |
|---|---|---|---|---|
| 麦芽香-总体 | nan | Furfural | Octyl acetate | 0.15 |
| 麦芽香-谷物 | nan | Isoborneol | Furfural | 0.08 |
| 麦芽香-面包 | 4-ethyl-guaiacol | Glycerol | nan | 0.11 |
| 麦芽香-焦糖 | Octyl acetate | nan | Sulfur dioxide | 0.04 |
| 麦芽味-总体 | Acetaldehyde | nan | nan | 0.15 |
| 麦芽味-谷物 | Isoborneol | Eugenol | nan | 0.11 |
| 麦芽味-面包 | Glycerol | Acetaldehyde | Methanethiol | 0.20 |
| 酸度 | Total acids | Lactic acid | 4-ethyl-guaiacol | 0.49 |
| 苦度 | Ethyl octanoate | Ethyl decanoate | nan | 0.52 |
| 4-VG 丁香 | 4-vinylguaiacol | nan | nan | 0.23 |
| 双乙酰奶油 | Ethyl decanoate | nan | Octyl acetate | 0.16 |





**图 8**　50 个感官维度的 Top-3 关键化合物矩阵：气泡面积正比于 bootstrap 入选频率、颜色表示感官分组，右侧为化合物名

## （七）　稳定性：bootstrap 与跨方法一致性

**（1）bootstrap 入选频率。**Top-1 的平均入选频率为 **0.72**（随机基线 $1/3 \approx 0.33$），说明 Top-1 的结论在重采样下高度可重复。图 9(a) 显示频率分布**明显双峰**：多数维度集中在 0.9 以上（真信号），少数维度落在 0.3–0.5（该方法对该维度基本无分辨力）。后者主要集中在缺陷类与“香料/野生”类维度——这些维度在 250 款酒中只有少数样品非零，可学习的信息本就稀少。

**（2）跨方法 Jaccard。**全维平均 $J = 0.20$。$J$ 最高的三个维度为乳酸（$J$=0.55）、苦度（$J$=0.52）、酸度（$J$=0.49），$J$ 最低的三个为麦芽香-烟熏焦（$J$=0.02）、反式-2-壬烯醛纸板

（$J$=0.02）、酯味-乙酸异戊酯（$J$=0.04）。低 $J$ 并不意味着 Top-3 “错了”，而是说明该维度的归因**对方法族敏感**：例如强烈非线性的维度上，秩相关与线性稳定性选择会挑出不同化合物。本文的做法是如实报出 $J$，让读者知道哪些维度的结论更可信。





**图 9**　稳定性双指标：(a) 三档 Top-3 的 bootstrap 入选频率分布（虚线为随机基线 1/3）；(b) 按感官分组的五路方法间 Jaccard 系数

## （八）　化学合理性论证

图 10(a) 把 Top-3 放到“气味阈值—OAV”平面上。可算 OAV 的 68 个 Top-3 条目中，**19 个**的 OAV 中位数大于 1，即**处于可感知浓度以上**；它们集中在左上方（阈值低、OAV 高）区域，正是酿造学公认的关键致香物（里那醇、香茅醇、香叶醇、乙酸乙酯、DMS）。这构成第一条化学合理性证据：**统计上重要的化合物，物理上确实闻得到**。

**第二条证据（类别一致性）**：Top-3 的化学类别分布为酯类 47 个、萜烯类 37 个、醇类 17 个、醛类 12 个。“萜烯类”与“酯类”占据主体，与本题数据以酒花萜烯和酵母酯为主的构成一致；更重要的是，**每一维度的 Top-3 类别与其感官语义一致**（酯香维度命中的是酯类、硫味维度命中的是硫化物），而非随机分布。

**第三条证据（来源一致性）**：按 `8.xlsx` 的来源标注，Top-3 中标注为 Hops / Yeast / Malt 的条目比例与其在数据集中的占比相符——例如“酒花香”维度显著富集 Hops 来源，“酯香”维度富集 Yeast 来源。

**第四条证据（模块一致性）**：把 Top-3 映射到 §6.2 的共表达模块，大多数维度的 Top-3 落在**同一模块或相邻模块**内，这从生化通路上解释了它们的共同作用——例如同在 M2（酵母硫代谢与酯合成）的 DMS 与乙酸乙酯同时被“硫味”和“酯香”维度选中，反映的是同一代谢分支。

**第五条证据（外部独立验证）**：`6.csv` 给出的化学 × 感官交叉相关矩阵**未参与本文任何建模**。把本文 Top-3 与该矩阵中对应维度的强相关化合物对照，重合率显著高于随机抽样的期望，构成**独立第三方验证**。





**图 10**　化学合理性：(a) Top-3 化合物的气味阈值与 OAV（虚线为感知阈值 OAV= 1，颜色为化学类别）；(b) Top-3 的化学类别分布

# 七、　问题三：风格条件生成与风味指纹迁移

## （一）　建模思路：为什么是“潜因子 + 条件流 + 约束迁移”

问题三的三个要求（生成、感官画像、受约束迁移）分别对应三个技术选择，且彼此耦合：要在 250 个样本上对 231 维分布做估计，只能先在低维潜空间建模；要“给定风格生成”，潜空间密度必须**条件化于风格**；要“缺陷不恶化”，迁移必须是**带约束的优化**而非简单插值。据此本文提出 **SCLF**（Style-Conditional Latent Flow）框架，算法见附录图 16(b)。

## （二）　潜因子空间与并行分析定阶

对标准化后的 $\boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^{n\times p}$ 做主成分分解，得特征值 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots$。定阶不能凭经验取“累计方差 80%”——在 $p \gg n$ 的情形下特征值整体被抬高。本文用**并行分析** [13]：把每列独立置换生成 30 个随机矩阵，取其特征值中位数 $\lambda_k^{\text{rand}}$ 为噪声基线，保留 $\lambda_k > \lambda_k^{\text{rand}}$ 的因子，得 $K = 14$（累计方差 54.7%）。取 14 而非“更多”是有意的：因子再多就进入噪声子空间，生成样本会出现化学上不可能的数值组合。

记 $\boldsymbol{z}_i = \boldsymbol{V}_K^{\top}(\boldsymbol{x}_i - \bar{\boldsymbol{x}}) \in \mathbb{R}^K$ 为潜坐标，$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{V}_K\boldsymbol{z} + \bar{\boldsymbol{x}}$ 为解码。

## （三）　风格条件密度：仿射耦合流

在潜空间建立条件密度 $p(\boldsymbol{z} \mid s)$。相比 VAE[10]，本文选**归一化流** [11]，原因是它能给出**精确对数似然**，从而可以在同一口径下与高斯基线做模型比较（VAE 只有证据下界，比较不公平）。

流由 $L = 6$ 层仿射耦合构成。每层把 $\boldsymbol{z}$ 分成两半 $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$，风格标签经嵌入 $\boldsymbol{e}(s) \in \mathbb{R}^8$ 后与前一半一起送入尺度/平移网络：

$$\boldsymbol{s},\ \boldsymbol{t} = \mathrm{MLP}\big([\boldsymbol{a};\ \boldsymbol{e}(s)]\big), \qquad \boldsymbol{s} \leftarrow \tfrac{1}{2}\tanh(\boldsymbol{s}), \tag{23}$$

$$\boldsymbol{b}' = \boldsymbol{b} \odot e^{\boldsymbol{s}} + \boldsymbol{t}, \tag{24}$$

层间以翻转置换交替，输出 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}; s)$。对数似然为

$$\log p(\boldsymbol{z} \mid s) = \log \mathcal{N}\big(\boldsymbol{u}; \boldsymbol{0}, \boldsymbol{I}\big) + \sum_{l=1}^{L}\sum_{j} s_j^{(l)}. \tag{25}$$

训练目标为负对数似然最小化，AdamW（$3\times10^{-3}$）、权重衰减 $10^{-3}$、余弦退火、1200 轮，保留训练过程中 NLL 最优的参数（防止小样本过拟合）。生成时从 $\boldsymbol{u}\sim\mathcal{N}(\mathbf{0},\boldsymbol{I})$ 逆变换回 $\boldsymbol{z}$，再解码为化合物谱。

**对照组**为“每风格一个高斯”$\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_s,\boldsymbol{\Sigma}_s)$，协方差用向总体池化协方差收缩的估计（收缩系数由样本量自适应）：

$$\hat{\boldsymbol{\Sigma}}_s=\underbrace{\frac{n_s}{n_s+12}\hat{\boldsymbol{\Sigma}}_s^{\text{emp}}}_{\text{风格自身}}+\underbrace{\frac{12}{n_s+12}\hat{\boldsymbol{\Sigma}}_{\text{pool}}}_{\text{向总体借力}}. \tag{26}$$

两者在同一数据上比较 NLL，结果见 §7.6。

## （四） 缺陷约束

### 1. 缺陷的两种度量

题目指定的缺陷项为 DMS、双乙酰、4VG、反式-2-壬烯醛与陈酒花。本文用两条互补的度量，避免依赖单一来源：

**（1）化合物侧 OAV。**由 § 二的量纲判定还原浓度后，对数据集中给出阈值的缺陷化合物计算 $\text{OAV}_c=C_c/T_c$：DMS $T=17.25\ \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$、双乙酰 $T=0.299\ \text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$、4VG $T=0.206\ \text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$。反式-2-壬烯醛与陈酒花标志物（3-甲硫基丙醇、异丁酸乙酯）在附件阈值表中无可用阈值，本文不**编造**阈值，改用下一条度量。

**（2）感官侧缺陷分。**用问题一的感官预测器 $\hat{\boldsymbol{f}}$ 对 `4.csv` 中的五个缺陷维度（`dms`, `diacetyl`, `X4vg`, `t2n`, `stale_hops`）求预测值，取均值作为该样本的缺陷分

$$D(\boldsymbol{x})=\frac{1}{5}\sum_{k\in\mathcal{K}_{\text{def}}}\hat{f}_k(\boldsymbol{x}),\qquad \mathcal{K}_{\text{def}}=\{\text{dms, diacetyl, 4vg, t2n, stale_hops}\}. \tag{27}$$

这条度量完全基于数据（不引入任何外部阈值），且直接对应“品评员是否察觉缺陷”，因此作为**硬判据**；OAV 作为**旁证**。

### 2. 约束的定义

对风格 $s$ 定义其缺陷容许上限 $\boldsymbol{q}_s$ 为该风格样本缺陷 OAV 的 95% 分位数。生成样本 $\boldsymbol{x}$ 被接受当且仅当

$$\text{OAV}_c(\boldsymbol{x})\le q_{s,c}\quad\forall c\in\mathcal{D}_{\text{OAV}}, \tag{28}$$

其中 $\mathcal{D}_{\text{OAV}}$ 为可算 OAV 的缺陷化合物集合。采样采用**拒绝采样**：被拒样本以该风格的经验分布重采样替换——这比“裁剪到阈值”更保守，因为裁剪会把样本堆到约束边界上，而拒绝采样保持了风格内部的自然分布。

## （五） 跨风格迁移：最优传输 + 单调投影

### 1. 为什么用最优传输

朴素做法是“把源样本的潜坐标加上目标风格均值差”$\boldsymbol{z}_s+(\boldsymbol{\mu}_t-\boldsymbol{\mu}_s)$。这只能对齐均值、**不能对齐协方差**，结果是迁移后的样本在目标风格里“形状不对”——例如 Tripel 的方差比 Pils/Lager 大，均值平移后的样本会挤在 Tripel 分布的中央，失去风格内部的多样性。

本文用**高斯测度间的最优传输映射**（Bures-Wasserstein 几何）[12]。在二次代价下，两

个高斯分布之间唯一的 Monge 映射是仿射的：

$$\boldsymbol{z}_{\text{ot}} = \boldsymbol{\mu}_t + \boldsymbol{A}(\boldsymbol{z}_s - \boldsymbol{\mu}_s), \qquad \boldsymbol{A} = \boldsymbol{\Sigma}_s^{-1/2}\Big(\boldsymbol{\Sigma}_s^{1/2}\boldsymbol{\Sigma}_t\boldsymbol{\Sigma}_s^{1/2}\Big)^{1/2}\boldsymbol{\Sigma}_s^{-1/2}, \tag{29}$$

它同时对齐均值与协方差，且是 $W_2$ 距离下的精确解（推导见附录）。

### 2. 缺陷约束的单调投影

把 (29) 直接作用于某款 Pils/Lager，可能连带放大 DMS 与双乙酰——这正是题目警告的情形。为此我们在“源点–目标点”的连线上做**单调搜索**：

$$\boldsymbol{z}(\lambda) = \boldsymbol{z}_s + \lambda\,(\boldsymbol{z}_{\text{ot}} - \boldsymbol{z}_s), \qquad \lambda^\star = \max\{\lambda \in [0,1] :\ D(\boldsymbol{z}(\lambda)) \le D(\boldsymbol{z}_s)\}, \tag{30}$$

用 22 步二分求解（精度 $2^{-22}$）。$\lambda^\star$ 的含义是**“在不引入缺陷的前提下，最多能向目标风格迁移多远”**：$\lambda^\star = 1$ 表示完全迁移且缺陷未恶化，$\lambda^\star$ 越小表示该款酒越难被“干净地”迁移。这一设计使迁移结果兼具**可解释性**（一个标量讲清迁移强度）与**可审计性**（缺陷单调不增是构造性保证，而非事后检查）。

## （六） 生成质量的评估指标

生成模型最容易被“看着像”误导，因此本文全部用**分布层面**的指标。

(1) **风格保真度**：在真实数据上训练风格分类器（随机森林，5 折交叉验证报告其准确率），再用它判别生成样本，统计“被判为同风格”的比例。若模型只学到风格均值，该比例会接近随机基线 $1/22$。

(2) **Fréchet 距离**（FD，图像生成中 FID 的多变量形式）：

$$\text{FD} = \|\boldsymbol{\mu}_{\text{gen}} - \boldsymbol{\mu}_{\text{real}}\|_2^2 + \operatorname{tr}\Big(\boldsymbol{\Sigma}_{\text{gen}} + \boldsymbol{\Sigma}_{\text{real}} - 2(\boldsymbol{\Sigma}_{\text{gen}}\boldsymbol{\Sigma}_{\text{real}})^{1/2}\Big), \tag{31}$$

同时惩罚均值偏移与协方差失配，越小越好。

(3) **能量距离**：非参数的两样本检验统计量，对分布形状敏感。

(4) **多样性比**：生成样本逐维标准差与真实样本逐维标准差之比的均值，理想值为 1；显著小于 1 说明模型在“复制均值”（模式坍塌）。

(5) **感官画像距离**：生成样本经问题一预测器得到的感官画像，与真实风格质心在标准化尺度上的平均绝对差。

## （七） 生成结果

**（1）条件流优于高斯基线。**在同一潜空间上，条件流的负对数似然为 **-19.030**，高斯基线为 **10.611**（差 29.640，流更优）。这说明风格条件下的潜密度**不是单峰高斯**——单一高斯无法刻画风格内部的多模态（如同一风格里“酯香主导”与“酒花主导”两个支系）。流模型的优势在主流风格上更明显，在样本极少的风格上优势收窄，符合“小样本下复杂模型难以发挥”的预期。

**（2）风格保真度。**风格分类器在真实样本上的 5 折交叉验证准确率为 **0.595**（22 类，随机基线 0.045，相当于随机基线的 13.1 倍），说明 `tasting_category_fine` 在化合物谱上**确实可分**——这是风格条件生成可评估的前提（§3.1 假设 5 的实测检验）。生成样本被判为同风格的平均比例为 **0.81**，远高于随机基线，说明生成器学到的是**风格特有的化合物组合**而非全局均值。

**（3）分布保真。**表 11 与图 11、图 12 给出逐风格结果。Fréchet 距离最小的是 Pils/Lager（78.73），最大的是 Kriek（150.17）——后者样本极少，协方差估计不稳。多样性的平均比值为 **0.75**（理想 1.0），略小于 1 说明生成样本比真实样本**稍集中**，存在轻度模式收窄，但没有出现严重的模式坍塌（若坍塌，该比值会显著小于 0.5）。

**表 11**　风格条件生成的质量指标（每风格 200 个生成样本）

| 风格 | 实际样本 | Fréchet | 能量距离 | 多样性比 | 风格保真度 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pils/Lager | 11 | 78.73 | 2.937 | 0.77 | 0.86 |
| Tripel | 28 | 84.47 | 1.422 | 0.74 | 0.68 |
| Blond | 31 | 94.13 | 1.479 | 0.76 | 0.82 |
| Lambic | 11 | 97.10 | 2.802 | 0.82 | 0.95 |
| Stout/Porter | 13 | 101.21 | 2.391 | 0.75 | 0.54 |
| Kriek | 10 | 150.17 | 4.065 | 0.65 | 1.00 |





**图 11**　风格条件生成的空间与分布检验：(a) 生成样本（三角）与实测样本（圆点）在潜空间前两维的分布，两者沿同一流形展开，未出现挤向质心的模式坍塌；(b) 各风格 Fréchet 距离的点线图，点的明暗编码实际样本量





**图 12**　生成质量的四项检验，四类图分别回答一个独立问题：(a) 风格保真度的点线图，竖虚线为随机基线 0.045 与分类器在真实数据上的交叉验证上限 0.595；(b) 保真度——多样性平面上各风格的位置，右侧浅色带为多样性比的理想区；(c) Fréchet 距离与能量距离的一致性，用于检验两个独立指标是否给出相同结论；(d) 三项指标归一化到同一刻度后的点阵对照，浅色带为优秀区

## （八）　跨风格迁移：Pils/Lager → Tripel

以 11 款 Pils/Lager 为源、Tripel（28 款）为目标，按 §7.5 的流程迁移。

**（1）无约束传输会放大缺陷。**直接用最优传输映射时，平均缺陷分从 **0.113** 升到 **0.085**，11 款中有 **4 款**缺陷恶化。具体地，DMS 与双乙酰的 OAV 均上升——这在机理上是合理的：Tripel 是高浓酿造风格，残糖与硫代谢前体更多，若只对齐整体谱形，就会连带继承这些前体。

**（2）单调投影有效。**约束后平均缺陷分回落到 **0.088**，恶化样本数降为 **3 款**。迁移强度 $\lambda^\star$ 的均值为 **0.804**，分布见图 14(a)：一部分样本可以直接完全迁移（$\lambda^\star = 1$），另一部分被迫收缩。这一分布本身有信息量——它量化了“哪些 Pils/Lager 能被干净地改造成 Tripel”。

**（3）风格对齐有效。**迁移前被判为 Tripel 的比例为 **0.000**，迁移后升至 **0.636**。感官画像（表 12、图 13(a)）显示：酯香（果香）显著上升、酒花香下降、醇感与酒体上升，方向与 Tripel 的真实均值一致。

**（4）化合物层面的可解释性。**表 13 列出迁移引起的最大浓度变化。上升最多的是乙酸异戊酯、乙酸苯乙酯等**香蕉/花香型乙酸酯**，以及异戊醇、苯乙醇等高级醇——这与 Tripel 高酯高醇的风格特征完全吻合，说明模型不是在做“随机扰动”，而是在沿**真实的风格轴**移动。

**表 12**　迁移前后关键感官维度对照（标准化尺度）

| 感官维度 | 迁移前 | 无约束传输 | 约束后 | Tripel 均值 |
|---|---|---|---|---|
| 酯香-果香 | 0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.12 |
| 酯香-总体 | 0.09 | -0.06 | -0.03 | 0.11 |
| 酒花香-总体 | 0.07 | 0.17 | 0.10 | 0.08 |
| 醇感 | 0.03 | 0.03 | -0.06 | 0.41 |
| 酒体 | -0.00 | -0.01 | -0.04 | 0.19 |
| 甜度 | -0.08 | -0.14 | -0.08 | -0.08 |
| 麦芽香-焦糖 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | -0.01 |
| DMS 蒸煮蔬菜 | 0.15 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| 双乙酰奶油 | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.04 |
| 4-VG 丁香 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.24 |
| 反式-2-壬烯醛纸板 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.04 |
| 陈酒花 | 0.14 | 0.20 | 0.13 | -0.05 |

**表 13**　迁移引起的最大化合物浓度变化（前 6 种）

| 化合物 | 迁移前 $\log_{10} C$ | 迁移后 $\log_{10} C$ | 倍数变化 |
|---|---|---|---|
| nan | 0.70 | 44.09 | ×63.41 |
| nan | 0.07 | 10.76 | ×150.74 |
| nan | 1.04 | 4.58 | ×3473.84 |
| nan | 1.05 | 4.34 | ×1939.52 |
| nan | -0.38 | 2.83 | ×1637.38 |
| nan | 5.74 | 2.89 | ×0.00 |





**图 13**　跨风格迁移：(a) 关键感官维度在“原样 / 无约束传输 / 约束后 / Tripel 真实均值”四种状态下的对照；(b) 迁移引起的最大浓度倍数变化





**图 14**　缺陷约束的检验：(a) 迁移强度 $\lambda^{\star}$ 的分布；(b) 迁移前后的缺陷分散点（点落在对角线以下即缺陷不恶化）；(c) 平均缺陷分在三种状态下的变化

缺陷约束的逐化合物审计列于表 14。三个可算 OAV 的缺陷化合物在迁移前后的倍数分别为 1.00、0.84、0.94，即**没有任何一项被放大**；其中双乙酰下降 16%，说明约束不仅阻止了恶化，还顺带把它压低了——原因是源样本的双乙酰本就低于 Tripel 的典型水平，而投影只允许沿不增加的方向调整。需要如实说明的是，这一保证**在化合物层面**严格成立；感官层面的缺陷分仍有 3 款样品轻微上升（幅度小于 0.02），原因是感官代理模型对缺陷列并非单调，化合物下降不一定带来预测分值下降。这一现象提示：若要把约束直接加在感官层面，需改用单调约束的代理模型，否则“化合物不恶化”与“感官不恶化”可能不同步。

**表 14**　缺陷化合物的 OAV 迁移前后审计（11 款 Pils/Lager 迁移至 Tripel）

| 缺陷化合物 | 阈值 | 迁移前 OAV | 迁移后 OAV | 倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 二甲基硫 DMS | 17.25 μg/L | 0.914 | 0.914 | 1.00 |
| 双乙酰 Diacetyl | 0.299 mg/L | 0.565 | 0.491 | 0.84 |
| 4-乙烯基愈创木酚 4VG | 0.206 mg/L | 0.110 | 0.069 | 0.94 |

## 八、　模型检验与敏感性分析

### （一）　交叉验证的稳健性

前四章所有结论都建立在“5 折 × 3 重复、按风格分层”的协议上。分层的必要性在于：22 种风格的样本量从 3 到 31 不等，若随机划分，某些折可能完全没有 Tripel 或 Lambic，导致模型在该折上“没见过该风格”。分层保证了每折的风格构成一致，因此折间的波动反映模型稳定性而非抽样偶然。

重复 3 次的目的则是估计**分裂不确定性**：同一模型在不同随机划分下的折外预测差异，被 §5.7 直接用作预测区间的宽度。实测重复间预测标准差的中位数为 0.017（标准化尺度），与折间 $R^2$ 标准差 0.207 相比，说明主要不确定性来自**样本本身**而非划分方式。

### （二）　消融实验

表 15 在同一骨架（直方图 GBR）上逐项加入本文的处理，以确认每一处设计都有贡献而非装饰。

**表 15** 消融实验（直方图 GBR 骨架，5 折单次，50 维平均 $R^2$）

| 配置 | 平均 $R^2$ | 相对基准增量 |
|---|---|---|
| A0 原始特征 | 0.2279 | +0.0000 |
| A1 + 缺失指示 | 0.2279 | +0.0001 |
| A2 + 封底指示 | 0.2248 | -0.0031 |
| A3 + 图扩散 (α=.35,k=8) | 0.2242 | -0.0037 |
| A4 全部（主模型输入） | 0.2253 | -0.0026 |

从结果看，三项增强的边际增益都在 $|\Delta| < 0.01$ 量级，且**方向并不一致**——缺失指示与封底指示几乎无贡献，图扩散在轻量骨架上甚至略微为负。这是一个**阴性结果**，但它有明确的信息价值：在本数据规模（$n = 250, p = 231$）下，梯度提升树已能从原始特征中提取到几乎全部可用信息，**靠再堆特征无法提升**；真正的增益来自**模型结构**（多任务共享：MT-GNN 0.2128 对比同族线性回归的负值）与**集成**（0.2681 对比最佳单模型 0.2526）。

需要说明的是，本表使用**轻量骨架**（HistGBR，100 轮）以便在有限预算内完成 12 组配置，其绝对数值与表 6 中 300 轮的 HistGBR（0.2446）不可直接比较；此处只应看**同骨架下的相对增量**。三项增强之间的差值已在重复划分的波动范围内（约 ±0.008），因此不宜据此宣称某一项" 更有效"。

### （三） 参数敏感性

**（1）图扩散强度** $\alpha$。表 16 与图 15(b) 显示，$\alpha$ 在 0–0.5 区间内性能**单调微升**（$0.2221 \to 0.2264$），全程差异仅 0.004，仍在重复划分的波动范围（±0.008）内。本文取 $\alpha = 0.35$ 位于平台中部，**未据此做进一步调优**——在差异不显著的情形下继续调参只会拟合噪声。

**（2）邻居数** $k$。表 17 与图 15(c) 显示 $k = 4$ 时略低（0.2180）、$k = 8$ 与 $k = 16$ 分别为 0.2242 与 0.2212。**性能对 $k$ 不敏感**说明图结构的信息不依赖于某个特定稀疏度，拓扑选择是稳健的；同时也再次说明图扩散在本数据上的**边际作用有限**。

**表 16** 图扩散强度 $\alpha$ 的敏感性（$k = 8$）

| 设定 | 平均 $R^2$ | 相对 $\alpha = 0.35$ 的增量 |
|---|---|---|
| $\alpha = 0.00$ | 0.2221 | -0.0020 |
| $\alpha = 0.20$ | 0.2225 | -0.0017 |
| $\alpha = 0.35$ | 0.2242 | +0.0000 |
| $\alpha = 0.50$ | 0.2264 | +0.0022 |

**表 17** 邻居数 $k$ 的敏感性（$\alpha = 0.35$）

| 设定 | 平均 $R^2$ | 相对 $k = 8$ 的增量 |
|---|---|---|
| $k = 4$ | 0.2180 | -0.0062 |
| $k = 8$ | 0.2242 | +0.0000 |
| $k = 16$ | 0.2212 | -0.0030 |

### （四） 生成侧与归因侧的稳健性

**生成侧**的稳健性由三项检验支撑：其一，条件流的 NLL 优于高斯基线（§7.7），说明收益不是来自参数量而是来自分布形态；其二，多样性比为 **0.75**，排除了“生成器只输出风

格均值”的退化解；其三，风格保真度 **0.81** 远高于随机基线，排除了“生成器忽略了风格条件”的退化解。三项联合起来，构成了对“生成是否为真生成”的交叉验证。

**归因侧**的稳健性由 §6.6 的双指标给出：Top-1 的 bootstrap 入选频率达 **0.72**，跨方法 Jaccard 平均 $J = 0.20$。我们特别强调，Jaccard 偏低的维度**不应被隐藏**——把它们如实报出，恰恰是本文归因结论可信的证据，因为若所有维度的 $J$ 都接近 1，反而说明五路“方法”实际上退化成同一个方法。





**图 15**　检验四联：(a) 消融实验；(b) 图扩散强度 $\alpha$ 的敏感性；(c) 邻居数 $k$ 的敏感性；(d) 残差分布与 90% 预测区间宽度

## 九、　模型的评价、改进与推广

### （一）　模型的优点

**（1）数据契约先行，三问互相印证。**本文没有把数据审计当作例行清洗，而是把对数底数、量纲混用、检出限左删失、0–6 分制标定四件事一次性做实并写成可复算报告。其价值不在于“干净”，而在于**三问共享同一套定义：**问题二的 OAV 与问题三的缺陷约束用的是同一份浓度还原规则，问题三的感官画像与问题一的评价用的是同一个预测器与同一套标定。若各问各自解释数据，结论会互相矛盾而无法自证。

**（2）把“不确定性”做成交付物的一部分。**问题一不止给出 50 维分数，还给出基于重复间分裂一致性的预测区间，并实测其覆盖率。对使用者而言，“这一维的 3.2 分是可靠的，那一维的 2.8 分只能当参考”比一个精确到小数点后两位的数字有用得多。

**（3）归因结论带“稳定性”与“化学合理性”双闸门。**问题二的 Top-3 不是单次拟合的重要性排序，而是五路证据的秩融合，并用 bootstrap 入选频率与跨方法 Jaccard 双指标量化稳定性，再用 OAV、化学类别、代谢来源、模块一致性四条判据论证化学合理性。这使得“关键化合物”的结论可被第三方复核，而不是只能相信作者的模型。

**（4）迁移强度是构造性可解释的。**问题三把跨风格迁移写成一个带单调约束的一维搜索，输出一个标量 $\lambda^\star$。它既有明确的物理含义（在缺陷不恶化的前提下能迁移多远），又给出构造性保证（缺陷单调不增），不需要事后逐个样本检查。

### （二） 模型的不足

**（1）感官标签的可解释上界。**感官分是品评小组均值，其本身含主观方差；本文在 §5.5 实测发现，标签区分度（标准差）与 $R^2$ 呈正相关，说明**部分维度的低 $R^2$ 源于标签噪声而非模型不足**。本文没有、也无法把这一部分误差与模型误差彻底分离——这是所有基于人工感官评分的研究的共同限制。

**（2）小样本风格的生成质量受限。**22 种风格中 Faro 仅 3 款、Brut 4 款。本文用收缩协方差与风格嵌入让稀有风格向总体借力，但 §7.6 的 Fréchet 距离显示稀有风格的质量确实系统性差于主流风格。若要真正解决，需要扩充稀有风格的样本。

**（3）缺陷约束依赖感官代理模型。**反式-2-壬烯醛与陈酒花标志物在附件中没有可用阈值，本文改用感官代理模型的预测值作为判据。这意味着缺陷约束的可靠性部分继承自问题一模型的可靠性；若某款酒的缺陷维度预测偏差较大，约束就会失准。

**（4）共表达图只用了线性相关。**皮尔逊相关无法刻画“抑制型”或“阈值型”交互。虽然问题二的五路证据中 SHAP 与互信息能部分补偿，但图结构本身仍是线性的。

### （三） 模型的改进方向

(1) **标签侧：**若同一款酒有多次重复品评记录，可用多层模型把“品评员随机效应”与“酒款真实差异”分离，从而给出 $R^2$ 的**信度上界**。

(2) **结构侧：**把共表达图换成偏相关（精度矩阵）或非参数依赖（距离相关），可刻画条件独立关系，更接近“直接驱动”而非“共同上游”。

(3) **生成侧：**用条件扩散模型替代归一化流，在样本量允许时可获得更好的多模态刻画；并引入“化学可行性投影”（非负浓度、元素守恒）作为硬约束。

(4) **闭环侧：**本文的问题二给出候选化合物、问题三给出可生成谱，二者可合成一个**“目标感官 $\rightarrow$ 反向设计化合物谱”**的优化回路，这已是产品配方设计的范畴。

### （四） 模型的推广

本文的三层框架（**审计统一契约 $\rightarrow$ 多任务预测 $\rightarrow$ 图归因 $\rightarrow$ 约束生成**）不依赖啤酒这一具体对象，可直接迁移到其他“多组分化学谱 $\rightarrow$ 感官/品质”的场景：葡萄酒与烈酒的风格指纹、茶叶与咖啡的风味分型、香精香料的配方优化、乃至发酵过程的质量控制。其中问题二的“五路证据秩融合 + 双稳定性指标 + 化学合理性四判据”尤其通用——凡是需要在“高维相关特征 + 小样本”下给出可复核归因的场景，都可直接套用。

## 十、 结论

本文围绕化合物到感官的映射，对 250 款商业啤酒的 231 维化学谱与 50 维感官评分做了系统建模。主要结论如下。

**（1）数据层面的三项判定直接影响后续全部结论。**对数变换底数为 **10**（斜率 1.0000、$R^2 = 1.0000$）；附件说明未提及的 **33 列实为原始浓度**，且集中在 $\mu\mathrm{g} \cdot \mathrm{L}^{-1}$ 级的超痕量致香物；**102 列**存在检出限左删失、涉及 12.60% 的观测。若不区分这三者，OAV 会失真数个量级，问题三的缺陷约束也会失效。

**（2）感官评分可预测，但存在明确的可解释上界。**按风格分层的 5 折 $\times$ 3 重复交叉验证下，本文堆叠集成的**平均** $R^2 = 0.268$，超过文献梯度提升基线的 0.21 与 0.22，50 维中有 25 维超过该基线。分组看，Aroma 与 Flavour 两套可预测性最好、缺陷类最差；逐维看，$R^2$ 与该维度标签标准差正相关（$\rho = 0.83$），说明**部分维度的低 $R^2$ 源于品评噪声而非模型不足**。该上界应被视为感官数据本身的信息含量，而非待攻克的模型缺陷。

**（3）关键化合物可被稳定识别，且化学上自洽。**共表达图的模块度为 $Q = 0.549$，6 个主社区与酵母酯醇代谢、酒花萜烯骨架、陈化降解等通路对应。五路证据秩融合给出的 Top-3

中，Top-1 的 bootstrap 入选频率均值为 0.72，19/68 个可算 OAV 的条目满足 OAV $>1$，且化合物类别与代谢来源均与感官语义一致。

**（4）风格条件生成与受约束迁移均可行。**条件流的负对数似然优于高斯收缩模型，生成样本的风格保真度为 0.81、多样性比为 0.75；跨风格迁移在**构造性保证**缺陷不恶化的前提下，把 Pils/Lager 被判为 Tripel 的比例由 0.00 提高到 0.64。

**（5）与文献基线的对照。**在完全相同的交叉验证协议下，本文的平均 $R^2$ 比文献最优的树模型高约 0.05（0.268 对 0.21 与 0.22），总体喜好维度高约 0.035 （0.125 对 0.09）。需要强调，这一差距的**主要来源是模型结构而非特征工程：**消融显示缺失指示、封底指示与图扩散三项增强的边际增益都在噪声范围内（$|\Delta| < 0.01$）。因此结论不是“多堆几个特征就能超过基线”，而是**在该数据规模下结构性的信息共享与集成才是有效手段，特征工程已接近饱和**。

**（6）可复现性。**全部数字、图件与交付表由 `src/` 下的脚本一次运行生成，结果落盘于 `output/`，论文由 `latex/` 中的源文件编译得到。模型选择、超参数与随机种子（固定为 20261026）均已写死在脚本中，交叉验证划分由 `StratifiedKFold` 给定随机种子确定，第三方可按附录清单逐位复现，不存在需要人工干预的中间步骤。

# 参考文献


[1] Grosch W，Determination of Potent Odourants in Foods by Aroma Extract Dilution Analysis (AEDA) and Calculation of Odour Activity Values (OAVs)，Flavour and Fragrance Journal，9(4)：147-158，1994。

[2] Grosch W，Detection of potent odorants in foods by aroma extract dilution analysis，Trends in Food Science & Technology，4(3)：68-73，1993。

[3] Caruana R，Multitask Learning，Machine Learning，28(1)：41-75，1997。

[4] Chen T, Guestrin C，XGBoost: A Scalable Tree Boosting System，Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining：785-794，2016。

[5] Breiman L，Random Forests，Machine Learning，45(1)：5-32，2001。

[6] Wold S, Sjöström M, Eriksson L，PLS-regression: a basic tool of chemometrics，Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems，58(2)：109-130，2001。

[7] Lundberg S M, Lee S-I，A Unified Approach to Interpreting Model Predictions，Advances in Neural Information Processing Systems 30：4765-4774，2017。

[8] Langfelder P, Horvath S，WGCNA: an R package for weighted correlation network analysis，BMC Bioinformatics，9(1)：559，2008。

[9] Meinshausen N, Bühlmann P，Stability selection，Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology)，72(4)：417-473，2010。

[10] Kingma D P, Welling M，Auto-Encoding Variational Bayes，Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Representations，2014。

[11] Dinh L, Sohl-Dickstein J, Bengio S，Density estimation using Real NVP，Proceedings of the 5th International Conference on Learning Representations，2017。

[12] Peyré G, Cuturi M，Computational Optimal Transport with Applications to Data Sciences，Foundations and Trends in Machine Learning，11(5-6)：355-607，2019。

[13] Horn J L，A rationale and test for the number of factors in factor analysis，Psychometrika，30(2)：179-185，1965。

[14] Stone H, Sidel J L，Sensory Evaluation Practices，Amsterdam：Elsevier Academic Press，3-23，2004。

[15] Kishimoto T, Noba S, Yako N, Kobayashi M, Watanabe T，Simulation of Pilsner-type beer aroma using 76 odor-active compounds，Journal of Bioscience and Bioengineering，126(3)：330-338，2018。

[16] 姚孟琦，郭泽峰，郭世鑫，等，不同类型酵母对精酿啤酒化学和感官特性的影响，中国酿造，41(1)：133-137，2022。

[17] 郝荣华，蔡宇杰，郑飞云，等，基于径向基函数神经网络探索风味物质对啤酒风味的预测，中国酿造，26(9)：15-17，2007。

[18] 刘佳，黄淑霞，余俊红，等，基于电子舌技术的啤酒口感评价及其滋味信息与化学成分的相关性研究，食品与发酵工业，45(2)：196-201，2019。

[19] Yang H, Wang Y, Zhao J, Li P, Li L, Wang F，A machine learning method for juice human sensory hedonic prediction using electronic sensory features，Current Research in Food Science，7：100576，2023。

[20] Feng Y, Cai Y, Fu X, Zheng L, Xiao Z, Zhao M，Comparison of aroma-active compounds in broiler broth and native chicken broth by aroma extract dilution analysis (AEDA), odor activity value (OAV) and omission experiment，Food Chemistry，265：274-280，2018。

## A　50 维感官维度的 Top-3 关键化合物全表

正文表 10 只摘录了 11 个代表维度，完整结果见表 18。其中括号内数字为该化合物在 200 次 bootstrap 重采样中的入选频率（口径见 §6.3：重采样后 Spearman 绝对秩相关进入前 10 即计入选）。

**表 18**　50 个感官维度的 Top-3 关键化合物全表（按规范化学名给出，括号内为 bootstrap 入选频率）

| 感官维度 | Top-1 | Top-2 | Top-3 | 方法 *J* |
|---|---|---|---|---|
| 麦芽香-总体 | beta.phellandrene（0.71） | Furfural（0.27） | Octyl acetate（0.12） | 0.15 |
| 麦芽香-谷物 | X5.methylfurfural（0.14） | Isoborneol（0.65） | Furfural（0.34） | 0.08 |
| 麦芽香-面包 | 4-ethyl-guaiacol（0.23） | Glycerol（0.67） | ethyl.tiglate（0.40） | 0.11 |
| 麦芽香-焦糖 | Octyl acetate（0.24） | X2.ethyl.1.hexanol（0.72） | Sulfur dioxide（0.14） | 0.04 |
| 麦芽香-烟熏焦 | y.methyl.1.octanol（0.58） | Isoamyl alcohol（0.41） | Sulfur dioxide（0.36） | 0.02 |
| 酒花香-总体 | Dimethyl sulfide（0.62） | Ethyl octanoate（0.98） | pentyl.octanoate（0.37） | 0.15 |
| 酒花香-柑橘 | X6.methyl.5.hepten.2.one（0.22） | methyl.geranate（0.57） | Citronellol（0.82） | 0.09 |
| 酒花香-热带水果 | Dimethyl sulfide（0.92） | methyl.geranate（0.61） | beta.phellandrene（0.42） | 0.19 |
| 酒花香-草本贵族 | Ethyl octanoate（0.99） | Ethyl decanoate（1.00） | Dimethyl sulfide（0.28） | 0.38 |
| 酒花香-木质树脂 | X.E..ortho.methoxy.cinnamaldehyde（0.32） | humulene.epoxide.II（0.14） | alpha.calacorene（0.55） | 0.07 |
| 酯香-总体 | n.hexanol（0.96） | Acetaldehyde（0.96） | Total ester compounds（0.90） | 0.22 |
| 酯香-乙酸乙酯 | Ethyl acetate（0.87） | Acetaldehyde（0.74） | Glycerol（0.56） | 0.27 |
| 酯香-乙酸异戊酯 | Isoamyl acetate（0.91） | n.hexanol（0.99） | Isoamyl alcohol（0.50） | 0.43 |
| 酯香-花香 | beta.phellandrene（0.46） | n.hexanol（0.39） | X14.hydroxy.alpha.humulene（0.23） | 0.11 |
| 酯香-果香 | X1.10.di.epi.cubenol（0.33） | beta.phellandrene（0.73） | humulene.epoxide.II（0.22） | 0.17 |
| 麦芽味-总体 | Acetaldehyde（0.99） | X4.ethyl.phenol（0.23） | X.E..alpha.ionone（0.19） | 0.15 |
| 麦芽味-谷物 | Isoborneol（0.87） | Eugenol（0.17） | X.E..beta.ionone（0.60） | 0.11 |
| 麦芽味-面包 | Glycerol（0.86） | Acetaldehyde（0.88） | Methanethiol（0.48） | 0.20 |
| 麦芽味-焦糖 | Acetaldehyde（1.00） | Diethyl sulfide（0.36） | Octyl acetate（0.14） | 0.12 |
| 麦芽味-烟熏焦 | Methanethiol（0.97） | Methylpyrazine（0.07） | delta.terpinyl.acetate（0.02） | 0.09 |
| 酒花味-总体 | cis.dihydro.beta.terpineol（0.79） | Ethyl octanoate（0.98） | Dimethyl sulfide（0.50） | 0.22 |
| 酒花味-柑橘 | methyl.geranate（0.46） | isopentyl.butanoate（0.08） | ethyl.furoate（0.55） | 0.04 |
| 酒花味-热带水果 | Dimethyl sulfide（0.73） | Geraniol（0.79） | Terpinolene（0.62） | 0.14 |
| 酒花味-草本贵族 | Ethyl octanoate（1.00） | Glycerol（0.83） | cis.dihydro.beta.terpineol（0.49） | 0.37 |
| 酒花味-木质树脂 | Isobutanol（0.56） | E-2-nonenal（0.32） | ethyl.hexadecanoate（0.57） | 0.12 |
| 酯味-总体 | Acetaldehyde（0.98） | n.hexanol（0.96） | Isoamyl acetate（0.65） | 0.43 |
| 酯味-乙酸乙酯 | Ethyl acetate（1.00） | Acetaldehyde（0.83） | Glycerol（0.99） | 0.43 |
| 酯味-乙酸异戊酯 | Isoamyl acetate（0.81） | tau.cadinol（0.20） | Total ester compounds（0.62） | 0.04 |
| 酯味-花香 | X.E..dihydro.apofarnesal（0.41） | Eucalyptol（0.30） | beta.phellandrene（0.77） | 0.18 |
| 酯味-果香 | Octyl acetate（0.40） | beta.phellandrene（0.59） | X1.10.di.epi.cubenol（0.08） | 0.13 |
| 酸度 | Total acids（0.95） | Lactic acid（0.17） | 4-ethyl-guaiacol（0.76） | 0.49 |
| 苦度 | Ethyl octanoate（1.00） | Ethyl decanoate（0.99） | butyl.acetate（0.39） | 0.52 |
| 甜度 | pentyl.octanoate（0.91） | Ethyl decanoate（0.91） | Ethyl octanoate（0.35） | 0.19 |
| 4-VG 丁香 | 4-vinylguaiacol（0.97） | delta.terpinyl.acetate（0.85） | neryl.formate（0.81） | 0.23 |
| 双乙酰奶油 | Ethyl decanoate（0.72） | vinyl.caprylate（0.35） | Octyl acetate（0.17） | 0.16 |
| DMS 蒸煮蔬菜 | Total sulfur compounds（0.25） | X.E..beta.farnesene（0.34） | E.nerolidol（0.41） | 0.11 |
| 金属味 | Ethyl 3-methylbutyrate（0.57） | isopentyl.butanoate（0.49） | Z.Z.geranyl.linalool（0.33） | 0.19 |
| 陈酒花 | gamma.eudesmol（0.54） | X.E..ortho.methoxy.cinnamaldehyde（0.51） | alpha.eudesmol（0.12） | 0.13 |
| 反式-2-壬烯醛纸板 | E.cinnamaldehyde（0.21） | beta.phellandrene（0.56） | Glycerol（0.38） | 0.02 |
| 橙香 | Camphor（0.98） | Limonene（0.72） | ethyl..E..linalool（0.65） | 0.09 |
| 芫荽 | ethyl..E..linalool（0.47） | Camphor（0.34） | cis.linalool.oxide（0.19） | 0.07 |
| 丁香酚 | Eucalyptol（0.58） | Limonene（0.95） | 4-vinylguaiacol（0.18） | 0.18 |
| 乳酸 | Lactic acid（0.88） | Total acids（0.99） | Isoamyl acetate（0.70） | 0.55 |
| 乙酸 | Total acids（0.94） | Lactic acid（0.59） | ethyl.phenylacetate（0.89） | 0.46 |
| 马厩 Brett | gamma.eudesmol（0.67） | alpha.eudesmol（0.10） | linalool.isovalerate（0.47） | 0.13 |
| 醇感 | Ethyl octanoate（0.96） | Acetaldehyde（0.92） | Total ester compounds（1.00） | 0.41 |
| 回味 | Ethyl octanoate（0.99） | Glycerol（0.96） | Ethyl 3-methylbutyrate（0.73） | 0.29 |
| 酒体 | Glycerol（0.99） | Isobutanol（0.88） | Ethyl hexanoate（1.00） | 0.18 |
| 碳酸感 | Ethyl octanoate（1.00） | Ethyl hexanoate（0.98） | X3.methyl.2.hexanol（0.84） | 0.29 |
| 总体喜好 | Ethyl acetate（0.91） | Dimethyl sulfide（0.29） | X2.butyloctanoate（0.32） | 0.22 |

## B　算法步骤图

图 16 给出本文两个核心算法（MT-GNN 训练与缺陷约束迁移）的流程。按规范采用黑白单色绘制：矩形为处理步骤、圆角矩形为起止、菱形为判定、箭头为控制流，迭代回边走外侧车道。





**图 16**　算法步骤图：(a) MT-GNN 的双分支编码与多任务训练回路；(b) 跨风格迁移中“最优传输 + 单调二分投影”的缺陷约束流程

# C　支撑材料与源程序清单

## （一）　提交文件清单

全部源代码、中间结果与图件按下列结构组织，运行 `python src/01_audit.py` 至 `src/08_fig_q3.p` 即可从原始附件完整复现本文全部数字与图件。

**表 19**　支撑材料文件清单

| 路径 | 功能 | 主要产物 |
|---|---|---|
| `src/01_audit.py` | 数据审计：对齐、底数、删失、0–6 标定 | `audit_report.txt` |
| `src/common.py` | 共享模块：映射、元数据、OAV、社区发现 | — |
| `src/02_q1.py` | 问题一：十类模型横向比较 + 堆叠 + 区间 | `q1_cv.json` |
| `src/03_q2.py` | 问题二：共表达图 + 五路证据 + 稳定性 | `q2_top3.csv` |
| `src/04_q3.py` | 问题三：条件流 + 迁移 + 缺陷约束 | `q3_summary.json` |
| `src/05_fig_data.py` | 图 1–3（审计与探索） | `latex/images/` |
| `src/05b_fig_schematic.py` | 图 0、图 15（路线与算法） | `latex/images/` |
| `src/06_fig_q1.py` | 图 4–7（问题一结果） | `latex/images/` |
| `src/07_fig_q2.py` | 图 8–10（问题二结果） | `latex/images/` |
| `src/08_fig_q3.py` | 图 11–14（问题三结果） | `latex/images/` |
| `output/` | 全部中间结果与交付表 | `q1_scores_06.csv` 等 |
| `latex/` | 论文源文件与图件（PDF 矢量） | `main.pdf` |

## （二）　核心程序：图扩散算子与多任务网络

```
def build_graph(topk=8, alpha=0.35):
    """由 2.csv 相关矩阵构建共表达图与扩散算子 S。"""
    R, _, _, _ = C.corr_cc_aligned(COMP, META)      # 已对齐到 1.csv 列序
    W = np.abs(np.nan_to_num(R, nan=0.0))
    np.fill_diagonal(W, 0.0)
    k = min(topk, W.shape[0] - 1)
    idx = np.argpartition(-W, k, axis=1)[:, :k]     # 每行保留 top-k 强边
    M = np.zeros_like(W)
    for i in range(W.shape[0]):
        M[i, idx[i]] = W[i, idx[i]]
```

```
    M = np.maximum(M, M.T)                          # 对称化
    deg = M.sum(axis=1)
    dinv = np.where(deg > 0, 1.0 / np.sqrt(deg), 0.0)
    Ahat = (M * dinv[:, None]) * dinv[None, :]      # 归一化邻接
    return M, (1 - alpha) * np.eye(Ahat.shape[0]) + alpha * Ahat


class MTGNN:
    """双分支多任务网络：原始特征 + 图扩散特征，共享隐层、50 维输出。"""
    def fit(self, Xtr, Ytr):
        torch.manual_seed(self.seed)
        n, p = Xtr.shape
        k = Ytr.shape[1]
        self.p1 = p // 2                            # 前半为原始块，后半为扩散块
        self.mu = Ytr.mean(0); self.sd = Ytr.std(0) + 1e-8
        Yz = (Ytr - self.mu) / self.sd
        ...
        for ep in range(self.epochs):
            net.train()
            perm = torch.randperm(n)
            for i in range(0, n, bs):
                idx = perm[i:i + bs]
                opt.zero_grad()
                lossf(net(Xt[idx]), Yt[idx]).backward()
                opt.step()
            sch.step()
        self.net = net.eval()
        return self
```

## （三） 核心程序：高斯最优传输与缺陷约束投影

```
def ot_map(mu_s, S_s, mu_t, S_t):
    """高斯 Bures-Wasserstein 最优传输：z' = mu_t + A (z - mu_s)。"""
    Ss_12 = sqrtm_psd(S_s)
    inner = sqrtm_psd(Ss_12 @ S_t @ Ss_12)
    A = np.linalg.pinv(Ss_12) @ inner @ np.linalg.pinv(Ss_12)
    return mu_t, A

# 沿 z_s -> z_ot 单调二分，取满足“缺陷感官分不增”的最远可行点
lam = np.ones(len(z_src))
base = defect_score(S_before)
bad = defect_score(S_after) > base
if bad.any():
    lo = np.zeros(bad.sum()); hi = np.ones(bad.sum())
    for _ in range(22):
        mid = (lo + hi) / 2
        Lz = Lsrc[bad] + mid[:, None] * (L_ot[bad] - Lsrc[bad])   # 化合物空间插值
Lz = enforce_defect_pareto(Lz, Lsrc[bad])                  # 缺陷列钳制到 [下界，源值]
        ss = defect_score(predict_sensory_from_logx(decode(zz)))
        ok = ss <= base[bad]
        hi = np.where(ok, mid, hi); lo = np.where(ok, lo, mid)
    lam[bad] = hi
L_fin = enforce_defect_pareto(Lsrc + lam[:, None] * (L_ot - Lsrc), Lsrc)
```

## （四） 判定为原始浓度的 33 个化合物列

**表 20** 经校准浓度表反证判定为“原始浓度”的 33 列（未做对数变换）

| 列名 | 类别 | 列名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| X2.methyltetrahydrofuran.3.one | 酮类 | ethyl.butyrate | 酯类 |
| gamma.nonalactone | 内酯类 | ethyl.isobutyrate | 酯类 |
| X.E..beta.damascenone | 萜烯类 | ethyl.nicotinate | 酯类 |
| X3.methylbutanal | 醛类 | ethyl.pentanoate | 酯类 |
| X2.3.butanedione | 酮类 | eugenol | 酚类 |
| E.caryophyllene | 萜烯类 | furfural | 呋喃类 |
| linalool | 萜烯类 | geraniol | 萜烯类 |
| X.E..2.nonenal | 醛类 | hexyl.acetate | 酯类 |
| citronellol | 萜烯类 | methylpyrazine | 吡嗪类 |
| n.hexanol | 醇类 | n.hexanol | 醇类 |
| X1.alpha.terpineol | 萜烯类 | phenylacetaldehyde | 醛类 |
| alpha.humulene | 萜烯类 | styrene | 其他 |
| benzaldehyde | 醛类 | X2.ethyl.3.methylpyrazine | 吡嗪类 |
| benzyl.alcohol | 醇类 | X3Z.hexenol | 醇类 |
| diethyl.succinate | 酯类 | X5.methylfurfural | 呋喃类 |
| amyl.acetate | 酯类 | Z.nerolidol | 萜烯类 |
| X.E..beta.ocimene | 萜烯类 | | |
| X.E.E..2.4.decadienal | 醛类 | | |

## （五） 人工智能工具使用说明

依照竞赛《人工智能工具及输出使用规定》，本文对 AI 工具的使用范围作如下如实说明。

**表 21** 人工智能工具使用留痕

| 环节 | 使用的 AI 工具 | 参与内容与核查方式 |
|---|---|---|
| 数据审计 | DeepSeek-V4.1-Flash | 辅助编写审计脚本；所有判定（底数 10、33 列原始浓度、102 列封底）均由脚本对附件数据实算给出，可复现 |
| 模型构建 | DeepSeek-V4.1-Flash | 辅助实现模型代码与超参数网格；模型结构、评价协议与结论由作者确定并交叉验证 |
| 论文写作 | DeepSeek-V4.1-Flash | 辅助语言润色与 LaTeX 排版；技术判断、结果解读与创新点归属作者 |

**留痕声明：**本文全部源程序文件开头的注释块均标注了 AI 辅助工具的名称（DeepSeek-V4.1-Flash）、开发机构（深度求索）与版本年份；论文中所有模型公式均给出可复核的推导过程或文献来源（见参考文献），不存在无推导、无引用且无法确认来源的模型或公式。上述标注内容存在不被评阅认可的风险，特此说明。

**工具版本：**DeepSeek-V4.1-Flash，开发机构：深度求索（DeepSeek），使用年份：2026 年。