

TOPOLOGIA - ZADANIE DOMOWE 2

KACPER SOLECKI

ZADANIE 1

Lipschitz \Rightarrow jednostajna ciągłość. Weźmy $\varepsilon > 0$. Niech $\delta = \frac{\varepsilon}{L}$. Weźmy dowolne $x, x' \in X_1$. Jeżeli $\rho_1(x, x') < \delta$ to z założenia

$$\rho_2(f(x), f(x')) \leq L\rho_1(x, x') < L \cdot \delta = \varepsilon$$

Jednostajna ciągłość \Rightarrow ciągłość. Weźmy dowolne $a \in X_1$. Weźmy $\varepsilon > 0$. Z założenia istnieje δ taka, że

$$\forall_{x, x' \in X_1} \rho_1(x, x') < \delta \Rightarrow \rho_2(f(x), f(x')) < \varepsilon$$

Weźmy dowolny $x \in X_1$. Wtedy w szczególności podstawiając $x' = a$ otrzymujemy tezę.

ciągłość \nRightarrow jednostajna ciągłość. Niech $f(x) = \frac{1}{x}$ będzie określone na $(0, 1)$. Oczywiście f jest ciągłe. W pobliżu 0 f ma nieograniczoną pochodną, więc w szczególności nie może być jednostajnie ciągłe (Dla danego ε nie może istnieć δ spełniająca tezę dla każdych $x, x' \in \mathbb{R}$, $|x - x'| < \delta$ bo $|\frac{1}{x} - \frac{1}{x'}|$ może być dowolnie duże).

jednostajna ciągłość \nRightarrow Lipschitz. Niech $f(x) = \sqrt{x}$ będzie określone na $[0, 1]$. Jest to funkcja ciągła na przedziale domkniętym, więc jest jednostajnie ciągła. Załóżmy nie wprost, że zachodzi dla niej warunek Lipschitza z pewnym $L > 0$. Weźmy $x = 0$, $x' = \frac{1}{4L^2}$. Mamy wtedy:

$$\left| \sqrt{\frac{1}{4L^2}} - 0 \right| = \left| \frac{1}{2L} \right| < L \cdot \frac{1}{4L^2} \Rightarrow \left| \frac{1}{2L} \right| < \frac{1}{4L}$$

co daje sprzeczność z założeniem $L > 0$.

ZADANIE 2

Lokalnie zwarta przestrzeń Hausdorffa jest regularna. D-d:

Niech X będzie lokalnie zwartą przestrzenią Hausdorffa, $x \in X$ - dowolnym punktem. Niech $F \subseteq X$ będzie dowolnym zbiorem domkniętym t. że $x \notin F$. Z założenia istnieje otwarty U : $x \in U \subseteq X$, t. że \overline{U} jest zwarty. Pokażę, że istnieją otwarte A, B : $x \in A$, $F \subseteq B$, $A \cap B = \emptyset$. Rozważmy 2 przypadki:

1°. $F \cap \overline{U} = \emptyset$

Wtedy tym bardziej $F \cap U = \emptyset$. $A = U$, $B = X \setminus \overline{U}$ są szukаныmi zbiorami.

Date: June 2020.

2°. $F \cap \bar{U} = C \neq \emptyset$

C jest domknięte jako przecięcie zbiorów domkniętych. Z zadania (9) z listy 4 wiemy, że zwarta przestrzeń Hausdorffa jest normalna, więc w szczególności też regularna. Stąd \bar{U} jest regularne, czyli istnieją otwarte $A, B' \subseteq \bar{U}$: $x \in A, C \subseteq B', A \cap B' = \emptyset$. Szukane zbiory to A oraz $B = B' \cup (X \setminus \bar{U})$

a). Niech Y będzie dowolną otwartą podprzestrzenią X .

Weźmy dowolny $x \in Y$. Z lokalnej zwartości X mamy otwarte $x \in U \subseteq X$ t. że \bar{U} jest zwarte. $U \cap Y$ jest otwartym otoczeniem x . Z zadania (4) z listy 5 wiemy więc, że skoro X jest regularne (lemat), to istnieje V - otoczenie x t. że $\bar{V} \subseteq U \cap Y$.

Mamy więc $x \in V \subseteq Y$ oraz $\bar{V} \subseteq \bar{U}$, więc \bar{V} jest zwarte jako zbiór domknięty w zwartym \bar{U} . Czyli Y jest lokalnie zwarte.

Przypadek Y domkniętego:

Weźmy analogiczne x oraz U . $V = (U \cap Y) \in \mathcal{T}_Y$, $\bar{V} \subseteq \bar{U} \cap \bar{Y} = \bar{U} \cap Y$. Stąd $x \in V \subseteq Y$ i podobnie \bar{V} jest zwarte jako zbiór domknięty w zwartym \bar{U} . Y jest lokalnie zwarte.

b). Tak:

Ustalmy $n \in \mathbb{N}$. Weźmy $x \in \mathbb{R}^n$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. Niech $U_i \subset \mathbb{R}$: $U_i = (x_i - 1, x_i + 1)$. \bar{U}_i są zwarte (przykład 2.1.7). Niech $U = U_1 \times \dots \times U_n$. Wtedy U jest otwartym otoczeniem x , a $\bar{U} = \bar{U}_1 \times \dots \times \bar{U}_n$ jest zwarte jako skończony iloczyn przestrzeni zwartych.

c). Nie:

Weźmy $x \in \mathbb{Q}$. Niech U będzie dowolnym otoczeniem x . W szczególności U zawiera jakąś kulę: $(a, b) \subseteq U \Rightarrow [a, b] \subseteq \bar{U}$.

Rozważmy zstępujący ciąg zbiorów domkniętych w \bar{U} :

$$A_n = [l_i, r_i], l_i = a + \frac{b-a}{5}(1 + \frac{1}{n})^n, r_i = a + \frac{b-a}{5}(1 + \frac{1}{n})^{n+1}$$

$(1 + \frac{1}{n})^n \leq (1 + \frac{1}{n})^{n+1} \leq 4$ (dla naturalnych n), więc $A_i \subseteq [a, b]$. Załóżmy nie wprost, że \bar{U} jest zwarte, czyli w szczególności $\cap A_i \neq \emptyset$. Niech $q \in \cap A_i$. jeżeli $q < e$ to od pewnego miejsca $l_i > q$, ponieważ l_i dąży do e od dołu (w \mathbb{R}). Jeżeli natomiast $q > e$ to od pewnego miejsca $r_i < q$ bo r_i też dąży do e (ale od góry). Otrzymujemy więc sprzeczność.

Alternatywnie, ponieważ odcinki o obu końcach niewymiernych stanowią bazę $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, wystarczy rozważać odcinki (a, b) , $a, b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Wówczas $q_n \in \mathbb{Q}$, $q_n \rightarrow a$ nie ma podciągu zbieżnego.

ZADANIE 3

a). $\rightarrow X \in \mathcal{T}$, bo $X = \{\infty\} \cup (Y \setminus \emptyset)$

$\rightarrow \emptyset \in \mathcal{T}$, bo $\emptyset \subseteq Y$

\rightarrow Niech $A, B \in \mathcal{T}$.

1°. $\{\infty\} \in A$ oraz $\{\infty\} \in B$

Wtedy $A = \{\infty\} \cup (Y \setminus I_1)$, $B = \{\infty\} \cup (Y \setminus I_2)$, gdzie I_1, I_2 - skończone.
 $A \cap B = \{\infty\} \cup (Y \setminus (I_1 \cup I_2))$, $(I_1 \cup I_2)$ też jest skończone, więc $A \cap B \in \mathcal{T}$.

2°. $\{\infty\} \notin A \vee \{\infty\} \notin B$

Wtedy $A \cap B \subseteq Y \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{T}$.

→ Niech $A_i \in \mathcal{T}$

Jeżeli $\{\infty\} \in \bigcup A_i$ to dla pewnego j : $A_j = \{\infty\} \cup (Y \setminus I)$, I skończone, więc $\bigcup A_i$ można też oczywiście zapisać w tej postaci dla pewnego $I' \subseteq I$.

W przeciwnym przypadku $\bigcup A_i \subseteq Y$ więc $\bigcup A_i \in \mathcal{T}$.

b). Każdy $\{y\}$, $y \in Y$, jest zbiorem otwartym, musi być więc elementem bazy, czyli baza może być przeliczalna tylko gdy Y jest przeliczalna. Z drugiej strony baza złożona ze wszystkich punktów Y oraz zbiorów postaci $\{\infty\} \cup (Y \setminus I)$: I skończone, na pewno wystarczy i jest przeliczalna, gdy Y jest przeliczalna. Tak więc baza jest przeliczalna $\Leftrightarrow Y$ jest przeliczalna.

Jeżeli Y jest przeliczalny to oczywiście X jest ośrodkowy (zbiór gęsty to wszystkie punkty). W przeciwnym przypadku X nie może być ośrodkowy, bo każdy zbiór gęsty musi zawierać wszystkie punkty z Y (jeżeli U nie zawiera $y \in Y$ to istnieje otoczenie $y - \{y\}$ które nie przecina U , więc \bar{U} nie zawiera całego Y). Stąd również:

X jest ośrodkowe $\Leftrightarrow Y$ jest przeliczalne.

c). Rozważmy $A \subseteq X$.

1.1°. $\{\infty\} \in A \rightarrow (X \setminus A) \subseteq Y \Rightarrow A$ jest domknięte jako dopełnienie zbioru otwartego.

1.2°. $A \subseteq Y$

Jeżeli A jest skończone to jest domknięte jako dopełnienie zbioru otwartego. W przeciwnym przypadku każde otoczenie $\{\infty\}$ przecina A więc $\bar{A} = A \cup \{\infty\}$ (jest to zbiór domknięty znów jako dopełnienie otwartego).

Podsumowując te przypadki: $\bar{A} = \begin{cases} A & \text{gdy } A \text{ jest skończone} \\ A \cup \{\infty\} & \text{wpp.} \end{cases}$

2.1°. $A \subseteq Y$

A jest otwarte więc $\text{Int}(A) = A$

2.2°. $\{\infty\} \in A$

$A = \{\infty\} \cup (Y \setminus I)$. Jeżeli I jest skończone to A jest otwarte: $\text{Int}(A) = A$. W przeciwnym przypadku $\text{Int}(A) = A \setminus \{\infty\}$

Podsumowując te przypadki: $\text{Int}(A) = \begin{cases} A & \text{gdy } I \text{ skończone} \\ A \setminus \{\infty\} & \text{wpp.} \end{cases}$

d). Weźmy domknięte $A, B \subseteq X : A \cap B = \emptyset$. Znajdziemy otwarte $U, V : U \cap V = \emptyset, A \subseteq U, B \subseteq V$.

Jeżeli $\infty \in A$ to B musi być skończone (jego dopełnienie, w którym jest $\{\infty\}$ musi być otwarte) i oczywiście zawarte w Y . Wtedy $V = B, U = X \setminus B$.

W przypadku $A \subseteq Y, B \subseteq Y : U = A, V = B$.

ZADANIE 4

Będziemy rozpatrywać przestrzeń $(X \times \mathbb{R}, d_{max})$, gdzie d_{max} jest metryką generującą topologię w iloczynie $X \times \mathbb{R}$:

$d_{max}((x_1, r_1), (x_2, r_2)) = \max(d(x_1, x_2), |r_1 - r_2|)$. Niech $G \subseteq Y \times \mathbb{R} \subseteq X \times \mathbb{R}$ będzie wykresem f .

\Rightarrow . Załóżmy, że (Y, d_f) jest zupełna. Weźmy ciąg $(y_n, f(y_n)) \in G$ zbieżny do dowolnego $(x_0, r_0) \in \overline{G}$. Wtedy $d_{max}((y_n, r_n), (x_0, r_0)) \rightarrow 0$ więc $d(y_n, x_0) \rightarrow 0$ oraz $|f(y_n) - r_0| \rightarrow 0$. Stąd y_n jest Cauchy'ego w (Y, d_f) . Skoro (Y, d_f) jest zupełny to $x_0 \in Y$, czyli też $r_0 = f(x_0)$, więc $(x_0, r_0) \in G$. z dowolności wyboru (x_0, r_0) : $G = \overline{G}$.

\Leftarrow . Załóżmy, że G jest domknięte. Weźmy dowolny ciąg Cauchy'ego $y_n \in (Y, d_f)$. Jest on też wtedy ciągiem Cauchy'ego w (X, d) ($d(y_n, y_m) + |f(y_n) - f(y_m)| < \varepsilon \Rightarrow d(y_n, y_m) < \varepsilon$) i $f(y_n)$ jest ciągiem Cauchy'ego w \mathbb{R} . X jest zupełne więc y_n ma granicę x_0 w X , \mathbb{R} jest zupełne, więc $f(y_n)$ ma granicę r_0 w \mathbb{R} . Czyli $(y_n, f(y_n)) \rightarrow (x_0, r_0) \in \overline{G} = G$. Stąd $(x_0, r_0) \in Y \times \mathbb{R}$, czyli $x_0 \in Y$. Z dowolności y_n : (Y, d_f) jest zupełne.

ZADANIE 5

Metryka Hausdorffa zadaje się wzorem:

$$d_H(A, B) = \max(\sup_{x \in A} d(x, B), \sup_{x \in B} d(x, A)).$$

1). Najpierw pokażę, że zbiory postaci

$$V = \{K \in K(X) : K \subseteq U_0, K \cap U_1 \neq \emptyset, K \cap U_2 \neq \emptyset, \dots, K \cap U_n \neq \emptyset\}$$

(U_i - otwarte w X)

tworzą bazę \mathbb{B} pewnej topologii na $K(X)$:

$$\cup V = K(X), \text{ bo } \{K \in K(X) : K \subseteq X\} = K(X) \text{ (} n = 0, U_0 = X \text{)}.$$

Weźmy

$$V_1 = \{K \in K(X) : K \subseteq U_0, K \cap U_1 \neq \emptyset, \dots, K \cap U_n \neq \emptyset\}$$

$$V_2 = \{K \in K(X) : K \subseteq U'_0, K \cap U'_1 \neq \emptyset, \dots, K \cap U'_m \neq \emptyset\}$$

Niech $x \in V_1 \cap V_2$. Wtedy

$$V_3 = \{K \in K(X) : K \subseteq (U_0 \cap U'_0), K \cap U_1 \neq \emptyset, \dots, K \cap U_n, K \cap U'_1 \neq \emptyset, \dots, K \cap U'_m \neq \emptyset\}$$

jest elementem tej bazy równym $V_1 \cap V_2$ czyli też $x \in V_3$.

2). Dla każdej kuli $B_{d_H}(K_0, r) \subseteq K(X)$ i zbioru $S \in \mathbb{B}$ istnieje $V \in \mathbb{B}$ t. że $S \in V \subseteq B_{d_H}(K_0, r)$:

Bzo, zastępując $B_{d_H}(K_0, r)$ pewną kulą postaci $B_{d_H}(S, r') \subseteq B_{d_H}(K_0, r)$, przyjmijmy $K_0 = S$.

Rozważmy otwarte pokrycie K_0 kulami postaci $B_d(x, \frac{r}{2})$, $x \in K_0$. Możemy z tego pokrycia wybrać pokrycie skończone: A_1, \dots, A_n . Niech

$$Y = \bigcup_{x \in K_0} B_d(x, r), \quad V = \{K \in K(X) : K \subseteq Y, K \cap A_1 \neq \emptyset, \dots, K \cap A_n \neq \emptyset\}.$$

Mamy $K_0 \in V$. Pozostaje sprawdzić, że $V \subseteq B_{d_H}(K_0, r)$. Weźmy dowolny $K \in V$.

$$K \subseteq Y \Rightarrow \sup_{x \in K} d(x, K_0) < r$$

(ostra nierówność, ponieważ K jest domknięty, a Y otwarty).

K_0 jest pokryte kulami A_i , w obrębie których maksymalna możliwa odległość jest mniejsza niż r , każda z nich przecina K , stąd:

$$\sup_{x \in K_0} d(x, K) < r.$$

Te dwie nierówności dają nam łącznie $K \in B_{d_H}(K_0, r)$. Z dowolności $K \in V \subseteq B_{d_H}(K_0, r)$.

3). Dla każdego $V \in \mathbb{B}$ i zbioru $S \in V$ istnieje $B_{d_H}(S, r)$ t. że $S \in B_{d_H}(S, r) \subseteq V$:

Niech

$$V = \{K \in K(X) : K \subseteq U_0, K \cap U_1 \neq \emptyset, K \cap U_2 \neq \emptyset, \dots, K \cap U_n \neq \emptyset\} \in \mathbb{B}$$

Weźmy dowolny $S \in V$.

$$\text{Niech } r_0 = \inf_{y \in X \setminus U_0} \sup_{x \in S} d(x, y).$$

$r_0 > 0$, bo $S \in U_0$, U_0 otwarte. Jeżeli $K \in B_{d_H}(S, r)$, $r < r_0$ to $K \subseteq U_0$, ponieważ w przeciwnym razie $\sup_{x \in K} d(x, S) \geq r_0 \Rightarrow d_H(K, S) \geq r_0$.

Dla $i \in \{1, \dots, n\}$:

Wiemy, że S przecina U_i , istnieje więc $u \in S \cap U_i$. Ponieważ U_i jest otwarte, istnieje kula $B_d(u, r_i) \subseteq U_i$, dla pewnego $r_i > 0$.

Zauważmy, że jeżeli $K \in B_{d_H}(S, r)$, $r < r_i$ to $K \cap U_i \neq \emptyset$, ponieważ inaczej $d(u, K) \geq r_i \Rightarrow d_H(S, K) \geq r_i$.

Stąd dla $r = \frac{\min(r_0, r_1, \dots, r_n)}{2}$: $K \in B_{d_H}(S, r) \Rightarrow K \in V$, czyli $B_{d_H}(S, r) \subseteq V$. Oczywiście $S \in B_{d_H}(S, r)$.

Niech topologia na $K(X)$ generowana przez \mathbb{B} to $\mathcal{T}_{\mathbb{B}}$, a topologia generowana przez metrykę Hausdorffa to \mathcal{T}_H . Na mocy punktu 2) : $\mathcal{T}_H \subseteq \mathcal{T}_{\mathbb{B}}$. Na mocy punktu 3) : $\mathcal{T}_{\mathbb{B}} \subseteq \mathcal{T}_H$. Stąd $\mathcal{T}_H = \mathcal{T}_{\mathbb{B}}$.