

# Ćwiczenia z ANALIZY NUMERYCZNEJ (M)

Blok 2: lista M6

21 listopada 2019 r.

**M6.1.** 1 punkt Uzasadnić następujący *algorytm Clenshawa* obliczania wartości wielomianu

$$w(x) = \frac{1}{2}c_0T_0(x) + c_1T_1(x) + c_2T_2(x) + \dots + c_nT_n(x)$$

w punkcie  $x$  ( $c_0, c_1, \dots, c_n$  są danymi stałymi). Określamy pomocniczo wielkości  $B_0, B_1, \dots, B_{n+2}$  wzorami

$$\begin{aligned} B_{n+2} &:= B_{n+1} := 0; \\ B_k &:= 2xB_{k+1} - B_{k+2} + c_k \quad (k = n, n-1, \dots, 0). \end{aligned}$$

Wówczas  $w(x) = \frac{1}{2}(B_0 - B_2)$ .

**M6.2.** 2 punkty Wykazać poprawność algorytmu Wernera obliczania stałych

$$(1) \quad \sigma_k \equiv \sigma_k^{(n)} := 1/p'_{n+1}(x_k) \quad (k = 0, 1, \dots, n),$$

gdzie  $p_{n+1}(x) := (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$ .

**Algorytm 1** (Werner, 1984).

a) Obliczamy pomocnicze wielkości  $a_k^{(i)}$  wg wzorów

$$\begin{aligned} a_0^{(0)} &:= 1, \quad a_k^{(0)} := 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n), \\ \left. \begin{aligned} a_k^{(i)} &:= a_k^{(i-1)} / (x_k - x_i), \\ a_i^{(k+1)} &:= a_i^{(k)} - a_k^{(i)} \end{aligned} \right\} \quad (i = 1, 2, \dots, n; k = 0, 1, \dots, i-1), \end{aligned}$$

b) Wówczas

$$\sigma_k := a_k^{(n)} \quad (k = 0, 1, \dots, n).$$

**M6.3.** 1 punkt Określmy wielomian  $H_{2n+1} \in \Pi_n$  za pomocą wzoru

$$H_{2n+1}(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) h_k(x) + \sum_{k=0}^n f'(x_k) \bar{h}_k(x),$$

gdzie węzły  $x_0, \dots, x_n$  są parami różne, ponadto

$$\left. \begin{aligned} h_k(x) &:= [1 - 2(x - x_k)\lambda'_k(x_k)]\lambda_k^2(x), \\ \bar{h}_k(x) &:= (x - x_k)\lambda_k^2(x), \\ \lambda_k(x) &:= \frac{p_{n+1}(x)}{(x - x_k)p'_{n+1}(x_k)}, \end{aligned} \right\} \quad (0 \leq k \leq n)$$

oraz  $p_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$ . Wykazać, że  $H_{2n+1}$  spełnia warunki

$$(2) \quad H_{2n+1}(x_i) = f(x_i), \quad H'_{2n+1}(x_i) = f'(x_i) \quad (0 \leq i \leq n).$$

- M6.4.** 1,5 punktu Niech będzie  $f \in C^{2n+2}[a, b]$  i niech wielomian  $H_{2n+1}(x) \in \Pi_{2n+1}$  spełnia warunki (2) dla parami różnych węzłów  $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$ . Udowodnić, że dla każdego  $x \in [a, b]$  istnieje taki punkt  $\xi \in (a, b)$ , że

$$f(x) - H_{2n+1}(x) = \frac{1}{(2n+2)!} f^{(2n+2)}(\xi) p_{n+1}^2(x).$$

*Wskazówka:* Dla  $x \in [a, b]$ , różnego od każdego z węzłów, rozważyć funkcję

$$g(t) = f(t) - H_{2n+1}(t) - K p_{n+1}^2(t),$$

gdzie stała  $K$  jest dobrana tak, żeby  $g(x) = 0$ .

- M6.5.** 1 punkt Wyznaczyć wielomian  $H_5 \in \Pi_5$ , spełniający warunki  $H_5(x_i) = y_i$ ,  $H_5'(x_i) = y_i'$  ( $i = 0, 1, 2$ ), gdzie  $x_i$ ,  $y_i$ ,  $y_i'$  mają następujące wartości:

$i$	$x_i$	$y_i$	$y_i'$
0	-1	7	-1
1	0	6	0
2	2	22	56

- M6.6.** 2 punkt, Włącz komputer! Niech  $f(x) = e^{\arctan(x)}$ . Rozważyć interpolację w przedziale  $[a, b] := [-5, 5]$  w  $n+1$  równoodległych węzłach. Znaleźć postać potęgową wielomianu interpolacyjnego  $L_n(x)$  oraz naturalną funkcję sklejaną trzeciego stopnia  $s(x)$ . Rozważyć  $n = 10, 20, 30$  i podać wartości całek

$$\int_a^b [f''(x)]^2 dx, \quad \int_a^b [L_n''(x)]^2 dx, \quad \int_a^b [s''(x)]^2 dx.$$

Wyniki należy przedstawić z dokładnością do 8 cyfr dziesiętnych.

- M6.7.** 1 punkt Wykazać, że jeśli  $s$  jest naturalną funkcją sklejaną trzeciego stopnia, interpolującą funkcję  $f$  w węzłach  $x_0, x_1, \dots, x_n$  ( $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ ), to

$$\int_a^b [s''(x)]^2 dx = \sum_{k=1}^{n-1} (f[x_k, x_{k+1}] - f[x_{k-1}, x_k]) M_k,$$

gdzie  $M_k := s''(x_k)$  ( $k = 0, 1, \dots, n$ ).

- M6.8.** 1 punkt Niech  $s$  będzie funkcją określoną w zadaniu **M6.7**. Wykazać, że dla węzłów  $x_k := a + k \cdot h$  ( $k = 0, 1, \dots, n$ ), gdzie  $h := (b - a)/n$ , zachodzi wzór

$$\int_a^b s(x) dx = h \sum_{k=0}^n {}'' f(x_k) - \frac{h^3}{12} \sum_{k=0}^n {}'' M_k.$$

(Symbol  $\sum''$  oznacza sumę, której pierwszy i ostatni składnik należy podzielić przez 2.) Jakie zastosowanie może mieć powyższa równość?

14 listopada 2019  
Rafał Nowak