Cerca del agua, lejos del montón: Influencia de variables ecológicas sobre la razón sexual y el tamaño del prosoma en *Tropicosa thorelli* (Lycosidae)



Cáceres-Obregón, Andrés-Felipe; Lozano-Pérez, Juan-David; Nieves-De La hoz, José-Luis; Ramos-Cortés, María-Juliana.

[1] Programa de Biología, Universidad El Bosque, Biología Tropical - Ecosistemas Terrestres - Gestión Ambiental

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo se relaciona la cercanía a un cuerpo de agua, cobertura del dosel y cantidad de hojarasca con el tamaño del prosoma y la razón sexual de las arañas *T. thorelli* (Familia Lycosidae)?

HIPÓTESIS BIOLÓGICA

La cercanía al río y la mayor cantidad de hojarasca favorecen la disponibilidad de recursos y refugio, generando una mayor proporción de hembras y un mayor tamaño en su prosoma.

Introducción



Depredadores importantes en ecosistemas terrestres



Arreglo ocular en licósidos

Dependen de la heterogeneidad ambiental



Relevancia


Comprender dinámicas ecológicas



Aporte para la gestión ambiental

Método

Diseño de muestreo



Transectos en banda perpendiculares al cuerpo de agua

Recolecta temporal

Búsqueda activa



Medida prosoma



Determinación del sexo



Marcaje y liberación

Registro variables

En punto de captura



Distancia perpendicular al río



Cobertura vegetal por imagej



Cálculo de volumen hojarasca

Recolecta permanente



Observación en estereoscopio

ISSN 1175-5326 (print edition)
ZOOTAXA
ISSN 1175-5334 (online edition)

Determinación taxonómica



Entrega al MCUEB

Modelo estadístico

Regresión lineal múltiple **(ANCOVA)**

Tamaño del prosoma

GLM logístico binomial

Razón sexual

Resultados

Total 193



Hembras tenían el prosoma un 15 % más grande que los machos




Fig. 1 — Tamaño de prosoma según la cobertura del dosel y la distancia al río





Fig. 2 — Probabilidad de sexo en función de la distancia al río y el volumen de hojarasca presente

Crías

Tres hembras con crías en cobertura <45% y entre 1 - 5 m



4 Hembras con ovisaco solo entre 1-5 m y poca hojarasca



Aporte

POMCA
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica
Cormacarena
Somos vida, somos Meta

Conclusión

Hubo mayor presencia de hembras cerca del río y en sitios con poca hojarasca y cobertura de dosel, además tuvieron un prosoma 15% más grande que el de los machos en todo el estudio. Sin embargo, la razón sexual fue 1:1.

Discusión



Ecosistemas riparios reciben subsidios tróficos provenientes del agua (Yuen y Dudgeon, 2015).

Espacios abiertos, donde la baja vegetación facilita la locomoción y captura de presas (Carrel, (2003).

Las hembras presentan desarrollo prolongado, una muda adicional y mayores tasas de crecimiento (Zhang *et al*., 2021)

Vídeo

ESCANEAME

Fuentes

UNIVERSIDAD EL BOSQUE