


Exposures positively associated with breast cancer risk  
meta-analysis of dietary-intake studies

| Exposure          | # of studies | Sample size | Cases     | Pooled RR (95% CI) |
|-------------------|--------------|-------------|-----------|--------------------|
| 비타민 A, C, D, E, K |              |             |           |                    |
| 비타민 K             | 2            | 5,048       | 2,592     | 1.01 (0.68-1.5)    |
| 무기질 및 미량 원소       |              |             |           |                    |
| 셀레늄               | 6            | 175,826     | 12,809    | 1.02 (0.87-1.2)    |
| 철                 | 8            | 385,425     | 22,415    | 1.22 (1.04-1.43)   |
| 폴리페놀 및 플라보노이드     |              |             |           |                    |
| 차                 | 24           | 1,181,650   | 65,433    | 1.02 (0.93-1.13)   |
| 과일 및 채소           |              |             |           |                    |
| 자몽                | 2            | 164,504     | 5,404     | 1.1 (0.8-1.52)     |
| 지방산 및 지질          |              |             |           |                    |
| 공액리놀레산            | 4            | 380,443     | 17,329    | 1.06 (0.92-1.22)   |
| 오메가-6 지방산         | 2            | 2,476       | 1,201     | 1.74 (1.26-2.42)   |
| 기타                |              |             |           |                    |
| 달걀                | 8            | 29,311      | 5,421     | 1.19 (0.99-1.43)   |
| 알코올               | 182          | 16,035,924  | 1,275,429 | 1.24 (1.22-1.27)   |
| 붉은 고기             | 34           | 1,178,141   | 60,075    | 1.33 (1.24-1.42)   |



Exposure group

- 지방산 및 지질
- 과일 및 채소
- 무기질 및 미량 원소
- 기타
- 폴리페놀 및 플라보노이드
- 비타민 A, C, D, E, K

RR > 1 = positively associated with breast cancer risk. | [\*] pooled RR (size proportional to # of studies) | [ ] red outline = statistically significant (95% CI excludes 1.0) | [\*] faded = non-significant | dashed line = 95% prediction interval