


Exposures inversely associated with ovarian cancer risk

Exposure	N studies	N	Cases	Pooled RR (95% CI)
類胡蘿蔔素				
葉黃素	4	529,715	3,624	0.69 (0.48–0.98)
–胡蘿蔔素	9	678,322	30,201	0.87 (0.78–0.98)
維生素 A、C、D、E、K				
維生素 E	7	657,479	30,006	0.65 (0.48–0.88)
維生素 C	3	583,089	2,528	0.72 (0.41–1.29)
維生素 D	13	426,489	19,570	0.81 (0.73–0.91)
維生素 A	6	1,588,466	9,351	0.97 (0.86–1.09)
B群維生素				
葉酸	9	712,037	10,452	0.87 (0.68–1.1)
礦物質與微量元素				
硒	3	1,947	768	0.23 (0.06–0.93)
鈣	7	42,324	4,508	0.69 (0.53–0.9)
多酚與類黃酮				
茶	6	238,872	3,158	0.77 (0.53–1.13)
水果與蔬菜				
豆類	2	63,479	506	0.6 (0.25–1.43)
脂肪酸與脂質				
Omega–6 脂肪酸	2	6,630	3,238	0.8 (0.69–0.91)
植物雌激素				
黃豆	2	1,906	754	0.41 (0.25–0.67)
其他				
酒精	18	2,268,288	41,778	0.96 (0.84–1.09)
咖啡因	12	380,116	39,052	0.97 (0.86–1.09)



Exposure group

- B群維生素 ■ 類胡蘿蔔素 ■ 脂肪酸與脂質 ■ 水果與蔬菜 ■ 礦物質與微量元素
- 其他 ■ 植物雌激素 ■ 多酚與類黃酮 ■ 維生素 A、C、D、E、K

RR < 1 = inversely associated with ovarian cancer risk. | [*] pooled RR (size proportional to k studies) | [] red outline = statistically significant (95% CI excludes 1.0) | [*] faded = non-significant | dashed line = 95% prediction interval