


Exposures inversely associated with ovarian cancer risk

Exposure	N studies	N	Cases	Pooled RR (95% CI)
카로티노이드				
루테인	4	529,715	3,624	0.69 (0.48-0.98)
베타-카로틴	9	678,322	30,201	0.87 (0.78-0.98)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 E	7	657,479	30,006	0.65 (0.48-0.88)
비타민 C	3	583,089	2,528	0.72 (0.41-1.29)
비타민 D	13	426,489	19,570	0.81 (0.73-0.91)
비타민 A	6	1,588,466	9,351	0.97 (0.86-1.09)
비타민 B군				
엽산	9	712,037	10,452	0.87 (0.68-1.1)
무기질 및 미량 원소				
셀레늄	3	1,947	768	0.23 (0.06-0.93)
칼슘	7	42,324	4,508	0.69 (0.53-0.9)
폴리페놀 및 플라보노이드				
차	6	238,872	3,158	0.77 (0.53-1.13)
과일 및 채소				
콩류	2	63,479	506	0.6 (0.25-1.43)
지방산 및 지질				
오메가-6 지방산	2	6,630	3,238	0.8 (0.69-0.91)
식물성 에스트로겐				
대두	2	1,906	754	0.41 (0.25-0.67)
기타				
알코올	18	2,268,288	41,778	0.96 (0.84-1.09)
카페인	12	380,116	39,052	0.97 (0.86-1.09)



Exposure group

-  비타민 B군
-  카로티노이드
-  지방산 및 지질
-  과일 및 채소
-  무기질 및 미량 원소
-  기타
-  식물성 에스트로겐
-  폴리페놀 및 플라보노이드
-  비타민 A, C, D, E, K

RR < 1 = inversely associated with ovarian cancer risk. | [*] pooled RR (size proportional to k studies) | [] red outline = statistically significant (95% CI excludes 1.0) | [*] faded = non-significant | dashed line = 95% prediction interval