


Exposures inversely associated with ovarian cancer risk

Exposure	# of studies	Sample size	Cases	Pooled RR (95% CI)
类胡萝卜素				
叶黄素	4	529,715	3,624	0.69 (0.48–0.98)
β-胡萝卜素	8	611,872	4,692	0.74 (0.6–0.92)
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 E	7	657,479	30,006	0.65 (0.48–0.88)
维生素 C	3	583,089	2,528	0.72 (0.41–1.29)
维生素 D	14	492,939	20,434	0.84 (0.77–0.92)
维生素 A	6	1,588,466	9,351	0.97 (0.86–1.09)
B族维生素				
叶酸	8	723,200	3,495	0.77 (0.58–1.03)
抗氧化剂				
抗氧化剂	4	523,871	2,791	0.62 (0.39–0.99)
矿物质与微量元素				
硒	3	1,947	768	0.23 (0.06–0.93)
钙	5	37,261	2,041	0.76 (0.5–1.13)
多酚与黄酮类				
茶	8	307,213	4,002	0.79 (0.58–1.07)
水果与蔬菜				
豆类	2	63,479	506	0.6 (0.25–1.43)
脂肪酸与脂质				
Omega-6 脂肪酸	2	6,630	3,238	0.8 (0.69–0.91)
植物雌激素				
大豆	2	1,906	754	0.41 (0.25–0.67)
其他				
酒精	22	2,398,895	44,419	0.98 (0.87–1.11)



Exposure group

- 抗氧化剂
- B族维生素
- 类胡萝卜素
- 脂肪酸与脂质
- 水果与蔬菜
- 矿物质与微量元素
- 其他
- 植物雌激素
- 多酚与黄酮类
- 维生素 A、C、D、E、K

RR < 1 = inversely associated with ovarian cancer risk. | [*] pooled RR (size proportional to # of studies) | [] red outline = statistically significant (95% CI excludes 1.0) | [*] faded = non-significant | dashed line = 95% prediction interval