


Exposures negatively associated with ovarian cancer risk
meta-analysis of dietary-intake studies

Exposure	# of studies	Sample size	Cases	Pooled RR (95% CI)
카로티노이드				
루테인	4	529,715	3,624	0.66 (0.45-0.98)
베타-카로틴	8	611,872	4,692	0.72 (0.57-0.91)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 D	2	4,611	1,993	0.52 (0.38-0.71)
비타민 E	6	591,029	4,497	0.66 (0.48-0.92)
비타민 C	3	583,089	2,528	0.71 (0.38-1.29)
비타민 A	6	1,588,466	9,351	0.97 (0.86-1.09)
비타민 B군				
엽산	8	723,200	3,495	0.76 (0.56-1.02)
항산화제				
항산화제	4	523,871	2,791	0.59 (0.36-0.99)
무기질 및 미량 원소				
셀레늄	2	1,633	611	0.58 (0.38-0.9)
칼슘	3	36,513	1,667	0.66 (0.54-0.81)
폴리페놀 및 플라보노이드				
차	8	307,213	4,002	0.77 (0.55-1.08)
과일 및 채소				
콩류	2	63,479	506	0.58 (0.22-1.49)
지방산 및 지질				
오메가-6 지방산	2	6,630	3,238	0.78 (0.67-0.9)
식물성 에스트로겐				
대두	2	1,906	754	0.37 (0.22-0.64)
기타				
알코올	18	819,111	17,098	0.95 (0.82-1.11)
카페인	11	336,054	38,479	0.95 (0.79-1.15)



Exposure group

항산화제

비타민 B군

카로티노이드

지방산 및 지질

과일 및 채소

무기질 및 미량 원소

기타

식물성 에스트로겐

폴리페놀 및 플라보노이드

비타민 A, C, D, E, K